四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一四二册目次

證治準繩六種四十四卷（四）（明）王肯堂撰 明萬曆三十年至三十六年刻本 〇〇一

證治準繩六種四十四卷（四）

（明）王肯堂撰

明萬曆三十年至三十六年刻本

女科證治準繩自序

婦人有專治方舊矣史稱扁鵲過邯鄲聞貴婦人即為帶下醫語兼長也然帶下直婦人一病耳調經雜證懷子免身患苦百出療治萬方一帶下寧渠盡之乎世所傳張長沙雜病方論三卷婦人居一焉其方用之奇驗奈弗廣何孫真人著千金方特以婦人為首盖易基乾坤詩首關雎之義其說曰特須教子女學習此三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何憂畏也而精於醫者未之深許也唐大中初白敏中守成都其家有因免乳死者訪問名醫得昝殷備集驗

方三百七十八首以獻是為產寶宋時濮陽李師聖得產論二十一篇有說無方醫學教授郭稽中以方附焉而陳言無擇於三因方評其得失確矣婺醫杜荍又附益之是為產育寶慶集臨川陳自明良甫以為諸書綱領散漫而無統節目詳略而未備醫者局於簡易不能深求徧覽有纔進一方不効輒束手者有無方可據揣摩臆度者乃采摭諸家之善附以家傳驗方編葺成篇凡八門門數十餘體總二百六十餘論論後列方綱領節目燦然可觀是為大全良方良方出而閨閫之調將大備矣然其論多採巢氏病源什九歸諸風冷藥偏猛熱未有條分縷析其宜不者近代薛己新甫始取良方增注其立論酌寒熱之中大抵依於養脾胃補氣血不以去病為事可謂救時之良醫也已第陳氏所葺多上古專科禁方具有源流本末不可昧也而薛氏一切以己意芟除變亂使古方自此湮沒余重惜之故於是編務存陳氏之舊而刪其偏駁者然亦存什之六七而已至薛氏之之說則盡收之取其以養正為主且簡而易守雖子女學習無難也若易水瀔水師弟則後長沙而精於醫者一方一論具掇是中迺它書所無有挾是而過

邯鄲庶無道少之患哉其積德求子與夫安產藏衣吉凶方位皆非醫家事故削不載云稿成而兵憲蔡虛臺公明府涂振任公助之貲刻行之以為此亦二公仁政萬分之一遂不復辭

萬厯丁未早秋念西居士王肯堂宇泰甫書於無住菴

女科證治準繩目錄

卷之一

治法通論

通治婦人諸疾

四物湯加減治雜病例　芎歸湯

異香四神散　玉仙散　烏犀丸

蒲黃黑神散　養犬散　濟陰丹

南岳魏夫人濟陰丹　皺血丸

加味五積散　卷柏丸　烏雞煎丸

小白薇丸　白堊丹　琥珀澤蘭煎

內灸散　勝金丸　沉香煎丸

龍骨散　妙應丹　萬應紫菀丸

溫白丸

調經門

經候總論

四物加黃芩黃連湯　當歸飲

七沸湯　四物加黃芩白朮湯　四物加葵花湯

四物加熟地黃當歸湯　先期後期先期湯

金匱土瓜根散　過期飲　滋血湯

調經半劑簡易當歸散　人參養血丸　逍遙散

增損四物湯　澹寮煮附丸　沉香降氣散

嚴氏抑氣散　紺珠正氣天香湯　東垣益胃升陽湯

調經峻劑大溫經湯　小溫經湯　溫經湯

滋血湯　加味吳茱萸湯　桃仁散

蒲黃散　紫石英丸　煖宮丸

內補當歸丸　熟乾地黃丸　禹餘糧丸

鹿茸丸　升陽舉經湯

調經破血之劑紅花當歸散　大玄胡索散

鼈甲丸　月痛越痛散　腹痛海藏八物湯

琥珀散　交加散　交加地黃丸

大全交加散　桂枝桃仁湯　玄胡索湯

三神丸　柴胡丁香湯　沒藥除痛散

加味烏沉湯　熱入血室加味小柴胡湯　乾薑柴胡湯

海蛤散　月水不斷膠艾湯　續斷丸

禹餘糧丸　牡蠣丸　伏龍肝散

固經丸　月水不利牛膝散　牡丹皮散

産寶方　養榮湯　過[illegible]不止芩心丸

茸附湯　補中芎藭湯

經閉

五補丸　衛生湯　大全萬病丸

土牛膝散　當歸散　琥珀散
產寶方　千金桃仁煎　三稜丸
紅花當歸散　通經丸　滋血湯
掌中金丸　礬石丸　柏子仁丸
澤蘭湯　沉香鼈甲散　劫勞散
麥煎散　牡丹散　六神湯
桃仁散
血崩
固經丸　旋覆花湯　半夏丸
備金散　縮砂散　五靈脂散

當歸芍藥湯　栢子仁湯　益胃升陽湯
調經升陽除濕湯　柴胡調經湯
獨聖散　加減四物湯　黃芪當歸人參湯
地黃丸　凉血地黃湯　小薊湯
芎藭酒　奇効四物湯　金華散
丁香膠艾湯　芎藭湯　斷下湯
熟附丸　鹿茸丸　赤龍丹
紫金散　白芷煖宮丸　和劑震靈丹
牡蠣散　栢黃散　伏龍肝散
地榆散　鹿茸散　栢葉散
補宮丸　鎮宮丸　十灰丸
十灰散　一笑散　香礬散
琥珀散　神應散　楊氏黑金散
如聖散　烏金散　梅飲子
赤白帶下
樗皮丸　固腸丸　乳香散
伏龍肝散　馬蹄丸　白芷散
補經固真湯　補真潤腸湯　白斂丸
當歸煎　牡蠣散　茯苓散
卷栢丸　艾煎丸　沉香牡丹丸

紫桂丸　固真丸　茅花散
苦楝丸　地榆膏　麒麟竭湯
豆花散　調經補真湯　地黃丸
桂附湯　二豆散　鶴頂丸
濟生白垩丸　養氣活血丹　茱萸浴湯
坐藥龍鹽膏　勝陰丹　回陽丹
小酒煮當歸丸　當歸附子湯　白礬丸
温經湯　益母散　玳瑁丸
神仙聚寶丹
白濁白淫

蒼黃散　内金鹿茸丸　烏金散
加味四七湯　鎖精丸　固精丸
卷之二
雜證門上
虛勞
增損四物湯　六神湯　加減大建中湯
清氣湯　黃芪散　四白散
桔梗飲子　如聖散　劫勞散
筒骨煎　補中丸　溫中丸
人參丸　秘方十補丸　五聖丸

七補丸　羊乳丸　人參鱉甲丸
艾煎丸　芪味丸　大聖散
渾身碎痛飲子　當歸木香湯　木香丸
煮肝散　硇砂煎丸　黃芪散
逍遙散　子芩散　知母散
半夏散　秦艽散　鱉甲地黃湯
胡黃連散　犀角散　紅藍花散
鱉甲散　豬肚丸　胡黃連丸
益母草煎丸　青蒿丸　鱉甲丸
雞蘇丸　得効方河車丸　黃芪丸
地黃煎丸　人參散　赤茯苓散
天門冬丸　麥煎散　牡丹湯
鱉甲丸　柴胡散　黃連散
青蒿散　豬肚丸　石膏散
青蒿鱉甲煎丸　天靈蓋散　益母草丸
獺肝丸　殺鬼方　溫金散
補肺湯　瓜蔞湯　人參荊芥散
地骨皮散　地黃煎　乞力伽散
大効油煎散　馬鞭草散　琥珀散
茯神散　逍遙散　熟乾地黃散

琥珀丸　鱉甲丸　牡丹丸
柴胡丸
客熱
麥門冬散　犀角散　黃耆飲
丹砂散　玉霜散　生乾地黃丸
寒熱
地骨皮散　生地黃散　異功散
七寶湯　柴胡散　桃仁丸
青蒿散　生地黃丸
惡寒

中風
防風散　芎藭散　附子散
羌活散　南星散　木香煮散
白僵蠶散　羚羊角散　紫湯
烏蛇丸　口噤天南星散　走馬散
烏蛇散　白朮酒　不語神仙解語丹
防風湯　竹瀝湯　手足不隨三痹湯
獨活湯　烏蛇散　東垣羌活湯
甘艸附子湯　獨活湯　續命煮散
補遺防風白朮牡蠣散　賊風偏枯大八風湯

增損茵芋酒　續斷湯　補遺全生虎骨散
虎脛骨酒　偏風口喎防風湯　深師續命湯
防風散
飛尸血厥
白薇湯　倉公散　補遺内鼻散
硫黃散
痓痙
顫振
交加散　增損柴胡湯　本事青鹽丸
本事星附散　三因獨活散　世傳茯苓丸

驚悸
茯神散　龍齒丸　朱貢琥珀散
茯苓補心湯　茯神湯　酸棗仁丸
定志丸　養心湯　硃砂安神丸
治要茯苓散　失血心神不安寧志膏　茯苓補心湯
妙香散　半夏湯　獨參湯
顛狂
防風散
血風煩悶
酸棗仁散　紫石英散　當歸散

赤芍藥散
血風攻脾不能食
草豆蔻散　訶梨勒散　神麴丸
進食散
身體骨節疼痛
芎藭散　海桐皮散　虎骨散
何首烏散　通靈丸　當歸沒藥丸
四生丸　羚羊角散　羌活勝濕湯
走疰痛
沒藥散　琥珀散　虎骨散

雄黄散　漏蘆散　麝香丸
芎藭知母湯　附子八物湯
頭目眩暈
養正丹　釣藤散　獨活散
川芎散　四神散
頭痛
旋覆花湯　七生丸　白附子散
川芎茶調散　玉真丸　硫黄丸
心痛
烏藥散　阿魏丸　雞舌香散
應痛散　陳氏二神丸　陳日華抽刀散
心腹痛
三神丸　沒藥散　延胡索散
琥珀散　瑞金散　牡丹散
八仙散二方　玄胡索湯　大效琥珀散
蠲痛散　沒藥散　菖蒲丸
手拈散　木香枳朮丸　木香化滯湯
小腹痛
威靈散　當歸散　追氣丸
石灰散　吳茱萸湯　椒紅丸

項筋強痛
追風散　急風散　蝎附散
木瓜煎
兩脇脹痛
靈寶散　草豆蔻散　菴䕡子散
人參紫金丸　氣針丸　木通散
三脘散　左金丸　當歸龍薈丸
補肝散
腰痛
如神湯　獨活寄生湯　舒筋散
腰腳疼痛
虎骨丸　仙靈脾散　藁本散
敗龜散　骨碎補散　附子散
養腎散
臂痛
栢子仁丸　舒筋湯　茯苓丸
控涎丹　白芥子散　流氣飲
秦艽地黄湯
腳氣

大腹皮散　紫蘇飲　四白散
蒼朮丸
癮疹瘙痒
何首烏散　蒺藜飲
卷之三
雜證門下
痰飲
旋復花湯　天南星丸　大半夏湯
導痰湯
咳嗽
黃芪散　蛤蚧丸　含化丸
貝母湯　定喘湯　補肺湯
金不換散　古今錄驗橘皮湯　深師四滿丸
團魚丸　參朮調中湯　噙化丸
喘滿
杏子散　橘皮半夏湯　葶藶丸
神授湯　天門冬丸
嘔吐
益智子散　丁香散　竹茹湯
良方槐花散　許仁則半夏丸　人參七味丸

青金丹　人參安胃散
霍亂
加減理中丸　四順湯　四逆加猪膽汁湯
香薷散　訶子散　胡椒湯
翻胃吐食
白壇散　白芷散　大倉丸
東垣補真丸
血膈
牡丹煎
鼻衄
刺薊散　伏龍肝散
吐血
雞蘇散　柔脾湯　四生丸
犀角地黃湯　青餅子　乾薑甘草湯
花蕊石散　濟生雞蘇散　生地黃散
三因茯苓補心湯　麥門冬飲子
積聚癥瘕
通用諸氣順氣丸　勝紅丸　香稜丸
大消石丸　阿魏膏　黃疸皂莢散
血瘕桃仁煎　三稜煎　癥瘕穿山甲散

蓬莪茂丸　丁香丸　桃仁散
食癥 硇砂丸　礞石丸　小三稜煎丸
血癥 大黃丸　中脘血癖 調榮湯　川當歸散
大黃湯　琥珀散　地榆散
疾癖 麝香丸　蔥白散　四等丸
木香硇砂丸　當歸散　血癥 乾漆散
當歸散　硇砂丸　巴豆丸
黑神丸　蟠蔥散　寶鑑蒺藜湯
丹溪定痛散

心腹脹滿

白朮散　檳榔散　木香散

嘈雜

旋覆花湯

小便淋瀝

石韋散　木通散　桃膠散
金沙散　雞蘇散　火府丹
滋腎丸　黃芩清肺飲　五淋散

脬轉不得小便

滑石散　葵葉散　石韋湯
蔥白湯　滋腎生肝飲

小便數

鹿茸散　桑螵蛸散　補遺縮泉丸

遺尿失禁

鹿茸丸　補遺秘元丸

小便出血

大全鹿茸散　髮灰散　生乾地黃散
當歸散

大便下血

加減四物湯　腸風黑神散　地榆湯
防風如神散

大便不通

通神散　大麻仁丸　皂角丸
潤腸丸　搜風順氣丸　子和脾約丸
蒺藜湯　大五柔丸　二仁丸

大便或祕或利

蜜兌法　補遺通氣散

泄瀉

香朴丸　桂香丸　豆蔻分氣飲
豆蔻丸　人參豆蔻散　木香散
香連丸　防風芍藥湯　滲濕湯

如金丸　茯苓湯　白朮芍藥湯
胃苓散　五香散　二神丸
五味子散　固腸丸
協熱下利
玉粉丸　四味阿膠丸
滯下
白頭翁湯　神朮散　六神丸
三黃熟艾湯　四順附子湯　三建丹
加朮茱附湯　香茸丸　調中湯
胃風湯　水煮木香丸　戊己丸

升陽除濕防風湯　三黃丸　芍藥湯
痢後嘔噦
橘皮乾薑湯　半夏生薑湯　丁香柿蒂湯
橘皮竹茹湯　生薑橘皮湯　退陰散
豬苓湯　補遺倉廩湯
痔瘻
鱉甲散
脫肛
升陽除濕湯
前陰諸疾

陰瘡 菖蒲散　麻黃湯　白礬散
陰痒 大黃散　陰腫 太和湯　海螵蛸散
陰痛 補心湯　藿香養胃湯　黃芩湯 十方
雄黃散　當歸湯　陰脫 下墜 三茱丸
一捻金丸　黃芩散　陰冷 五加皮酒
傷丈夫頭痛 桑白皮湯
與鬼交通
茯神散　桃仁丸　辟瘟丹
殺鬼雄黃散　別離散　朱砂散
卷之四

胎前門
求子
六味地黃丸　螽斯丸　抑氣散
大五補丸　增損三才丸　紫石門冬丸
白薇丸　趙氏蓯蓉菟絲子丸　加味香附丸
調經丸　正元丹　溫胞湯
坐導藥　蓯蓉丸　千金種子丹
紫桔丸　五子衍宗丸　十子丸
趙氏加味六丸
候胎

驗胎散　探胎散
胎產大法
保生丸　交感地黃煎丸　琥珀丸
龍齒湯　佛手散　返魂丹
內灸散
逐月養胎法
烏雌雞湯　補胎湯　艾葉湯
黃連湯　雄雞湯　茯神湯
菊花湯　調中湯　阿膠湯
安中湯　安胎當歸湯　麥門冬湯

柴胡湯　旋復花湯　葱白湯
杏仁湯　芍藥湯　葵子湯
丹溪縮胎丸　半夏湯　豬腎湯
丹溪縮胎丸　滑胎枳殼散　內補丸
易產滑胎散　神寢丸　榆白皮散
保氣飲　無憂散　縮胎飲非達生散
黑神丸
惡阻
乾薑人參半夏丸　半夏茯苓湯
茯苓丸　旋復半夏湯　旋復花湯

白术散　人參丁香散方二　醒脾飲子
人參橘皮湯　歸原散　安胎飲
小地黃丸　保生湯　白术散
二香散
胎動不安
永固孕湯　當歸散　白术散
阿膠散方二　立効散　寄生湯
黃芪湯　順氣飲子　安胎寄生湯
秦艽湯　小品止痛湯　黃芩湯
鉤藤湯　葱豉安胎湯　安胎織罩散

銀苧酒　鯉魚臛
胎上逼心
本事紫蘇飲　當歸湯
妊娠經來　漏胎下血
濟生如聖湯　桑寄生散　鄭氏人參散
羅氏立聖散　二黃散　地黃湯
保命枳殼湯　子芩丸　防風丸
防風黃芩丸　桂枝茯苓丸　榆白皮散
胎漏黃汁下或如豆汁
跌僕傷胎毒藥傷胎

催生神妙佛手散　竹茹酒
補遺安胎散　奪命丸
心痛
火龍散　白朮湯
心腹痛
當歸芍藥散　阿膠散　芎歸湯
草豆蔻散　香蘇散
腹痛
地黃當歸湯
小腹痛
腰腹及背痛
通氣散　五加皮散　五加皮丸
大地黃丸　紫酒　小品苧根湯
心腹脹滿
倉公下氣湯　訶梨勒散　安胎和氣飲
枳殼湯　附子湯
胎水腫滿
天仙藤散　葶藶子散方二　澤瀉散
防己湯　千金鯉魚湯　腎著湯
消迷五皮散　全生白朮散

腹內鐘鳴
積聚
孕癰
傷食
木香丸　白朮散　鄭氏勝金散
中惡
當歸散
中風
防風散　生犀角散　防己散
獨活散　白僵蠶散　赤箭丸
白朮散
風痙
羚羊角散　葛根湯　羌活酒
痰涎
眩暈
消風散　犀角散
驚悸
大聖散
瘖
煩口乾附

竹葉湯　竹瀝湯　竹茹湯
知母飲　麥門冬湯　麥門冬散方三
柴胡散　人參散　一母丸
煩躁口乾升麻散　知母散　葛根散
人參黃芪散
吐血衄血咳唾血
局方必勝散
咳嗽
款冬花散　桔梗散　馬兜鈴散
麻黃散　百合散　紫菀湯
喘
平安散
瘧
驅邪散　七寶散　柴胡散方三
霍亂
人參白朮散　人參散　白朮散
木瓜煎　縮脾飲
泄瀉
加味理中湯
滯下

大寧散　黃連湯　厚朴散
草果飲
大小便不通
甘遂散　豬苓散　葵子湯方二
當歸散　大腹皮湯
小便不通
葵子茯苓散　苦參丸　獨聖散
淋
地膚大黃湯　安榮散　大腹皮散
遺尿
桑螵蛸散
尿血
續斷湯　補遺蒲黃湯
眼目
天門冬飲子
臟躁悲傷
甘麥大棗湯　淡竹茹湯
妊病可下胎斷胎
胎自墮
濟生芎藭補中湯　阿膠湯

杜仲丸　四製艾附丸　生地黃湯
人參湯　人參黃芪湯　龍骨散
當歸酒　烏金散　紅藍花散
白蜜湯　豬骨飲　當歸湯
地黃湯　澤蘭湯　蒲黃酒
當歸川芎湯　芎歸湯　當歸散
聖愈湯　當歸補血湯　四物二連湯
全生活血湯
胎不長
安胎白朮散　黃芪散　人參丸

枳實檳榔丸
日月未足欲產過期不產
集驗知母丸　槐子丸
鬼胎
雄黃丸
臨產坐草法
蛇蛻散
催生法
催生如聖散　柞木飲子
乳朱丹二方　開骨膏　催生丹一名兔腦丸
如意散　勝金散　催生湯
易產天麻丸　如聖散　無憂散
催生如聖散　半夏湯　七聖散
勝金散　如聖膏　萬金不傳遇仙丹
立聖丹　如神散　勝金丹
加味芎歸湯
下死胎法
烏金散　一字神散
卷之五
產後門

產後通用方
加味四君子湯　四順理中丸
地黃丸　四味湯　玉露散
地黃煎　地黃酒　桃仁煎
產後腊壅　黑神散　琥珀散
千金增損澤蘭丸　黑龍丹
胞衣不下
奪命丹　花蕊石散　芎歸散
必效牛膝湯　牛膝散　千金備急丹
下胎丸

血暈
清魂散　保命荊芥散　來甦散
芎歸湯　獨行散　奪命散
紅花散　牡丹散
血不下
荷葉散　沒藥丸
血不止
芎歸加芍藥湯　獨聖湯　牡蠣散
豆淋酒
心痛
七氣手拈散　大岩蜜湯　失笑散
經心蜀椒湯
腹痛
延胡索散　黑神散　黑白散　地黃散
當歸血竭丸　溫隱居澤蘭湯　蓉荷散
産乳芍藥散　枳實芍藥散　下瘀血湯
千金桃仁芍藥湯　延胡索散
香桂散　紫金丸　當歸養血丸
當歸生薑羊肉湯　內補當歸建中湯
濟生增損四物湯

脇脹痛
當歸散　抵聖湯
腰痛
千金大豆酒　生地黃湯　桃仁湯
五香連翹湯　當歸黃芪湯
頭痛
川芎散　一奇散　芎附散
加減四物湯
脚氣
獨活寄生湯
遍身疼痛
趁痛散
中風
防風湯　川芎散　經効茯苓湯
鹿肉湯　保命血風湯　華佗愈風散
虛極生風濟危上丹　葛根湯　乾葛湯
天麻散　當歸散　伏龍肝散
交加散　角弓反張羚羊角散　一物獨活湯
一物白鮮湯　千金雞矢醴　大豆紫湯
大豆湯　羚羊角飲子　防風當歸散

瘈瘲
防風湯　增損柴胡湯　秦艽湯
拘攣
芎藭散　防巳膏
不語
七珍散　胡氏孤鳳散　逐血補心湯
狂言譫語
烏金散　四物補心湯
顛狂
大聖澤蘭散
乍見鬼神
調經散　茯神散　柏子仁散
驚悸
白茯苓散　熟乾地黃散　產乳七寶散
大効牡丹散　遠志丸　白茯苓丸
人參散　琥珀地黃散　茯苓散
抱膽丸
恍忽
琥珀散　遠志散　天麻丸
辰砂遠志丸

虛煩
金黃散　沒藥丸　竹葉湯
甘竹茹湯　人參當歸湯　蘆根湯
芍藥梔豉湯　仲景三物黃芩湯　竹皮大丸
渴
熟地黃湯　黃芩散　栝蔞根湯
千金竹葉湯　七味白朮散　竹葉歸芪湯
玄胡索散　桃花散
自汗
全生活血湯　麻黃根散二方　止汗散
人參湯　當歸六黃湯　參附湯
芪附湯
黃疸
發熱
羅氏犀角飲子　三之一湯　三分散
加味逍遙散
往來寒熱
柴胡四物湯　小柴胡加生地黃湯　增損柴胡湯
雲岐熟地黃散　黃芪丸　大調經散
加減烏金散　知母湯

瘧
草果飲子　生熟飲子
蓐勞
石子湯　豬腰子粥　人參鱉甲散
白茯苓散　胡氏牡丹散　黃芪煮散
黃芪建中湯
虛羸
三合散　當歸羊肉湯　十全大補湯
痞悶
見睍丸

腹脹
小調經散　白朮湯　奪魂散
水腫
漢防己散　加減吳茱萸湯　加減八物湯
積聚
芍藥湯　四神散　桂心丸
霍亂
白朮散　溫中散　附子散
嘔吐
高良薑散

開胃散　石蓮散
吃逆
丁香散　羌活散
咳嗽
知母飲
喘
血竭散　小參蘇飲　旋覆花湯
五味子湯　人參湯
鼻衄
血崩

固經丸　芎藭湯加芍藥方　熟乾地黃散
白芍藥散　阿膠丸　菖蒲酒
瑞蓮散
月水不調
琥珀散　蒲黃丸
月水不通
瀉利
調中湯
赤白痢
救急散　黃連丸　白頭翁加甘草阿膠湯

大便秘澁
麻仁丸
大小便不通
桃花散
遺尿
淋閟
茅根湯　滑石散
小便數
桑螵蛸散　括蔞湯
小便不禁
固脬散　補遺補脬飲　雞內金散
小便出血
大便下血
陰脫玉門不閉
硫黃散　桃仁膏　硫黃湯
熨法　當歸散
陰蝕
洗搨湯　甘濕散　狼牙湯
乳少
漏蘆散　湧泉散　成煉鍾乳散

玉露散　羅氏湧泉散　吹妳括蔞散
皂角散　妬乳連翹湯　赤龍皮湯
天麻湯　飛烏膏散　黃連胡粉膏散

金壇王肯堂輯　門人南昌張綍校

治法通論

保婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆從屬厥陰天癸既絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰者是祖氣生化之原也厥陰與少陽相表裏故治法無犯胃氣及上二焦爲三禁不可汗不可下不可利小便若發汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥制藥之法能不犯此三禁則榮衛自和而寒熱止矣外則和

於榮衛內則調於清便先將此法爲初治次後詳而論之見證消息同壞證傷寒爲之緩治或小便不利大便秘結或積熱於腸胃之間或已成痰或散血氣而爲浮腫蓋產理多門故曰同傷寒壞證如發渴而用白虎氣弱而用黃耆血刺痛而用當歸腹痛而加芍藥已上例證不犯三禁謂產後之久病也若產後暴病又不可拘也如產後熱入血室者用桃仁承氣抵當湯等藥胃堅燥若大承氣不可以泄藥言之產後世人多用烏金四物湯是不分四時之寒熱不分血氣之虛實皆然一槩用藥如此而愈加困劇是誤也大抵產病天行則增損柴胡雜證則加減四物又春夏從柴胡秋冬從四物藥性寒熱病證虛實不可不察也四物湯常宜服何今立四時增損法於後

[illegible]四物湯　益榮衛滋氣血治月水不調臍腹㽲痛婦人經病或前或後或多或少疼痛不一腰足腹中痛或崩中漏下或半產惡露過多或停留不出妊娠腹痛下血胎不安產後血塊不散或亡血過多惡露不止四物湯加茱萸煎服若人陽臟少使茱萸陰臟多使茱萸一方加香附

熟地黃　補血如臍痛非此不能除乃通腎經之藥也

川芎　治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥也

芍藥　和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也

當歸　和血如血刺痛非此不能除乃通肝經之藥也

右爲麁末水煎服

春倍川芎　一曰春二曰脈弦三曰頭痛

夏倍芍藥　一曰夏二曰脈洪三曰泄

秋倍地黃　一曰秋二曰脈澀三曰血虛

冬倍當歸　一曰冬二曰脈沉三曰寒而不食

若春則防風四物加防風倍川芎　若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥　若秋則門冬四物加天門

冬倍地黃　若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸
若血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹
痛六合　若風眩運加秦艽羌活謂之風六合
若氣虛弱起則無力尪然而倒加厚朴陳皮謂之
氣六合（厚朴不可用當用人參黃芪之屬）　若發熱而煩不
能睡臥者加黃連梔子謂之熱六合　若虛寒脈
微自汗氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒
六合　若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯
苓謂之濕六合　若婦人筋骨肢節疼及頭痛脈
弦憎寒如瘧宜治風六合或傷損氣血乘虛而暈

若四物湯（兩）羌活防風（各半兩）　若血氣上衝心腹
脇下滿悶宜治氣六合四物湯（兩）木香檳榔（各壹）
若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜玄胡六合
（小腹痛）四物湯（兩）玄胡苦楝（碎各炒焦）　若氣衝經
脈故月事頻併臍下多痛宜芍藥六合四物湯（兩）
芍藥（兩）黃芪（兩）　若經事欲行臍腹絞痛臨經痛
若血澀也宜八物湯四物湯（兩）玄胡檳榔苦楝（炒）
（焦）木香（各壹兩）　若婦人血虛心腹疞痛不可忍者
去地黃加乾薑名四神湯　補下元加乾薑甘草（兩）
甘草七分　氣築小腹痛加玄胡索煎服　若腹

中刺痛惡物不下倍加當歸芍藥　若腹痛作聲
經脈不快加熟地黃一倍添桂心半倍煎　經行
腹痛腰背痛加萆薢牛膝紅花吳茱萸菴閭甘草
銀器煨心熱服　若經水澀少宜四物湯內加葵
花煎又加紅花血見愁　若經水少而色和者四
物湯加熟地黃當歸（各壹兩）　若經水暴下四物湯
內加黃芩若腹痛加黃連如夏月不去黃芩　若
經水如黑豆汁者加黃芩黃連（各壹兩）　若經水過
多別無餘證宜黃芩六合湯四物湯（兩）黃芩白朮
（各壹兩）　經血淋瀝不斷加乾瑞蓮房炒入藥　陰

陽交合經脈行加赤石脂黃芪肉桂百草霜藕節
敗棕灰肉豆蔻當歸木香龍骨白朮茯苓地榆
若經水適來適斷或有寒熱往來者先服小柴胡
湯以去其寒熱後以四物湯和之如寒熱不退勿
服四物是謂變證表邪猶在不能效也依前論中
變證隨證用藥調治　若血崩者加生地黃蒲黃
補血住崩加百草霜棕櫚灰首絲灰蒲黃炒過龍
骨白薑　血成片加地黃藕節　黑血片人參白
朮　若血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾　月
水不調血崩或多少或前後嘔逆心膨陳艾黃芪

若赤白帶下宜香桂六合四物湯四兩桂枝香附各錢五　四物湯為細末煉蜜丸梧子大空心米飲下三四十丸治年高婦人白帶良驗　白淫濁龍骨地黃當歸　五色研麝香好酒　鮮紅溫酒鹽湯　帶下加肉桂蒲黃白芍藥甘草黑豆白术玄胡索白薑龍骨空心鹽酒下　白帶加白龍骨酒下　若婦人血積者加廣茂京三稜桂乾漆炒煙盡各等分　若經血凝澀腹內血氣作疼加廣茂官桂等分用之王石肩云熟地黃滯血安能止痛不若以五靈脂代之　血滯不通加桃仁紅花各貳錢半

經閉加枳殼大黃荊芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔子車前子　血寒加甘草烏梅柴胡桃柳枝　月經久閉加肉桂甘草黃芪薑棗千木通紅花　月水不通加野苧根牛膝紅花蘇木酒水同煎　血氣不調加吳茱萸各兩甘草半兩　四物湯加甘草半兩為細末煉蜜丸每兩作八九酒醋共半盞煎湯同化調下名當歸煎去敗血生好血如人行五里再進一服無時　若虛熱煩四物湯與參蘇飲相合名補心湯主之　添柴胡名五神湯大能補虛退虛熱　潮熱加黃芩

地骨皮柴胡一方加柴胡乾葛黃芩人參　虛熱口乾加麥門冬黃芩各兩　虛渴加人參乾葛烏梅栝蔞根　虛而多汗加煅牡蠣麻黃根各半兩　虛寒潮熱加柴胡地骨皮白术茯苓甘草秦艽知母黃芩麥芽貝母人參烏梅棗子　若四肢腫痛不能舉動宜與蒼术各半湯主之　若大便燥結四物湯與調胃承氣湯各半名玉燭散主之　若流蒸潤燥宜四物理中各半湯　若氣血俱虛四物與四君子湯各半名八珍湯主之加硃砂仁保胎氣令人有子　有熱加黃芩　若內熱生風者加

川芎柴胡防風　血氣痠加荊芥柴胡　血風兩腦築痛或盤腸成塊加大黃蓽撥乳香　血弱生風四肢痺疼行步艱難加人參乳香沒藥麝香甘草五靈脂羌獨活防風荊芥地龍南星白附子澤蘭為末蜜丸木瓜鹽湯下　血風膨脹加甘草木香枳殼馬兜鈴葶藶紫蘇藿香地黃空心服　臟腑祕加大黃桃仁　滑泄加官桂附子　虛滑加人參川芎白芷蒲黃炒阿膠白术吳茱萸續斷乾薑附子肉桂黃芪赤石脂甘草為末蜜丸鹽梅湯下　嘔加白术人參生薑一方加　嘔吐不止加藿香白

子142 021

术半兩人參貳錢半、嘔逆飲食不入加白术丁
香甘草人參縮砂益智仁胡椒、若欬嗽加桑白
皮半夏人參生薑北五味子甘草、感風勞嗽加
欵花知母阿膠半夏麻黃甘草馬兜鈴貝母杏仁
柴胡薑錢訶子烏梅、若發寒熱加乾生薑牡丹
皮柴胡一分加各等　如寒熱往來加炮乾薑牡丹皮
參各等分　若平常些少虛弱服體瘦倦月信不通只用
生薑薄荷此是婦人常服之藥溫味涼而性緩效
遲而功濃　若大渴加知母石膏　若水停心下
微吐逆者加豬苓茯苓防巳　若心腹脹滿加枳

殻青皮　虛汗加麻黃根　汗多加浮麥　大便
下血四肢寒膨脹腸胃有風槐花枳殻消瘋荊芥
木香白鷄冠花木通紅內消紫草石榴皮陳皮青
皮黃芩甘草白茅根槐角　腸風下血加槐角槐
花枳殻荊芥黃芩大腹皮紅內消地榆石楠葉白
鷄冠花爲散煎一半爲末空心鹽湯舊酒調下
鼻衄吐血加竹青蒲黃藕節半夏丁香訶子桂花
紅棗飛羅麪白茅根蚌粉　若頭昏項強加人參
黃芩　若虛寒似傷寒者加人參柴胡防風　若
虛煩不得睡加竹葉人參　若諸病有濕者四物

與白术相半加天麻茯苓穿山甲用酒煎服　治
老人風秘加青皮等分煎服　治瘡疾荊芥酒煎
常服　婦癰加連翹天蓏子紅內消白芷瓜片荊
芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏蘆生地黃　赤眼頭
風疾加薄荷清茶　赤眼生風加防風黃芩　風
瘡赤腫加荊芥牛蒡子何首烏甘草防風羌活地
黃鹽酒　脚腫加大腹皮赤小豆茯苓皮生薑皮
若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜八物
湯四物湯加黃芪白术茯苓甘草各等分　若妊娠
傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而

弱太陽經病宜表虛六合湯四物湯加桂枝地骨
皮各七錢　若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊太
陽經病宜表實六合四物湯加麻黃細辛各半兩
若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭
痛此太陽標病也宜風濕六合湯四物湯加防風
蒼术各七錢　若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發
斑如錦紋宜升麻六合四物湯加升麻連翹各七錢
若妊娠傷寒胸脇滿痛脈弦少陽頭昏項強
宜柴胡六合四物湯加柴胡黃芩各七錢　若妊娠
傷寒大便鞕小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本

子142 022

病也急下之宜大黃六合四物湯（四物四兩）大黃（一兩）桃仁（十箇去皮尖炒）　若妊娠傷寒汗下後欬嗽不止宜人參六合湯　四物湯（四兩）人參　五味子（各半兩）　若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合湯亦治欬嗽喘滿　四物湯（四兩）厚朴　枳實（炒各半兩）　若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合湯　四物湯（四兩）梔子　黃芩（各半兩）　若妊娠傷寒身熱大渴而煩脈長而大者宜石膏六合四物湯　四物湯（四兩）石膏　知母（各半兩）　若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜茯苓六合湯　四物湯（四兩）茯苓　澤瀉（各半兩）　若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合湯　四物湯（四兩）琥珀　茯苓（各半兩）　若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣損者宜膠艾六合湯　四物湯（四兩）阿膠　艾（各半兩一方加甘草一方如前加甘草同上）　若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合湯　四物湯（四兩）附子（炮去皮臍）　桂（各半兩）　若妊娠傷寒蓄血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯　四物湯（四兩）生地黃　大黃（酒浸各半兩）　四物與麻黃桂枝白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆可作各半湯不能彌述此易老用藥大畧也　安

胎及滿胎下血加阿膠大艾甘草蒲黃炒過　若胎動不安下血不止每服加艾葉五七片更加葱白阿膠木黃芩減四味之半當歸只用小半如疾勢甚者以四味各半兩細剉以水四盞熬艾一塊如雞子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分作四服一日令盡　一方加粉草乾薑黃芪（各一錢）服至二劑　胎前產後每日可一二服亦治血痢不止腹痛難忍宜加阿膠艾葉煎服名六物湯　如氣虛血海不調不妨一方四物加黃芪柏葉阿膠甘草續斷平常經血淋瀝不斷或多或少或赤或白非時漏下多服有効　受胎小腸氣痛加木香　傷食脹前嗽加枳殼甘草款冬知母馬兜鈴半夏　大小便不通產後人參若模麥門冬　胎氣衝肝腰腳痺行步艱難加枳殼　大便不通加荊芥地黃羌獨山梔目甘草燈心空心服　妊娠心煩加竹茹一塊　如有敗血則用當歸近上節白芍藥以赤易熟地黃以生者　妊娠作惡生寒面青不思飲食憔悴加陳皮枳殼白术茯苓甘草　損胎下血不止頭痛寒熱耳鳴氣血勞傷所致加黃芩荊芥生地黃赤芍藥小茴　臨產小腹緊痛加紅花滑石甘

草燈心茯子　產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木
牛膝　產後腹痛血塊攻脇加大艾沒藥好酒
若因產後欲產中惡致新補血海治諸疾加生薑煎
若產後被種種積滯敗血一月內惡物
微少敗血作病或脹或疼胸膈痞悶或發寒熱四
肢疼痛加玄胡索沒藥香白芷與四物等分為細
末淡醋湯或童子小便酒調下　如血風於產後
乘虛發作或產後傷風頭疼發熱百骨節痛每四
物湯兩加荊芥穗天麻香附子石膏藿香各貳錢五分
每服三錢水一盞煎至七分服　產後傷風頭痛

加石膏甘草　若產後虛勞日久而脈浮疾
者宜柴胡四物湯乃本方與小柴胡湯合用也
若產後諸證各隨六經以四物與仲景藥各半服
之甚效　產後虛煩發熱煩悶加生地黃　產後
腹脹加枳殼肉桂各　產後寒熱往來加柴胡
麥門冬各半　產後敗血築心加地骨皮芍藥
產後潮熱加白朮北柴胡甘草牡丹皮地骨皮
產後病眼加北細辛羌活荊芥甘草木賊石
決明草決明　產後淋瀝木通
加牡丹皮荊芥小薊大黃杏仁

半夏烏梅飲生薑葱白薄荷　產後失音不語加
訶子人參沙蜜百藥煎　產後悶亂加茯神遠志
各半兩　胎前產後痢後風加乳香龍骨茱萸木香
肉桂蒼朮牡丹皮白薇人參甘草澤蘭大椒藿香
煉蜜為丸木瓜酒下　一方等分為麄末每服四
錢水一盞半煎至八分去滓取六分清者帶熱食
前服若平常血氣不調及常服只用本方日二三
服　一方為細末湯酒調服或以醋糊煉蜜為丸
治帶下赤白痢陳米飲下　心腹脹炒薑酒下
血氣艾醋湯下　渾身勞倦為末炒薑酒陳青
蒿鹽和調下　虛證四肢黃甘草牡丹皮澤蘭白

薇蒼朮桂心藿香蜜丸鹽湯溫酒下　陳氏經驗
方云吳興周端仁郎中頃赴省試照曉一醫云其
本醫家凡婦人百病只以四物湯加茱萸無不效
者產難及胎衣不下子死腹中入酒同煎凡用有
效謹以此為報此藥不知起於何氏或云自魏華
陀陀之術精微方類單省傳稱陀鍼灸不過數處
千金方云自三代以來醫方藥論未有如此詳備
其間有湯圓名公諸方今[illegible]乃宋崇時節度
總管錢唐所撰其中有內經散後條入聖惠方自

後醫者易啟發湯證用者若馭良馬當隨意無不
得全爲命名醫於四物中增損品味隨意虛實寒
燠皆得其要者然亦非止婦人之疾可用而已
芎歸湯 又九 治一切去血過多眩運悶絕傷胎去血
產後崩中去血拔牙去血金瘡去血不止舉頭欲
倒悉能治之
當歸　川芎 各等分
右每服五錢水煎服不拘時　產後眩暈加芍藥
產後腹痛不可忍加官桂童便酒浸　妊娠子
死或不死胎動酒水合煎即下未死者即安　若

虛損腹痛少氣頭眩自汗每服加羊肉壹兩生薑
十片水煎　若臨月服之則縮胎易生　若室女
婦人心腹疞痛經水不調水煎服　若妊娠胎氣
不安產後諸疾酒煎服　若難生倒橫子死腹中
先用黑豆壹大合炒熟與小便合煎服　若難產
用百草霜香白芷等分童便好醋各一盞沸湯浸
服甚者再服即分娩矣　若傷臟毒每服加槐花
末五分三日取下血塊即愈若吐血亦服此　若
血氣上喘下腫空心煎艾湯調下　若產後惡血
注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑自然汁

煎服　若產後頭痛加荊芥　若崩中漏下失血
不止加炒香附每兩入甘草壹錢沸湯點服　若
有白帶者加芍藥半兩乾薑等分米飲調下
抑氣 異香四神散 又名調氣散 專調理婦人室女血
氣不調胎前產後諸疾折七之證女人以氣血爲
主殊不知因氣先不調然後血脈不順即生諸證
此方大有奧理
香附子 去毛炒半斤　烏藥 炒四兩
甘草 炙一兩　右㕮咀每服五錢重水壹盞生
薑三片棗一箇煎至七分去滓空心溫服或用葱

白三寸同煎如治諸證依後加減用之立見功效
婦人氣血不順心胸痞滿加紫蘇葉同煎　鬱
憂悶氣蓄怒傷神心滿腹痛面目虛浮及一切氣
疾並加石菖蒲同煎　血脈不調血脇脊胃嘔吐
飲食以老薑一塊燒令黑切作五片入鹽少許同
煎　脾胃感冷亦依前用　血積血暈悶血癥血
刺血煎熱入好醋一呷服　經血行時被風冒或
驚憂相併經候不時名曰指脈腹痛緊腹腰腿疼
痛每服加炒茴香一撮同煎　血氣不順喘滿氣
急面目浮腫加生薑紫蘇葉同煎　唾血咯紅痰

瘕中脹氣加黃柰茱三四枚花茶尤佳　血滯澁
秘大便結滯不通宜加枳殼數片或去白青皮亦
可　凡血臟虛冷血滯腹痛血海久冷血崩赤白
帶下小便頻數又血脈妄行滲入大腸有似腸風
並入炒吳茱萸末一匕同煎亦名溫經湯　經絡
感熱經水沸溢血脈妄行病曰熱崩加生地黃
凡敗血攻衝胃腎血喧氣血咳逆加生薑三片柿
蔕五箇　血氣搏鬬心腹刺痛加良薑赤芍藥以
水酒各半盞同煎　胎脹傷食脇膈不快噎氣食
臭心腹緊滿加南木香或宿砂仁煎　懷胎臨月

近上逼心名曰子懸依前用薑片紫蘇同煎　產
後諸疾不明血脈去留不辨虛實冷熱且宜此藥
通暢血氣不致差互然後隨證調理　產後寒氣
入腹便緊臍下刺痛名曰寒疝加炒吳茱萸煎服
產後因產中用力太過子宮脫下俗名癩病先
用此調氣安腸兼以橘樹枝或枝梗同葱白以花
椒煎湯熏洗子腸自定及平居女人患此亦然
滋肯黑神散調理室女婦人風虛勞冷一切氣血之
疾及胎前產後血滯血崩惡露不快敗血衝疾並
宜服之凡生產之後首先進烏金散破血暈逐惡

血第二日即便常進此藥逐敗血安新血自然百
病不生此方常用百發百中必得效驗若將調理
女人諸疾用煉蜜爲劑每一兩三錢仲分作十丸
或用酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸
隨證用湯使各以其病立名稱之名桂脂丹又名
通真丸又名勝金丹又名金釵煎又名保生丸又
名調順理中散　黑豆　香附子末　乾薑
生熟地黃　右爲末每服二錢食前溫酒調
下或以酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服三十丸
溫酒米湯任下　新產敗血不散兒枕塊硬疼痛

若產子小便下　臨產胎死腹中或死胎不下以
黑豆一合醋煮豆熟爲度調藥七分盞服暖其胎
即自下　臨產之時胞衣不下以童子小便同煎
酒調下　產後惡露不快血暈衝心眼昏黑悶昏
口禁不省人事並用溫酒調下若猶重可用秤錘
淬酒服　前項黑神散以煉蜜和劑爲丸如梧桐
子大名調順理中丸　新產五指攣痛若少氣
體常自汗以米飲吞下三十丸空心服　若以煉
蜜爲丸如彈子大治胎前名保生丸理婦人初受
胎時胎氣不安多卧少起不進飲食名曰惡阻每

服一丸細嚼以苧根糯米煎飲送下或以秦艽糯
煎飲亦可　又漏胎下血不止或下黃赤汁腰腹
痛重以溫酒嚥下兼以膠艾湯法艾湯六物湯安
胎飲　又有初結胎氣鬱煩悶嘔逆痰涎不喜飲
食過腹膨脹以淡竹茹青同橘皮煎湯送下兼以
茯苓半夏湯或二陳湯下　若因房勞動胎下血
名曰傷胎溫酒下　若妊娠數經墮胎多至半產
漏下用溫酒服氣順排血自然胎息安固　若妊
娠日月不足而一向似欲產者以貝知母煎湯下
若妊娠胎上逼心胎不近下川芎煎湯下　若

妊娠至七八月常服養胎益血安和子臟仍令易
產以枳殼糯米煎湯下但糯米飲下亦得　若產
後用名勝金丹治產後一切諸疾並以溫酒或米
飲下　若補理血虛血勞血氣血風等病名益陰
丹以溫酒米飲下　若女人血冷面白脫色青筋
進露以酒服良驗　若調理經候滋養少女名益
叙煎丸是經候不調月水混濁腹常刺痛及室女
血弱陰虛經脉不勻並依前酒飲送下　又一等
少女經脉已行一二次後至一二年又不行或有
四季一行或有三五箇月復至此本血脉未弱未

充故行脉斷續宜以此藥調氣潤血血旺自通若
必攻之不爾成血瘕積塊　成血勞氣得為骨
蒸勞瘵兼此一方號曰勝金丹滋血湯佐之若婦
人中有風疾用木香通氣丸　治諸中風口禁角
弓反張手足癱瘓並以羌活同黑豆炒酒下兼以
小續命湯烏荊丸之類　又婦人漏下五色及治
血少氣寒面色青白及產後百日內常服能除宿
血生養新血兼益氣補虛調和榮衛不生諸疾皆
以溫酒米飲下
前和其排補散其中尚品佐助溫和有不上服而

自有妙理與夫前方法不同臨產對證且如妊娠
一節至精絕妙一氣方凝經云秘法調養胞源精
若與溫門致損墮故經云與寒為損傷熱而驚峻
借湯劑勿可妄用恐傷胎氣及其生產之後有節
開張去血過多津液燥少陰陽俱虛臟腑怯弱偶
有疾傷便成危殆故經云犯時微若秋毫感病重
於高嶽故涼冷之劑剛燥之藥尤戒輕用轉生他
病若委有目風感熱之疾亦是和解陰證調理緩
有虛寒極冷之後亦宜用性溫平和之藥救療漸
次加進大溫藥調治切戒粗疎若依此說則產後

胎前百無一失，不可取目前之急，亂投湯劑，反致其禍，罪福非輕，切須記之。

攝養濟陰 莪术散 隨證斟量加入

莪术（煨） 川芎 當歸（去尾）
熟地黃（酒蒸九次） 白芷 茴香
揚芍藥 甘草（炒，各等分）

右爲細末，每服二錢，鹽酒調下。月水不調，銀器燈心；安胎，黃芪生地黃；補虛調氣，生薑紅棗；遍身虛腫，當歸酒；小便不通，滑石末；心虛，硃砂研末調；敗血沖心，腹疼如刀刺，燒秤錘紅淬酒，如不退，五靈脂酒；血閉身疼，炒薑酒；吐酸，木香七粒煎湯；血風上攻，眼目浮腫，荊芥；小腹痛，木瓜；渾身浮腫，當湯或葱湯；胃虛惡心，藿香；頭面腫，赤豆荊芥湯下；血不止，木香湯；冷嗽，桑白皮乾柿；頭痛，川芎細辛；血風潮熱，牛黃紅棗；虛汗，麻黃根；吐不止，青陳皮；血風腰痛，芸薹子搥碎；女人血結不通，手發攣急，不知其數，蒼朮一撮，爛研取汁；手足痲，楮柳根浸酒；女人血氣成塊，[illegible]心，銀子燈心；血崩，赤白帶，鼈甲骨碎，好紅酒[illegible]；血風中心，狂言亂語，渾身壯熱，桃柳枝七寸；血刺成塊不散，蒼耳；女人癖氣膈氣，炒茴香酒；婦人不開，虛熱傷風，潮熱增寒，一切百病，先以三服隨證湯引投之，服以他藥調理，無不應驗。冷嗽，豬血；心燥，豬肝酒；催生順流，水滑石、禹餘糧、榆白皮；坏子，乳香麥子，酸車草汁煎湯，黃柞葉垂下者；胎衣不下，再加莪术地黃竹青；行血，蒼耳生地黃紅花蘇木陳艾；瘕，揚芍藥加赤芍藥、積。

[illegible]僊散 治婦人血[illegible]

香附子（炒，去毛） 白芍藥（各等分） 甘草（減半）

右爲細末，每服三錢，沸湯下。血崩不止，竹葉煎湯下；月水不行，手足熱，炒生薑炒當歸煎木通湯下；月水不勻，當歸酒下；頻頻下血不住，米飲下；氣痛及老婦人忽下血，炒當歸炒陳皮湯任下。

理氣活血消積 濟陰丹 治婦人久冷無子息，及產後敗血沖心，中風口噤，子死腹中，擘開口灌藥，須臾生下，便得無恙。治胎治腹中攻刺痛，橫生逆產，胎衣不下，血暈，血癖，血崩，血滯，血入四肢，一應血臟有患，及諸種風氣，或傷風吐逆咳嗽寒

熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩中不定因此成疾室女經脉不通並宜服之常服煖子宮和血氣悅顏色退風冷能消除萬病

三稜（煨切）　蓬朮（壹兩切片浸）　蒼朮（米泔浸去皮）
枳殼（去穰）　大艾（去梗）　劉寄奴
香附子（淨）　敗薑（各壹兩半）　烏豆（叁合已上九味以醋）
當歸身（酒浸）　橘皮（去白紅者佳）
白芍藥（各壹兩）　蒲黃（炒）　牡丹皮（去骨）
官桂（去粗皮）　赤芍藥　片薑黃
青皮（去白各壹兩）　生地黃（酒浸）　熟地黃（酒浸）
川芎（各七錢半）　玄胡索（炒）　五靈脂（酒）
白朮（半兩　牛膝各半兩）

右爲細末以糯米粉穀醋打糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心沉香湯送下蘇湯鹽湯下亦可

南嶽魏夫人濟陰丹　治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁已上諸疾皆令孕育不成以致絕嗣此藥治產後百病百

邪內常服除宿血生新血令人有子亦生子充實亦治男子亡血諸疾

木香（炮）　京墨（煅）　茯苓
桃仁（去皮尖麩炒各壹兩）　鱉甲（燒）　藁本
秦艽　石斛（酒浸炒）　桔梗（炒）
人參　甘草（各貳兩）　牡丹皮（去心）
乾薑（炮）　細辛　桂心
當歸　川芎（各半兩）　蒼朮（米泔浸八兩）
大豆卷（炒半升）　川椒（去目炒出汗合）　山藥（各二兩）
澤蘭葉　熟地黃（酒浸）　香附子（炒各四兩）
糯米（炒一升）

右爲細末煉蜜和丸每兩作六丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒送下淡醋湯化服亦可空心食前服一方山藥川椒各三兩或以醋糊爲丸如梧桐子大每服五十丸依前服亦可

理氣衍血皺血丸　治婦人血海虛冷百病變生氣血不調時發寒熱或下血過多或久閉不通崩中不止帶下赤白癥瘕癖塊攻刺疼痛小便緊滿脇肋脹痛腰重脚弱面黃體虛飲食減少漸成勞狀及經脉不調胎氣多損產前產後一切病患無不

治瘀

菊花(去梗) 茴香 玄胡索(炒)
香附(一兩醋浸一宿焙) 肉桂(去粗皮) 當歸
芍藥 熟地黃 牛膝
蒲黃 蓬朮(醋煨)
右為細末，用烏豆一升，醋煮候乾，焙為末，再入醋二碗，煮至一碗，留為糊，丸如梧桐子大，每服二十丸，溫酒或醋湯送下。血氣攻刺，炒薑酒下；癥瘕絞痛，當歸酒下。忌鴨肉羊血。此藥破子宮，令人有子。孕
治積血損衝任，破血瘕及胞絡傷損，治瘀乾血

[illegible] 加味五積散
蒼朮(米泔浸去皮炒) 白芷 陳皮(各壹兩)
厚朴(去粗皮薑汁炒) 半夏(洗) 枳殼(炒)
揚芍藥 香附子(炒去毛) 桔梗
人參(去蘆) 茯苓(去皮) 川白芷
川芎 當歸(去尾) 茴香(炒)
木香 肉桂 粉草(炙各壹錢)
右剉碎，生薑棗水瓜入鹽煎服。陰證傷寒，生薑附子；血脈不勻，紫蘇；[illegible]烏梅薑錢，勻經藥子薑錢；補益血海，[illegible]；產後，生薑醋炒陳艾。胃冷不納食，陳皮縮砂；赤白帶，陳米；冷氣，茴香茱萸；心煩背筋急，頭暈腰腳疼，生地黃當歸；脾虛，蘇葉粉草；月中夜發，或因爭鬥，心頭結塊，五膈五噎，茴香棗子；口苦舌乾，吞酸噯氣，此為胃冷，生薑鹽；腰痛，桃仁，厚朴杜仲川續斷；身疼，秦艽；諸虛脾胃不和，痰冷氣，蘇鹽；冷溜炒過，生薑烏梅肉，草蔻陳米，各煎湯。

[illegible] 卷柏丸 治婦人衝任本虛，血海不足，不能流通經絡，月水不調，赤白帶下，二十六疾並皆治之。常服和經絡，暖五臟，潤肌膚，長髮，去黑，除風

令人有子
卷柏(去根) 當歸(去蘆) 艾葉(炒各貳兩)
熟地黃(九蒸) 川芎 白芷
柏子仁(微炒) 肉蓯蓉 牡丹皮(各壹兩)
右為細末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服五十丸，用溫酒或米飲送下，空心食前服。

治經之劑 氣血攻補 烏雞煎丸(和劑) 治婦人胎前產後諸般疾患，並皆治之。
烏雄雞(去毛腸) 烏藥 石床
牡丹皮 人參 白朮

黃芪（[illegible]）　莪术（[illegible]）　海桐皮
肉桂（去皮）　附子（炮去皮臍）　白芍藥
蓬莪术　川烏（炮）　紅花
陳皮（各一兩）　玄胡索　肉荳蔻
木香　琥珀　熟地黃（[illegible]）
荜茇（各半兩）

右細剉，用烏雄雞一隻，沸湯挦去毛及腸肚，將上件藥安放雞肚中，用[illegible]，以好酒一斗同煮令乾，去雞骨，以油單盛焙乾，為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸。胎前產後傷寒，蜜糖酒下。

胎前氣悶壯熱，炒薑酒下。　赤白帶下，生薑地黃酒下。　產後敗血注心，童子小便炒薑酒下。　產後血塊填築心腹疼痛，玄胡索酒下。　胎前嘔逆，薑湯下。　催生，炒蜀葵子酒下。　安胎，鹽酒下。　室女經脈當通不通，四肢疼痛，煎紅花酒下。　血氣攻刺心腹疼痛，煎當歸酒下。　血暈，棕櫚燒灰酒調吞下。　血邪，研朱砂麝香酒下。　血悶，煎烏梅湯研朱砂下。　子宮久冷，溫酒或棗湯下，空心日一服。　血風勞，人參酒吞下。　小腹疠痛，炒茴香鹽酒吞下。　血散四肢，遍身虛浮黃腫，赤小豆酒下。　常服溫酒鹽湯任下，並空心食前服。

溫經澀脫

小白薇丸（[illegible]）治婦人衝任虛損，子臟受寒，久無子息，及斷續不產，此由上熱下冷，百病滋生，或月水崩下，帶漏五色，腰腹疼重，面黃肌瘦，或因產乳不能將護，勞傷太早，或久坐濕地，或冷風從下入，血癥[illegible]虛風[illegible]因乘，或月水當行失於調攝，傷動胞絡，陰陽[illegible]，[illegible]虛陽[illegible]下，藏邪冷結伏，致使胎孕不[illegible]，或月水不勻，飲食減少，夜多盜汗，肉上[illegible]，[illegible]腰膝疼重，舉動少力，並宜服之。

覆盆子（[illegible]）　[illegible]　遠志（去心）
桃仁（去皮尖麩炒）　白茯苓（[illegible]）　藁本（[illegible]）
卷柏（去根）　肉桂（去皮）　人參
白芷（[illegible]）　白龍骨　川椒（去目及合口者炒出汗）
白薇（[illegible]各）　乾薑（炮）
蛇床子（炒）　當歸（去蘆）
芎藭（各半兩）　熟地黃　麥[illegible]（[illegible]去心各[illegible]）

右為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服三十丸，空心用溫酒或米飲送下。此藥常服[illegible]，補益血氣，煖子宮，除[illegible]，令人有子。

白聖丹治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱
惡風怯寒咳逆煩滿拘急短氣心脇腰背肚腹與
子藏相引痛漏下五色心常恐懼遇恚怒憂勞即
發皆是內傷所致、
白堊　牡蠣煅研　細辛
禹餘糧火煅紅醋淬研　龍骨煅研　附子炮去皮臍
石葦去毛　烏賊魚骨煅　黃連去毛
茯苓去皮　肉桂去麁皮　瞿麥穗
白斂　芍藥　白芷
白石脂煅　當歸去蘆　乾薑炮
人參　甘草炙各
川椒去目并合口者炒出汗各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空
心用溫酒送下、一方無人參
調經琥珀澤蘭煎治婦人三十六種血氣八
風五痹七癥八瘕心腹刺痛中風癱瘓手足痠疼
乳中結核姙娠胎動胎死不出產衣不下敗血湊
心頭旋眼花血暈四肢浮腫衝任久虛絕產
無嗣早晚服食或月候不調赤白帶下惡
心嘔逆身體瘦瘁脈滑胎易產、

琥珀　澤蘭葉去梗　牡丹皮去心
紫巴戟去心糯米炒　茴香　五味子去梗
五加皮　劉寄奴草去梗　白芷
川當歸酒浸　赤芍藥　金釵石斛去根酒浸
川芎　白芍藥　生地黃酒洗
熟地黃酒洗　人參　白朮
附子　艾葉
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用
溫酒磨化服、治血刺痛煎糯米飲下、寒熱往
來四肢煩疼煎青蒿酒下、婦人室女經閉煎紅
花酒下、血崩不省人事童子小便和煖酒下、

催生雞子清和酒下、血氣血塊攻刺心腹燒秤
錘淬酒下、傷寒及中風口噤煎麻黃湯下以被
蓋出汗即愈、心驚悸及頭痛薄荷酒下、咳嗽
煎桑白皮湯下、血風攻疰渾身瘙癢頭面麻痺
炒黑豆浸酒下、產後產前常服不生諸疾甚效
溫經理氣和血丸治婦人產前產後一切血
疾血崩產後腹脇滿痛氣逆嘔吐冷血冷氣凝積
塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中虛鳴氣滿堅
脹瀉血腰疼口吐清水頻產血衰顏色青黃勞傷

劣弱月水不調下血墮胎血迷血暈血瘕時發疼
痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不乾體虛
多汗手足逆冷並宜服之

茴香　藿香　丁皮
熟地黃(洗焙)　肉桂(去皮各[illegible])　川芎
藁本　黃芪(去蘆)　乾薑(炮各[illegible])
木香([illegible])　陳皮([illegible])　白芍藥([illegible])
當歸(去蘆)　山藥　白朮
白芷　甘草([illegible])

右為末每服二錢水一大盞入生薑五片艾一團
同煎至七分空心食前熱服溫酒調亦得　如產
後下血過多加蒲黃煎　惡露不快加當歸紅花
煎　水瀉加肉荳蔻末煎　嘔吐加藿香生薑煎
上熱下冷加荊芥煎　但是腹中虛冷血氣不
和並宜服之產後每日一服則百病不生丈夫虛
冷氣刺心腹疼痛尤宜服之

和血通經湯丸　治婦人久虛無子及產前後一
切病患兼治男子下虛無力此藥能安胎催生妊
胎臨月服五七丸產時減痛婦人無子是子宮冷
如服二十丸男女自至又治積年血風腳手麻痺
半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結
痛吐逆心痛子死腹中繞臍痛氣滿煩悶失盜汗
不出月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不
禁中風不語口噤產後痢疾消渴眼前見鬼迷暈
敗血上衝寒熱([illegible])面色痿黃淋瀝諸疾血下無
度血痢不止飲食([illegible])產後傷寒虛煩勞悶產後
血癖產後臍腹([illegible])不問年深日近並宜
服之([illegible])人諸虛不足心腹疼
痛

藁本　當歸　石脂(赤白皆可)
白芍藥　人參　白薇
川芎(火[illegible])　牡丹皮　桂心
白芷　白朮([illegible])　白茯苓
玄胡　甘草([illegible])
沒藥(各[illegible])

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸溫酒化
下初產了用熱醋湯下食前服此方係王承宣惠
祖傳張家凡婦懷身便服此藥甚有神效常服尤
妙係([illegible])一方
有附子無[illegible]

溫經理氣 沉香煎丸

沉香 貳錢半　丁香 壹兩　麝香 貳兩

白朮 錢半　官桂　乾薑

縮砂仁　白荳蔻　檳榔 各壹錢半

青皮　南木香　肉荳蔻

胡椒　人參　生薑

訶子肉　陳皮　甘草 各半兩

右為細末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼生薑湯下溫紅酒亦可空心食前日進三服

溫脘保澀 溫中龍骨散　治腹下十二經絕產一曰白帶二曰赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子臟堅六曰臟癖七曰陰陽患痛八曰內強九曰腹寒十曰臟閉十一曰五臟酸痛十二曰夢與鬼交並宜服之

龍骨 參兩　半夏　黃蘗

竈中黃土　桂心　乾薑 各壹兩

石葦　滑石 各壹兩　烏賊魚骨

代赭 各肆兩　白殭蠶 [illegible]枚

右治下篩酒服方寸匕日三[illegible]若加[illegible]

薑各二兩[illegible]小腹冷加[illegible]

[illegible]子藏堅赤加乾薑官桂各二兩以上多利病增之服藥三月有子即住藥大過多生兩子當審方取好藥寡婦童女不可妄服

治錯雜之邪 妙應丹　治婦人衆疾無所不治

晚蠶沙 炒　鯉魚鱗 燒為[illegible]　當歸 去蘆

石膏 煅研　澤蘭 去梗　附子 炮去皮臍

木香 [illegible]各　熟地黃 酒蒸　防風 去蘆

蕪荑 炒　馬牙硝　柏子仁 微炒別研

川芎　人參　黃芪

蟬蛻 洗去足　白薇　檳榔 不見火

川椒 微炒各壹兩　吳茱萸 湯泡　紅花 炒各

藁本 去蘆　白薑 炮　厚朴 去粗皮薑製

甘草 炙各

右為細末鍊蜜搜和杵數千下丸如彈子大每服一丸　血瘕塊痛綿灰酒下　催生細嚼溫酒下　血勞血虛桔梗酒下　血崩棕櫚灰酒下　血氣痛炒白薑酒下　血風荊芥酒下　血暈悶絕胎死腹中胞衣不下並用生地黃汁童子小便酒各一盞煎一沸調下　常服醋湯溫酒化下並空心食前服

攻積　紫菀丸　療痃癖腹久患痃癖如桃大及諸
黃病每地氣起時上氣衝心遶臍絞痛一切蟲咬
十種水病十種蠱病及胃吐食嘔逆惡心飲食不
消天行時病婦人多年月水不通或腹如懷孕多
血天陰即發又治十二種風頑痹不知年歲晝夜
不安夢與鬼交頭白多屑或哭或笑如鬼魅所著
腹中積聚脹痛及治小兒驚癇大人癲狂一切風
及無孕婦人身上頑麻狀如蟲行四肢俱腫呻吟
等疾並皆治之功效不可具述

紫菀去苗　柴胡去蘆　菖蒲
吳茱萸湯泡七次焙乾　厚朴去皮薑汁製各　桔梗去蘆
茯苓去皮　皂角去皮子炙　黃連去鬚
桂枝　乾薑炮各分　川烏炮去皮臍
羌活去蘆　獨活去蘆　防風去蘆
巴豆去皮出油　人參去蘆　蜀椒去目并閉口者微炒
上件各
右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三丸
漸加至五七丸食後臨臥生薑湯送下初有孕者
不宜服　痔漏腸風酒下　赤白痢訶子湯下
膿血痢米飲湯下　墮傷血悶四肢不收酒下

蛔蟲咬心檳榔湯下　氣噎憂噎荷葉湯下　打
撲傷損酒下　中毒帚灰甘草湯下　一切風升
麻湯下　寸白蟲檳榔湯下　霍亂乾薑湯下
咳嗽杏仁湯下　腰腎痛豆淋酒下　陰毒傷寒
溫酒下　吐逆生薑湯下　食飲氣塊麴湯下
瘧氣井花水下　脾風陳皮湯下　頭痛茶下
心痛溫酒下　大小便不通燈草湯下　因物所
傷以本物湯下　吐水藜蘆湯下　熱病乾薑湯
下　小兒天風吊指防風湯下防己亦可　小兒
疳痢葱白湯下　小兒乳食傷白湯下　月信不
通紅花酒下　婦人腹痛川芎湯下　懷孕半
年後漏胎艾湯下　有子氣衝心酒下　產血暈
當歸酒下　血氣痛當歸酒下　產後心腹脹滿豆
淋湯下　難產益智湯下　產後血痢當歸湯下
赤白帶下酒煎艾湯下　解內外傷寒粥飲下
室女血氣不通酒下　子死葵子湯下
溫白丸　治婦人諸疾斷續而生帶下淋瀝五邪失
心憂愁思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹
中一切疾病有[illegible]連年累月羸瘦困斃或歌
或哭者或如鬼[illegible]

桔梗　柴胡　菖蒲
吳茱萸湯泡七次焙乾　紫菀去苗土　黃連去毛
肉桂去粗皮　厚朴去粗皮薑汁炙　人參去蘆
茯苓去皮　皂角去皮子炙　蜀椒去目并合口者炒出汗
巴豆去皮心膜出油細研各半兩　川烏炮去皮臍各兩半
右為細末研勻煉蜜丸梧子大每服三丸漸加至五七丸食後臨臥薑湯送下

調經門

經候總論

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下天謂天真之氣癸謂壬癸之水壬為陽水配丁而化木癸為陰水合戊而化火故曰水火者陰陽之徵兆也女子陰類故得癸為衝為血海任主胞胎二脈流通經血漸盈應時而下天真氣降與之從事故曰天癸也常以三旬一見以像月盈則虧不失其期又名月信也若遇經行最宜謹慎否則與產後證相類若被驚恐勞役則血氣錯亂經脈不行多致勞瘵等疾若逆於頭面肢體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血而瘰癧癰瘍若經血內滲則竅穴淋瀝無已凡此六淫外侵而變證百出犯時微若秋毫成患重如山嶽可不畏哉　[illegible]血者水穀之精氣也和調五臟灑陳六腑在男子則化為精在婦人上為乳汁下為血海故雖心主血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然　其婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衝任之脈損手太陽少陰之經蓋衝任之脈皆起於胞中

為經絡之海與手太陽小腸手少陰心經為表裏上
為乳汁下為月水然月水為經絡之餘苟能調攝得
宜則經應以時矣〔脾〕經曰飲食入胃游溢精氣上
輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水
精四布五經並行東垣以生血調脾為生化之原心統
諸經之血誠哉是言也篇謂心脾平和則經候如常
苟或七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃
虛損心火妄動則月經不調矣有先期而至者有後
期而至者其說詳見後條血生於脾上故云脾統
血凡血病當用甘溫之劑以助陽氣而生陰血也

辨色 用經水者陰血也陰必從陽故其色紅稟火色
也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降
則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁往往
見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也來後
作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也
錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚
也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指為風
冷而行溫熱之劑則禍不旋踵矣良由病原論月水
諸病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也或曰黑北
方水色也紫淡於黑非冷而何予曰經曰亢則害承

乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也況婦
人性執而見鄙嗜欲加倍臟腑厥陽之火無日不起
非熱而何若曰風冷必須外得設或有之蓋千百一
二者也（冷證外邪初感入經必痛或不痛者久則鬱而變熱矣且寒則凝既行而紫黑故非寒也）

經色紫黑

〔附〕四物加黃芩黃連湯 治經水如黑豆汁

四物湯（壹兩） 黃芩 黃連（各壹兩）

右為末醋糊丸服

〔附〕月經黑口渴倦怠形短色黑脈不勻似數

赤芍藥 香附米（各一兩） 黃蘗（炒）
黃芩（各參錢） 甘草（貳錢）

右為末醋糊丸白湯下五六十丸

一婦人娠子二十歲二月經事不來忽行小腹痛
有塊血黑紫色

白芍藥 白朮 陳皮（各半兩）
黃芩 川芎 木通（各貳錢）
甘草（炙少許）

何婦人氣滯血澀脈不澀經不調或前或後紫色口
噤兩大腿外臁麻木有時痒生瘡大便秘滯

麻子仁 桃仁 芍藥（各貳兩）
枳殼 歸頭

經色淡爲虛

威靈仙　訶子肉　生地黃
陳皮各伍錢　大黃爛柒錢
各爲末粥丸如梧子大白湯下五六十丸
丹經水色淡者氣血俱虛也宜八物湯之類八物者
四物四君子也如兼它證隨證加藥
孀婦人年四十八因有白帶口渴月經多初血黑色
後來血淡倦怠食少臍上急
白朮壹錢半　白芍藥　陳皮各壹錢
木通　枳殼　黃芩各伍分
縮砂仁　甘草炙各叁分　紅花豆許

右煎湯下保和丸叁拾丸抑青丸貳拾丸
經多婦人病多是月經乍多乍少或前或後將發
疼痛醫者不審一例呼爲經病不知陽勝陰陰勝陽
所以服藥無效蓋陰氣乘陽則包藏寒氣血不運行
經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若
陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢
故令乍多而在月前當和血氣平陰陽斯爲福也
陽勝陰月候多者當歸飲
當歸飲　抑陽助陰調理經脈
當歸　地黃　川芎

白朮　白芍藥　黃芩各等分
每服叁錢水一盞半煎至八分空心溫服
陰勝陽月候少者七沸湯
七沸湯　治榮衛虛經水愆期或多或少腹痛
當歸　川芎　白芍藥
蓬朮　熟地黃　川薑
木香各等分
每服肆錢水一盞半煎至八分溫服
經水過多爲虛熱爲氣虛不能攝血
治四物加黃芩白朮湯　治經水過多

四物湯　黃芩　白朮
丹經水過多
黃芩炒　芍藥炒　龜板炙
樗樹根皮　黃蘗炒　香附
右爲末酒糊丸空心白湯下五六十丸
丹婦人脉弦而大不數形肥初夏時倦怠月經來
時多此禀受弱氣不足攝血故行多
白朮壹錢半　黃芪生　陳皮各壹錢
人參伍分　甘草炙
經水澀少爲虛爲澀虛則補之澀則濡之

補四物加葵花湯　治經水澀少
四物湯肆兩　葵花貳兩　一方又加紅花血見愁
四物湯加熟地黃當歸湯　治經水少而色和
四物湯肆兩　熟地黃　當歸各壹兩
脉師曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰曾更下利若汗出小便利者可何以故師曰亡其津液故令經水少設經下多於前者當所苦困當言恐大便難身無復汗也

先期後期　王子亨曰經者常候也謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故每月一至太過不及皆為不調陽太過則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致
丹溪　經不及期而來者血熱四物湯加黃連　肥人不及日數而多痰者血虛有熱南星白朮蒼朮黃連香附川芎作丸　薛先期而至者　有因脾經血燥者宜加味逍遙散　有因脾經鬱滯者宜歸脾湯方見健忘門　有因肝經怒火者宜加味小柴胡湯方見傷寒少陽病　有因血分有熱者宜加味四物湯即四物加柴胡丹皮山梔　有因勞役火動者宜補中益氣湯方見勞倦門

先期湯　治經水先期而來宜涼血固經
生地黃　川當歸　白芍藥各貳錢
黃蘗　知母各壹錢　條芩
黃連　川芎　阿膠炒各捌分
艾葉　香附　炙甘草各柒分
水二鍾煎一鍾食前溫服

金匱土瓜根散　治帶下經水不利小腹滿痛經一月再見者
土瓜根　芍藥　桂枝
䗪蟲各柒錢半
右四味杵為散酒服方寸匕日三服
按仲景此方乃破堅下血之劑　經不及期有因瘀血者矣[illegible]所未及也然[illegible]有無須以小腹滿痛與不滿痛別之

過期　丹溪經水過期血少川芎當歸人參白朮與痰藥　過期色淡者痰多也二陳湯加芎歸　過期色紫有塊血熱也必作痛四物湯加香附黃連　薛過期而至者　有因脾經血虛者宜人參養榮湯　有因肝經血少者宜六味地黃丸　有因氣虛血弱者宜八珍湯方見虛勞門

過期飲　治經水過期不行乃血虛氣滯之故法當

補血行氣
熟地黃　白芍藥　當歸
香附各貳錢　川芎壹錢　紅花柒分
桃仁泥陸分　蓬莪茂　木通各伍分
甘草　肉桂各肆分
水二鍾煎一鍾食前溫服
滋血湯　治婦人心肺虛損血脉虛弱月水過期
人參　山藥　黃芪各壹錢
白茯苓去皮　川芎　當歸
白芍藥　熟地黃各壹錢半
右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

三月一來名居經

脉師曰脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為
可否者此為居經三月一來師曰寸口脉微而濇微
則衛氣不足濇則血氣無餘衛不足其息短其形躁
血不足其形逆榮衛俱虛言語謬誤趺陽脉浮而濇
濇則衛氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣濇則失液
少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒濇則血不來
此為居經三月一來　問曰婦人妊娠三月師脉之
言此婦人非軀今月經當下其脉何類何以別之師
曰寸口脉衛浮而大榮反而弱浮大則氣強反弱則
少血孤陽獨呼陰不能吸二氣不停衛降榮竭陰為
積寒陽為聚熱陽盛不潤經絡不足陰虛陽往一作實
故令少血時發洒淅咽燥汗出或溲稠數多唾涎沫
此令重虛津液漏泄故知非軀畜煩滿血月禀一經
三月一來陰盛則瀉名曰居經謂右脉浮大左脉反弱也

調經平劑

簡易方當歸散　治經脉不匀或三四月
不行或一月再至
當歸　川芎　白芍藥炒
黃芩炒各壹兩　白朮　山茱萸肉壹兩半
右為細末空心溫酒調下貳錢日三服　如冷去
黃芩加肉桂壹兩
人參養血丸和劑　治女人禀受素弱血氣虛損常服
補衝任調經候暖下元生血氣
烏梅肉叁兩　熟地黃伍兩　當歸貳兩
人參　川芎　赤芍藥
蒲黃炒各壹兩
右為細末煉蜜丸梧子大每服八十丸溫酒米飲
任下
逍遙散和劑　治血虛煩熱　肢痛痰嗽
潮熱

當歸 白朮 白芍藥
柴胡 茯苓各壹兩 甘草炙半兩
右㕮咀每服半兩入薄荷葉煎服、
薛新甫加牡丹皮山梔炒各伍分名加味逍遙散
神仙聚寳方無當歸芍藥甘草有人參黃芪各等
分
增損四物湯 治月事不調心腹疼痛補血温經注
顔
川芎 當歸 芍藥
熟地黄 牡丹皮 白朮各壹錢半
地骨皮伍分
右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服
濟生方論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣
有所謂九氣喜怒憂思悲恐驚者七氣也七情之外
益之以寒熱二證而為九氣也氣之為病男子婦人
皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身血隨氣行氣
一壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事
將行預先作痛或月事已行淋瀝不斷心腹作痛或
連腰脇或引背膂上下攻刺吐逆不食甚則手足搐
搦狀類驚癎或作寒熱或為癥瘕肌肉消瘦非特不

能受孕久而不治轉而為瘵疾者多矣、
戴復菴云婦人每月經水應期而下不使有餘猶太
陰之缺也其有或先或後或少或多或欲來先病或
遇來而斷續皆謂之不調和氣飲加香附子半錢兼
煎獨附丸
升麻和氣飲見雜病水腫門
濟陰香附丸 治經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭
暈惡心崩漏帶下並宜服之
香附子 [illegible]
右醋糊為丸梧子大日乾每五十丸淡醋湯下
一方香附子壹斤艾葉肆兩當歸貳兩製同名艾附
丸
沉香降氣散 順氣道通血脉
烏藥 木香 香附子
縮砂仁 甘草各等分
右為細末每服貳錢空心鹽湯調下
嚴氏抑氣散 治婦人氣盛於血變生諸證頭暈膈
滿
香附子肆兩 茯神 甘草炙各壹兩
陳皮貳兩

右爲末每服貳錢食前沸湯調下

緋珠正氣天香湯　治婦人一切氣氣上湊心心胸攻築脇肋刺痛月水不調

台烏藥貳錢　香附子捌錢　陳皮

蘇葉各壹錢　乾薑半錢

右㕮咀每七八錢水煎服

右抑氣例　莫附丸醋製佐以當歸則氣中之血藥也今世以童便酒醋鹽水四製而以四物佐之皆本於此人人知之故不著　氣鬱多者宜於雜病氣鬱門中選用不必拘此

東垣益胃升陽湯　治婦人經候不調或血脫後脉弱食少水泄日二三行

黃芪貳錢　白朮叁錢　炒麴壹錢半

當歸身　陳皮　炙甘草

人參各壹錢　升麻　柴胡各半錢

黃芩半錢秋去之

右㕮咀每服半兩水煎腹痛加芍藥嗽去人參

補中益氣湯　治婦人室女經候不調脉微食少體倦或熱方見雜病勞倦門

四君子湯　六君子湯方見雜病

右補氣例

調經溫劑　大溫經湯出金匱　治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小腹急痛五心煩熱並皆治之

吳茱萸湯泡　牡丹皮　白芍藥

肉桂去粗皮　人參　當歸去蘆

芎藭　阿膠蛤粉炒　甘草炙各

麥門冬去心　半夏各二錢半

右作一服用水一鍾半生薑五片煎至一鍾食前服

小溫經湯　治經候不調血臟冷痛

當歸　附子炮各等分

右㕮咀每服叁錢水一盞煎捌分空心溫服

溫經湯　治婦人血海虛寒月水不調

川芎　當歸　芍藥

蓬朮各壹錢半　人參　牛膝各貳錢

桂心　牡丹皮各壹錢　甘草半錢

水一鍾煎至一鍾不拘時服

滋血湯　滋養榮血補婦人治血海久冷

當歸　川芎　麥門冬去心

牡丹皮　芍藥

琥珀各壹錢　半夏製　官桂
阿膠炒　酸棗仁　甘草各半錢
右作一服水一鍾半生薑三片煎至一鍾食前服
加味吳茱萸湯　治衝任衰弱月候愆期或前或後
或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時
頭眩飲食減少氣滿心怯肌肉不澤悉皆治之
半夏貳錢　吳茱萸　當歸各壹錢半
麥門冬去心　乾薑　白茯苓
苦梗　南木香　防風
牡丹皮　甘草各壹錢　官桂
北細辛各半錢

右作一服水一鍾生薑三片紅棗一枚煎至一鍾
食前服
桃仁散　治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來
狀如瀉水四體虛倦不能飲食腹中堅痛不可行
動月水或前或後或經月不來多思酸物
桃仁　半夏　當歸
川牛膝　桂心　人參
蒲黃　牡丹皮　川芎
澤蘭葉各壹錢　生地黃各壹錢半

粉草八分
右作一服水一鍾生薑一片煎至一鍾食前服
蒲黃散　治血臟久冷月水不調臍腹刺痛
蒲黃炒　白芍藥　玄胡索
牡丹皮　當歸各壹錢半　蓬朮
紅花　桂心　川芎各壹錢
右作一服水一鍾酒半鍾煎至一鍾不拘時服
紫石英丸　治婦人病多是月經乍多乍少或前或
後時發疼痛醫者一類呼為經病不曾說是陰勝
陽是陽勝陰所以服藥少效蓋陰氣乘陽則胞寒
氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令

乍少而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂
天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當別其
陰陽調其血氣使不相乘以平為期宜服此丸
紫石英細研水飛　川烏炮　杜仲炒去絲
禹餘糧醋淬　遠志去心　澤瀉
桑寄生　桂心　龍骨別研
當歸　人參　肉蓯蓉酒浸
石斛　乾薑炮　五味子
甘草炙各壹兩　川椒去目并合口者不用

炒[illegible]各半兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前用米飲湯下

煖宮丸　治衝任虛損下焦久冷月事不調不成孕育崩漏下血赤白帶下並皆治之

生硫黃（研細）　赤石脂（火煅）　海螵蛸

附子（炮去皮臍各壹兩）　禹餘粮（貳兩火煅醋淬）

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒或醋湯送下

內補當歸丸　治血氣虛損月水不調或崩中漏下去血過多肌體羸困及月水將行腰腿重痛並皆治之

當歸（炒）　阿膠（炒）　白芷

續斷　乾薑（炮）　芎藭

甘草（炙各壹兩）　熟地黃（半兩）　附子（炮去皮臍）

白芍藥　肉桂（各壹兩）　吳茱萸（湯泡）

白朮（各參兩）　蒲黃（炒各肆錢）

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒送下

熟乾地黃丸　治婦人[illegible]虛勞冷[illegible]

腸虛受冷大便時泄或月水不調淋澀不止或閉斷不通結聚癥瘕久不成胎一切諸虛之證

熟地黃　五味子（各壹兩半）　柏子仁（炒另研）

牛膝（去苗酒浸焙）　芎藭　禹餘粮（火煅醋淬）

白茯苓（去皮）　肉蓯蓉（酒浸）　卷柏（去根）

山藥　厚朴（去粗皮）　乾薑（炮）

白芷　細辛（去苗）　防風（去蘆各[illegible]兩）

赤石脂（煅另研）　杜仲（去粗皮炙）　蕪荑（炒）

人參（去蘆）　川椒（去目并合口者）　蛇床子

艾葉（炒）　續斷（各六錢半）　紫石英（火煅另研）

石膏（煅各[illegible]）　當歸（去蘆酒炒）　澤蘭（去梗）

官桂（去粗皮各[illegible]錢半）　石斛（去根[illegible]）　甘草（炙[illegible]錢半）

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒或米飲送下

禹餘粮丸　治血虛煩熱月水不調赤白帶下漸成崩漏

禹餘粮（火煅醋淬）　白石脂（各[illegible]）　附子（炮去皮臍）

鱉甲（去裙醋炙）　桑寄生　白朮

厚朴（去粗皮製）　當歸（去蘆）　柏葉（炒）

乾薑（炮[illegible]）　狗脊（去毛各[illegible]錢半）

吳茱萸（湯泡炒）

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒或米飲湯送下

鹿茸丸　治衝任虛損又為風寒所乘尺脉微小者可灸關元穴

鹿茸（炙）　赤石脂　禹餘粮（各壹兩）

續斷（酒浸）　栢葉　附子（炮）

熟地黃　當歸（酒洗）　艾葉（各半兩）

右為末酒糊丸梧子大每服五十丸空心溫酒下

按此足少陰厥陰藥也今人多用之故收入治血虛濕勝帶下甚捷

升陽舉經湯（東垣）　治經水不調右尺脉按之空虛是氣血俱脫大寒證輕手其脉數疾舉指弦緊或澀皆陽脫之證陰火亦亡見熱證於口鼻眼或渴此皆陰躁陽欲去也當溫之舉之升之燥之此法大升浮血氣補命門之下脫也當藥言根近苗處去苗便是

柴胡根　當歸（酒洗）　白朮

黃芪（各叁錢）　[illegible]　羌活根

防風根（各貳錢）　[illegible]　白芍藥（各伍分）

獨活根（半錢）　桃仁　細辛

川芎　熟地黃　人參

黑附子（炮去皮臍）　甘草稍　肉桂

右為麤末每服貳錢水一盞煎至八分空心稍熱服

調經破血之劑

紅花當歸散　治婦人血臟虛竭或積瘀血經候不調或閉斷不定時作腹痛腰胯重疼攻刺小腹緊硬及室女月水不通並皆治之

紅花　紫葳　牛膝

白芷　蘇木（各壹錢）　桂心（壹錢半）

當歸尾　劉寄奴（各貳錢）　赤芍藥（叁錢）

甘草（半錢）

右作一服水一鍾酒一鍾同煎至一鍾空心服

大玄胡索散　治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛

玄胡索　赤芍藥　川楝子（去核）

蓬莪朮　京三稜（煨）　厚朴（薑製）

當歸　黃芩　川芎

桔梗（各壹錢）　木香

官桂（去粗皮）　甘草（半錢）　大黃（貳錢）

右件一服水一鍾煎至一鍾食前服

鼈甲丸 治婦人月經不調肌肉黃瘁脇下積氣結痛時發刺痛漸成勞狀

鼈甲（去裙醋炙） 桂心 三稜（炮醋煮）
牡丹皮 牛膝（去苗） 琥珀
訶子（取肉） 桃仁（去皮尖雙仁者麩炒） 土瓜根
大黃（燒門上各等分）

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸食前用桃仁湯送下

針灸 心月經不調 陰獨（二穴在足大指次指行經定為皮在足內踝前陷中三壯）

又法 內踝下白肉際青脈上灸隨年壯

又法 中極 三陰交 腎俞 氣海

心經閉久忽大崩復又斷絕復又大行不調者 豐隆（六分止灸三壯） 石門（禁針灸）

婦人五旬經斷後再行或多或少或瘀或紅並下腹中氣滿如胎孕 天樞 中脘 氣海（各五分）

婦人漏下若血閉不通逆氣脹 血海上之 女子胞中痛月水不以時休止 天樞上之（千金作腹脹腸鳴氣上衝胸）

小腹脹滿痛引陰中月水至則腰脊痛胞中瘕 子門有寒引髕髀 水道（三寸）之（千金作大小便不通）

論所以經水者行氣血通陰陽以榮於身者也氣血盛陰陽和則形體通或外虧衛氣之充養內乏榮血之灌溉血氣不足經候欲行身體先痛也

越痛散 治血氣虛寒身體作痛

虎骨（伍銖） 茯苓 甘草
藁本 防風 白芷
當歸 芍藥 續斷
白朮 附子（各炙銖）

右為麤末每服五錢水一盞薑五片棗一枚煎至一盞不拘時服

腹痛 良婦人經來腹痛由風冷客於胞絡衝任或傷手太陽少陰經用溫經湯桂枝桃仁湯若憂思氣鬱而血滯用桂枝桃仁湯地黃通經丸（方見經閉）若血結而成塊用萬病丸（方見前）若風寒傷脾者六君子加炮薑（方見血崩）憂勞思慮傷血者四物加參朮（方見虛勞）思慮傷氣者歸脾加柴梔（方見經行腹痛）鬱怒傷血者歸脾逍遙兼服餘參前後論治之 戴經云經事來而腹痛者經事不來而腹亦痛者皆血之不調故也欲調其血先調其氣四物湯加吳茱萸半錢（痛甚者加）香附子一錢和氣飲加茱萸半錢亦可用 痛甚者玄胡索湯然又恐感外

[illegible]致痛當不快血丸宜詳審和氣飲加前兼
治因冷而作因作血痛宜大溫經湯冷甚者去麥門
冬不用
四抑氣丸治臨經之時腹痛用四物湯加玄胡索陳
皮牡丹皮甘草痛甚以枳殼酒痛少以常便煮香附
入條芩爲丸經水將來而痛者四物湯加桃仁香附
黃連
八物湯 治經事將行臍腹絞痛臨經痛者血澀
故也
川芎貳錢 當歸 芍藥

熟地黃各貳錢 木香 檳榔
玄胡索 苦楝碎炒焦各壹錢
右作一服水二鍾煎至一鍾食前服
治婦人月經壅滯每發心腹臍疞痛不可忍及治
產後惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死者
琥珀散
京三稜 蓬莪朮 赤芍藥
劉寄奴 牡丹皮 熟地黃
官桂 菊花 [illegible]
當歸各壹兩 濟生方無菊花蒲黃有玄胡索烏

藥
右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升
同煮豆爛爲度焙乾入後五味同爲末每服二錢
溫酒調下空心食前服 一方不用菊花蒲黃用烏
藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛
只一服產後血衝心二服便下常服尤佳予前後
救人急切不少此藥亦宜多合以濟人
大交加散 治榮衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛
經血諸疾並皆治之
生薑[illegible] 生地黃[illegible] 白芍藥

當歸 桂心各壹兩 紅花炒無惡血不用
沒藥另研各 玄胡索[illegible]
蒲黃各[illegible]
右將地黃汁炒生薑滓生薑汁炒地黃滓各焙乾
用諸藥爲細末每服三錢溫酒調下 若月經不
依常蘇木煎酒調下 若腰痛糖酒調下
交加地黃丸 治婦人經不調血塊氣痞肚腹疼痛
生地黃搗汁存滓 老生薑[illegible]
玄胡索 當歸 川芎
芍藥各貳兩 明沒藥 木香各壹兩

桃仁[illegible] 人參[illegible] 香附[illegible]
右為末先以生薑汁浸地黃滓以地黃汁浸生薑
滓曬乾皆以汁盡為度[illegible]一味作一處曬乾研
為末醋糊為丸空心[illegible]下
大交加散 治婦人榮衛不通經脉不調腹中撮痛
氣多血少結聚為瘕產後中風
生地黃 生薑各伍兩各研取汁
右交互取汁浸一夕各炒黃漬汁盡為度末之每
當腹痛酒調下二錢產後尤不可闕
溫經湯 方見前
通經
桂枝桃仁湯 治經候前先腹痛不可忍
桂枝 芍藥 生地黃各貳兩
桃仁[illegible] 甘草壹兩
右為粗末每服五錢水二盞薑三片棗一枚同煎
去滓溫服
玄胡索湯 治婦人室女七情傷感遂使血與氣併
心腹作痛或連腰脇或引背膂上下攻刺甚作搐
搦經候不調但是一切血氣疼痛並可服之
當歸[illegible] 玄胡索[illegible] 蒲黃[illegible]
赤芍藥 官桂[illegible] 片子薑黃[illegible]

乳香 沒藥[illegible] 木香各[illegible]錢
甘草炙貳錢半
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分
去滓食前溫服 吐逆加半夏橘紅各半兩
[illegible]瘀血
香附子[illegible] 桃仁[illegible] 牡丹皮
大黃[illegible] 當歸[illegible] 川芎
紅花各半兩 瓦龍子[illegible]
右炊餅為丸空心溫酒下三四丸
三神丸 治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經
調經
行澀少或經事不調以致疼痛
橘紅貳兩 玄胡索[illegible] 當歸[illegible]
右為細末酒煮米糊為圓如梧桐子大每服七十
圓加至百圓空心艾湯送下米飲亦得
柴胡丁香湯 治婦人年三十歲臨經預先腰腹
痛甚則腹中亦痛經縮二三日
柴胡 羌活 丁香
全蝎 當歸身 生地黃
右都作一服水四盞煎至一盞去查稍熱食前服
沒藥除痛散 [illegible]腹痛

蓬术[illegible]　當歸[illegible]　玄胡索

五靈脂　肉桂去粗皮　良薑炒

蒲黃炒　甘草炙　沒藥各半兩

右為末每服五錢溫酒調服

【案】一婦人三十歲每因浴後必用冷水淋通身又嘗大驚遂患經來時必先少腹大痛口吐涎水然後經行行後又吐水二日其痛直至六七日經水止時方住百藥不効予診其脉寸滑大而弦關尺皆弦大而急尺小於關關小於寸所謂前大後小也遂用香附[illegible]兩半[illegible]茯苓黃芩各壹兩半枳實玄胡牡丹

皮人參當歸白朮桃仁各壹兩黃連[illegible]錢川楝遠志甘草各半兩桂[illegible]錢[illegible]五貼水煎入生薑汁兩蜆殼熱服後用熱湯洗浴得微汗乃已忌當風坐臥手足見水并喫生冷服三十貼全愈半年後又因驚憂而病復舉腰腹時痛小便淋閉心惕惕跳驚悸[illegible]意其表已解病獨在裏先與灸少衝勞宮崑崙三陰交止悸定痛次用桃仁承氣大下之下後用香附叁兩蓬术當歸身各壹兩半三稜玄胡索桂大黃青皮俱醋製青木香檳榔滑石木通桃仁各壹兩烏藥甘草[illegible]檳榔肉各半兩木香吳茱萸各貳錢分作二十貼入新取牛膝濕者貳錢[illegible]煎去片用荊芥湯煎服服訖漸安

右行血例

加味烏沈湯　治婦人經水欲來臍腹㽲痛

烏藥　縮砂　木香

玄胡索各壹兩　香附炒去毛貳兩　甘草壹兩半

右細剉每服七錢水一盞半生薑三片煎至七分不拘時溫服

右抑氣例

【案】一婦人經行腹痛[illegible]後發熱作渴

此乃氣血不足用八珍[illegible]而愈後[illegible]年血經不行[illegible]入參湯逍遙散自余例方愈[illegible]

右補虛例

【案】一婦人瘦小年二十餘經水紫色或前或後臨行腹痛[illegible]或時感寒腹亦作痛[illegible]澀兩尺沉弦略洪而滑此血熱也或曰[illegible]如此何謂為熱曰熱極似寒也遂用酒煮黃連[illegible]兩香附歸身尾各貳兩五靈脂[illegible]之而愈

一婦年二十一[illegible]求死脉

殺血驟大則沉細而近數汪曰經收斂澀[illegible]
緩尺沉緊滑澀也以酒煮黃連半斤炒香附陰[illegible]
五靈脂半炒牛膝參兩歸身尾各兩爲末粥丸空心
湯下三四錢服至五六料越九年得一子又越四年
經行兩月不斷腹中微痛又服前丸而愈續後經行
六七日經止則流清水腹中微痛又服前丸而痛亦
止又經住只有七八日清水行時或大行五六日續
則適來適斷或微紅或[illegible]經行後常流清水小腹大
痛漸連遍身胸背腰腿[illegible]骨痛自巳至酉乃止痛
則遍身冷熱汗大出汗止痛減尚能飲食自始痛至
今幾十五年[illegible]服藥多罔効者何也汪復診

之脈皆洪滑無力幸其尚存精神汪曰此非傷[illegible]比
癸病乃鬱熱今則虛寒東垣曰始爲熱中終爲寒中
是也經曰脈至而從按之不鼓乃陰盛隔陽當作寒
治且始病時而形斂小今則形肥大癸醫書曰瘦人
血熱肥人氣虛豈可同一治耶所可慮者汗大泄而
脈不爲汗衰血大崩而脈不爲血減耳其痛日重夜
輕知由陽虛不能健運故亦凝滯而作痛以證參脈
宜用助陽[illegible]參[illegible]氏歸來
大劑加桂附一帖來早再診脈皆稍斂服至一二三十帖

帖脈[illegible]二月令左片痛自[illegible]所以病有始終寒熱之異
藥有前後用舍不同形有肥瘦壯少不等豈可以一
方而通治哉

但經過後而作痛者乃虛中有熱所以作痛
新荷姐頭痛口乾經行後身痛腰[illegible]痛

生地黃　白朮　芍藥各壹錢
芎藭　歸身尾各伍分　黃蘗炒
甘草炙各參分　右用水入少酒煎服

按經後腹痛爲虛明此[illegible]脈不數[illegible]熱未可
斷其爲熱也[illegible]八珍爲宜有熱逍遙爲宜

治發熱例

發熱不必治一婦經血過多五心煩熱日晡潮熱
諸藥不效以四物加胡黃連三服而愈　薛新甫治
一婦人發熱口乾月經不調兩腿無力服祛風滲濕
之劑腿痛體倦二膝浮腫經事不通薛作肝脾腎三
經血虛火燥名鶴膝風用六味地黃八味二丸兼服兩
月形體漸健飲食漸進膝腫漸消不半載而痊前證
若肝脾虛[illegible]足膝[illegible]或足膝枯細用八味丸若飲
食[illegible]或浮腫作痛用補中益氣
加[illegible]一[illegible]經後適期發熱倦怠或

用四物黃連之類反兩月之度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽薛曰脾爲諸陰之首目爲血脈之宗此脾傷五臟皆爲失所不能歸于目矣遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主脾胃年餘尋愈　一婦人月事未期而至發熱自汗服清熱止汗之劑反作瀉頭痛手掉身麻此因肝經風熱用柴胡炒芩連炒山梔歸芍生地丹皮各壹錢參芪苓朮各壹錢伍分川芎七分甘草五分二劑其汗全止更以補中益氣而愈凡發熱久者陽氣亦自病須調補之　一婦人氣血素虛經行不調飲食少思日晡熱甚用十全大補加山茱萸山藥丹皮麥門冬五味子而愈次年秋寒熱或用清脾飲而元氣愈弱仍以前藥而愈

一婦人素勤苦冬初患咳嗽發熱久而吐血盜汗經水兩三月一至徧身作痛或用化痰降火藥口噤筋攣此血虛而藥益損耳用加減八味丸及補中益氣加麥門五味山藥治之年餘而痊

集議　經水適來適斷者或有往來寒熱者先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之

凡婦人血脈不調往來寒熱狀如勞倦

當歸　川芎[illegible]　甘草

黃芪　官桂去麤皮各壹兩　熟地黃

白朮　白芍藥各貳兩　柴胡

阿膠各半兩

爲細末每服五錢棗一枚水煎空心溫服白湯點服亦得常服不生帶下調血脈養子宮終身無病

太倉公治一女病腰背痛寒熱衆醫皆以爲寒熱也公診之曰內寒月事不下也即竄以藥旋下病已病得之欲男子不可得也所以知其病者診其脈時切之腎脈也嗇而不屬嗇而不屬者其來難堅故曰月不下肝脈弦出左口故曰欲男子不可得也蓋男子以精爲主婦人以血爲主男子精盛則思室女子血盛則懷胎夫肝攝血者也厥陰弦出寸部又上魚際則陰血盛可知矣[illegible]

薛新甫治一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝火氣滯而血凝用小柴胡加山梔川芎丹皮治之諸證悉退

月事不行而寒熱者詳經閉門

熱入血室　凡婦人傷寒傷風發熱經水適來晝則安靜夜則譫語有如瘧狀此爲熱入血室治者無犯胃氣及上二焦宜服小柴胡湯若脈遲身涼當刺期門穴下針病人五吸停針良久徐徐出針凡針期門穴

必瀉勿補肥人二十瘦人一十也 〇前證若因勞
役或怒氣發熱適遇經行而患前證者亦用小柴胡
湯加生地黃治之血虛用四物加柴胡若病既愈而
熱未已或元氣素弱並用補中益氣湯脾氣素鬱用
濟生歸脾湯血氣素虛用十全大補湯 許學士治
一婦病傷寒發寒熱遇夜則如見鬼狀經六七日忽
然昏塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人病勢危
困許視之曰得病之初曾值月經來否其家云經水
方來病作而經遂止得一二日發寒熱晝雖靜夜則
有鬼祟從日昨不省人事許曰此乃熱入血室證仲

景云婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明了暮則
讝語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉
以剛劑與之遂致胸膈不利涎潮上脘喘急息高昏
冒不知人當先化其痰後除其熱乃急以一呷散投
之兩時頃涎下得睡省人事次授以小柴胡湯加生
地黃三服而熱除不汗而自解矣 一婦人患熱入
血室證醫者不識用補血調氣藥治之數日遂成血
結胸或勸用前藥許公曰小柴胡已遲不可行也無
已刺期門穴斯可矣予不能針請善針者治之如言
而愈或問熱入血室何爲而成結胸許曰邪氣傳

入經絡與正氣相搏上下流行遇經水適來適斷邪
氣乘虛入于血室血為邪所迫上入肝經肝受邪則
讝語而見鬼復入膻中則血結于胸中矣何以言之
婦人平居水養木血養肝方未受孕則下行之為月
水既孕則中畜之以養胎及已産則上壅之以為乳
皆血也今邪逐血併歸于肝經聚于膻中結于乳下
故手觸之則痛非藥可及故當刺期門也 虞恒德
治一少婦夏月行經得傷寒似瘧譫語狂亂諸醫皆
以傷寒內熱投雙解散解毒湯服之大汗如雨反如
風狀次以牛黃丸金石之藥愈投愈劇一日延虞診

視脈弦而大虞思傷寒內熱狂亂六陽俱病豈不口
乾舌黑況昏不數病體捫之或熱或靜其腹急痛意
必有內傷在前傷寒在後今傷寒得汗雖已內傷則
尚存故也因細問之患者曰正行經時因飲食後多
汁用冷水抹身因得此證方知冷水外閉其汗內閉
其血邪熱入室經血未盡血得邪熱乍靜乍亂寒熱
譫語掉眩類風須得玉燭散下之而愈下後譫語已
定次以四物小柴胡湯調理五日熱退身涼其患遂
瘳 衛生云 一婦人溫病已十二日診之其脉六七
至而濇寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾不了了耳

藥間之病數日經水乃行此屬少陽熱入血室也若
治不對病則必死乃按其證與小柴胡湯服之二日
又與小柴胡湯加官桂乾薑一日寒熱遂止又云臍
下急痛又與抵當丸微利臍下痛痊身漸涼脈漸勻
尚不了了乃復與小柴胡湯次日但胸中熱燥口鼻
乾又少與調胃承氣湯不得利次日心下痛又與大
陷胸湯半服利三行次日虛煩不寧時妄有所見復
狂言雖知其尚有燥屎以其極虛不敢攻之遂與竹
葉湯去其煩熱其夜大便自通至曉兩次中有燥屎
數枚而狂言虛煩盡解但咳嗽唾此肺虛也若不治

恐成肺痿遂與小柴胡湯去人參大棗生薑加乾薑
五味子湯一日咳減二日而病悉愈以上皆用仲景
方　立齋治一婦人經行感冒風寒日間安靜至
夜譫語用小柴胡加生地治之頓安但內熱頭暈用
補中益氣加蔓荊子而愈後因惱怒寒熱譫語胸脅
脹痛小便頻數月經先期此是肝火血熱妄行用加
味逍遙加生地黃而愈　一婦人因怒寒熱頭痛譫
語日晡至夜益甚而經暴至蓋肝藏血此怒動火而
血妄行用加味逍遙散加生地黃治之神思頓清但
食少體倦月經未已蓋脾統血此脾氣虛不能攝血

用補中益氣治之月經漸止　一婦人懷抱鬱結感
冒經行譫語服發散之劑不應用寒涼降火前證益
甚更加月經不止肚腹作痛嘔吐不食痰涎自出此
脾胃虛寒用香砂六君脾胃漸健諸證漸退又用歸
脾湯而全愈

加味小柴胡湯　治婦人傷風經行寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結致如瘧狀

柴胡二錢　半夏　黃芩各[illegible]

生地黃　人參各[illegible]　甘草[illegible]

作一服水二鍾薑五片棗二枚煎一鍾不拘時服

乾薑柴胡湯　治婦人傷寒經脈方來熱入血室寒熱如瘧或狂言見鬼

柴胡一錢　桂枝三分　栝蔞根五分

牡蠣煅　乾薑炮　甘草炒各三分

右水煎服汗出而愈

海蛤散　治婦人傷寒血結胸脅宜服此藥及針期門穴

海蛤　滑石水飛　甘草各五錢

芒硝壹兩

右為末每服二錢用雞子清調下小腸通利其結

血自散更用桂枝紅花以發其汗則愈方見
陳[illegible]注右山治一婦經行必瀉三日然後行診其脉皆濡弱此脾虚也脾屬血屬濕經水將動脾血先已流注血海然後下流為經脾血既虧則虚而不能運行其濕令作參苓白术散每服二錢一日米飲調下二三次月餘經行不瀉矣　一婦年逾四十形長色脆病經不調右脉浮軟而大左脉虚軟而小近驟當時經前作泄今年四月感風咳嗽用湯洗浴汗多因泄一月六月復因洗浴發瘧六七次瘧雖止而神思不爽至八月盡而經水過多白帶時下瀉泄遂覺右

脚疼痛[illegible]肉腹脹今則股此延痛臀腿腰胯尻骨頸項右[illegible]皆痛或咳嗽一聲則腰眼痛如嵌札日輕夜重[illegible]痛不已[illegible]痛稍止飲食如常今[illegible]月水過多白帶時下日輕夜重瀉泄無時亦屬下多亡陰宜作血虚論治服四物[illegible]痛益甚尼月汪復診[illegible]此病乃合仲景所謂陽生則陰長之法矣人參[illegible]帶下當泄瀉皆由陽虚陷下而然命曰陽[illegible]旦輕夜重蓋日陽旺而得健運之職故血亦無凝滞之患而日故輕也夜則陰旺而陽不得其任失其健運之常血亦隨滞故夜重也遂以參术助陽之藥煎服五七貼痛減此亦病證之變治法殊當故記之

[illegible]　婦人月水不斷淋漓無時或因勞損氣血而傷衝任或因經行而合陰陽皆令氣虚不能攝血若時止時行腹痛脉沉細此寒熱邪氣客於胞中非因虚弱也　[illegible]前證若鬱結傷脾用歸脾湯恚怒傷肝逍遙散肝火妄動加味四物湯脾氣虚弱六君子湯元氣下陷補中益氣湯熱傷元氣前湯加五味麥門[illegible]藥　儒者錢思習子室年三十餘無嗣月經淋瀝無期夫婦異處幾年矣思習欲為娶妾以謀

諸[illegible]余謂此鬱怒傷肝脾虚火動而血不歸經乃肝不能藏脾不能攝也當清肝火補脾氣遂與加味歸脾逍遙二藥四劑送至其家仍告其姑曰服此病自愈而當受胎妾可無娶也果病愈次年生子　一婦人性急每怒非太陽耳項喉齒胸乳作痛則胸滿吞酸吐瀉少食經行不止此皆肝火之證肝自病則外[illegible]見[illegible]則內證作　[illegible]加[illegible]白朮茯苓柴歸炒梔炒[illegible]膽消　[illegible]加柴胡芎藥神麯吳茱萸炒黃　[illegible]月經不止只血分有熱邪氣尚虚以逍遙散倍用白朮茯苓陳

皮寸以補中益氣加酒炒芍藥兼服而安　一婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體倦瘦口乾內熱盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生發元氣用參芪歸朮茯神遠志棗仁麥門五味丹皮龍眼肉炙草柴胡升麻治之獲痊　一婦人懷抱不舒腹脹少寐飲食素少痰涎上湧月經頻數余曰脾統血而主涎此鬱悶傷脾不能攝血歸源耳用補中益氣濟生歸脾而愈

膠艾湯　治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷

阿膠炒　川芎　甘草炙各貳兩
當歸　艾葉炒各叁兩　熟地黃
白芍藥各肆兩

右㕮咀每服半兩水煎　一方有黃芪

續斷丸大全　治月水不斷口乾心煩四肢羸乏飲食減少

川續斷　當歸　烏鰂骨
黃芪　牛角鰓燒　五味子
甘草　赤石脂煅研
熟地黃各壹兩　地榆半兩　艾葉
附子　乾薑　川芎各柒錢半

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心溫酒下

禹餘糧丸　治久冷月水不斷面黃肌瘦虛煩減食

禹餘糧貳兩　鹿角膠粉炒柒錢半　紫石英
續斷　赤石脂　熟地黃
川芎各壹兩　乾薑　黃芪
艾葉　柏葉炒　當歸炒
人參　白茯苓各半兩

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心米飲下

牡蠣丸　治血海虛損月水不斷

牡蠣粉　赤石脂　代赭石各壹兩
阿膠　川芎　當歸
鹿茸　續斷　乾薑各叁兩
甘草貳錢半

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸空心溫酒下

經驗方　治經血不止

黃芩伍分　當歸　柏葉
蒲黃各肆分　生薑貳分　艾葉壹分
生地黃貳拾肆分　伏龍肝拾貳分

右㕮咀用水二升煎取八合分為二服

又經血不止詩云　婦人經血久淋漓舊蓋蓮蓬燒作灰熱酒一杯調入字自然安樂更無疑

又方　蓮蓬殼　拒霜花各等分（燒灰）為末每服二錢空心米飲調下

伏龍肝散和劑　治血氣勞傷衝任脉虛經血非時注下或如豆汁或成血片或五色相雜臍腹冷痛月經不止

伏龍肝　麥門冬去心　赤石脂各壹錢
熟地黃　艾葉炒各壹錢半　當歸去蘆炒
川芎各壹錢　肉桂去粗皮　乾薑炮
甘草各半錢

右作一服水一鍾紅棗一枚煎至一鍾食前服

固經丸　治經水過多不止乃陰挾熱所致法當補陰清熱

黃檗炒參兩　龜板炙酥兩　黃芩貳兩
白芍藥參兩　樗根皮壹兩半　香附子童便製壹兩半

右為細末酒糊丸梧子大每以空心食前白湯下五七十丸

月水不調良方　婦人月水不利者由勞傷氣血體虛而風冷客於胞內傷於衝任之脉故也若寸脉弦關脉沉是肝病也兼主腹痛孔竅生瘡尺脉滑血氣實經絡不利或尺脉絕不至兼主小腹引腰痛氣攻胸膈也　調前證屬肝膽二經蓋肝膽相為表裏多因恚怒所傷若本經風熱用補肝散方見前血虛用四物加酸棗仁若腎水不足用六味丸若患瘡瘍治見後

牛膝散　治月水不利臍腹作痛或累小腹引腰氣攻胸膈

牛膝酒浸壹兩　桂心　赤芍藥
桃仁去皮尖　玄胡索炒　當歸酒浸
牡丹皮　木香各柒錢半

右為末每服一錢空心溫酒調下

牡丹散　治月候不利腹臍疼痛不欲食

牡丹皮　大黃炒各壹兩　赤茯苓
桃仁　生地黃　當歸
桂心　赤芍藥　白朮各柒錢半
石韋去毛　木香各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎七分空心溫服

濟實方　治女人月經不利臍下氣脹上攻欲嘔不

科聊
當歸（半錢）　乾漆（炒令煙盡）
右爲細末，煉蜜丸梧子大，空心溫酒下十五丸。
養榮湯　治婦人血海虛弱，心中怔忪，時多驚悸，或
發虛熱，經候不調。
白芍藥　川芎　熟地黃
黃芪　當歸　川薑
青橘皮　五加皮　牡丹皮
海桐皮　白芷（各等分）
每服三錢，水一盞半，生薑五片，烏梅一箇，煎至一
女科一　二七
分，去滓服，不拘時，送紫桂丸五十粒。（紫桂丸見帶下）
[illegible]論　一云：男子生於寅，寅屬木，陽中有陰，故
八數。女子生於申，申屬金，陰中有陽，女子得
七數。男以氣爲主，八八則卦數已盡，盡則陽精痿；女
以血爲主，七七則卦數已終，終則經水絕，任衝脈虛
衰，天癸絕，地道不通，而無子矣。或勞傷過度，喜怒不
時，經脈衰微之際，又爲邪氣攻衝，所以當止不止而
崩下也。　許學士云：婦人經脈過期不及，腰腹疼痛，
或七七數盡而月經下者，宜用當歸散治之。
當歸散　治婦人天癸已過期，經脈不勻，或三四月
不行，或一月再至，腰腹疼痛。《素問》云：七損八益，謂
女子七數盡，而經不依時者，血有餘也，不可止之，
但令得依時，不腰痛爲善。（方見前調經平補）
芩心丸　治婦人四十九歲已後，天癸當住，每月
却行，或過多不止，用黃芩心枝條者二兩，米泔浸
七日，炙乾，又浸又炙，如此七次，爲末，醋丸如桐子
大，每服七十丸，空心溫酒送下，日進二服。
右二方，熱者宜之。
桂附湯　補任衝，調血氣。
乾薑（炮）　肉桂（去粗皮）　附子
女科一　三八
鹿茸　防風（各等分）　北蝎（炒）
當歸（各貳兩）　鹿茸（酒炙各兩）
每服三錢，水二鍾，煎八分，溫服。
補中芎藭湯　治風虛冷熱，勞傷衝任，月水不調，崩
中暴下，產後失血過多，虛羸腹痛，或妊娠胎動不
安，下血。
當歸　乾薑（炮各叁兩）　川芎（[illegible]）
黃芪　甘草（炙）　吳茱萸（炮黃）
杜仲（炒）　熟地黃　人參（各壹兩）
每服三錢，[illegible]，空心服。

右二方寒者宜之，亦有血海虛寒而不行者也。

前證若肝腎虛熱，用當歸散；肝血虛熱，四物加柴胡、山梔、丹皮；肝火內動，小柴胡加山梔、丹皮；肝火血燥，加味逍遙散；脾經鬱火，加味歸脾湯；肝脾鬱火，歸脾、逍遙兼服；肝腎虧損，歸脾、六味兼服。仍與前後月經不調治驗同用、一婦人年五十，內熱晡熱，經水兩三月一至，此血虛有熱，用逍遙散加山茱萸治之而愈。後有痰作渴，或小便不調，或頭暈白帶，用六味丸而安、

問曰：婦人年五十數，一朝而崩血二三日不止，何病？以治之。師曰：此婦人前絕不經水不下，今反崩，此爲何經[illegible]……此經水下者在[illegible]

女科　十九

經閉

內經陰陽別論云：二陽之病發心脾，有不得隱曲，女子不月，其傳爲風消，爲息賁者，死不治。　潔古曰：女子月事不來者，先瀉心火，血自下也。內經曰：二陽之病發心脾，有不得隱曲，故女子不月，其傳爲風消。王啓玄註曰：大腸胃熱也，心脾受之，心主血，心病則血不流；脾主味，脾病則味不化，味不化則精不足，故其病則不能隱曲。脾土已病，則風邪勝而氣愈消也。又經曰：月事不來者，胞脈閉也。胞脈屬於心，絡於胞中，今氣上迫肺，心氣不得下通，故月事不來。先服降心火之劑，後服局方中五補丸，後以衛生湯治脾養血也、　李東垣曰：經閉不行有三，補前人之闕。　婦人脾胃久虛，形體羸弱，氣血俱衰，以致經水斷絕不行；或病中消胃熱，善食漸瘦，津液不生。夫經者，血脈津液所化，津液既絕，爲熱所爍，肌肉漸瘦，時見渴躁，血海枯竭，名曰血枯經絕，宜瀉胃之燥熱，補益氣血，經自行矣。此病或經適行而有子，子不成而爲胎病者有矣。　或心包絡脈洪數，躁作時見，大便秘澀，小便雖清不利，而經水閉絕不行，此乃血海乾枯，宜調血脈，除包絡中火邪，而經自行矣。

經閉　女科　八十

子142 058

也

或因勞心心火上行月事不來者胞脈閉也包
脈者屬於心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下
通故月事不來宜安心補血瀉火經自行矣（此上俱心肺熱結也）
裴澤之夫人病寒熱月事不至者數年又加喘
嗽醫者率以蛤粉桂附投之曰不然夫人病陰爲陽
所搏溫劑太過故無益反害投以涼劑涼血和血藥
則行矣已而果然

五補丸（補諸虛安五臟堅骨髓養精神）

熟地黃　人參　牛膝（酒洗去蘆焙乾）
白茯苓　地骨皮（各等分）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三五十丸溫酒
下空心服

衛生湯

當歸　白芍藥（各二兩）　黃芪（三兩）
甘草（壹兩）

右爲末每服半兩水二盞煎至一盞溫服空心如
虛者加人參壹兩

右東垣潔古治血枯之法皆主於補血瀉火也補
血者四物之類瀉火者東垣分上中下故火在中
則善食消渴治以調胃承氣之類火在下則大小
秘澀治以玉燭之類玉燭者四物與調胃承氣等
分也火在上則得於勞心治以芩連及三和之類
三和者四物涼膈當歸等分也潔古先服降心火
之劑者蓋亦芩連三和玉燭之類後服五補衛生
者亦補氣之劑也

【素】帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊
臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名爲
何何以得之岐伯曰病名血枯此得之少年時有所
大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也
帝曰治之奈何岐伯曰以四烏鰂骨一藘茹二味并

合之丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯飲以鮑魚
汁利腸中及傷肝也（[illegible]）

右岐伯河間治血枯之法

凡血枯經閉者四物湯加桃仁紅花　陰虛經脈久
不通小便短澀身疼者四物加蒼朮牛膝陳皮生甘
草作湯又用蒼莎丸加蒼耳酒芍藥爲丸就煎前藥
吞下

右丹溪治血枯大法

夫經水，陰血也，屬衝任二脈主，上為乳汁，下為月水。其為患，有因脾虛而不能生血者，有因脾鬱傷而血耗損者，有因胃火而血消爍者，有因脾胃損而血少者，有因勞傷心而血少者，有因怒傷肝而血少者，有因腎水不能生肝而血少者，有因肺氣虛不能行血而閉者。治療之法，若脾虛而不行者，調而補之；脾鬱而不行者，解而補之；胃火而不行者，清而補之；脾胃損而不行者，調而補之；勞傷心血而不行者，靜而補之；怒傷肝而不行者，和而補之；肺氣虛而不行者，補脾胃；腎虛而不行者，補脾肺。經云：損其肺者益其氣，損其心者調其榮衛，損其脾者調其飲食、適其寒溫，損其肝者緩其中，損其腎者益其精。審而治之，庶無誤矣。

一婦人停食飽悶發熱，或用人參養胃湯益甚；再用木香檳榔丸，泄瀉吐痰，腹中成塊，飲食少思；又用二陳、黃連、厚朴之類，前證益甚，腹脹不食，月經不至。余以為胃氣虧損，用補中益氣加茯苓、半夏，三十餘劑，脾胃健而諸證愈；又二十餘劑而經自行。

一婦人飲食後，或腹脹，或吞酸，彼服枳朮丸，吞酸益甚，飲食日少，胸膈痞滿，腿內酸痛，畏見風寒；又服養胃湯一劑，腿內作痛；又一劑，腿膝浮腫，月經不行。

余謂鬱結所傷，脾虛濕熱下注，侵晨用四君、芎、歸、二陳，午後以前湯送越鞠丸，飲食漸進，諸證漸愈；又用歸脾、八珍二湯兼服，兩月餘而經行。

一婦人性沉多慮，月經不行，胸滿少食，或作脹，或吞酸。余以為中氣虛寒，用補中益氣加砂仁、香附、煨薑，二劑胸膈和而飲食進；更以六君加芎、歸、貝母、桔梗、生薑、大棗數劑，脾胃健而經自調矣。

一婦人素有胃火，或用清胃散而安；後因勞役，燥渴內熱，肌肉消瘦，月經不行。余謂此胃火消爍陰血，用逍遙散加丹皮、炒梔以清胃熱，用八珍湯加茯苓、遠志以養脾血，而經自行矣。

一婦人久患瘧，形體怯弱，內熱晡熱，自汗盜汗，飲食少思，月事不行；或用通經丸，虛證悉具。余曰：此因虛而致疾，因疾以閉經也。用補中益氣及六味地黃丸各百餘劑，瘧愈而經行。

一婦人久患瘧，瘧作則經不行，形虛脈大，頭痛懶食，大便泄瀉，小便淋瀝，口乾唇裂，內熱腹脹。蓋由久瘧正氣已虛，陰火獨旺，用補中益氣湯治之，瘧愈，惟不時頭痛，乃加蔓荊子而痛止；又兼用六味地黃丸而經行。

一婦人因勞耳鳴頭痛體倦，此元氣不足，用補中益氣加麥門、五味而痊。三年後得子，因飲食勞役，前症益甚，月經不行，晡熱內熱

自汗盜汗用秦艽鼈甲散補中益氣湯加減之○一婦
人胃氣素弱為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水三月
不行余以為悲則傷肺思則傷脾遂朝服補中益氣
加桔梗貝母知母夕用歸脾湯送地黃丸而愈○一
孀婦少寐經水兩月餘一至誤服通經丸展轉無寐
午前惡寒午後發熱余以為思慮傷損脾血用歸脾
湯作丸午前以六君送下午後以逍遙散送下兩月
餘得寐半載經行如期年餘而痊愈
右法以治[illegible]元為上蓋木易水
師曰[illegible]
經門
問曰婦人當下利而經水反斷者何也師曰但當止
利經自下勿怪所以利不止而血斷者但下利
亡津液故經斷利止津液復經當自下　問曰婦人
病下利一月而反經來今脈反微澀何也師曰
此前中有當下利故令妨經利止月經當自下此
非軀也　婦人血下咽乾而不渴其經必斷此榮不
足本自有微寒故不引飲渴而引飲者津液得通榮
衛自和其經必復下
仲婦人之病因虛積冷結氣為諸經水斷絕至有歷
年血寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎沫久

成肺癰形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛
與臟相連或結熱中病在關元脈數無瘡肌若魚鱗
時着男子非止女身在下未多經候不勻令陰掣痛
少腹惡寒或引腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脛疼煩
奄忽眩冒狀如厥顛或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下
非有鬼神久則羸瘦脈虛多寒三十六病千變萬端
審脈陰陽虛實緊弦行其針藥治危得安其雖同病
脈各異源子當辨記勿謂不然
丹經候過期不行杜牛膝搗汁大半鍾以玄胡末一
錢香附末枳殼末各半錢空心調服
經門
大萬病丸　治經事不來繞臍痛
乾漆 杵碎炒烟盡　牛膝 酒浸焙乾各一兩
右為末以生地黃汁一升入二味藥末銀器內慢
火熬可丸即丸如桐子大每服二丸空心米飲或
溫酒下
土牛膝散　治婦人室女血閉不通五心煩熱
土牛膝　當歸尾 各壹兩　桃仁 去皮尖麩炒另研
紅花 各半兩
右為細末每服二錢空心溫酒下
當歸乾漆丸　療月經不利臍下氣逆氣脹 見調經門月水不利

治月經澁滯臍腹疼痛

當歸 玄胡索

右為粗末每服三錢薑三片水一鍾半煎至七分去滓稍熱服

當歸散 治血脉不通

當歸 穿山甲灰炒 蒲黃炒各半兩

辰砂一錢另研 麝香少許

右為細末研勻每服二錢食前熱酒調下

琥珀散 治心膈迷悶腹臟撮痛氣急悶月信不通等疾

經閉 女科一 八十七

天台烏藥 當歸 莪朮各壹兩

右為細末每服二錢溫酒調下後以食壓之忌生冷油膩産後諸疾炒薑酒調下

小腸移熱於大腸為伏瘕為沉 王註云血澀不利月事沉滯而不行

治婦人月水澁滯不快結成瘕塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別以淨器盛熬成膏食前溫酒調下半匙

雞血極膏治婦人乾血氣以川大黃

成膏子丸如雞頭大每服一丸酒化下 腹脹大

便利一二行後紅脉自下是婦人之仙藥也 當歸

頭

經閉 血 婦人經水不利抵當湯主之 亦治男子膀胱滿急有瘀血者方見傷寒

産寶方 治月經不通腹中痛

牛膝陸分 大黃 桃仁去皮尖炒

細辛各肆分 川芎 當歸各肆分

水蛭糯米炒黃

右為細末煉蜜丸梧子大每服二十丸空心溫酒下

千金桃仁煎 治血積癥瘕月水不行

經閉 女科一 八十八

大黃湯浸 朴硝 桃仁各貳兩

虻蟲去足翅炒黑

右為細末醋二升半銀石器中慢火熬膏却入大黃桃仁虻蟲末不住攪度可丸却入朴硝再攪良久出之丸如梧子大五更初溫酒下五丸至日午取下如赤豆汁雞肝蝦蟆衣樣候鮮紅住服仍以調氣藥補之

三稜丸 治婦人經脉不通氣痛帶下兼治血瘕

三稜醋炒 川芎 牛膝

玄胡索 蓬朮醋炒 蒲黃

莪蒁 牡丹皮 芫花醋炒
白芷 當歸 地龍去土酒炒
乾薑炮各壹兩 大黃貳兩為末以米醋熬成膏和藥
右為細末以大黃膏和丸如梧子大每服三五十
丸空心醋湯下或紅花煎酒下
右經一節方七首皆治汚血有熱而經閉滿一方
輕劑後六方重劑也
紅花當歸散 治婦人經候不行或積瘀血腰腹
疼痛及室女月經不通
紅花 當歸尾 紫葳
女科一
牛膝 甘草 蘇木細剉各貳兩
赤芍藥炙各 劉寄奴伍兩 桂心
白芷各壹兩半
右為細末空心熱酒調三錢服之食前臨卧再服
若久血不行濃煎紅花酒下孕婦休服一名凌霄
花散即紫葳
牛膝散 治經閉月 溫經湯見前調經門
桂枝桃仁湯 治婦人月事不通臍腹脹疼痛見調經門腹痛條
牡丹散見前調經

通經丸 治婦人室女月候不通或成血瘕 本事
桂心 青皮去白 大黃炮
乾薑炮 川椒炒出汗 川烏炮
蓬莪朮 乾漆炒煙盡 當歸
桃仁去皮尖炒各等分
右為末先將四錢用米醋熬成膏和餘六錢末成
劑臼中杵丸如梧子大晒乾每服二十丸用淡醋
湯下加至三十丸溫酒亦得空心食前服 濟生
去川烏加紅花等分
滋血湯 治婦人勞傷致臟腑衝任氣虛不能約制經血
以致崩中或下鮮血或下五色連日不止淋瀝不
斷形羸氣劣倦怠因之月水閉絕
馬鞭草 牛膝 荊芥穗各貳兩
當歸 肉桂 牡丹皮
赤芍藥 川芎各壹兩
右每服四錢烏梅一箇水二盞煎一盞食前服日
進四五服服至半月或一月經脈自通
右方七首皆治汚血有寒而經閉前四方輕劑後
三方重劑也

大治月水不通屢試有驗厚朴不以多少薑汁炙香
細切濃煎去查空心服不過三四劑瘥形實氣盛者宜之
丹積痰傷經不行夜則妄語
瓜蔞子壹兩 黃連半兩 吳茱萸拾兩
桃仁伍拾粒 紅麯貳錢 縮砂叁兩
山查末壹兩
右生薑汁研炊餅為丸
軀脂滿經閉導痰湯加芎連不可服地黃如用薑汁
拌炒[illegible]
楊村婦人年二十餘兩年經閉食少乏力

黃連[illegible] 白术壹錢 陳皮
滑石叁壹錢 黃芩半錢 木通叁分
桃仁拾貳個 甘草炙少許 此方分兩有訛
右丹溪治痰結胸腹而經閉之法皆用輕劑導痰
降火也
經云氣上迫肺則心氣不得下通故月事不來今用
連朴之類導痰降火使不上迫於肺故心氣下通而
月事來也
丹溪治一婦人久瘧食少經閉兩手無脉每日與白
花[illegible]十餘[illegible]一月餘食進脉出又半月脉

愈又一月經行亦此意也許見久瘧子宮擬丹溪之
意治陳氏婦二十餘歲形肥痞塞不食每日卧至未
牌吃一盞薄粥吃粥後必吐水半碗仍復卧經不通
三月矣前番脅脇過思色脈之症六脉寸關滑皆有力
午後關滑寸不滑詢之因乘怒飲食而然遂以白朮
壹兩半厚朴黃連枳實各壹兩半夏茯苓陳皮山查
人參滑石各捌錢縮砂香附桃仁各半兩紅花貳錢
分作十貼每日服一貼各入薑汁二蜆殼間三日以
神祐丸神秘沉香丸微下之至十二日吐止食漸進
四十日平復如故又浙氏婦三十餘形瘦亦痞不食

用水經不通以前藥方加參术歸為君煎熟入竹瀝
半盞薑汁服之但不用神佑丸下亦平復君咳嗽寒
熱而經閉者當於欬門濕痰條求之
子和凡婦人月事不來用茶調散吐之次用玉燭散
芎歸湯三和湯桂苓白朮散之類降心火益腎水開
胃進食分陰陽利水道之藥也 一婦人月事不行
寒熱往來口乾頰赤飲食少旦暮間欬一二聲諸醫
皆用虻蟲水蛭乾漆硇砂芫青紅娘子沒藥血竭之
類惟戴人不然曰古方雖有此法柰病人服之必腑
腹發痛飲食不進乃命止藥飲食少進內經曰二陽

之病發心脾心及之則血不流故女子不月既心受
積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃誘食乃涌出痰一
二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自然滿流
月事不爲水濕所隔自依期而至矣亦不用蝱蟲水
蛭之類有毒之藥如用之則月經縱來小溲反閉他
證生矣凡精血不足宜補之以食大忌有毒之藥偏
勝而致夭閼多矣 一婦人年三十四歲經水不行
寒熱往來面色痿黃唇焦頰赤時咳三二聲問其所
服之藥黑神散烏金丸四物湯燒肝散鱉甲散建中
湯寧肺散針艾千百轉劇家人意倦不欲求治戴人

婦門 女科 九十

憫之先涌痰五六升午前涌畢午後食進餘證悉除
後三日復輕涌之又去痰一二升食益進不數日又
下通經散瀉訖一二升後數日去死皮數重小者如
麩片大者如葦膜不一月餘經水行神氣大康矣
月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今
氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也 [illegible]
太室女月水不來用雄鼠屎一兩燒存性爲細末空
心溫酒調下一錢神效
海掌中金丸 治婦人乾血氣
穿山甲炮 甘草 苦丁香
川椒 苦葶藶 白附子
豬牙皂角 草烏頭各一錢 巴豆 [illegible]
右爲細末以生葱絞汁和丸彈子大每用一丸新
綿包之內陰中一日即白二日即赤三日即血神
效
治婦人經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下白物
礬石丸主之
礬石三分燒 杏仁一分
右二味末之煉蜜丸棗核大內臟中劇者再內之
室女經閉成勞 寇宗奭曰夫人之生以氣血爲本人

婦門 女科 八十四

之病未有不先傷其氣血者若室女童男積想在心
思慮過度多致勞損男子則神色消散女子則月水
先閉蓋憂愁思慮則傷心而血逆竭神色先散月水
先閉且心病則不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故
發嗽腎水絕則木氣不榮而四肢乾痿故多怒鬢髮
焦筋骨痿若五臟傳徧則死自能改易心志用藥扶
持庶可保生切不可用青蒿虻蟲等涼血行血宜用
柏子仁丸澤蘭湯益陰血制虛火 內經云五穀入
於胃其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積于胸中
出於喉嚨以貫心脈而行呼吸 [illegible] 其有溢其津液注

之於脉化以為血以榮四末內養五臟六腑若服苦
寒之劑復傷胃氣必致不起　一室女年十七癥久
不愈天癸未通發熱咳嗽飲食少思欲用通經丸余
曰此蓋因禀氣不足陰血未充故耳但養氣血益津
液其經自行彼[illegible]速效仍用之余曰非其治也此
乃剽悍之劑大助[illegible]陰血得之則妄行脾胃得
則愈虛後果經血[illegible]行飲食愈少遂致不救
柏子仁丸　治如上證無服澤蘭湯
柏子仁 炒研　牛膝　卷柏 各半兩
澤蘭葉　續斷 各二兩　熟地黃 酒蒸三兩
為細末煉蜜丸如梧子大空心米飲下三十丸
澤蘭湯
澤蘭葉 三兩　當歸　芍藥 各一兩
甘草 半兩
為麤末每服五錢水一盞煎一盞溫服
沉香鱉甲散　室女經候凝滯或頭目昏悶停痰五
心虛煩少食多困
沉香　甘草 炙　檳榔 各叁分
木香　常山　當歸
柴胡　人參　半夏

桂心　生地黃　白茯苓
青皮　淨陳皮 各壹兩　鱉甲 壹兩半
右為細末每二錢薑三片水煎七分空心溫服
劫勞散　療心腎俱虛水火不交初則微嗽遇夜發
熱錯冷有盜汗倦怠瘦弱減食恍惚或微嗽唾中
有紅線名曰肺痿為不治
白芍藥 六兩　黃芪　甘草
人參　當歸　半夏
白茯苓　北五味子　阿膠 炒
熟地黃 洗 各二兩
右㕮咀每三大錢水盞半薑十二片棗三枚煎九分
服百藥不效一料除根
麥煎散　治少男室女骨蒸婦人血風攻注四肢心
胸煩壅口臭肌熱盜汗
鱉甲　大黃 煨　常山
赤茯苓　柴胡　白朮
當歸　乾漆 炒煙盡　生地黃
石膏 各壹兩　甘草 半兩
右為細末每服二錢水一盞小麥五十粒食後臨
臥溫服有虛汗加麻黃根一兩

牡丹散（和劑）治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肢體羸困漸成骨蒸

乾漆（炒令煙盡貳兩）　蘇木　蓬莪术
鬼箭（各壹分）　甘草　當歸
桂心　牡丹皮　芍藥
延胡索（炒）　淨陳皮　紅花
烏藥　沒藥（另研各壹兩）

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分溫服無時

六神湯（簡易）治血氣不足肌體煩熱四物湯加黃芪地骨皮各等分㕮咀水煎　又治衝任虛損月水行則發熱如瘵狀四物湯各一兩柴胡半兩黃芩　分水煎

桃仁散　治婦人女子血閉不通五心煩熱

紅花　當歸　桃仁（炒）　牛膝（各等分）

右為末每服三錢酒調下空心服

脈訣曰有一婦人將一女子年十五所來診言女子年十四時經水自下今經反斷其母言恐怖師曰若是夫人親女必夭[illegible]時次以經水下所以斷此為避年勿怪後當自下　此與氣[illegible]而然也宜因天元[illegible]水升火降則五臟自和而經

脈通矣　入方

鹿茸　山茱萸　當歸（各肆兩）　麝香（壹兩）

為細末入麝香拌勻和酒糊為丸每服百丸或五十丸溫酒鹽湯任下

針灸　心經脈不通已有寒熱此穴大効　三陰交（三分）

（[illegible]）

脈經脈不通（[illegible]）　曲池　支溝　三里　三陰交

（此[illegible]補之）

月經斷絕　中極　三陰交　腎俞　合谷

又法　四滿（在丹田傍[illegible]）

心經脈不通變成瘕聚飲食如常腹漸大如盤　氣海（[illegible]）　陰交（[illegible]）

中月水不通奔泄氣上下引腎脊痛氣穴主之　女子不下月水照海主之　婦人少腹堅痛月水不通帶脈主之　月水不利見血而有身則敗及乳腫臨泣主之

脈　腎脈微滑為不月

【按】用紫色成塊者血熱四物加黃連柴胡之類氣虛血虛者皆於四物內加參芪 急則治其標白芷湯調百草霜甚者棕櫚灰後用四物加炒乾薑調理因勞者用人參帶升補藥因熱者用黃芩因寒者用炒乾薑 【戴】血大至曰崩中或清或濁或純下瘀血或腐勢不可止證狀非一所感亦異甚則頭目昏暈四肢厥冷並宜膠艾湯吞震靈丹佐以三灰散或以童子小便煎理中湯或以沉香降氣湯加入百草霜米飲調下 血崩甚而腹痛人多疑惡血未盡又見

血色瘀黑愈信惡血之說不敢止截大凡血之為患欲出未出之際停在腹中即成瘀色難盡以瘀為惡又焉知瘀之不為虛冷乎若必待見瘀血之後截之恐併與人無之矣此腹痛更有說瘀血腹痛血通而痛止崩而腹痛血住則痛止宜芎歸湯加乾薑熟附一錢止其血而痛自止仍以刺花繡拭黑片燒灰研末米飲調下二三錢 以毛蟹殼燒存性米飲下亦有以早黃麻根燒灰為末米飲下 【脉經】云陰虛陽搏謂之崩又云陽絡傷則血外溢陰絡傷則血內溢又云脾統血肝藏血其多是憂思所傷虛損不能攝血歸源

或因肝經有火血得熱而下行或因肝經有風血得風而妄行或因怒動肝火血熱而沸騰或因脾經鬱結血傷而不歸經或因悲哀太過胞絡傷而下崩治療之法脾胃虛弱者六君子湯加當歸川芎柴胡脾胃虛陷者補中益氣湯加酒炒芍藥山梔肝經血熱者四物湯加柴胡山梔蒼术肝經風熱者加味逍遙散或小柴胡湯加山梔芍藥丹皮若怒動肝火亦用前藥脾經鬱火者歸脾湯加山梔柴胡丹皮哀傷胞絡者四君子湯加柴胡升麻山梔皮東垣丹溪諸先生云凡下血證須用四君子以收功斯言厥有旨哉

若大去血後毋以脉診當急用獨參湯救之其發熱潮熱咳嗽脉數乃是元氣虛弱假熱之脉也尤當用人參之類此等證候無不由脾胃先損故脉洪大察其有胃氣受補則可救設用寒涼之藥復傷脾胃生氣反不能攝血歸源是速其危也

經驗簡要治崩中等證 冷者脉緊細手足寒紅大淡黑或五色當歸建中加白龍骨血竭附子下紫石英丸震靈丹灸火 熱者脉洪四肢溫心煩口苦燥血沸而成用黃芩湯荊芥散或清心蓮子飲加竹瀝生地黃汁甚者生地黃汁磨京墨百草霜冷服 虛

若腹痛加香附各一錢若能以四物湯或養榮湯加
龍骨白芍送靈砂丹　實者腹中痛煮附丸四物湯
加香附子　心虛者怔忡多夢健忘舌強小便多面
紅盜汗宜柏子仁湯酸棗仁湯加龍骨當歸茯苓
靈砂丹又靈砂當歸蓮肉龍骨棗肉丸參湯送下崩
中作痛者當歸香者心氣已散急服靈砂龍骨等
有因婦崩中者下者用大薊根酒煎溫早服生麥中
紅花當歸花或六合即薊根也
分崩　受熱而赤者謂之陽崩　受冷而
白者謂之陰崩

膠艾湯　治陽崩不止小腹疼痛見前月水不調條

[illegible]丸　治陰崩不止
艾葉炒　鹿角霜　伏龍肝
乾薑各等分為末
右鎔鹿角膠和藥丸梧子大食後淡醋湯下五十丸

丹溪云凝鬱胸中清氣不升故經脈壅遏而降下非
開涎不足以行氣非氣升則血不能歸隧道此論血
泄之義甚明蓋開胸膈濁涎則清氣升清氣升則血
歸隧道不崩矣故其證或腹滿如孕或臍腹疞痛或
血結成片或血出則快止則悶或臍上動其治法宜

開結痰行滯氣消污血
〔醫案〕江氏婦三十歲時墮胎後血不止食少中滿倦
怠不起躁煩六脈沉伏而數重取微弦予作怒氣傷
肝感動胃氣　二陳加川芎白朮縮砂二十貼而安
仲景旋覆花湯　治半產漏下脈弦而大
旋覆花三兩　葱十四莖　新絳少許
右三味以水三升煮取一升頓服之
半夏丸　治下血吐血崩中帶下痰喘急滿虛腫
亦消宿水治痰飲
圓白半夏刮淨槌扁以生薑汁調飛白麵作餅包炙
黃色去麵取半夏作末
米糊為丸梧子大每服十丸溫熟水下　芎歸湯亦
香附降氣湯各半煎送下止血之要藥
丹　治婦人崩中下血不止以衣中白魚雞糞等分為
末以井花水服之日二服瘥
右三方開痰
〔調氣〕[illegible]附益散　治婦人血崩不止
香附子炒四兩　當歸尾一兩二錢　五靈脂一兩炒
右為細末每服伍錢醋湯調空心服立效
〔止〕治下血不止或成五色崩用香附子舂去皮毛

中斷之時炒爲末每服一錢溫米飲調下此方徐朝
奉傳其內人有是疾偏服藥不效後服此遂愈久服
爲佳亦治產後腹痛大是婦人仙藥常服益血調氣

大煮附丸 見前滴血門一方用香附子白芷爲丸

縮砂散 治血崩用縮砂仁不以多少於新瓦上炒
香爲細末米飲調下三錢

右四方行滯氣

治崩漏血 治血崩用乾荷葉濃煎湯一碗空心服之
立愈或調醋炒香附末丸妙

五靈脂散 治婦人血崩及治男子脾積氣

五靈脂 不以多少炒令烟盡出爲末

右爲末每服一錢溫酒調下此藥兼能解毒及蛇
蟲蜈蚣咬塗傷處立愈一方每服三錢水酒童便
各半盞煎至八分通口服名抽刀散治產後有疾
服二服散惡血或心腹脇肋腳痛不可忍者或止
用童子小便尤佳或中風即入草烏頭半錢同煎
亦治腸風下血如不飲酒者煎烏梅柏葉湯調下
如心煩口乾渴者加蒲黃炒減半一方燒存性研
醋酒下然此藥氣惡難喫燒之存性極妙一方治
婦人經血不止加當歸兩片酒一鍾與藥末同煎
服甘親服黃守正卿爲和劑局甘內子凌夫人忽
苦此疾危殆百藥不效偶得此方旋服遂愈

(雲) 治血崩不止五靈脂二錢炒熟加當歸酒同煎或
水酒童便各半盞同煎服一方五靈脂半生半熟爲
末酒調服一方水煎五靈脂半乾去滓澄清再煎成
膏入神麴末爲丸如桐子大空心溫酒下二三十丸
便止

又方 鹿茸炙醋 當歸各等分錢 蒲黃炒半兩 右爲末
溫酒調下五錢匕日三服

仲景桂枝茯苓丸 治婦人有癥在臍上動下血不止 方見□□門

右四方消污血

當歸芍藥湯 治婦人經脈漏下不止其色
鮮紅時值七月處暑之間先因勞役脾胃虛弱氣
短逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食亦不思食沉
困懶倦四肢無力大便時瀉後復因心氣不足其
經脈再下不止惟覺氣下脫其元氣逆上全無惟
覺心腹中氣不行氣短則不能言是無力以言非
懶語也此藥主之

黃芪一兩 白朮[illegible] 蒼朮泔浸去皮

當歸身　白芍藥各伍錢　甘草炙
生地黃各叁分　柴胡貳分　熟地黃
陳皮伍分
右十味爲麁末作二服水煎去滓熱服空心一服之後漸減次日諸證悉去頗喜飲食所以者何蓋氣通而開飲食之香得平康故也

論　婦人面黃或赤覺腰間或臍下作痛四肢困倦煩熱不安經行先發寒熱兩肋如束血湧如崩此脾胃虧損元氣下陷與相火濕熱所致用補中益氣加防風芍藥炒黑黃蘗煎服以歸脾湯調補而血始歸經

汪石山治一婦年逾四十形色蒼紫忽病血崩醫者或用涼血或用止澀俱罔効診之六脈皆沉濡而緩按之無力乃以氣病用血病藥也當用甘溫之劑健脾理胃使胃氣上騰血循經絡則無復崩矣遂用補中益氣湯多加參芪兼服參苓白朮散崩果愈

金匱膠艾湯　治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連日不止臍腹疼痛及妊娠將攝失宜胎動不安腹痛下墜或勞傷胞絡胞阻漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶奔衝短氣及因產乳衝任氣虛不能約制經血淋瀝不斷延引日月漸成羸瘦方見前月水不斷條

論　婦人久患血崩肢體消瘦飲食到口但聞腥臊口出津液強食少許腹中作脹此血枯之證肺肝脾胃虧損之患用八珍湯烏鰂魚骨圓兼服兩月而經行百餘劑而康寧如舊矣

柏子仁湯　治婦人憂思過度勞傷心經不能藏血遂致崩中下血不止

柏子仁炒　香附子炒去毛　芎藭
鹿茸火燎去毛酥炙　茯神去木　當歸各壹錢半
阿膠　小草各壹錢　川續斷壹錢
甘草炙伍分

右作一服水一鍾半生薑五片煎至一鍾空心服

論　經水漏不止有一種婦人之閫　婦人脾胃虛損致命門脈沉細而數疾或沉弦而洪大有力寸關脈亦然皆由脾胃有虧下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶者脈必弦細寒作於中有赤帶者其脈洪數疾熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行而先發寒熱往來兩脇急縮兼脾胃證出見或四肢困熱心煩悶不得眠臥心下急宜大補脾胃而升降氣血可一服而愈或先貴而後賤或先富而後貧病名脫營者

心氣不足其火大熾旺於血脈之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉顏色似不病者此心病也不形於脈故脾胃飲食不調其證顯矣而經水不時而下或適來適斷暴下不止治當先說惡死之言勸諭令懼死而心不動以大補氣血之劑補養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也故經曰大經空虛發則肌痺傳為脈痿此之謂也

益胃升陽湯　治血脫益氣古人之法也先補胃氣以助生長故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉世皆以為補氣殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人之一身內穀為寶

黄芪貳錢　人參有嗽者去之　神麴炒各壹錢半
升麻　柴胡各五分　白朮參錢
當歸身酒浸　甘草炙　陳皮各壹錢
生黄芩少許泄瀉盛者之去秋涼不用　一方用生地黃

右為麁末每服二錢或五錢如食添再加之如食減已定三錢不可多服每服二錢水煎去滓熱服如腹痛每服加白芍藥三分中桂少許如渴口乾加乾葛二分如嗽去人參服不計時候

升陽合德侯經歷家人病崩漏醫莫能效切脈之後且以紙疏其證至四十餘種為製調經升陽除濕湯療之明日而十減其八前後五六日良愈

調經升陽除濕湯　治女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因飲酒勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜臥四肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脈緩而弦急按之洪大皆中指下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脈二者受邪病皆在脈脈者血之府也人者脈之神也心不主令胞絡代之故曰心之脈主屬心系心系者胞絡命門之脈也主月事生孕皆由脾胃虛而心胞乘之故漏下血水不調也況脾胃為陰陽之根蒂當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

柴胡　防風　甘草炙
藁本　升麻各壹錢　羌活
蒼朮　黄芪各壹錢半　獨活

當歸酒洗 獨活各五分 蔓荊子七分

右㕮咀，水五大盞，煎至一大盞，去滓，稍熱，空心服。藥畢，待少時，以早饍壓之，可一服而已。如灸足太陰脾經中血海穴二七壯或三七壯，立已。此藥乃從權衡之法，用風勝濕，為胃氣下陷而氣迫於下，以救其血之暴崩也。若病愈，經血惡物已盡，主病雖除，後必須以黃芪、甘草、人參、當歸之類數服以補之，於補氣升陽湯中加和血藥是也。若經血惡物下之不絕，尤宜救其根源，治其本經。只益脾胃，退心火之亢，乃治其根蒂也。若遇夏月白帶下，脫漏不止，宜用此湯，一服立止。

柴胡調經湯 治經水不止，鮮血，項筋急，腦痛，脊骨強痛，不思飲食。

羌活 獨活 藁本
升麻各五分 蒼朮一錢 柴胡根七分
葛根 當歸身 甘草炙各三分
紅花少許

右㕮咀，作一服，水四大盞，煎至一盞，去滓，稍熱，空心服，微汗立止。

一婦人經候黑血凝結成塊，左廂有血瘕，水瀉不止，穀食有時一化，有時不化。今歲四月，血塊暴下，併水注俱作，是前後二陰有形之血脫竭於下。既久，經候猶不調，水瀉日見三兩行，食罷心煩不快，飲食減少，甚至瘦弱。東垣先生曰：夫聖人治病，必本四時升降浮沉之理，權變之宜，若不本四時，以順為逆，非其治也。且治之大法，必先歲氣，無伐天和，無盛盛，無虛虛，遺人夭殃；無致邪，無失正，絕人長命。故聖人云：陽盛陰虛，下之則愈，汗之則死；陰盛陽虛，汗之則愈，下之則死。大抵聖人立法，各自有義。且如升陽或發散之劑，是助春夏之陽氣令其上升，乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣，此病是也。當用此法治之，乃升降浮沉

之至理也。天地之氣以升降浮沉，乃從四時，如治病逆之，則殺人矣。故經云：順天者昌，逆天者亡，可不畏哉！夫人之身亦有天地四時之氣，不可止認在外，人體亦同天地也。今經漏不止，是前陰之氣血已下脫矣；水瀉又數年不愈，是後陰之氣血又下陷矣。後陰者，主有形之物也；前陰者，精氣之門戶。俱下竭，是病人周身之氣常行秋冬之令，陰主殺，此等收藏之病是也。陽生陰長，春夏是也。在人身之中，令氣升浮者，穀氣上行是也。既病，則周身血氣皆不生長，穀氣又不升，其肌肉消少，是兩儀之氣俱將絕矣。既下元

二陰俱脫血氣消竭假令當日元是熱證今下焦久
脫已化為寒矣此病久沉久降寒濕大勝當急救之
瀉寒以熱降濕以燥大升大舉以助長生補養氣血
不致偏枯聖人立治之法云濕氣大勝以所勝助之
助甲風木上升是也故經云風勝濕是以所勝平之
也當調和胃氣次用白朮之類以燥其濕而滋元氣
如其不止後用風藥以風勝濕此之謂也此藥便是
大舉大升以助春夏二濕之久陷下之至治也又一
本云此病只用四物隨證加減

只獨聖散　治婦人血崩不止用防風去蘆不以多少為細末酒煮白麪清調下二錢空心食前日二服更以麪作糊酒投之極驗

治血崩夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時服

又治崩中不止芎藭八兩清酒五升煎至二升半分三服不耐者徐徐進之（義云藥不可久服令人暴死）

右大舉大升之劑治崩脈沉弦而洪或沉細而數者皆胃氣下陷也或崩而又久瀉者亦胃氣下陷也故舉之升之其病愈也

[illegible]加減四物湯　治室女二七天癸至亦有當時未至[illegible]然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多[illegible]皆悉宜服之

川芎　熟地黃[illegible]　川當歸[illegible]
白芍藥（各一兩）　香附子[illegible]

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑[illegible]片煎至七分去滓食前溫服如血色鮮而不止者去熟地黃加生地黃煎服

[illegible]丁未年冬郭大方來說其妻經水暴崩不止先曾殞身失血自後一次經數日而來今又不止其人心窄性急多驚以予料之他日必因心氣不足飲食失節得之大方曰容到彼診得掌中寒脈沉細而緩間而沉數九竅微不利四肢無力上喘氣短促口鼻氣皆不調果有心氣不足飲食失節脾胃虛弱之證胃脘當心而痛左脇下急縮有積當臍有動氣腹中鳴下氣大便難諸虛證[illegible]不能盡錄擬先治其不餘證可以皆去與安[illegible]其心調和脾胃大益元氣補其血脈養其心[illegible]之劑去其冬寒凝在皮膚內少加生地黃去[illegible]不令四肢痿弱黃蘖當歸人參湯

黃芪　人參[illegible]
黃蘖[illegible]分

神麴　　枳殼　　陳皮

杏仁　　生地黃

右爲麤末水三大盞先煮麻黃數沸去滓入前藥同煎至一大盞分巳午之前食消盡服之其胃脘痛乃胃上有客寒與大熱藥草豆蔻丸一十五丸其痛立止再與肝之積藥除其積之根源而愈

地黃丸　治足三陰虧損經行數日不止或兼帶下無子

熟地黃　　山茱萸肉　　薏苡仁

白芍藥　　代赭石　　乾薑炮

血崩

白殭蠶　　女科　　厚朴

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸空心溫酒下日三服

右症挾積滯而崩帶治一老婦人血崩不止流流不絕滿腹皆血起床不得者三月矣腹滿如鼓作痛挾痰積污血治之用四物四兩參朮各壹兩甘草半兩以治虛香附三兩半夏壹兩半茯苓陳皮枳實縮砂玄胡各壹兩以破痰積污血分二十貼每貼以水煎荷葉側柏葉湯再煎服之服盡良愈今再不發神効

涼血　腎陰虛陽搏謂之崩

涼血地黃湯　治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守包絡相火故血走而崩也

生地黃　　當歸尾各半錢　　黃連

黃柏　　知母　　藁本

川芎　　升麻各二分　　紅花少許

柴胡　　防風　　川羌活

黃芩　　細辛　　荊芥穗

蔓荊子　　甘草炙各一分

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓空心稍熱服

血崩　灸足太陰脾之經中血海二穴在膝臏上內廉白肉際二寸中治女子漏中月事不調逆氣腹脹其脈緩者是也灸三壯足少陰腎之經中陰谷二穴在膝內輔骨後大筋下小筋上按之應手屈膝取之治膝如錐不得屈伸舌縱涎流煩逆溺難少腹急引陰痛股內痛婦人漏下不止腹脹滿不得息小便黃如蠱女子如妊身可灸三壯

大小薊湯　治崩漏不止色明如水得溫則煩悶者此陽傷於陰令人下血當補其陰脈數疾小者順大者逆

小薊莖葉（研取汁） 生地黄（研取汁各一盞） 白朮（半兩剉）

右三件入水一盞煎減一半去滓温服

芎藭酒 治崩中晝夜不止醫不能治

芎藭（二兩） 生地黄汁（一盞）

右用酒五盞煮芎藭一盞去滓下地黄汁再煎二三沸分爲三服

治崩中去血不止

大小薊根（各五兩） 白茅根（三兩）

右二味細切用酒五升煮取四升去查分四服

丹漏下乃熱兼虚四物加黄連

奇効四物湯 治有熱久患血崩

當歸（酒浸） 大川芎 熟地黄 白芍藥 阿膠（蛤粉炒如珠子） 大艾葉 黄芩（去朽各一兩）

右剉碎每服四錢水一盞半生薑五片煎七分空心温服（[illegible]血得熱則行得寒則止[illegible]此醫以黄連解毒湯加大艾[illegible]見數婦血崩者亦用[illegible]無不効者又當量其虚實用之）

金華散 治血室有熱崩下不止服温藥不効者

延胡索 瞿麥穗 當歸 乾薑 牡丹皮（各一兩） 石膏（貳兩） 桂心（别研） 威靈仙（各七錢） 蒲黄（半兩）

右爲細末每服二錢水一盞半空心温服日二

治崩中下血方 崩中藥多是用止血藥及補血藥惟此方治陽乘陰所謂天暑地熱經水沸溢者

黄芩（不以多少）

右爲細末每服一錢霹靂酒調下一方荊芥煎湯下近朝有王御醫直夜有一宮女血如山崩其時暑月藥笥中只有太順散兩貼以冷水調服旋即奏効以此知醫者要在權變也

治漏下五色亦治嘔血令人黄瘦虚弱

右用地楡三兩剉碎以醋一升煮十餘沸去滓食前稍熱服一合 本草注云地楡主帶下十二病一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門澼七[illegible]八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定[illegible]代茶甚解熱

[illegible]經水多去不能止以三補丸加茲根龜板金毛狗

丁御史當人母年五十餘血崩一載僉用澀劑丸黑神散保安丸白薇散補之不效戴人見之曰天癸已盡本不當下與其血得熱而流散非寒也夫女子血崩多因大悲哭悲甚則肺葉布心系為之急血不禁而下崩內經曰陰虛陽搏謂之崩陰脉不足陽脉有餘數則內崩血乃下流舉世以虛損治之莫有知其非者可服大劑大劑者黃連解毒湯是也次以香附一兩炒白芍藥一兩焙當歸一兩焙三味同為細末水調下又服檳榔丸不旬日而安 丙寅公治一婦人年六十二歲血崩不止投黃連解毒湯四貼後服涼膈散合四物六貼即愈此婦因悲哀太過則心悶急肺布葉舉而上焦不通熱氣在中血走而崩故效

薛 一婦人年將七十素有肝脾之證每作則飲食不進或胸膈不利或中脘作痛或大便作瀉或小便不利余用逍遙散加山梔茯神遠志木香而愈後憂女婿居不時吐紫血其病每作先倦怠而後發熱經日前憂傷肺積思傷脾肺布葉舉是令子母俱病不能攝血歸經而致前證遂以前藥加炒黑黃連三分吳茱萸二分頓愈後因怒吐赤血甚多躁渴垂死此血脫也法當補氣乃用人參一兩苓朮當歸各三錢陳皮炮黑乾薑各二錢炙草木香各一錢一劑頓止

一婦人年六十四久鬱怒頭痛寒熱春間乳內時痛服流氣飲之類益甚不時有血如經行又大驚恐飲食不進夜寐不寧乳腫及兩脇焮痛如炙午後色赤余以為肝脾鬱火血燥先以逍遙散加酒炒黑龍膽一錢山梔一錢半二劑脹痛頓退又二劑血全消再用歸脾加炒梔貝母諸證悉愈 一婦人因怒崩血久不已面青黃而或赤此肝木制脾土而血虛也用小柴胡合四物以清肝火生肝血又用歸脾補中

二湯以益脾氣生肝血而瘥此證若因肝經有風熱而血不寧者用防風一味為丸以兼發之藥煎送或肝經火動而血不寧者用條芩炒為丸以兼發之藥煎送無有不效 一婦人性急每怒非太陽耳項喉齒胸乳作痛則胸滿吞酸吐瀉少食經行不止此皆肝火之證肝自病則外證見土受尅則內證作若自病見用四物加白朮茯苓柴胡炒梔炒龍膽若內證作用四君子加柴胡芍藥神麴吳茱萸炒過黃連諸證漸愈惟月經不止是血分有熱脾氣尚虛以逍遙散倍用白朮茯苓陳皮又以補中益氣加酒炒芍藥

一服血調

溫經丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣不足勞役及飲食不節所得經隔少時其脉兩尺俱弦緊而洪按之無力其證自覺臍下如冰求厚衣被以禦其寒白帶白滑之物雖多間下如屋漏水下時有鮮血不多右尺脉時微洪屋漏水多暴下者是急弦脉爲寒多而洪脉時見乃熱少合而言之急弦者北方寒水多也洪脉時出者命門包絡之火也黑物多赤物少合成屋漏水之狀也

川芎 丁香各肆分 熟地黄以酒大洗

血崩 白芍藥各玖分 阿膠炒後入 當歸身貳分壹錢 女科一 百九

生艾葉後入伍錢

爲細末作一服水二盞煎至五沸去滓入膠艾再上火煎至一大盞空心宿食消盡帶熱服三服效

又治血崩

熟艾如雞子大 阿膠炒研 乾薑壹錢

右件未用水五盞先煎艾薑至二盞半入膠消溫分二服空心服

芎藭湯一名芎歸湯 治[illegible]下漏[illegible]不[illegible]風虛冷熱勞損衝任月水[illegible]淋瀝不斷及產後失血過多虛羸腹痛或妊娠胎動不安下血連日小便頻數肢體煩倦頭運目暗不欲飲食

芎藭 黃芪 芍藥

乾地黄 吳茱萸 甘草各貳兩

當歸 乾薑各壹兩

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黄茱萸加杜仲人參各二兩

斷下湯 治衝任氣虛崩中漏下經脉不調每遇月候將來臍腹腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶

血崩 女科一 百二

下三十六疾悉能療之

人參去蘆 熟地黄[illegible] 艾葉醋炒

烏賊骨燒灰 當歸各貳兩 川芎各壹兩

乾薑炮壹兩 阿膠[illegible] 川芎柒錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓食前溫服

治崩漏方

四物湯壹兩 人參貳錢 吳茱萸壹錢

右剉碎每服半兩薑棗煎服食前五六服寒熱腹痛皆退須[illegible]未止續服後熟附丸

熟附子　木賊去節　龍骨煅
赤石脂煅各半兩　川芎　當歸各壹兩
右爲細末醋糊爲丸如梧子大每服五六十丸食
前米飲下　一婦人年五十已上經斷七年忽然
經行遂成崩漏發熱腹痛兩月不瘥予診其脉虛
細疾數予曰此乃陰虛而攸宜服此藥
鹿茸丸　治經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸少
氣臍腹冷極則汗出如雨尺脉微小由衝任虛衰
爲風冷客乘胞中氣不能固可灸關元百壯在臍
下正中三寸
鹿茸燎去毛醋炙　赤石脂製　禹餘糧製各壹兩
艾葉一兩　柏葉　附子炮各半兩
熟地黃　當歸　續斷各貳兩
右爲細末酒糊和丸梧子大每服三十丸空心溫
酒下　一方煉蜜丸亦可
赤龍丹　治崩中不止
禹餘糧煅　烏賊骨　鹿茸
龍骨　石燕煅　阿膠
當歸　乾薑各等分

右爲末酒醋糊爲丸每服五十丸溫酒下
紫金散　治月水過多崩漏帶下淋瀝不斷腰腹
痛一切五色帶疾
禹餘糧煅赤醋淬七次細研水飛過乾秤叁兩　白芍藥
川芎　熟地黃　附子
當歸各壹兩　乾薑炮　肉桂各半兩
赤石脂　龍骨各煅並別研壹兩
右爲細末每服二錢入麝香少許米飲空心調下
白芷暖宮丸　暖血海實衝任治子宮虛弱風寒客
滯斷緒不成孕育及數墮胎或帶下赤白漏下五
色虛眩少氣胸腹滿痛心下煩悸自汗下血過多
禹餘糧製壹兩　乾薑炮　芍藥
白芷　川椒製　阿膠粉炒
艾葉製　川芎各柒錢半
右爲細末蜜丸梧子大每服四十丸米飲溫酒醋
湯任下
和劑震靈丹　治崩中下血不止或脉虛細手足或
冷以芎歸湯加木香煎送下或陳皮香附子煎湯
下三丸或靈砂丹亦可兼治暴驚風九竅出血獨
參湯下方見雜病

又方治崩中不止丁香二兩爲細末用酒三升煮取
一升空心頓服　必効方用丁香百顆酒煎服
又方益智炒爲細末鹽米飲調下
和劑暖宮丸　內補當歸丸　熟乾地黃丸
濟陰丹　禹餘糧丸　內灸散
鎭血丸　紫石英丸
右諸方並治崩中帶漏並見前通治門及調經門
陳表弟[illegible]健甫內人五十歲辛丑患血崩諸藥罔効壬
寅八月身熱體痛頭暈涕出吐痰少食衆作火治展
轉發熱絕粒數日余[illegible]脾胃久虛過服寒藥中
血崩　女科
痛未已其病復起遂用[illegible]遂索粥
數匙再服食倍熱減痛止乃服[illegible]而愈癸卯秋
因[illegible]後憂怒甲辰夏病復作胸飽發熱脊痛腰疼脇
[illegible]復作內傷或作中暑崩血便血煩渴引飲粒
米不進昏憒時作脈洪大按之微弱此無根之火內
虛寒而外假熱也以十全大補加附子一劑遂食粥
三四匙崩血漸減日服八味丸始得全愈　大尹王
天成之內久患崩自服四物涼血之劑或作或輟因
怒發熱其血不止服前藥不応乃主降火更加腹脇
大痛手足俱冷余曰此脾胃虛寒所致先用附子理
中湯[illegible]又用濟生歸脾[illegible]補中益氣二湯崩血
頓愈[illegible]補法則誤矣　錦衣楊永興之內患
前證[illegible]之劑其證益甚更加肚腹痞悶飲食
不入發熱[illegible]脈洪大而虛余曰此脾經氣血虛而
發躁也當[illegible]用八珍湯加炮薑以溫補之緩則不救
不信乃服止血降火之劑虛證蜂起始信余言緩不
及治矣

[illegible]大治崩中下血不止小腹痛
芎藭[illegible]　栢葉[illegible]
右用水一升煎取六合入酒五合煎取七合空心
[illegible]分爲二服　又方爲細末酒調一錢一方有鹿角膠
[illegible]治白帶臍腹痛
[illegible]散　治月水不止衆藥不愈者牡蠣火煅研
細用[illegible]成丸再煅過通紅候冷研細出火毒却
用醋調艾末熬成膏和丸如桐子大每服五十丸
醋艾湯下
[illegible]栢黃散　療經血不止
黃芩[illegible]　側栢葉　蒲黃各壹兩
伏龍肝[illegible]兩
右㕮咀水二[illegible]煎取八合分爲二[illegible]

入方　治患崩中不止結作血片如雞肝色碎爛
芎藭 各貳分　阿膠　青竹茹 各捌分
續斷　地榆　小薊根 各叁分
當歸 陸分　生地黃　伏龍肝 各拾壹分
右用水九盞煮取三盞去滓分三服
〔衍〕治婦人血露糝砂壹兩炒伏龍肝半兩阿膠壹兩
同爲末温酒調空心二三錢以知爲度 大全名無比散無阿膠
〔經〕伏龍肝散　治氣血勞傷衝任脉虚經云非時忽
然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白
相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減
少四肢無力虚煩驚悸
伏龍肝 壹兩　甘草 半兩　赤石脂 壹兩
芎藭 叁兩　肉桂 半兩　熟地黃
艾葉 微炒各二兩　當歸　乾薑 各一兩半
麥門冬 一兩半
右爲麁末每服四錢棗一枚水同煎
地榆散　治婦人崩中漏下不止
地榆　蒲黃　白芍藥
白茯苓　柏葉 微炒　蟹爪 微炒

熟地黃　鹿角膠 搗碎炒令黃　漏蘆 各壹兩
芎藭　當歸 剉炒各柒錢半　伏龍肝 半兩
乾薑 炮　桂心　甘艸 各半兩炙
右剉碎每服三錢水一中盞入竹茹一分煎至七
分去滓食前温服
右五方伏龍肝[illegible]可去濕也前二方去濕熱
後二方去寒濕[illegible]爲止血之聖藥先賢治
崩用旋覆花半夏[illegible]同濕痰而崩止者亦此意
〔補遺〕鹿茸散　治崩中漏下不止虚損羸瘦
鹿茸 [illegible]　白龍骨
鼈甲 [illegible]　熟地黃　白芍藥
白石脂　烏鰂魚骨 炙黃　續斷 各二兩
肉蓯蓉 [illegible]
右爲細末每服二錢食前粥飲調下
柏葉散　治婦人崩中漏下不問年月遠近漸至黃
瘦四肢無力腹內疼痛不思飲食
柏葉　續斷　川芎
生地黃　當歸　鹿茸
鼈甲 [illegible]　禹餘糧 [illegible]　阿膠
牡蠣　地榆　赤石脂

艾葉　鹿茸各二兩

右為細末每服二錢食前粥飲調下一方有丹參加鹿茸煉蜜和丸如梧子大每服三四十丸空心用溫酒送下或艾湯亦可

補宮丸　治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形羸崩中帶下

白薇　牡蠣　白芍藥

鹿角霜　山藥　白术

白茯苓　烏賊魚骨　白芷各等分

右為細末麪糊和丸如梧子大每服五十丸空心用米飲送下

鎮宮丸　治婦人崩漏不止或下五色或赤白不定或如豆汁或狀如豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久而不止令人黃瘦口乾胸煩不食

代赭石火煅醋淬七次　紫石英　禹餘糧煅醋淬

香附子各醋煮　陽起石火煅紅研細　鹿茸燎去毛醋蒸焙

茯神去皮木　阿膠炒　當歸去蘆酒浸

蒲黃炒　芎藭各一兩　血竭別研半兩

右為細末用艾煎醋汁煮糯米糊為丸如梧子大每服七十丸空心米飲下

[illegible]治漏崩下血燒灰為末二錢匕同燒蓮房為末三指撮酒調服　又方百草霜貳錢狗膽汁拌定分作二服當歸酒調下

一方治血崩用葫蘆去子穰實荊芥穗燒存性飲湯調服

治室女血崩不以冬熱皆可服

荊芥　蒲黃炒各等分

右為細末每服二錢空心米飲調下

十灰丸　治崩中下血不止

錦灰　黃絹灰　馬尾灰

艾葉灰　藕節灰　蓮房灰

油髮灰　赤松皮灰　棕櫚灰

蒲黃灰各等分

右研勻用醋煮糯米糊和丸如梧子大每服七十丸加至一百丸空心米飲送下

十灰散　治下血不止

錦片　木賊　棕櫚

柏葉　艾葉　乾漆

鯽魚鱗　鯉魚鱗　血餘

當歸以上各等分燒灰存性　麝香少許研

右研勻每服二錢空心温酒調服
一笑散 治婦人血崩
右用新綿一口燒灰研末空心酒調下立止
治婦人經年血崩
香附子（炒去毛） 蓮殼（燒灰存性）
右為細末每服二錢空心陳米飲調下
世 香礬散 治血崩香附子不以多少極酸醋浸一
宿炒焦為灰存性 用入白礬末二錢米飲調
服空心神効 一法治[illegible]湯尤妙
大 用香附子去毛炒焦[illegible]為細末用極熱酒調
下二錢於温服不過兩服[illegible]甚者三錢匕如
血山崩不止者亦能解之米飲調亦可許學士云治
下血不止或成五色崩須香附子是婦人仙藥也
炒仁不以多少新瓦上炒黑為末米飲調 一方益智
仁炒黑為末鹽米飲調下
世 婦人血崩不止用檳榔燒灰存性[illegible]以温酒調
下甚妙
大 五靈脂散治婦人血崩諸藥不止者五靈脂炒令
煙盡為末[illegible]每服[illegible]錢水酒
童便各半盞煎服名抽刀散

琥珀散 治崩暴不止
赤芍藥 香附子 枯荷葉
男子髮（皂莢水洗） 當歸 棕櫚（炒焦存性）
烏紗帽（是漆紗[illegible]）
右等分除棕櫚外其餘並用瓷片新瓦上煅成黑
灰存性三分為細末每服五錢空心童便調下如
人行十里再一服七八服即止若產後血去多加
米醋京墨麝香少許 一法先以五積散加醋煎
投一二服次服五靈脂散
行 黃牛角䚡用尖燒為黑灰微存性治婦人血崩大
便血及冷痢白痢
大 治漏下不止者鹿角燒灰細研食前温酒調下二
錢 又方桃仁燒灰研細食前温酒調下二錢 又
方亂髮皂角水洗淨燒為細末空心温酒調二錢
世 治血久崩夏枯草燒存性為末空心米飲調下此
用灰與前用草不同
大 荊芥散治婦人崩中不止用好荊芥[illegible]燈
心就上燒荊芥焦[illegible]每服三錢童便調下
簡 治婦人[illegible]
研食前温[illegible]

產寶治崩中不止不問年月遠近用槐耳燒作灰為
末以酒服方寸匕
大神應散治血崩不止桂心不以多少炒極焦存性
為末每服一二錢米飲調下
楊氏家藏黑金散 治婦人血氣虛損經候不調崩
中漏下
鯉魚皮 [illegible]角鰓 棕櫚皮
破故紙 [illegible] 烏賊魚骨
熟乾地黃 [illegible] 當歸洗焙
木賊各[illegible]

右剉拌入礶內鹽泥固濟候乾炭火五斤煅通
赤煙盡埋土內令冷取研細每三錢入麝少許米
飲空心調下
如聖散 治血山崩
棕櫚 烏梅肉各一兩 乾薑一兩五錢並燒存性
右為細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服久
患不過三服愈
治血崩屢効方
當歸 白芍藥 乾薑 [illegible]各等分
右各煅存性研為細末[illegible]以竹筯左攪四
十九轉食前服
又方用棕櫚白礬煅為末酒調二錢服
烏金散 治血崩不止
棕櫚毛燒存性壹兩 龍骨煅過貳錢
右為細末研勻每二錢空心好酒調服二服立止
梅飲子 治婦人血崩
右以鹽白梅燒灰存性為末空心米飲調下
治婦人血崩方
右用烏梅燒灰研末以烏梅湯調下酒調亦可
又方
烏梅肥大者十斤[illegible] 百草霜研細

右搗和丸如梧桐子大每服三四十丸空心以淡
醋湯送下日進二服
右二味方皆燒灰黑藥經云北方黑色入通於
腎皆通腎經之藥也夫血者心之色也血見黑即
止者由腎水能制心火故也
治血崩不定或淋瀝經行者
白礬[illegible]兩 沒藥各[illegible]錢 硼砂
黃丹各[illegible]分
右件將白礬溶開[illegible]餘藥細末[illegible]一處攪勻就

戊先子如彈子大每服一丸新綿裹內陰中立效

運氣 中氣血崩皆屬風火經云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大溫其病血崩是也

針灸 崩經血過多不止并崩中（同心術） 三陰交 行間（各針灸之訖）

通理（足小指上二寸灸二七壯刺） 漏下不止（心術同捕） 三陰交 太衝

子胞門不閉漏下惡血不禁 氣門（在關元旁三寸刺入五分）

崩血崩并漏下 中極（灸） 子宮（針二寸） 敗血不止 三陰交 百勞 風門 中極 腎俞 膏肓 曲池 絕骨

（加減）婦人不字陰暴出經水漏然谷主之 婦人漏血腹脹滿不得息小便黃陰谷主之（千金云婦人漏血少腹脹熱服）

女子血不通會陰主之 女子漏血太衝主之

脈 問曰五崩何等類師曰白崩者形如涕赤崩者形如絳黃崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑崩者形如衃血也寸口脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏下（見血）

經寸口脈微而緩微者衛氣疏疏則其膚空緩者胃弱不實則穀消而水化穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成榮盛則其膚必疏三焦絕經名曰血崩

診 婦人漏下赤白日下血數升脈急疾者死遲者生 診婦人漏下赤白不止脈小虛滑者生大緊實數者死

尺寸脈虛者漏血脈浮者俱不治（脈經）

良 婦人衝任二脈為經脈之海外循經絡內榮臟腑若陰陽和平經下依時若勞傷不能約制則忽然暴下甚則昏悶若寸脈微遲為寒在上焦則吐血衄血尺脈微遲為寒在下焦則崩血便血大抵數小為順洪大為逆大法當調補脾胃為主

殺血心痛 良婦人血崩而心痛甚名曰殺血心痛由心脾血虛也若小產去血過多而心痛甚者亦然用烏鰂魚骨炒為末醋湯調下失笑散亦效 **薛** 前證若陰血耗散用烏賊丸收斂之若瘀血不散用失笑散行散之若心血虛弱用芎歸湯補養之若鬱結傷血用歸脾湯調補之 一婦人血崩兼心痛三年矣諸藥不應每痛甚虛證悉具面色痿黃余曰心主血蓋由去血過多心無所養以致作痛宜用十全大補湯參朮倍之三十餘劑稍愈百餘劑全愈

赤白帶下

巢氏病源論婦人有三十六疾者七癥八瘕九痛十二帶下也而帶下不顯其證今人雖知赤白二帶耳此由勞傷衝任風冷據於胞絡婦人平居血欲常多氣欲常少百疾不生或氣倍於血氣倍生寒血不化亦遂成白帶若氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交并則赤白俱下其脈右手尺浮浮為陽陽絕者無子苦足冷帶下輕則漏下甚則崩中皆心不榮血肝不藏血所致其脈寸口弦而大弦則為減大則為芤減為寒芤為虛寒虛相搏其脈為革主半產漏下又尺寸脈虛者漏血漏血脈浮者不可治

千金帶下三十六疾者是十二癥九痛七害五傷三固謂之三十六疾也十二癥者是所下之物一者如膏二者如青血三如紫汁四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如葵羹八如凝血九如清血似水十如米泔十一如月浣十二如經度不應期也九痛者一陰中痛二陰中淋痛三小便痛四寒冷痛五月來時腹中痛六氣滿來時足痛七汗出陰中如蟲齧痛八脇下皮痛九腰痛七害者一害食二害氣三害冷四害勞五害房六害娠七害睡五傷者一竅孔痛二寒冷痛三小腹痛四臟不仁五子門不正引背痛三固者月水閉塞不通其餘二者文缺不載而仲景所說三十六種疾皆由子臟冷熱勞損而夾下起於陰內也

丹赤白帶羅先生法或十棗湯（方見傷寒）或神佑丸（方見腫脹）或玉燭散（即四物加調胃承氣）皆可用之虛者不可峻攻實者可行　血虛加減四物湯　氣虛以朮參陳皮間與之　赤屬血白屬氣主治燥濕為先　濕甚者固腸丸（方見後）　相火動者諸藥中加炒檗　滑者加龍骨赤石脂　滯者加葵花（白者治白帶赤者治赤帶）　性躁者加黃連　寒月少加薑附臨機應變先須斷厚味

帶下與夢遺同法治之　肥人有帶多是濕痰用海石半夏南星炒檗青黛蒼朮川芎　瘦人帶病少如有多是熱用炒檗蛤粉滑石川芎青黛樗皮　帶漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱出於大腸小腸宜升提甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加白朮蒼朮仍用丸子

戴赤白帶下皆因七情內傷或下元虛冷感非一端大率下白帶多間有下赤者並宜順氣散吞震靈丹仍佐艾附丸或米飲調沙參末帶下不止成尪羸者四物湯加煅牡蠣粉半錢吞固陽丸多服取效（固陽丸方）

見雜病遺精門

有帶疾愈後一二月或再發半年一發先血而後下帶來不可遏停蓄未幾又復傾瀉此名漏帶最爲難治　下截之血小腹主之有因血虛而虛熱陷入小腸致小便澀痛色白如泔或成沙粒皆不可作淋治用冷劑宜以四物湯五苓散各半貼和煎

良婦人帶下其名有五因經行産後風邪入胞門傳於臟腑而致之若傷足厥陰肝經色如青泥傷手少陰心經色如紅津傷手太陰肺經形如白涕傷足太陰脾經黄如爛瓜傷足少陰腎經黑如衃血人有帶脉横於腰間如束帶之狀病生於此故名爲帶

[illegible]　入門　女科一

[illegible]後用或先生云前發白屬氣而赤屬血東垣先生云血崩久則亡陽故白滑之物下流未必全拘於帶脉亦有濕痰流注下焦或腎肝陰淫之濕勝或因驚恐而木乘土位濁液下流或思慕爲筋痿戴人以六脉滑大有力用宣導之法此瀉其實也東垣以脉微細沉緊或洪大而虛用補陽調經乃兼責其虛也丹溪用海石南星椿根皮之類乃治其濕痰也竊謂前證皆當壯脾胃升陽氣爲主佐以各經見證之藥色青者屬肝用小柴胡加山梔防風濕熱壅滯小便赤濇用龍膽瀉肝湯肝血不足或燥熱風熱用六味丸

虛少者補攻藥　脉滑大有力宜攻

色赤者屬心用小柴胡加黄連山梔當歸思慮過傷用妙香散等藥色白者屬肺用補中益氣加山梔色黄者屬脾用六君子加山梔柴胡不應用歸脾湯色黑者屬腎用六味丸氣血俱虛八珍湯陽氣下陷補中益氣湯濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼术黄柏氣虛痰伏下注四七湯送六味丸不可拘肥人多痰瘦人多火而以燥濕瀉火之藥輕治之也

濕治帶下少腹冤結而痛者先以十棗湯下之次服苦楝丸大玄胡散調之是先攻後補之法也

治結痰白帶以小胃丹半饑半飽津液下數丸候鬱積行却服補藥

[illegible]　入門　女科一

白术 三兩　蒼术 二兩　紅白葵花 [illegible]

白芍藥 [illegible]

右爲末餅爲丸空心煎四物湯下廿丸

附　遺道外姪女年七十形瘦善啖白帶食前薑湯吞大補丸五十丸二三次午膳後及臨卧時各與小胃丹十五丸愈

子和頃頓在一婦人病帶下連緜不絶白物或來已三載矣命予脉之診其兩手脉俱滑大而有力得六七至常上[illegible]余知其實有寒痰

病中以瓜蒂散吐出冷痰二三升皆醋水也間如

[illegible]狀如爛膠又以粟粥養其胃氣又次用導水禹

攻以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數

[illegible]而愈 息城李左衛之妻病白帶如水窈漏中綿

不絕臭穢之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫

皆云積冷陽起石硫黃薑附之藥重重燥補污水轉

多戴人斷之曰此帶濁水[illegible]經其寒水不

[illegible]而故如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃

痰[illegible]升次用下泄水十餘行三遍汗出周身至

明日病人[illegible]矣次用寒涼之劑服及半載

[illegible]

產一男

[illegible]有濕熱[illegible]不禁攻者[illegible]宜涼燥[illegible]濕

宜滋燥

樗皮丸 治赤白帶有濕熱者

芍藥 [illegible] 良薑 [illegible]各

椿根皮 [illegible]

右為末粥丸每服三五十丸空心[illegible]下

赤白帶因濕熱勝而下者

蒼朮 鹽炒 白芍藥 [illegible] 枳殼 [illegible]錢

椿根皮 [illegible] 地榆 [illegible]

甘草 叁錢 滑石 [illegible] 為末粥丸米飲下

治帶下

椿根皮 貳兩 神麴 炒 麥皮麴 炒

黃柏 炒各壹兩 芍藥 [illegible]兩 滑石

枳殼 各半兩 蒼朮 壹兩

右為末糊丸[illegible]服五十丸空心下

固腸丸 治濕[illegible]食白帶去脾胃陳積之

後用此以燥下濕[illegible]湯使椿根

皮為末酒糊為丸[illegible]炒用一方加

滑石一兩

治白帶因七情所傷脈數者

黃連 炒 側柏葉 [illegible] 黃柏 炒各[illegible]

香附子 [illegible] 白朮 [illegible] 白芷 [illegible]

木香 各叁錢 椿根皮 炒[illegible] 白芍藥 壹兩

右為末飯粥為丸米飲湯送下

右左方治帶椿皮側涼燥之劑濕熱盛者宜之後

一方有黃連香附木香故可治七情所傷

乳香散 治赤白帶下

草果 [illegible]

右為細末每服貳錢陳皮飲調下重者三錢

用帶下不止用椒目白芷　治白帶用椒目爲末米
飲調服
治帶下方　右用雲母粉溫水調下三錢立見神效
伏龍肝散　治赤白帶下久患不瘥延悴乏力六脉
微濇
棕櫚（不拘多少燒灰存性以盆蓋陰冷存性）　伏龍肝（於竈直下去取赤土炒令烟盡）
屋梁上懸塵（炒令烟盡出火毒）
右等分研勻入龍腦麝香各少許每服二錢溫酒或淡
醋湯下患十年者半月可安
馬蹄丸　治白漏不絕
白馬蹄（燒）　禹餘糧（各四兩）　龍骨（叁兩）
烏賊魚骨　白僵蠶　赤石脂（各貳兩）
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸空心
酒送下不止加三十丸
又方治白帶
用白芷以石灰炒去灰白芷少許粥糊丸服
白芷散　治赤白帶下
白芷（壹兩）　海螵蛸（貳個燒）　胎髮（壹團煅）
右爲細末空心溫酒調下二錢
丹赤白帶用白狗頭骨燒灰存性酒調服或入藥服

潤劑　帶下久而枯涸者濡之凡大補氣血皆所以濡
之如以四物湯爲末煉蜜丸梧子大空心米飲下三
四十丸以療年高婦人白帶良驗皆潤劑也以另有
補劑故止存葵花郁李仁之例於此條耳
補經固真湯　白文舉正室白帶常漏久矣服諸藥
不效診得心胞尺脉極微其白帶流而不止叔和
脉經云崩中日久爲白帶漏下多時骨水枯言崩
中者始病血崩不已久下則血少復亡其陽故白
滑之物下流不止是本經血海將枯津液復亡枯
乾不能滋養筋骨以本經行經藥爲引用爲使以
大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液以大
辛熱之氣味補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄
其肺而救其上熱傷氣以人參補之以微苦溫之
藥佐而益元氣名曰補經固真湯
人參（貳錢）　橘皮（不去白半錢）　乾薑（細末貳錢）
白葵花（拾陸朵去萼碎）　柴胡　甘草（炙）
郁李仁（去皮尖）　生黃芩（另搗）（各壹錢）
右除黃芩外以水三大盞煎至一盞七分再入黃
芩同煎至一盞去渣空心熱服候少時以早膳
壓之

補真潤腸湯　治白帶下陰戶中痛控心而急痛身黃瘦發身重如山陰中如冰（一名助陽湯）
黃柏（壹錢）　柴胡（貳分）　良薑（貳錢）　白葵花（柒朶）
防風　郁李仁　乾薑
甘草（各壹錢）　陳皮　生黃芩（各伍分）
右爲細末剉散只作一服水二盞煎至一盞去滓食前熱服
右葵花郁李仁之滑以潤燥益枯澀滯者者宜之
婦人散食少及久病曾經攻下者俱作虛治有熱用涼補無熱用溫補

類本同

丹治白帶
龜板（炙）　枳子（各貳兩）　黃柏（炒壹兩）
白芍藥（壹兩柒錢半）　乾薑（炒貳錢半）　香附子
山茱萸　苦參　樗皮
貝母（各半兩）
右爲末以酒糊爲丸空心米飲下
治赤白帶
龜板（酒炙）　黃柏（炒壹兩）　乾薑（炒壹錢）
枳子（貳錢半）
右爲末酒糊爲丸日二服每服七十丸

又方治帶下脈數者
枸杞根（壹斤）　生地黃（伍斤）
右二味以水一斗煮取五升分三服
右三方治帶龜板黃柏地黃側滋腎水真陰虛者宜之
〔刪補〕婦人白帶下月經甚多食少倦怠面黃經中有如血塊者有如筋膜者與參朮等補血氣調脾胃後諸證皆退惟帶未止以樗皮丸主之（方見前）
右法治帶下虛而有熱者若虛而有寒脈微面白不澤無力以言者東垣補經固真湯丁香膠艾湯香桂六合湯是也

〔增補〕白斂丸　治室女衝任虛寒帶下純白
鹿茸（醋蒸焙）　白斂　狗脊（燎去毛各壹兩）
右爲細末艾煎醋汁打糯米糊丸如梧子大每服五十丸空心溫酒送下
當歸煎　治赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日漸羸瘦
當歸（酒浸）　赤芍藥　牡蠣（火煅取粉）
熟地黃（酒蒸）　阿膠　白芍藥
續斷（酒浸各壹兩）　地榆（半兩）
右爲末醋糊爲丸如梧子大每五十丸空心米飲下

家山妻年三十餘十八胎九殰八夭會先君松滋難作賊兄弟皆西奔妻驚憂過甚遂昏昏不省人事口唇舌皆瘡或至封喉下部虛脫白帶如注如此四十餘日或時少醒至欲自縊自悲不能堪醫或投涼劑解其上則下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥熏蒸其下則熱暈欲絕四弟還脈之始知為亡陽證也大哭曰宗嗣未立幾誤殺吾嫂急以鹽煮大附子九錢為君制以薄荷防風佐以甘桔芎歸之屬水煎入井水冷與之未盡劑[illegible]熟睡通宵覺即能識人時止一嗣子二女相抱痛哭咸皆悲戚友備悉女驚曰君何術也弟曰方書有之假對假真對真爾上乃假熱故以假冷之藥從之下乃真冷故以真熱之藥反之斯上下和而病解矣繼後主以女金丹錯綜以二三之不但去其疾且調治元氣庚午生一子今應襲也壬申生一子去年又患瘧疾十三月亦主以養元氣調生氣得飲食大進然後劫以毒藥吐下塊物甚多投以附子湯二錢而愈不責効旦暮間其用女金丹即勝金丹也得之與人倍加香附而視氣血之偏者又加减皆條芩倍川芎之屬取効甚多子愈無子者往往有之痛思子得了之難其苦何如乃次第錄其

赤白帶下 八 女廿一 昌五

方併女金丹以濟人云雪翁識（女金丹方見求子門）

【驗】一婦腹脹脇滿內熱晡熱月經不調肢體瘦不時吐痰或用清氣化痰喉間不利帶下青黃腹脇膨脹又用行氣之劑胸膈不利肢體如麻此乃鬱怒傷損肝脾朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味逍遥散以生肝血[illegible]百餘劑而愈　一婦人久病赤帶發熱口乾[illegible]味丸加麥門五味大劑煎與恣飲[illegible]劑中氣益加茯苓半夏十餘劑而愈　一婦人[illegible]痰胸滿氣喘得食稍緩苦於白帶一十餘年矣[illegible]此氣虛而痰

赤白帶下 八 女廿一

飲也痰飲愈而帶自愈遂[illegible]湯夕用六味地黃丸不月而驗　一婦人[illegible]熱口乾喉中若有一核吞吐不利月經不調[illegible]帶下余以為肝脾鬱結用歸脾湯加半夏山梔升麻柴胡間以四七湯下白丸子而愈　一婦人[illegible]少便泄月經不調服消氣化痰丸而[illegible]帶下黃白面瘦體倦此脾胃俱虛濕痰[illegible]補中益氣倍用參朮加茯苓半夏炮薑而愈　一婦人帶下四肢無力余曰[illegible]下注以補中益氣[illegible]　一婦人帶下

黃白怒則胸膈不利飲食少思或用消導利氣之藥
痰喘胸滿大便下血余曰此因脾氣虧損不能攝血
歸源用補中益氣加茯苓半夏炮薑四劑頓減又用
八珍加柴胡山梔而痊

補澀溫 牡蠣散 治帶下兼經水過多或暴下片血
不限年月遠近

牡蠣　龍骨　赤石脂
肉蓯蓉酒浸　石斛去根　烏賊骨去甲
黃芪蜜炙　牛角䚡灰　阿膠炒燥
熟地黃焙　芍藥炒　乾薑炮

當歸　人參　白朮
桑耳　杜仲去粗皮　芎藭
附子炮去皮臍　艾葉炒各壹兩

右為細末每服二錢平旦米飲調服日再

茯苓散 治婦人血傷兼帶下積久不止面黃體瘦
漸成虛勞腰腳沉重胎氣多損

白茯苓　木香　熟地黃焙
訶黎勒皮　柏子仁研　杜仲去粗皮炙
青橘皮去白　烏賊魚骨去甲　五加皮
艾葉炒　牛角䚡灰

秦艽　赤石脂　兔絲子酒浸
當歸酒洗各

右為細末每服二錢溫酒調下糯米飲亦得或有
胎息用鯉魚糯米粥下藥

卷柏丸 治婦人室女腹臟冷熱相攻心腹絞痛腰
腿疼赤白帶下面色痿黃四肢羸乏

卷柏醋炙　鹿茸酥炙　白石脂
赤石脂各火煅醋淬七次　芎藭　艾葉醋炒
桑寄生　代赭石火煅醋淬七次　鱉甲醋炙
當歸去蘆酒浸　地榆各壹兩　木香不見火

龍骨各　乾薑炮　黃芪去蘆蜜炙
熟地黃酒蒸各壹兩

右為細末醋煮糯米糊和丸如梧桐子大每服七
十丸空心米飲送下

艾煎丸 治婦人一切虛寒胎前產後赤白帶下或
成血瘕久服此藥自然融化

伏道艾 [illegible]
[illegible]
大漢椒 [illegible]
白芍藥

川芎　白薇　附子（大者炮去皮臍）
卷栢（取青葉）　澤蘭（去枝梗取葉已上各焙乾秤用）
熟地黃（[illegible]）
（[illegible]各[illegible]兩）
右件為細末與前艾末椒末作勺米醋煮糊和丸如梧桐子大每服五七十丸至百丸二百丸空心艾醋湯送下。一婦人因產後虛寒惱惡不食腹痛如刺時作寒熱復出盜汗瘦悴骨立臍腹之左結成硬塊其大如掌冰冷雖盛暑此處獨無汗每塊微動則痛不可忍百藥治不効夢中忽有人授以

此方因服之惡心寒熱盜汗既止盡一料遂平復獨血塊如故服至五六料其塊自融化而出如魚凍

抗脊牡丹丸　治婦人血海久虛經候不利赤白帶下血氣衝心多發刺痛四肢煩困
沉香（[illegible]）　牡丹皮（去心）　赤芍藥
吳茱萸（[illegible]）　當歸　桂心
川芎　[illegible]（[illegible]）　人參
茯苓　山藥　川巴戟（去心）
白朮　[illegible]　木香

乾生薑　白龍骨　牛膝（[illegible]）
枳殼（去瓤麩炒）　肉荳蔻　厚朴（製各半兩）
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒下若心腹痛白芷煎酒下

紫桂丸　補益血海治衝任氣虛經脉不調腰痛腹痛冷滯崩漏
禹餘粮（火煅醋淬[illegible]）　龍骨　艾葉（醋炒）
赤石脂　牡蠣（煅）　地榆（各貳兩）
牡丹皮　厚朴　當歸（[illegible]）
阿膠（[illegible]）　吳茱萸（[illegible]）　香白芷（[illegible]）
肉桂（[illegible]）　附子（炮[illegible]兩）

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十丸溫酒或醋湯下

[illegible]固真丸　治白帶久下不止臍腹冷痛其寒[illegible]之如冰陰中亦然目中溜火[illegible]痛無所見齒皆惡熱飲痛須得黃連末擦之其痛乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞內故喜乾而惡濕肝經陰火上溢走於標故上壅而目中溜火腎水侵肝而上溢致目[illegible]而無所見齒惡熱飲者[illegible]大寒濕以丸

藥治之故曰寒在下焦治宜緩大忌湯散以酒
制白石脂白龍骨以枯其濕以炮乾薑大辛熱瀉
寒水以黃蘗之大寒為因用又為鄉導治法云古
者雖有重罪不絕人之後又為之伏其所主先其
所因之意又瀉齒中惡熱飲也以柴胡為本經之
使以芍藥半錢以導之又恐辛熱之藥太甚損其
肝經故微瀉之以當歸身之辛溫大和其血脈此
用藥之法備矣

白石脂（燒赤水飛細研日乾） 柴胡（各壹錢） 白龍骨（貳錢煅水飛）
當歸（酒洗各壹錢） 乾薑（炮肆錢） 黃蘗（酒洗）
白芍藥（各伍分）

右為細末水煮稀糊為丸如雞頭大每服三十丸
空心宿食消盡煎白沸湯放溫送下無令胃中停
住待少時以早膳壓之是不令熱藥犯胃忌生冷
硬物與酒濕麪

右石脂龍骨之澀以去脫滑濕多滑脫者宜之

治婦人赤白帶下不問遠年近日並皆治之
龍骨（半兩） 舶上硫黃（參錢）
右為細末每服半錢空心無灰酒下

茅花散 治婦人血崩不止赤白帶下
茅花（壹握） 棕櫚皮（叁寸） 嫩荷葉（叁張）
甘草節（貳寸）
右為細末空心酒調半匙服

血治赤白帶下舊進房為末入麝香空心米飲下

（衍義）少腹熱痛為熱瘕以劉河間法治之
（保）赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本皆濕熱結
于脈故津液涌溢是為赤白帶下本不病結緣五經
脈虛結熱屈滯于帶故女子臍下痛陰中綿綿而下
也經曰任脈為病男子內結七疝女子帶下瘕聚王
註云任脈自胞上過帶脈貫于臍上故男子內結七

疝女子帶下帶脈起于季脇章門似束帶狀今濕熱
冤結不散故為病也經曰脾傳之腎名曰疝瘕小腹
冤結而痛出白一名曰蠱所以為帶下冤結也冤屈
也屈滯而病熱不散先以十棗湯下之後服苦楝丸
大延胡散調下之熱去濕除病自愈矣（十棗湯見消[illegible]　大延胡散[illegible]分見）

苦楝丸 治婦人赤白帶
苦楝（碎酒浸） 茴香（炒） 當歸（各等分）
右為末酒糊為丸如梧桐子大每服三五十丸空心溫酒下如腰
腿疼[illegible]煎湯送下

又地榆散 治赤白帶下骨立者地榆一斤用水三升煎至一半去查再煎如稠餳絞濾空心服三合日二服

治漏下五色 地榆三兩剉用醋一升煮十餘沸去滓稍熱食前服一合

〔十〕治婦人赤白帶下三葉酸漿草陰乾爲末空心溫酒下三錢匕

右二方治帶地榆側寒澁之劑亦濕熱成而滑脫者宜之按三葉酸漿草葉細如萍叢生莖端有三葉俗又名布谷飯布谷者鳩也蓋鳩常食之故又名鳩漿草御藥院方入若蔑餘即曰三葉酸漿草之

若蔑即酸漿草 [illegible]

按地榆本血分之藥而其性寒故凡血分有熱而妄行者能止之非澁劑也

〔廿〕治赤白帶下腰痛或少腹痛有熱者

樗皮(一兩) 延胡索 桃仁

側柏葉 川楝肉 藁香

當歸(各半兩) 香附子(捌錢) 官桂(去粗皮)

烏藥(各六錢) 麥[illegible](各五兩)

右末之酒糊爲丸每服五六十丸神効

麒麟竭湯 治婦人血傷赤白帶下小腹疼痛

麒麟竭 黃蘗(炙) 地榆(各壹兩)

禹餘粮(火煅醋淬七次) 赤芍藥(各二兩) 熟地黃(切焙肆兩)

甘草(乾) 地黃

右剉碎每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時服二方爲細末粥飲調下二錢

治白崩方

棕櫚(燒灰) 絲瓜(俗云魚鰦夏月人家作涼棚者是也)

右等分爲細末空心酒調下

治婦人白崩

右用白扁豆花焙乾爲末炒米煮飲入燒鹽空心服數次即効紫花勿用

〔廿二〕調經補真湯 冬後一月微有地一尺 治其白帶出來陰户中寒一服立止大進飲食

麻黃(去節不去根) 杏仁(叁枚) 桂枝(少許)

甘草(炙五分) 良薑(叁錢) 黃芪(柒分)

人參 當歸身 白朮(各伍分)

蒼朮(貳分) 羌活(肆分)

防風(貳錢) 柴胡 獨活

藁本各貳分　升麻□□　黄芩各伍分
乾薑炮貳分　白葵花柒朵去萼
右除黄芩麻黄外都爲粗末先將二味水二盞煎
麻黄一味令沸掠去沫入餘藥同煎至二盞又再
入生黄芩煎至一盞去滓稍熱服空心宿食消盡
日高服之一時許可以食
不治婦人月經不調□□數日不止兼有白帶漸漸
瘦悴飲食少味累年無子地黄丸
熟地黄貳兩　山茱萸　白蕪荑
乾薑　白芍藥　代赭石
厚朴　白僵蠶
右細末煉蜜丸如梧子大每服四五十丸空心酒
下日三服此腥老方婦人有白帶是第一等病令
人不産育宜急治之此扁鵲過邯鄲聞貴婦人所
以專爲帶下醫也
桂附湯　治白帶腥臭多悲不樂大寒
肉桂壹錢　附子叁錢　黄蘗
知母各伍分
爲粗末作一服水二盞煎至一盞去滓食遠熱
服　如少食常飽有時似腹脹加白芍藥半錢

如不思飲食加五味子貳拾箇　如煩惱面上麻
木如蟲行乃胃中元氣極虛加黄蘗壹錢人參叁分甘
草貳分　升麻半錢
□香附子木香湯治赤白帶下[illegible]
大治赤白帶下年月深久不瘥
白芍藥貳兩　乾薑半兩
右各炒黄色同爲末空心米飲調下二錢日二服
二豆散　治耳鳴心躁腰脚疼重腹内虚鳴臍下
冷頻下白水如泔湛濁證
白豆蔻　肉豆蔻　丁香
白茯苓　巴戟　丁皮
蒼朮　黑附子火炮　桂心各壹兩
人參　白朮　山藥
桔梗　藿香　粉草各半兩
右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片紫蘇葉三
片同煎至七分去滓空心溫服
鶴頂丸　治帶下之證有三未嫁之女月經初下止
而仰得或浴之以冷水或熱而扇或當風此室女
病帶下之由有家之婦陰陽過多即傷胞絡風邪
乘虛而入胞經絡冷遂使穢液與血水相連而下

之産後帶下由于血失氣傷動包絡門開而外風
襲肌體虛而冷風入冷風與熱氣相連故成液而
下冷則多白熱則多赤冷熱相交赤白俱下
當歸 二錢半酒浸　附子 半兩去皮炮　龍骨 鹽泥煅
吴茱萸 湯泡去涎　赤石脂 火煅醋淬　乾薑 炮各壹兩半
牡蠣 壹兩叁錢鹽泥煅　艾葉 壹兩以醋十盞煮乾爲末
右爲細末研勻醋糊和丸如梧子大以赤石脂末
爲衣每服五十丸空心用艾葉鹽湯烏梅煎湯下

濟生白堊丸　治婦人白帶久而不止腰膝冷痛日
漸羸困

白堊 煅　禹餘糧　鱉甲　烏賊骨 [illegible]
當歸 酒浸　鵲巢灰　乾薑　紫石英 煅醋淬七次
附子 炮　狗脊 去毛　川芎　鹿茸 醋炙各壹兩
香附 醋煮貳兩以上各爲末
用醋煮糯米糊丸如梧子大每服七十丸溫酒下

養氣活血丹　治勞傷衝任赤白帶下
大艾葉 炒焦取末伍兩　乾薑 炒末貳兩半　右二味用醋貳
升無灰酒貳升生薑自然汁貳升將薑艾末調
於銀器用慢火熬成膏
附子 [illegible]　白朮

橘紅　川芎　當歸
巴戟 去心糯米炒　人參　五味子 各貳兩
右爲細末入前膏內并炒熟熟白麵貳兩半和爲
劑杵千下丸梧子大每服五十丸溫酒或米飲下

茱萸浴湯　治下焦虛冷臍腹疼痛帶下五色月水
崩漏淋瀝不斷
吴茱萸 湯泡　杜仲 炒去絲　蛇床子
五味子　丁皮 各壹兩　木香
丁香 各半兩
右件如麻豆大每用半兩以生絹袋盛水三大碗
煎數沸乘熱熏下部通手淋浴早晚二次熏洗

坐藥龍鹽膏
丁香　木香　川烏頭 炮各壹錢半
全蝎 伍枚　龍骨　當歸尾
茴香　炒青鹽　酒防已
肉桂　紅豆 各貳錢　玄胡索 伍錢
厚朴 叁錢　良薑　木通 各壹錢
枯礬 半錢
右爲末煉蜜丸彈子大綿裹留絲在外納陰戶內
又方勝陰丹爲上藥 [illegible] 二錢內加行性熱藥

三柰子　川烏頭　大椒各五分
柴胡　羌活各貳錢　全蝎叁箇
大蒜壹錢　破故紙與蒜同焙壹錢　甘松叁分
升麻　枯白礬各貳分　麝香少許
右為細末同前法用制
又方同陽丹
全蝎　升麻　甘松各貳分
草烏頭　羌活各叁分　大椒
三柰子　華撥　枯礬各伍分
川烏頭　柴胡各柒分　水蛭炒焦
虻虫去翅足炒　大蒜　破故紙各貳錢
炒黃鹽壹錢必用之藥去之則不效
右為極細末依前制如指尖大用綿裹納陰戶中
覺臍下煖為効

酒煮當歸丸　治癩瘕白帶下疰脚氣腰已下如在水
雪中以火焙炕重厚綿衣蓋上猶冷不任寒之極
也面白如枯魚之象肌如刀削消瘦之速也小便
不止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目青
藍如菜色目䀮䀮無所見身重如山行步欹側不
能安地腿膝枯細大便秘結口不能言無力之極
食不下心下痞煩心懊憹不任其苦面停垢背惡
寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱竭故噦
嘔不止胃寒之極也其脈沉厥緊而澀按之空虛
若脈洪大而澀按之無力猶為中寒之證況按之
虛空者乎按之不鼓是為陰寒之極也其空虛乃
氣血俱虛之極也
當歸壹兩　茴香半兩　黑附子炮去皮臍
良薑各柒錢
右四味剉如麻豆大以好酒一升半同煎至酒
盡為度炭火焙乾同為細末入以下藥
炒黃鹽　丁香各半錢　全蝎叁箇
柴胡貳錢　升麻根　木香各壹錢
苦楝子　甘草炙各半錢　玄胡索肆錢
右與前四味藥末同為細末酒煮麵糊為丸如梧
子大每服二十丸空心宿食消盡淡醋湯下忌油
膩冷物酒麵

當歸附子湯　治臍下冷痛赤白帶下
柴胡柒分　良薑　乾薑
附子各壹錢　升麻　蝎梢各伍分
甘草炙陸分　炒黃鹽叁分　當歸貳錢

黃蘗（少許各炒為度末）

右用五錢水二盞煎至一盞去滓熱服為丸亦得

右炒黃例東垣回陽丹註云必用炒黃蘗無則不

効蓋寒疝之要藥也

[illegible] 治帶下并腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至

臍腹更增冷痛此蓋敗膿血所致卒無已期須以此

排膿白芷（一兩） 單葉紅蜀葵根（二兩） 白芍藥 白礬（各半兩） 礬

燒枯另研餘為末同以蠟丸如梧子大空肚及飯前

米飲下十丸或十五丸候膿盡乃以別藥補之

大伏龍肝散 治婦人赤白帶下久不瘥肌瘦黃

（[illegible]）

白人經年崩漏[illegible]微與此伏龍

肝散兼白礬丸服之愈

白礬丸

白礬（肆兩） 附子（貳兩） 黃狗骨頭（燒灰肆兩）

[illegible]

右搗丸梧子大每服三十丸

溫經湯 衛問曰婦人年五十所病下利數十日不止

暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱脣口乾燥何也

師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不

去何以知之其證脣口乾燥故知之當以溫經湯主

之

溫經湯

吳茱萸（參兩） 當歸 芎藭

芍藥 人參 桂枝

阿膠 牡丹皮 生薑

甘草（各貳兩） 半夏（半升） 麥門冬（壹升）

右十二味以水一斗煮取三升分溫三服 亦主

婦人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水來

過多及至期不來

丹 治赤白帶用五靈脂半生半熟為末酒調服

縮砂散 治帶下赤白惡露下不止縮砂草開花時

採搗為細末空心溫酒下二錢日三服

香礬散神効○（方見崩中血見黑止條白礬炒香附灰也）

用赤白帶皆屬於血有出於大小腸之分黃荊子炒

焦為末米飲調服

治帶下用韭菜子炒黑為末每服三錢匕調酒下

治婦人赤白帶下不問年月深遠日漸羸瘦起止不

得用刺薊根（不以多少擇去科每斤以童子小便五升浸一伏時取出曬乾）

右為細末每服二錢食前服溫酒調下

玳瑁丸 治赤白帶下不止

玳瑁　續斷各壹兩　安息香
麒麟竭　乳香　沒藥各半兩
故錦灰柒錢半
右為細末以蜜及安息香熬和藥末丸如菉豆大
每服二十丸食前溫酒送下

室女帶下 產寶第十四問未出女子有三病何也答
曰女子一病者經水初下陰中熱或當風臥或扇風
二病者太衝脈盛氣盛則內熱以冷水洗之三病者
或見丹下驚怖者名三者一有所受後必有帶下之
證也

神仙聚寶丹　治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不
散積聚成塊或成堅瘕及血氣攻注腹脇疼痛小
便急脹或虛鳴嘔吐涎沫頭旋眼花腿膝重痛面
色痿黃肢體浮腫月假欲行先若重病或多或少
帶下赤白崩漏不止驚怖健忘小便頻數或白時
見虛熱盜汗羸瘦此藥不問胎前產後室女並皆
治之常服安心去邪逐敗血養新血令有子
木香另研　琥珀另研　當歸末焙作
沒藥各壹兩　滴乳貳錢半　麝香別研
辰砂研各[illegible]

右為末滴冷熱杵為丸每一兩作十五丸每服一
丸溫酒磨下服息不順腹內疼痛一切產難酒和
童便磨下　產後血暈敗血奔心口噤舌強或惡
露未盡發渴面浮煎烏梅湯和童便磨下室女月
候不調溫酒磨下半丸產後血氣不調童便磨下
不拘時服

灸崔氏四花穴治赤白帶如神 [illegible]
下赤白帶　中極 [illegible]　白環俞 [illegible]
又法　中極 [illegible]　白環俞 [illegible]　腎俞 [illegible]
又法　氣海　中極　白環俞 [illegible]　三陽交
又法　帶脈 [illegible]　又法　三陰交
陰陽 [illegible]　漏陰 [illegible]　又法　交儀
灸赤帶 [illegible]　白帶 [illegible]　氣海 [illegible]　中極
又 [illegible]　中極 [illegible]　曲骨
承陰各[illegible]
心婦人得子多變成白水淋漓血下經久身面虛腫
陰谷 [illegible]　絕骨 [illegible]　如喘滿　魚際透太淵

海帶病太陰主之灸章門穴麥粒大各三壯効
川婦人下赤白沃後陰中乾痛惡合陰陽少腹䐜堅
小便閉曲骨主之　女子赤白帶腰腧主之　女子
赤淫大赫主之　女子絕子陰挺出不禁白瀝上窌
主之　女子赤白瀝心下積脹次窌主之　女子赤
淫時白氣癃月事少中窌主之　女子下蒼汁不禁
赤瀝陰中痒痛引少腹控䏚不可俯仰下窌主之
女子疝少腹腫赤白淫時多時少蠡溝主之　月事
不利見赤白而有身及前陰寒行間主之　女子疝
及少腹腫溏泄癃遺溺陰痛面塵黑目下背痛太衝

主之　女子俠臍疝中封主之　女子疝瘕按之如
以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛經水來下陰中腫
或癢漉清汁若葵羹血閉曲泉主之　婦人下赤白
裏急瘈瘲五樞主之

診

腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓皆為瘕（大奇論○王冰云小急為寒甚不鼓則血不流血不流而寒薄故血內凝而為瘕也）
三陽急為瘕三陰急為疝（王註云太陽受寒血聚為瘕太陰受寒血聚為疝）
脈急者曰疝瘕少腹痛（平人氣象論）
脈師曰婦人帶下六極之病脈浮則為腸鳴腹滿緊
則為腹中痛[illegible]弦則陰疼掣

痛、婦人帶下脈浮惡寒者不治

胎前白帶丹治有孕白帶

蒼朮（叁錢）　山茱萸（去核）　白芍藥（各貳錢半）
黃芩（炒）　白芷（各貳錢）　椿根皮（炒）
黃連（炒）　黃檗（炒各壹錢半）

右為末糊丸空心溫酒下五十丸

白濁白淫

大婦人小便白濁白淫者皆由心腎不交養水火不升降或因勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰為洩便之道胞冷腎損故有白濁白淫宜服局方金鎖正元丹（雜病遺精）或因心虛而得者宜服平補鎮心丹（雜病驚悸）降心丹或妙香丸（雜病遺精）若因思慮過當致使陰陽不分清濁相干而成白濁者然思則傷脾故也宜用四七湯（雜病氣）吞白丸子（雜病中風）此藥極能分利更宜小烏沉湯（雜病鼻衄）每貼加茯苓一錢重者益智二十枚去殼碾碎煎服（宜前證若元氣下陷用補中益氣湯）脾胃虧損不君加升麻柴胡肝經鬱結歸脾加黃檗山梔肝經怒火龍膽瀉肝湯虛則用加味逍遙散宜與帶下參看上治　一婦人善怒或小腹痞悶或寒熱往來或小便頻數時下白淫藥久不愈面青口苦余以為積憤而不能發散所致用龍膽瀉肝湯而愈用加味逍遙散八珍湯而安

蒲黃散　治血臟久冷腹脹疼痛小便濃白如泔

片薑黃（二兩）　大附子（炮二兩）　柳桂　三稜（各半兩）

赤芍藥　紅藍子

木香　牡丹皮　芫花（醋浸炒）

郁李仁（去皮）　沒藥（各一錢半）

右為細末每服一錢酒煎服如腹痛用當歸沒藥為末以水七分酒三分同煎熱服

內金鹿茸丸　治婦人勞傷血脈胞絡受寒小便白濁日夜無度臍腹疼痛腰膝無力

雞內金　鹿茸　黃芪

肉蓯蓉　五味子　遠志肉

牡蠣　桑螵蛸　龍骨

附子（各等分）

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服五十丸食前用溫酒或米飲送下

一以散　治耳鳴心躁腰腳疼重腹內虛鳴臍下冷痛頻下白水如泔名濕濁（方見前帶下諸白帶下）

烏金散　治身熱口燥氣塊築痛下黃水如葵汁

百草霜（炒）　紫金皮（米泔浸煮炒黃）　粉草（炙各等分）

右為末每服二錢艾湯或醋湯空心調下　心嘈豬血入鹽酒下　白帶用鯉魚一尾去腸不去鱗將油髮一團入魚肚內黃泥固濟炭火內煅存性去泥研魚為末每用一錢以白湯調同前藥服

四七湯煎成送下青州白丸（見雜病中風）最效

加味四七湯　治婦女小便不順甚者陰戸疼痛

半夏 湯洗七次各二兩　厚朴 薑汁製　赤茯苓

香附子 炒各伍錢　紫蘇　甘草 各貳錢

右㕮咀分四貼每服水二鍾薑五片煎八分去滓加琥珀末一錢調服

鎖精丸　治小便白濁

破故紙 炒　青鹽　白茯苓

五味子 各等分

爲末酒糊丸空心鹽湯或酒任下三十丸

固精丸　治下虛胞寒小便白濁或如泔或如凝脂腰重

牡蠣 煅粉　菟絲子 酒蒸　韭子 炒

龍骨　五味子　白茯苓

桑螵蛸 酒炙　白石脂 各等分

爲末酒糊丸梧桐子大每服七十丸空心鹽湯下

治婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁

右用鹿角屑炒黃爲細末每服二錢空心溫酒調下

又方　川雞膍胵炙爲末空心酒調服二錢

女科證治準繩卷之二

女科證治準繩卷之二

金壇王肯堂輯　門人新安閔承詔校

雜症門上 凡諸證男女一也此卷方論皆女科書多雜病書所遺故存之耳

虛勞

勞倦所傷用補中益氣湯當治乃舉病也失治而有發熱潮熱盜汗欬嗽咯血出焉謂之虛勞又復失治而有皮聚毛落飲食不爲肌膚骨髓中熱經閉不行淋瀝出焉謂之瘵骨蒸熱至於傳尸之疾別曰一種其源不起於勞欲其流或至於滅門介於雜病首冊則既條分而備列矣然男以精爲主女以血爲主其致病既殊其施治亦異故應別著方法而陳氏良方分勞瘵骨蒸勞血風勞氣虛風勞冷勞熱勞客熱等門未免惑亂後人今所述從今釐正如左醫者更參雜病虛勞傳尸勞二門而用之則無遺少之患矣

初病大法　凡治婦人虛勞當分中消首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後是治有熱虛勞也

虛有病後血虛者有本體血虛者其人往來寒熱或五心發熱日晡無力面色痿黃頭目昏暈變生諸疾芍歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮

湯服之血虛血氣旺者宜抑氣湯即香附末

增損四物湯 方見法 治婦人氣血不足四肢怠惰乏力少氣兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱

當歸　川芎　人參

乾薑 炮　甘草 炙　白芍藥 各等分

右㕮咀每服四錢水壹盞煎至六分去滓熱服

八物湯 方見法 治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不嗜飲食服之補養胃氣進美飲食充澤肌膚

當歸　熟地黃　白芍藥

川芎　黃耆　地骨皮 各等分

右爲麤末每服五錢水壹盞半煎至八分去滓空心溫服

加減大建中湯 普濟方 治婦人胎前產後一切虛損月水不調臍腹疞痛往來寒熱自汗口乾煩渴

芍藥 煨熟　當歸　川芎

黃耆　桂 各壹兩　甘草 炙

白朮 各半錢半

右爲末每服貳錢半水一盞半薑棗煎六分去滓溫服食前

清氣湯 [illegible]方 治肌熱骨瘦者陰衰陽盛也是氣弱不治血熱則外蒸肌肉內蒸骨髓煩渴口乾頰赤頭疼飲食無味心神驚悸肢體痠疼或時盜汗或時咳嗽或月家斷絕或經極少俗謂血勞產後曰蓐勞及羸瘦之人與清氣湯羊乳丸治之

紫蘇子　五味子　大腹子

知母　桑白皮 微炒　菖蒲

地骨皮　白朮　柴胡

秦艽　獨活　乾葛

甘草 炙 各等分

右㕮咀每服五錢水壹盞入紫蘇七片烏梅壹箇煎至七分溫服

黃耆散 一名防風湯 治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此因失血榮衛損也

黃耆 壹兩　白芍藥　防風

當歸　乾地黃 各半錢伍分　甘草 半兩

右㕮咀每服五錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至七分去滓溫服食前

四白散 治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲食四肢羸瘦骨節拘攣脚痛不能行

黄耆　厚朴　益智仁
藿香　白朮　白扁豆
陳皮各壹兩　半夏　白茯苓
人參　白豆蔻仁　天台烏藥
甘草各半兩　京南芍藥　檀香
沉香各壹錢
右爲細末每服四錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至
七分溫服
桔梗飲子良方　治心氣不足解勞倦益血
黄耆　人參　麥門冬

苦梗　甘草各壹兩　青皮半兩
右爲末每服叁錢水壹盞煎至七分溫服
如聖散良方大全　治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易
冒疾傷月水不調久而心虚狀若心勞四肢倦怠
筋骨少力盜汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不
長間作頭昏飲食無味胸膈不利或産前産後受
病並可服之
北柴胡　白茯苓　甘草
熟地黄　人參　當歸各壹兩
鼈甲　胡黄連　沉香

知母各[illegible]　桑寄生　乾葛各半兩
右爲細末每服貳錢水壹盞[illegible]麥
門冬數粒煎至八分服無時
劫勞散　治心腎俱虚勞嗽一二三聲無痰遇夜發熱
熱過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黄瘦飲食減
少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽
有唾唾中有紅線名曰肺痿失治便成羸劣之疾
白芍藥陸兩　綿黄耆蜜炙　甘草炙
人參去蘆　當歸洗去蘆　半夏
白茯苓去皮　熟地黄洗焙乾　五味子

阿膠各貳兩炒
右㕮咀每服叁錢水壹盞生薑七片棗叁枚煎至
九分溫服無時日三
蒿骨煎良方大全　治諸虚疾羸瘦乏力腰背引痛心煩
喘嗽唾膿嘔血頑涎壅盛睡卧有妨胸滿氣促夜
多盜汗鬢焦耳鳴皮寒骨熱一切五勞七傷骨蒸
等候並皆療治
地骨皮　粉草　北柴胡
前胡　烏藥　麻黄各[illegible]
乾葛　青蒿　苦梗

知母　天仙藤　條黃芩各壹兩
人參　生乾地黃　秦艽
鱉甲　黃耆各半兩

右㕮咀每服參錢水壹盞酒壹分豬脊骨壹莖炙焦分為四服兼柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖搥碎煎至七分去滓溫服加烏梅半箇亦妙　一方加當歸芍藥

滋血湯　治婦人經候不通或血聚肢體麻木肌熱身重倦怠少力將成勞瘵不可妄行破血宜滋養潤利

補中丸　治婦人虛損諸疾

白朮　地黃各壹兩　川芎
白芍藥　當歸　黃耆
人參　陳皮各半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十丸溫米下

溫中丸　治衝任虛損血氣虧傷月水斷續來不應期或多或少腹中疠痛不實熱煩悶口舌乾心神忪悸頭目眩暈肢體倦怠腹背引痛筋脈拘急帶下赤白飲食進退或發寒熱

生地黃　生薑各壹斤研取汁將地黃汁炒生薑滓生薑汁炒地黃滓
蒲黃炒　白芍藥　人參去蘆
當歸酒洗　琥珀另研
白茯苓去皮　黃耆蜜炙　延胡索炒
麥門冬去心　烏梅肉各壹兩

右為末別用艾葉壹兩水壹升煎取濃汁熬成膏和前藥丸如梧桐子大每服五拾丸溫米飲下空心食前

人參丸　養陰生血補虛

人參　鹿角膠炒　熟地黃
芍藥　當歸　白朮
川芎各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服參拾丸空心米飲下

秘方十補丸　治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸瘦面黃背倦口苦舌乾心忪多汗血衰氣盛寒熱往來一切血崩帶下墮胎落孕此藥皆治孕婦服之尤有神效

熟乾地黃酒洗焙乾　肉蓯蓉酒浸焙乾
人參　川芎

當歸去蘆洗浸焙 白芍藥炒 白茯苓
白朮去蘆泔浸炒各貳兩 甘草炙半兩 肉桂去皮壹兩
右為細末用好酒調山藥末打糊為丸如梧桐子
大每服六七拾丸食前米湯或溫酒下
五聖丸 調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不
調臍腹㽲痛崩中漏下血瘕塊硬發歇疼痛妊娠
宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛
風寒內搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛時作寒
熱
當歸 川芎 白芍藥
熟乾地黃酒各壹兩 生乾地黃貳兩
右為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服六七
拾丸食前溫酒下
七補丸十便良方 治婦人氣血虛弱衝任不和腹中經
結狀若懷孕月候尚來未分經脉宜服此方
當歸 芍藥 川芎各叁分
白芷 白朮 熟地黃
阿膠炒各貳分
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五六拾丸空
心米飲下

羊乳丸 治虛勞羸瘦
秦艽 柴胡 地骨皮
山茱萸肉 黃耆蜜炙 地黃酒洗各等分
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五拾丸煎人參
湯下不拘時候日進三服
人參鼈甲丸普濟 治婦人一切虛損肌肉瘦瘁盜汗
心忪咳嗽上氣經脉不調或作寒熱不思飲食
杏仁湯浸去皮尖炒 人參 當歸
赤芍藥 甘草炙 柴胡
桔梗去蘆各壹兩 地骨皮 宣黃連去鬚
胡黃連各半兩 肉桂去粗皮 木香各半兩
麝香半分研細 鼈甲壹枚重貳兩者醋炙黃色
右為細末用青蒿壹觔研爛絞汁童子小便五升
酒五升同熬至貳升次入眞酥叁兩白沙蜜叁兩
再熬成膏冷方下衆藥末搜和令勻丸如梧桐子
大每服五十丸溫酒送下無時
艾煎丸垣東 治婦人諸虛
北艾葉 大當歸各貳兩 香附子肆兩
右醋煮半日焙乾為末再用醋煮糊丸艾醋湯下
[illegible]味丸垣東 補虛敗

黃耆（蜜炙兩鹽水火炙）北五味（貳兩）
右爲末秫米糊丸空心鹽酒下
〔無熱虛寒〕一婦人冷勞屬血氣不足臟腑虛寒以致臍下冷痛手足時寒月經失常飲食不消或時嘔吐惡寒發熱骨節痠疼肌膚羸瘦面色痿黃也〔論〕前證有內外真寒然有內外真熱亦有內真熱而外假寒者又有內真寒而外假熱者若飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食畏寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒之證也宜用附子理中湯以回陽八味地黃丸以壯火若飲食如常大便堅實胸腹痞脹

飲食喜冷手足煩熱面赤嘔吐不畏風寒此內外真熱之證也宜用黃連解毒湯以消陰六味丸以壯水若飲食如常大便堅實胸腹痞脹飲食喜寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內真熱而外假寒也亦用解毒湯六味丸若飲食少思大便不實吞酸噯氣胸腹痞滿手足逆冷面赤嘔吐畏見風寒此內真寒而外假熱也亦用附子理中湯與八味丸當求其屬而治之經曰益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光便不知真水火之不足泛以寒熱藥治之則舊疾未去新病復生矣夫所謂屬者猶主也謂心腎也求其

屬也者言水火不足而求之於心腎也火之源者陽氣之根即心是也水之主者陰氣之根即腎是也非謂火爲心原爲肝水爲腎主爲肺也　一婦食少作嘔口吐痰涎面黃腹痛月經不調手足逆冷此內外俱寒之證以六君加附子木香治之而瘥　一婦忽嘔吐酸水內熱作渴飲食不進惟喜冷水面色青赤投之以藥入口即吐此內外真熱之證積十餘日以黃連一味煎湯飲之徐加白朮茯苓仍加陳皮當歸炙甘草至月餘始進米飲稀粥調理而瘥　一婦內熱作渴大便秘結畏惡風寒手足逆冷此內真熱而

外假寒先用黃連解毒湯後用六味丸而瘥　一婦初患痰喘熱渴醫以降火散氣治之肌日削而氣日索延至甲辰木旺痰盛身熱口腐腹脹神昏絕食幾死此虛熱無火投以壯水生土之劑隨服隨効越數歲夏初坐則頭墜不能起視臥則背冷覺風透體煩熱暈眩咳嘔痰湧手足麻冷此內真寒外假熱之證也遂以大補湯附之劑投之不三四服而大勢已平仍以前藥加減而瘥　韓懋治其嫂年三十餘十八胎九殰八夭會家難作驚憂過甚遂昏昏不省人事口唇舌皆瘡或至封喉下部虛脫白帶如注如此四

十餘日或時少甦至欲自縊悲不能堪醫或投涼劑解其上則下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥熏蒸其下則熱暈欲絕此亡陽證也急以鹽煮大附子九錢為君制以薄荷防風佐以薑桂芎歸之屬水煎入井水冷與之未盡劑鼾睡通宵覺即能識人或曰此何謂也曰方書有之假對假真對真爾上乃假熱故以假冷之藥從之下乃真冷故以真熱之藥反之斯上下和而病解矣繼以女金丹錯綜以三二方不但去其疾且調治元氣無何連生二子以上論及治驗有無當歸虛勞者而言以方劑通之大三方不可不究也

虛勞十二

砥大聖散 治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血衝心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便得無恙治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血運血癖血滯血崩血入四肢應血臟有患及諸種風氣或傷寒吐逆欬嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脈不調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩中不定因此成疾室女經脈不通並宜服之常服煖子宮和血氣悅顏色退風冷消除萬病兼療丈夫五勞七傷虛損等病

澤蘭葉　石膏研細各　卷栢去根

白茯苓去皮　防風去蘆　厚朴去粗皮薑汁炙

細辛去苗　柏子仁微炒別研　桔梗

吳茱萸湯洗七次焙炒各壹兩　五味子揀淨

人參　藁本去苗　乾薑炮

川椒去目閉口者微炒出汗　白芷　白朮

黃耆去苗　川烏炮去皮臍　丹參各叄分

蕪荑微炒赤　甘草炙　川芎

芍藥　當歸各壹兩半去蘆　白薇

阿膠搗碎炒令燥　肉桂去皮各壹分　生乾地黃壹兩

右為細末每服貳錢空心臨卧熱酒調下若急疾有患不拘時候日三服

渾身疼痛飲子 治婦人勞倦

虎骨各錢　防風　藁本

甘草　白芷　茯苓各貳錢

當歸　芍藥　續斷

白朮　附子各貳錢

右為麤末薑棗煎服不拘時

十全大補湯 治婦人冷勞最妙方見雜病虛勞

當歸木香湯 治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩譫語聲沉重舌根強硬言語蹇澀口苦不食白日困睡

夜有盜汗神思恍惚夢寐驚悸面色萎黃頻發喘嗽遍身疼痛腳氣走注四肢沉重背胛拘急時發寒熱五心煩躁唇乾多渴胸膈不利咽喉噎塞肚羸瘦弱經曰大脈為勞宜服

當歸　青皮　五加皮
海桐皮　陳皮　丁皮
桑白皮　地骨皮　牡丹皮
棕櫚皮燒存性各壹兩　赤芍藥　木香各半兩

右為末每服壹錢水壹盞入香油壹貳點古錢壹文洗同煎至七分不拘時溫服

熟乾地黃丸方見前通治門

木香丸　治婦人冷勞經脈不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味漸加羸瘦

木香　琥珀　吳茱萸炮
當歸　牡丹皮　赤芍藥
三稜　附子炮　延胡索
川芎各叁分　乾薑　人參
桂心各半兩　北柴胡　白朮
鱉甲醋煮去裙炙　厚朴　熟地黃
陳橘皮各壹兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸空心溫酒下

煮肝散　治婦人冷勞脾胃虛乏大腸轉減水穀不化四肢羸瘦口內生瘡不思飲食漸加無力

北柴胡　縮砂仁　蒔蘿
蓽撥各叁分　白朮　白芷
[illegible]　白薑　陳皮
山茵陳　人參　蕪荑仁
木香　紫菀　白芍藥
北細辛　桂心各半兩

右為細末以豶豬肝一具去脂膜切如柳葉片以新汲水洗過入葱白叁寸細切入藥末半兩於銚內以新水貳大盞入鹽醋少許以甆碗合煮令水盡空心以意食之吃前飲下食後良久飲煖酒一盞為妙晚食前熱服

硇砂煎丸　治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢羸瘦不食

鱉甲醋炙　桃仁去皮尖麩炒　木香
五靈脂去土石炒　當歸炒各壹兩　硇砂貳兩醋壹升熬成膏

右為細末用硇砂膏為丸如梧桐子大空心溫酒

下貳拾九（此大劑大人不宜輕用）

骨蒸論　夫婦人熱勞由心肺經熱傷於氣血以致心神煩躁頰赤頭疼眼澀唇乾口舌生瘡神思昏倦四肢壯熱飲食無味肢體痠疼心忪盜汗肌膚日瘦或寒熱往來當審其所因調補氣血其病自瘥矣

薛按前證乃壯火食氣虛火煎熬真陰之所致也王太僕云如大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎心虛則生熱腎虛則生寒腎虛

則寒動於中心虛則熱收於內竊謂前證若肝脾血虛用四物參朮肝脾鬱怒小柴胡合四物湯脾胃氣虛補中益氣湯肝脾血虛加味逍遙散肝經風熱加味小柴胡湯心經血虛天王補心丹肺經氣虛人參補肺湯肝經血虛加味四物湯大抵午前熱屬氣分用清心蓮子飲（方見發熱赤白濁）午後熱屬血分用四物湯參朮牡丹皮熱從左邊起肝火也實則四物湯龍膽山梔虛則四物參朮黃耆熱從臍下起陰火也四物參朮黃蘗知母酒拌炒黑五味子麥門冬肉桂如不應急用加減八味丸（方見）若病熱或無定處或從腳心起此無根虛火也用加減八味丸及十全大補湯加麥門五味主之　一婦經行不調飲食少思日晡熱甚此肝脾氣血俱虛用十全大補加山茱萸山藥牡丹皮麥門五味而瘉次年秋寒熱如瘧仍用前藥而瘉　一婦生育多胎月經不調兩足發熱年餘其身亦熱勞則足痠痛又年許唇腫裂痛又半年唇裂見血形體瘦倦飲食無味月水不行此氣血俱衰之證彼誤用通經丸等藥復傷氣血遂致不起

黃耆散（良方）　治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲飲食

人參　黃芩　當歸（各柒錢半）

北柴胡（去皮壹兩半）　黃耆　地骨皮

赤茯苓　麥門冬（去心）　生地黃

赤芍藥（各壹兩）　甘草（炙壹錢半）

右㕮咀每服四錢水壹盞薑五片煎六分去滓溫服無時

逍遙散（良方）　治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又主室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肢體羸瘦漸成

骨蒸

白茯苓　白朮去蘆　白芍藥

當歸去蘆酒浸半日微炒　北柴胡去苗各壹兩　甘草炙壹兩半

右剉散每服叁錢水壹盞半薑叁片麥門冬貳拾粒去心煎服不拘時候　一方加知母地骨皮　一方薄荷湯下無門冬　一方名人參散治婦人血熱虛勞骨蒸兼治邪熱客於經絡痰嗽煩躁頭目昏痛夜多盜汗補血氣解勞倦用人參白朮茯苓柴胡半夏當歸赤芍藥乾葛甘草黃芩各等分㕮咀每服四錢水壹盞半生薑五片棗貳箇煎至六分不拘時候溫服應有勞熱之證皆可服之熱退卽止

子芩散拔粹　涼心肺解勞除熱使榮衛順血不絕

黃耆壹兩　白芍藥　子芩

人參　白茯苓　麥門冬去心

生乾地黃各半兩　苦梗貳錢半

右爲麤末先用竹葉壹握小麥柒拾粒水叁盞薑叁片煎至壹盞半入藥末叁錢重煎至七分去滓溫服

知母散聖惠　治婦人熱勞體瘦壯熱四肢煩疼咽喉不利少思飲食

知母　黃芩各柒錢半　柴胡去苗

生乾地黃各壹兩　赤芍藥　麥門冬去心

射干　川升麻各柒錢半　甘草半兩炙微赤剉

右爲麤散每服四錢水壹中盞入生薑半分淡竹葉貳拾柒片同煎至六分去滓不計時候溫服

半夏散仝上　治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛或時寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏　知母　苦梗

人參　赤茯苓　秦艽

赤芍藥　麥門冬　烏梅肉各半兩

鱉甲醋炙　北柴胡　黃耆各壹兩

大腹皮柒錢半　甘草貳錢半

右爲麤末每服四大錢水壹盞半生薑叁片煎至七分去滓溫服無時

秦艽散仝上　治血經有熱月脉凝滯五心煩倦

麥門冬　秦艽各壹兩　生地黃

當歸各半兩　地骨皮　鬱金

蘇木各貳錢半

右爲細末每服壹錢半水壹盞入紅花少許同煎至

七分溫服若經脉調不用紅花忌酒與熱物此方
可服二年
鼈甲地黃湯備遺 治熱勞手足煩心怔忡悸悶婦人
血室有乾血身體羸瘦不爲肌肉
柴胡去蘆　當歸去蘆酒浸　麥門冬去心
鼈甲醋炙　石斛　白朮
熟地黃酒浸　茯苓　秦艽去蘆各壹兩
人參　肉桂不見火　甘草炙各半兩
右剉每服四錢薑四片烏梅半箇煎溫服
胡黃連散聖惠 治婦人熱勞體瘦經脉不通四肢疼
痛口乾煩渴不得眠臥飲食全少
鼈甲壹兩去裙襴醋炙　天靈蓋酥炙黃　柴胡去蘆
生乾地黃　地骨皮　黃耆剉
川大黃壹兩剉微炒　犀角屑各[illegible]兩　胡黃連
當歸　青蒿　黃芩各半兩
赤芍藥　木香　麝香細研入各半兩
右爲麤末每服四錢以水壹中盞入生[illegible]錢炙
分桃柳心各七莖煎至六分去滓不拘時溫服
犀角散聖惠 治婦人熱勞心胸煩熱不思飲食四肢
多疼經脉澀滯

犀角屑　黃芩　甘草炙微赤剉各半兩
赤芍藥　虎杖　茯苓
地骨皮　麥門冬去心　當歸
枳殼麩炒微黃去瓤各柒錢半　柴胡去苗　紅藍花
鼈甲醋炙黃去裙襴各壹兩
右爲麤散每服叁錢以水壹中盞入生薑半分煎
至六分去滓溫服無時
紅藍花散聖惠 治婦人熱勞四肢羸瘦經脉不通
柴胡去苗　紅藍花　當歸
生乾地黃　赤芍藥　鬼箭羽
虎杖　大腹皮剉　麥門冬去心
土瓜根　地骨皮　枳殼麩炒微黃去瓤各壹兩
甘草炙微赤半兩
右爲麤散每服四錢以水壹中盞入生薑半分煎
至六分去滓溫服無時
鼈甲散聖惠 治婦人熱勞發渴壯熱四肢煩疼漸漸
黃瘦心胸躁悶
鼈甲醋炙令黃去裙襴　柴胡去蘆各壹兩半　麥門冬去心壹兩
知母　川大黃剉微炒　地骨皮
赤芍藥　人參　黃芩

黃耆剉　　桑根白皮各柒錢半　甘草炙微赤剉

右為麤散每服四錢以水壹中盞入生薑半分葱白五寸或五十粒煎至六分去滓溫服無時

治婦人骨槽勞熱宮臟不調因感勞氣子母相傳邪氣干心非時驚恐如人將捕戰慄不安（楊子建護命方）

桑寄生半兩　人參　茯苓

鱉甲醋炙　柴胡去苗　獨活

天靈蓋酥炙　川芎各貳錢半　沈香玖分

木香[illegible]

右細杵羅為末每服叁錢水壹盞煎兩三沸[illegible]出空心忽非時和滓喫

豬肚丸（聖惠）　治婦人熱勞羸瘦

北柴胡　赤茯苓　人參

黃耆各壹兩　黃連叁兩　地骨皮

木香各半兩　桃仁　鱉甲各壹兩半

右為細末用好嫩豬肚一枚淨洗將藥末入豬肚內以線縫合蒸令爛熟於砂盆內研如膏丸如梧桐子大食前粥飲下叁拾丸午食前再服

胡黃連丸（聖惠）　治婦人熱勞煩悶四肢黃瘦疼痛時有咳嗽不欲飲食

胡黃連　知母　川升麻

玄參　人參去蘆　當歸

甘草炙微　檳榔　桔梗去蘆各半兩

赤芍藥　犀角屑　地骨皮

茯神　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　秦艽去苗

紫苑[illegible]　川大黃剉碎微炒

枳殼麩炒微黃去瓤錢半　柴胡去苗壹兩

麥門冬去心焙　鱉甲塗醋炙微黃去裙襴貳兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以湯飲下叁拾丸

益母草煎丸（聖惠）　治婦人熱勞煩悶四肢疼痛經脈滯澀腹脇妨悶不欲飲食

益母草汁壹升　青蒿汁壹升　無灰酒壹升

生薑汁叁合　童子小便壹升

已上六味於銀器中以慢火熬成膏

柴胡去苗　麥門冬去心　赤芍藥

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃　生乾地黃

羚羊角屑各[illegible]　鱉甲塗醋炙微黃去裙襴　人參去蘆

琥珀細研　地骨皮　白朮

枳殼麩炒微黃去瓤　桔梗去蘆　當歸剉微炒

麝香（細研）

右為末用前膏子和搗三二百杵丸如梧桐子大食前以溫水下五拾丸

青蒿丸（聖惠） 治婦人熱勞咳嗽肌體消瘦心膈煩熱夜多盜汗四肢痠痛食少無力

青蒿 杏仁（湯浸去皮尖雙仁麩炒黃） 天靈蓋（酥炙）

鼈甲（醋炙黃去裙） 天門冬（去心焙） 柴胡（去苗）

地骨皮 旋復花 紫苑（洗去苗土）

貝母 人參（去蘆） 秦艽（去蘆）

葳蕤 黃耆 川大黃（剉碎微炒）

枳殼（麩炒微黃去瓤） 甘草（炙微赤剉） 龍膽草（去蘆）各一兩

朱砂（細研水飛過） 麝香（細研）各半兩

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每以麥門冬湯下貳拾丸不計時候

鼈甲丸 治熱勞尫怯

河車（…） 鼈甲（醋炙壹兩） 桔梗

白芍藥 大黃（煨） 甘草

苦參 貝母 知母

秋石 敗心 草龍膽

黃藥子 茯苓 犀角屑

消石（研）各半兩

右為末以前膏子為丸湯使如前

雞蘇丸（拔粹） 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉（半兩） 黃耆 苦梗（炒各半）

防風 荊芥穗 生乾地黃（…兩）

甘草 川芎 甘菊花（各…錢）

眞腦子（半錢）

右為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸用麥門冬去心煎湯嚼下又治肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子貳錢半每服壹丸煎桑枝湯嚼下日可六七服桑枝剉炒香每用水壹盞煎至壹盞去滓下藥

瘵骨蒸熱 五勞六極七傷諸證治已見雜病虛勞門茲不贅敘婦人致此多因經行胎產或飲食起居七情重傷肝脾之所致又或失於調攝或過於攻伐而成與男子治法稍有不同故採集古今禁方專治婦人者於此若欲窮其源流更當參考彼篇

補虛治瘵疾得効方河車丸 治勞瘵 一切勞瘵虛損骨蒸等疾

河車 [illegible]

雪白茯苓(半兩) 揀參(去蘆壹兩) 乾山藥(貳兩)

右爲細末入河車汁加麪糊爲丸如梧子大以少

麝香末爲衣每服伍拾丸 [illegible] 溫酒鹽湯送下

空心服嗽甚者五味子湯下

十全大補湯 [illegible] 加熟加柴胡地骨皮秦

艽

補虛退熱潤燥黃(耆) [illegible] 治婦人骨蒸煩熱四肢

羸瘦疼痛口乾心躁不得眠卧

黃耆 麥門冬(去心) 茯神

北柴胡 甘草 生乾地黃(各壹兩)

酸棗仁(炒) 郁李仁 杏仁(去皮尖麩炒黃)

枸杞子 人參(去蘆) 黃芩(各叁錢半)

百合 枳殼(去穰麩炒) 赤芍藥

知母 秦艽(各半兩) 鱉甲(醋炙)

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大清粥飲下伍拾

丸無時候

地黃煎丸 解勞生肌進食活血養心

生地黃汁 杏仁汁 生薑汁

藕汁 薄荷汁 鵝梨汁(各壹升)

法酒(貳升) 沙糖(貳升)

右慢火熬成膏入後藥

北柴胡(壹兩) 木香 人參

茯苓 山藥 栢子仁(去皮炒研)

遠志肉 枳實(麩炒) 白朮(各壹兩)

秦艽 苦梗(各貳兩) 麝香(半兩研)

熟地黃(酒洗蒸焙)

右爲細末以前膏子和丸如梧子大食後甘草湯

下貳叁拾丸

攻補兼施人參散 治婦人骨蒸勞身體壯熱手

足疼痛月水不通日漸瘦悴兩脇氣刺四肢羸弱

腹內塊生時有欬嗽不欲飲食

人參(去蘆) 鱉甲(去裙醋炙黃) 柴胡(去蘆)

地骨皮(各壹兩) 羚羊角屑 赤茯苓

枳殼(麩炒微黃去穰) 牛膝(去蘆) 貝母

栝樓根(各貳兩) 知母(壹兩半) 赤芍藥

桃仁(湯浸去皮尖麩炒微黃各壹兩) 黃芩

當歸(各叁錢伍分)

右爲細末每服半兩以豶豬肝一具用醋酸蔥白

各少許和煮 [illegible] 溫酒貳盞

赤伏苓散(出聖惠) 治婦人骨蒸及血勞等疾，面色萎黃，四肢無力，煩疼痰壅，涕唾稠粘，不思飲食

鱉甲(醋炙如法，去裙，二兩) 赤伏苓 柴胡(去苗)

麥門冬(去心) 川大黃(銼碎微炒，各一兩) 人參(去蘆)

木香 杏仁(製如前) 白朮

羅參 赤芍藥 當歸

半夏(湯洗七遍去滑，各半兩)

右爲麤散，每服四錢，以水一中盞，入生薑半分，煎至六分，去滓，溫服，無時。

攻積天門冬丸(大全) 治伏連傳注，腹中有堅塊積氣，攻心胸作痛，痛引脇肋，脘腑滿悶

鬼臼 天門冬(去心，各半錢) 巴豆

秦艽 不蛀皂角 葶藶子 雄黃(各一兩)

右爲細末，煉蜜爲丸如小豆大，每服一丸，漸加至參拾丸，空心湯水吞下，臨臥一服，常宜服，忌勿令泄瀉，忌鯉魚、山豬、莧菜

破血幼痰麥煎散(大全) 治少男室女骨蒸，婦人血風攻疰四肢，心胸煩壅

赤伏苓 當歸(酒浸) 乾漆(生)

鱉甲(醋炙) 常山 大黃(煨)

北柴胡 白朮 石膏

生乾地黃(各一兩) 甘草(半兩)

右爲細末，每服二錢，水一盞，小麥五十粒，煎，食後臨臥溫服。有虛汗，加麻黃根一兩。東坡云：在黃州療骨蒸黃瘦，口臭，肌熱，盜汗極效，寶此方如希世之珍

通經破血牡丹湯(濟生) 治婦人骨蒸，經脈不通，漸增瘦弱

牡丹皮(一兩半) 桂皮(去粗皮) 木通(銼，炒，各一兩)

芍藥 土瓜根(各一兩半) 鱉甲(醋炙去裙，二兩)

桃仁(製如前)

右爲麤末，每服五錢，水一盞半，煎至一盞，去滓溫服，空心食後

鱉甲丸(直指) 治婦人骨蒸勞，月水不通，臍下癥瘕往往腹痛

鱉甲(醋炙黃，一兩) 土瓜根 桂心

京三稜 牡丹皮 牛膝(去苗)

川大黃(銼碎微炒) 訶黎勒皮 琥珀(細研，各一兩)

杏仁(製如前)

右爲末，煉蜜和搗三二百杵，丸如梧桐子大，不計

時候以兎仁湯下叁拾丸

清肺柴胡散聖惠 治婦人骨蒸勞熱咳嗽胸膈痰壅
腹脇妨悶不欲飲食
柴胡去苗 桑根白皮 麥門冬去心
赤茯苓各壹兩 川大黃剉碎微炒 枳殼麩炒微黃去瓤
百合 秦艽去苗 紫菀洗
黃芩 赤芍藥 知母
木通剉各柒錢半 半夏湯洗七遍去滑 甘草炙微赤各半兩
鼈甲醋炙壹兩
右爲麤散每服叁錢以水壹中盞入生薑壹錢煎
分煎至六分去滓溫服無時

涼膈黃連散聖惠 治婦人骨蒸勞熱四肢煩[illegible]
疼痛面色萎黃漸漸無力
黃連去鬚 知母各壹兩 鼈甲塗醋炙微黃去裙襴
柴胡 木通各壹兩半 麥門冬去心
白朮 地骨皮 黃芩
犀角屑各半兩 龍膽去蘆 甘草炙微赤各半兩
右爲麤散每服四錢以水壹中盞入生地黃壹錢淡
竹葉貳七片煎至六分去滓溫服無時
青蒿散聖惠 治婦人骨蒸勞熱四肢煩疼日漸羸瘦

青蒿 鼈甲塗醋炙令黃去裙襴 柴胡去苗
黃連去鬚 黃耆 桑根白皮
白朮各壹兩 梔子仁 知母各柒錢半
地骨皮 甘草炙微赤各半兩 龍膽草去蘆頭錢半
右爲麤散每服四錢以水壹中盞入生薑半
分煎至六分去滓溫服無時
豬肚丸 治骨蒸勞瘠煩熱氣羸口乾壯熱盜汗
大腸秘澁小便[illegible] 黃瘦食
青蒿 鼈甲醋炙 北柴胡
木香 生乾地黃各壹兩 牡丹皮半兩
黃連各半兩

右爲細末以豬肚壹箇洗淨入藥在內縛定蒸令
極軟研如泥爲丸如梧子大湯下拾五丸空心日
三服忌濕麪毒物
石膏散 治女人骨蒸外寒內熱附骨蒸盛之時
四肢微瘦足趺腫者病在臟腑中
與石膏不以多少研極細如粉用新汲水和服方寸
匕取身無熱爲度 [illegible] 能食大便實者
不可服
寒熱往用青蒿鼈甲煎丸 [illegible] 人骨蒸勞退熱

解肌進食
九肋鼈甲壹箇 北柴胡貳兩 甘草
杏仁 桔梗 當歸
人參 地骨皮 赤芍藥各壹兩
胡黃連 宣連各貳錢半 官桂
木香各半兩 麝香各壹字 酥
蜜各壹兩
右爲細末用青蒿自然汁童子小便五升好酒壹升
熬青蒿汁約減一升已來擬入青蒿不用入酥蜜再
熬成膏冷後入藥末搜和爲丸如梧桐子大每服
十五丸溫酒下米飲亦得日三服如秋後合再入
桃柳枝七莖此藥甚妙即是方人參鼈甲丸也
得效大靈蓋散 治婦人骨蒸勞四肢無力每至
晚間即熱兩頰紅色飲食不下心神煩躁
天靈蓋酥炙 安息香 地骨皮
當歸 人參去蘆 山梔子仁
貝母去心 黃連 桃仁去皮尖麩炒黃
檳榔各壹兩 鼈甲醋炙 北柴胡
生乾地黃 赤茯苓 麥門冬各壹兩半
阿魏半兩

右爲麤末以童子小便壹大盞桃柳枝各七寸蘆
五片葱白五寸藥四錢煎至七分去滓溫服
益母草丸濟生 治婦人骨蒸勞瘦月候不通心神煩
熱四肢疼痛不能飲食
益母草 青蒿各貳斤 桃枝五握長壹尺
柳枝五握長壹尺
已上四味細剉用童子小便壹斗於銀鍋中煎至
壹升絞去滓煎成膏
柴胡去苗 赤芍藥 犀角屑各貳兩
朱砂水飛研 天靈蓋酥炙 木香
甘草炙各壹兩 鼈甲醋炙 桃仁去皮尖
麝香研
右爲末用益母草煎都和搗五七百杵丸如梧桐
子大每以烏梅甘草湯下三拾丸無時
獺肝丸聖惠 治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食
獺肝壹具 鼈甲醋炙 北柴胡各壹兩半
川升麻 桃仁 天靈蓋酥炙
犀角屑 梔子仁 地骨皮
知母各壹兩 黃芩半兩 甘草半兩
麝香貳錢半研 朱砂半兩細研水飛

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大溫水下叄拾丸無時

殺鬼方（聖惠） 治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連

麝香（柒錢半） 犀角屑 木香

白朮 鬼箭羽（各壹兩） 虎頭骨（酥炙黃色）

一 天靈蓋（塗酥炙黃） 桃仁（去皮尖雙仁麩炒黃） 雄黃（另研）

朱砂（各壹兩半光明者另研）

右爲細末入研了藥和勻煉蜜丸如梧桐子大溫水下貳拾丸空心食前服或帶亦可

止嗽溫金散（錢氏方） 治勞嗽

甘草 黃芩 桑白皮

防風（各壹兩） 杏仁（貳拾粒去皮尖麩炒） 人參

茯神（去木各半兩） 麥門冬（壹分）

右前五味以米泔浸一宿曬乾次入人參茯神麥門冬三味同爲細末每服貳錢水壹盞蠟茶豆大煎八分食後溫服

一方（和劑） 調榮衛消痰血出聲音治痰嗽

當歸 牡丹皮 白芍

子芩 木通 麥門冬

甘草 細辛（各半兩） 生乾地黃（各壹兩）

右㕮咀每服叄錢薑叄片水煎溫服

一方（類要） 治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧（壹對去頭足酒浸一宿酥炙） 知母 貝母（去心）

人參 甘草 杏仁（炒製）

枇杷葉（炒去毛） 鹿角膠（炒各壹兩）

右爲細末每服叄錢水壹盞入桑白皮溫服

補肺湯（類要） 治勞嗽

桑白皮 熟地黃（各貳兩） 人參

紫菀 黃耆 五味子（各壹兩）

右爲細末每服貳錢水壹盞入蜜少許食後溫服

四君子湯加條芩貳錢煎服尤妙

治胸痺 一方（類要） 治心胸積氣作胸痺引兩脇痛昏悶不收音聲不清虛熱上壅作鼻衄

桑白皮（叄分） 枳殼 木通

子芩 生乾地黃 白芍藥

甘草（各半兩）

右爲細末每服叄錢水煎食後溫服

一方（和劑） 治伏瘀血在心肺時作衄心胸徹背痛

白芍藥 牡丹皮（各壹兩） 生犀屑（半兩）

生地黃（貳兩）

右㕮咀每服半兩水煎溫服
瓜蔞湯 治胸痺
瓜蔞壹個 枳殼肆枚 厚朴
薤白各壹兩 桂枝壹兩熟者去皮
右㕮咀水煎溫服
一方 治積氣堅硬作氣噎胸脇引背痛
白芍藥壹兩半 鱉甲醋炙 枳殼
北柴胡各壹兩 甘草 赤茯苓各半兩
右㕮咀每服叁錢生薑叁片棗壹枚水煎溫服
出竒效一方 治失聲音

訶子肉 木通各壹兩 甘草半兩
右㕮咀水叁升煎至升半入生地黃壹合再煎數
沸放溫分六服食後日作半料
治喉痛一方 咽喉痛
百藥煎去黑皮 硼砂 甘草
生白礬各等分
右為細末每服壹錢食後米飲調細細呷嚥
已上諸方辰陽李仲傳屢救人甚効服藥止可食
淡煮豬蹄肉仍須煮熟肉去元汁再以白湯熟煮
仍忌房勞生冷魚腥鹹酸醃藏等修合煎藥忌一切
生人男女猫犬雞畜見仍不令病人知藥味大面
効
婦人血風勞 [大]婦人血風勞證因氣血素虛經候不調或
外傷風邪內挾宿冷致使陰陽不和經絡痞澀腹中
堅痛四肢痠疼月水或斷或來面色痿黃羸瘦又有
因產後未滿百日不謹將護臟腑虛損百脉枯竭遂
致勞損久不瘥則變寒熱休作有時飲食減少肌膚
瘦瘁遇經水當至即頭目昏眩胸背拘急四肢疼痛
身體煩熱足重面浮或經水不通故謂之血風勞氣
也 [辯]東垣云喜怒不節起居不時有所勞傷皆損

其氣氣衰則火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故困
熱懶言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜
安心靜坐存養其氣以甘寒瀉其熱氣以酸味收其
散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之要
略云平人脉大為勞以黃耆建中湯治之 一婦人
勞則足跟熱痛此足三陰血虛用聖愈湯而瘥後徧
身瘙癢誤服風藥發熱抽搐肝脉洪數此肝家血虛
火盛而生風以天竺黃膽星為丸用四物麥門五味
芩連炙甘草山梔柴胡煎送而愈 一婦素清苦勤
於女工因感風邪自[illegible]久而寒熱自汗

六汁形氣虛甚其脉或浮洪或微細其面或青白或
[illegible]黃此邪去而氣血愈虛也用十全大補湯三十餘
劑漸瘥又用加味逍遙散兼治半載而痊
人參荊芥散 大全良方　治婦人血風發熱身體疼痛頭
昏目澀心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿
精神不爽或月水不調臍腹㽲痛痃癖塊硬疼痛
發歇或時嘔逆飲食不進或因產將理失節淹延
瘦瘁乍起乍臥甚即着床
人參　荊芥穗　生乾地黃
北柴胡　鼈甲 醋炙　酸棗仁 炒

枳殼 麩炒　羚羊角 別鎊　白朮 各七錢半
桂心　甘草　防風
川芎　當歸 各半兩
右為麤末每服五錢水一盞半生薑五片煎至八
分去滓熱服無時
地骨皮散 大全良方　治婦人血風氣體虛弱寒熱發渴
地骨皮　桑白皮　枳殼
前胡　黃耆 各壹錢半　白茯苓
五加皮　白芍藥　人參 各壹錢
柴胡 貳錢　官桂　甘草 各半錢

右作壹服水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾不拘時服
地黃煎 大全良方　治婦人血風勞心忪發熱不退
生乾地黃　熟乾地黃
右等分為細末用生薑自然汁和水打糊為丸如
梧桐子大每服叁拾丸用地黃湯下或只茶酒醋
湯下亦可食後日三服覺臟腑虛冷早間先服八
味丸一服不可謂地黃性冷滯泥壞脾大概陰虛
則發熱蓋地黃大能補陰益陰血退熱也　薛云
前方肝脾血虛發熱內熱晡熱盜汗作渴體倦筋
骨疼痛肝脉拘急血虛發熱虛熱生痰咳嗽之良

劑若因肝脾腎精血燥熱生痰胸膈痞滿喘咳作
渴及　切虛火發必用六味丸為主
乞力伽散 大全良方　治血虛肌熱又治小兒脾虛蒸熱
羸瘦不能飲食
白朮　白芍藥　白茯苓 各壹兩
甘草 半兩
右為細末薑棗煎叁錢服
大効油煎散 大全良方　治血風勞氣攻疰四肢腰背疼
痛嘔逆醋心不[illegible]飲食日漸羸瘦面色萎黃手足
麻痺血海冷敗[illegible]

五加皮　川烏(炮)　芍藥

海桐皮　牡丹皮(各壹兩)　桂心

乾薑　川芎(各半兩)

右爲細末每服貳錢水壹盞生麻油淺錢壹文同煎至六分溫服常服以油浸貳錢煎藥時不可攪喫藥時不可吹

治血風勞方(大全良方)

牡丹皮　地骨皮　防風

甘草　黑豆　白芷

白芍藥(各壹兩)　荊芥穗(貳兩)　川芎(貳錢半)

右爲細末每服貳錢水壹盞中入生薑叁片棗壹箇葱白壹寸煎至八分溫服無時

馬鞭草散(大全良方)　治血風攻透肢體疼痛或覺瘙癢或覺痺麻作寒作熱飲食減味

馬鞭草(去梗)　荊芥穗　北柴胡

烏梅肉(各貳兩)　枳殼　白朮

羌活　白芍藥(各壹兩)　秦艽

天台烏藥　麻黃(各壹兩半)　木香(半兩)

當歸　川芎　甘草(各壹兩)

右爲細末每服貳錢水壹盞生薑叁片棗壹枚葱白貳寸煎至七分日午臨臥溫服常服無忌

勿服

琥珀散(聖惠)　治婦人血風勞氣臍腹疼痛經脈不調漸加羸瘦

琥珀(細研)　白朮　當歸

桃仁(去皮尖麩炒)　赤芍藥(各柒錢半)　柴胡(去苗)

鱉甲(塗醋炙)　延胡索　紅花子

牡丹皮　桂心(各半兩)

右爲散每服叁錢水壹盞中盞入生薑半分煎至六分去滓食前稍熱服

茯神散(聖惠)　治婦人血風勞氣頭目赤胸背氣壅四肢疼痛心煩驚悸少欲飲食

柴胡(去苗)　石膏(各貳兩)　茯神

羚羊角　防風(去蘆)　赤芍藥

人參(去蘆)　天門冬(去心)　獨活

郁李仁(去皮微炒)　生乾地黃　枳殼(麩炒去穰各壹兩)

甘草(炙半兩)　桃仁(湯浸去皮尖雙仁麩炒黃各壹兩半)

右爲散每服叁錢水壹盞中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服

逍遙散(和劑局方)　[illegible]五心煩躁心多怔忪

恍惚憂懼頭目昏重夜多盜汗
人參　白茯苓去皮　柴胡去苗
白朮炒　黃耆
右各等分爲散每服叄錢入甘草壹寸同煎至六分
溫服
熟乾地黃散神巧萬全方　治婦人血風勞冷氣攻心腹
疼痛四肢不和食減少日漸羸瘦
熟乾地黃　柴胡　黃耆
蒼朮　牛膝去苗各一兩　鱉甲醋炙黃去裙各一兩
白芍藥　當歸　蒲黃

琥珀　厚朴去皮薑汁塗炙　川芎
陳橘皮去白各一錢半　木香　桂心
羌活各半分
右爲散每服四錢以水壹中盞生薑半分煎至六分
熱服
琥珀丸博濟方　治血風虛勞上熱下冷或發動即心
中煩躁困乏無力不美飲食醋心口瘡月水不調
肌肉黃瘁腹痛腸鳴或有氣塊攻衝或時作寒熱
頭旋痰逆[illegible]大宜常服
琥珀[illegible]　木香

川芎　防風　檳榔各[illegible]
三稜炮　乾薑炮　桂心各[illegible]錢半
吳白朮洗　柴胡　人參各半兩
青皮　吳茱萸洗炮　全蝎炒
附子炮　草豆蔻　赤芍藥
柏葉　白芷　天麻各半錢
桃仁去皮尖麩炒　敗龜甲醋炙　鱉甲醋炙各半兩
右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每日空心酒下貳
拾丸午前近晚再服如覺壞近晚不須服[illegible]
腹內塊積攻衝[illegible]檳榔三稜各加一倍

爲妙忌生冷[illegible]物
澤蘭丸良方大全　治婦人血風勞氣四肢羸瘦疼痛經
脈不利飲食無味漸加虛困
鱉甲　紫菀　桂心
川芎　防風　川牛膝
當歸　秦艽　人參
桃仁　琥珀[illegible]　黃耆
赤芍藥　藁本[illegible]　水蛭製
鬼箭羽　白朮　羌活各半兩
熟地黃[illegible]錢

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大空心食前溫酒下
叁拾丸

牡丹丸（婦人良方） 治婦人血風勞氣氣塊攻心日漸黃
瘦經脉不行

牡丹皮　桃仁（湯浸去皮尖各一兩）　芍藥
當歸　芎藭　桂心
苦參　大黃（醋炒各壹兩）　貝母（半兩）

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服貳拾丸食前
溫酒下日二

柴胡丸（聖濟） 治婦人血風勞氣攻注目昏腹胸背拘急
四肢痠疼心躁煩熱氣滿腹脹腰膝無力經脉不
調

虛勞　女科　四十

柴胡（去苗）　黃連（去鬚）　知母（焙）
赤芍藥　龍膽　黃芩（去苗）
地骨皮　麥門冬（去心焙）　茯神（去木）
甘草（炙各半兩）　檳榔（半錢）

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服貳拾丸溫酒下
無時

客熱

大客熱者因體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自
生故云客熱其狀上焦胸膈之間虛熱口燥心煩手
足壯熱者是也　薛前證若客邪所使用補中益氣
加川芎防風　肝虛血少六味地黃丸　胃火飲冷
錢氏瀉黃散　胃虛飲冷七味白朮散　潮熱時熱
八珍湯　晡熱內熱逍遙散　發熱體倦補中益氣
湯　忿怒發熱小柴胡湯　鬱怒發熱加味歸脾湯
寅卯酉戌時熱升陽益胃、

大麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不
下

客熱　女科　四十九

麥門冬　赤茯苓　赤芍藥
柴胡（各壹兩）　桑白皮　生地黃
黃芩　羚羊角屑（各貳錢）　甘草（半錢）

右件一服水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾不拘時服

犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

犀角屑　赤芍藥　地骨皮
赤茯苓　紅花　人參
枳殼　麥門冬（各壹錢）　柴胡（貳分）
黃芩（貳錢）　甘草（半錢）

右作一服水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾不拘時服

黃耆飲　治婦人客熱心胸壅悶肢節煩疼不思飲食

黃耆　生地黃各貳錢　人參
茯神炒　犀角屑　瓜蔞仁
黃芩各壹錢　甘草半錢

右作一服水貳鍾淡竹葉五片煎至壹鍾不拘時服

丹砂散　治婦人客熱心肺煩躁口乾舌澀飲食無味

丹砂半兩細研　犀角屑　天竺黃
胡黃連各半兩　麥門冬去心焙貳兩　寒水石細研
馬牙硝細研各壹分　鉛霜半兩細研

右為細末入研了藥和勻每以竹葉湯調下壹錢無時

玉霜散　治婦人客熱煩渴頭痛痰涎如泉

石膏[illegible]　寒水石[illegible]

右和勻每以生地黃汁調下壹錢無時

生乾地黃丸　治婦人客熱四肢煩疼口舌生瘡心胸煩躁飲食無味

生乾地黃壹兩　羚羊角屑　白蘚皮
威靈仙各半兩　黃連去鬚　黃耆炙剉各
麥門冬去心焙壹兩半　玄參　犀角屑
地骨皮　甘草炙微赤剉各　川大黃壹兩

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每以溫水下叁拾丸無時

敗毒散　治婦人客熱四肢煩悶疼痛不思飲食甚者可加地骨皮黃芩方見雜病傷寒

寒熱

大經曰陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒又曰
由勞傷氣血陰陽不調寒熱如瘧也當分氣血虛實
而治之 ○若前症若寸口脉微名曰陽不足則陰氣
上入於陽中用補中益氣湯若尺部脉弱名曰陰不
足則陽氣下陷入陰中用益陰腎氣丸若因氣血俱
虛用八珍湯若因怒動肝火用小柴胡湯若陰陽俱
不足則氣血不歸其本部以致寒熱交爭也一婦人
年六十有四久鬱怒頭痛寒熱春間乳內時痛服流
氣飲之類益甚時有血如經行又大驚恐飲食不進

夜寐不寧兩乳腫脹兩脇焮痛午後色赤余以為肝
脾鬱怒火燥先以逍遙散加酒炒黑龍膽一錢山梔
一錢五分服二劑脇痛頓愈又二劑全愈再用歸脾
湯加炒梔貝母諸症悉愈

大地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱或晡熱內熱

柴胡 地骨皮各一兩 桑白皮炒
枳殼麩炒 前胡 黃耆炒各七錢五分
白茯苓 五加皮 人參
甘草 桂心 白芍藥各半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七
分溫服

生地黃散 治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思
飲食

生乾地黃 北柴胡各一兩 羌活
木香 桂心 防風各半兩
酸棗仁炒 羚羊角屑 白芍藥
白朮 黃耆 川牛膝
白茯苓 甘草 枳殼各七錢五分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去
滓空心溫服

異功散 治婦人血氣虛冷時發刺痛頭目昏悶四
肢無力寒熱往來狀似勞倦並宜服之

烏藥 川芎 苦梗
玄胡索 當歸 陳皮各一錢半
官桂 牡丹皮 芍藥
白芷 乾薑各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾入酒半
盞再煎一二沸不拘時
右三方內有相火寒多者宜之第三方無滯氣污
血尤不宜服

七寶湯　治寒熱往來

防風去蘆　知母　生地黄各半兩

柴胡去蘆　秦艽　甘草炙

前胡去蘆各貳錢半

右㕮咀每服五錢水一盞半加人參三寸煎至七分熱服

柴胡散　治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡　赤茯苓　黄耆

白朮各壹兩　麥門冬參錢　鼈甲醋炙貳錢

人參　地骨皮　枳殼麩炒

生地黄　桑白皮　赤芍藥

桔梗　甘草各肆錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

桃仁丸　治婦人頭目昏重心神煩悶或時寒熱肢節疼痛不欲飲食

桃仁湯浸去皮尖麩炒微黄　芎藭

白朮　柴胡去蘆　人參去蘆

生地黄　酸棗仁微炒各　赤茯苓

訶黎勒皮　枳殼麩炒微黄去穰　赤芍藥各半兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每以生薑荊芥薄荷湯下三十丸

青蒿散　治男子婦人肢體倦疼虛勞寒熱用青蒿八九月間將成實時採去枝梗以童子小便浸三日曬乾為末每服貳錢烏梅一箇煎至七分服

右三方熱多者宜之

論寡婦寒熱　宋褚澄治療師尼寡婦別製方者蓋有謂也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類温瘧久則為勞嘗讀史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背痛寒熱衆醫皆以為寒熱病治之不瘥倉公曰此病得之欲男子不可得也衆曰何以知欲男子不可得倉公曰診其脈肝脈弦出寸口是以知之蓋男子以精為主婦人以血為主男子精盛以思室婦人血盛以懷胎夫肝攝血者也厥陰肝脈弦出寸口上魚際則陰盛可知故知褚氏之言信有謂矣

又師尼寡婦與室女出嫁愆期者多欲心萌而不遂慨然成病乍寒乍熱久則為勞經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶瘦瘠等證皆寡婦之病也

薛按若肝脈弦出魚際用小柴胡加生地黃送下
六味地黃丸久而血虛佐以四物湯　若兼怒動肝火
而寒熱者佐以加味逍遙散　若兼脾損肝經而寒
熱者佐以八珍湯　若兼腎損元氣而寒熱者佐以
補中益氣湯　若兼鬱傷脾氣而寒熱者佐以濟生
歸脾湯　婦人因夫經商久不歸發寒熱月經旬
日方止服降火涼血藥反潮熱內熱自汗盜汗月經
頻數余曰熱汗氣血虛也經頻肝脾虛也用歸脾湯
六味丸而愈若治寒熱用逍遙散愈而寒熱不衰當仍用本
證藥　一婦人年三十有七早婦居兩腿骨作痛晡

熱體倦月經不調或發寒熱數年矣一日頸項兩側
結核兩脇脹痛此係肝經鬱火而成也先用小柴胡
湯合四物數劑肝症頓愈又用加味逍遙散加澤蘭
乳香没藥三十餘劑血症漸痊再用加味歸脾湯年餘
而安　一婦人兩腿作痛或用除濕化痰等藥遍身
作痛而無定處此血症也不信仍服流氣飲之類而
殁　一放出宮人年四十餘臂腿內股作痛潮熱口
乾月經不調此係肝經血少不能養經絡而然也宜
加味逍遙散加澤蘭葉五十帖諸症稍緩又以歸脾
湯二百餘劑而痊　一放出宮人臂腿腫痛內熱晡

熱惡寒體倦咳嗽胸痞月經過期而少彼以爲氣毒
流注服消熱理氣之劑益甚此肝經瘀血停留所致
蓋肝經上貫膈布脇肋循喉嚨下循腹內聯絡陰器
抵少腹主治之法但當補其所不勝而制其所勝補
者脾也制者肝也經曰虛則補之實則瀉之此定法
也彼不信仍服前藥遂致不起

本生地黃丸　許學士治一尼患惡風體倦乍寒乍
熱面赤心悸或時自汗是時疫氣大行醫見其寒
熱作傷寒治之用大小柴胡湯雜進數日病急召
予診之三部無寒邪脈但厥陰弦長而上魚際宜

服抑陰等藥故製此方
生地黃二兩　柴胡　秦艽
黃芩各五錢　芍藥一兩
右爲細末煉蜜丸如梧子大每服叁拾丸用烏梅
湯吞下日三服不拘時

惡寒

夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脉必浮數發於陰者宜溫裏脉必沉細又有汗後利後惡寒及背惡寒已上疾證方治並載百問不復繁引僕嘗治一婦人但惡寒別無他證六脉平靜遂用敗毒散而安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脉道沉伏愈令病人寒不可過但去被撤火兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結

聚針藥所不能治矣　薛前證若怠惰嗜臥洒淅惡寒乃陽不能伸發用升陽益胃湯若勞傷形氣而惡寒乃無陽以護衛用補中益氣湯若飲食傷胃而惡寒乃元氣虛損用六君子湯若加煩躁或欲飲水仍進前劑但加薑桂若體倦煩渴頭痛自汗用補中益氣湯加五味麥門東垣云晝則發熱惡寒是陰氣上溢於陽分也夜則惡寒是陰血自旺於陰分也瀕湖云六月大熱之氣反得大寒之證當捨時從證治以薑桂之類丹溪云久病惡寒乃痰鬱於阻抑遏陽氣不得外泄治當解鬱

中風

[illegible]應云婦人中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口眼喎斜風眩頭痛血風心神驚悸癲狂骨節風血風走注瘙痒癮疹風痰諸證雖各有方論亦要先明其大體察脉之虛實辨證之冷熱相人強弱入臟入腑在絡在經首以方調治未要猛速用藥今之治法先宜順氣然後治風萬不失一蓋有中風中寒中暑中痰中氣皆能令人涎潮昏塞所謂朱紫相凌玉石不分醫者不可不詳而究之如中風若作中氣治之十愈八九中氣若作中風治之十無一生所以疑

似之間不問中風中氣首以蘇合香丸五積散加薑煎如中暑則有參蘇飲如中寒則有理中湯如中暍則有白虎湯如的然是中風有三生飲木香煮散排風續命風引大小竹瀝大八風湯辨其冷熱虛實而投之未有不安者也然此疾積襲之久非一日所能致令人服藥三五服便責無效其責醫者亦速矣正宜大劑久服方有其效孟子曰七年之病求三年之艾也　大全夫中風者虛風中於人也風是四時八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者名為虛賊風

害萬物人體虛者則中之當時雖不卽發停在肌膚後或重傷於風前後重沓因體虛則發入臟腑俞俞皆在背中風多從俞入隨所中之俞而乃發病婦人血氣虛損故令中風也當察口眼開闔以別重輕涎沫有無以明證治如眼開口閉手足不開涎不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿不覺者死

按卒仆暴厥之證不論男子婦人是風是寒是氣是食是痰是濕但要分得閉與脫二證明白如牙關緊閉兩手握固卽是閉證宜蘇合香丸三生飲之類開之若口開手撒卽是脫證宜用大劑黃芪人參煎濃湯

灌之雖曰在法不治亦十救五六若誤服蘇合香丸之類卽不可救矣蓋斬關奪門之藥原爲閉證設若施之脫證是人既入井而又下之石也

薛中風者卽內經所謂偏枯風痱風懿風痺是也而有中腑中臟中血脈之分焉夫中腑者爲在表中臟者爲在裏中血脈者爲在中在表者宜微汗在裏者宜微下在中者宜調榮中腑者多著四肢如手足拘急不仁惡風寒此數者病淺皆易治用加減續命湯之類中臟者多滯九竅如眼瞀者中于肝舌不能言者中于心脣緩便祕者中于脾鼻塞者中于肺耳聾者中于腎此數者病深多難治中血脈者外無六經之證內無便溺之阻肢不能舉口不能言用大秦艽湯主之中腑者多兼中臟如左關脈浮弦面目青左脇偏痛筋脈拘急目瞤頭目眩手足不收坐踞不得此中膽兼中肝也用犀角散之類如左寸脈浮洪面舌赤汗多惡風心神顛倒言語謇澁舌強口乾忪悸恍惚此中小腸兼中心也用麻黃散之類如右關脈浮緩或浮大面唇黃汗多惡風口喎語澁身重怠惰嗜臥肌膚不仁皮肉瞤動腹膨不食此中胃兼中脾也用防風散之類如右寸脈浮濇而短面色白鼻流

清涕多喘胸中冒悶短氣自汗聲嘶四肢痿弱此中大腸兼中肺也用五味子湯之類如左尺脈浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不能俛仰兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀胱兼中腎也用獨活散之類此皆言其中風也而有氣血之分焉蓋氣虛而中者由元氣虛而賊風襲之則右手足不仁用六君子湯加鈎藤薑汁竹瀝血虛而中者由陰血虛而賊風襲之則左手足不仁用四物湯加鈎藤竹瀝薑汁氣血俱虛而中者則左右手足皆不仁也用八珍湯加鈎藤薑汁竹瀝其與中風相類者則有中寒中濕中火中

氣食厥勞傷房勞等證如中於寒者謂冬月卒中寒
氣昏冒口噤肢攣惡寒脉浮緊用麻黃桂枝理中湯
之類中於暑者謂夏月卒冒炎暑昏冒痿厥吐瀉喘
滿用十味香薷飲之類中於濕者丹溪所謂東南之
人多因濕土生痰痰生熱熱生風也用清燥湯之類
加竹瀝薑汁中於火者河間所謂非肝木之風內中
六淫之邪外侵良由五志過極火盛水衰熱氣怫鬱
昏冒而卒仆也用六味丸四君子獨參湯之類內有
恚怒傷肝火動上炎者用柴胡湯之類中於氣者由
七情過極氣厥昏冒或牙關緊急用蘇合香丸之類

誤作風治者死食厥者過於飲食胃氣自傷不能運
化故昏冒也用六君子加木香勞傷者過於勞役耗
損元氣脾胃虛衰不任風寒故昏冒也用補中益氣
湯房勞者因腎虛精耗氣不歸源故昏冒也用六味
丸此皆類中風者也夫內經主於風河間主於火東
垣主於氣丹溪主於濕愚之斯論僭補前人之闕也
若夫地之南北人之虛實固有不同其男子女人大
略相似當與後論參看通變治之（錄內方在前婦人中風）　靳閣
老夫人先胸膈脹痛後四肢不收自汗如水小便自
遺大便不實口緊目瞤飲食頗進十餘日矣或以為

中臟公甚憂余曰非也若風既中臟真氣既脫惡證
已見禍在反掌焉能延之乃候其色面目俱赤而時
或青診其脉左三部洪數惟肝尤甚余曰胸乳脹痛
肝經血虛肝氣痞塞也四肢不收肝經血虛不能養
筋也自汗不止肝經風熱津液妄泄也小便自遺肝
經熱甚陰挺失職也大便不實肝木熾盛剋脾土也
遂用犀角散四劑諸證頓愈又用加味逍遙散調理
而安後因鬱怒前證復作兼發熱嘔吐飲食少思月
經不止此木盛剋土而脾不能攝血也用加味歸脾
湯為主佐以加味逍遙散調補肝脾之氣清和肝脾

之血而愈後每遇怒或睡中手足搐搦復用前藥即
愈
　大參朱雲溪母於九月內忽仆地痰昧不省人
事唇口喎斜左目緊小或用痰血之劑其勢稍緩至
次年四月初其病復作仍進前藥勢亦漸緩至六月
終病乃大作小便自遺或謂風中於臟以為不治余
診之左關弦洪而數此屬肝火血燥也遂用六味丸
加五味子麥門芎歸一劑而飲食頓進小便頓調隨
用補中益氣加茯苓山梔鉤藤丹皮而安至十月復
以傷食腹痛作瀉左目仍小[illegible]洪弦指余
以六君加木香吳茱升麻柴胡一劑而[illegible]緩復

以六君加肉果故紙一劑諸脉頓平痛瀉俱止余謂左關弦洪由肝火血燥故左目緊小右關弦洪由肝邪乘脾故唇口喎邪腹痛作瀉二尺鼓指由元氣下陷設以目緊口喎誤作風中投以風藥以腹痛泄瀉誤作積滯投以峻劑復耗元氣爲害甚矣後以暘虐惡寒閒火過熱致痰喘誤服寒劑而卒　一婦人因怒仆地語言謇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿六脉洪大肝脉尤甚皆由肝火熾盛蓋肝主小便因熱甚而自遺也用加味逍遙散加鈎藤及六味丸尋愈

一老婦兩臂不遂語言謇澁服祛風之藥及致筋

攣骨痛余謂此肝火血虛所致用八珍湯補氣血用地黄丸補腎水佐以排風湯年餘而愈　一婦人經行口眼歪斜痰涎壅盛此血虚而肝火動用加味逍遥散加丹皮治之尋愈後因飲食停滯日吐痰涎此脾氣虚不能攝涎歸經也用六君子二十餘劑而安

一婦人因怒口眼喎斜痰涎上涌口噤發搐此脾肺氣虚而肝木旺用六君子加木香鈎藤柴胡治之漸愈又用加味歸脾湯調理而安　一產婦勞於女工忽仆地牙關緊急痰喘氣粗四肢不遂此氣血虛而發痙朝用補中益氣加茯苓半夏夕用八珍加半夏各二十餘劑不應此氣血之未復藥之未及也仍用前二湯又五十餘劑尋愈　一婦人素性急患肝風之證常服搜風順[illegible]頭後因大怒吐血餘日牽緊小便頻數[illegible]亦以為肝火旺而血妄行遂用小柴胡湯加[illegible]梔丹皮漸愈五年之後又大怒吐血誤服[illegible]祛風化痰之劑大便頻數胸滿少食用清氣化痰之劑嘔而不食頭暈口乾不時吐痰用導痰降火之類痰出如涌四肢常冷余曰嘔而不食胃氣虛弱也頭暈口乾中氣不能上升也痰出如涌脾氣不能攝涎也四肢逆冷脾氣不能運

行也用補中益氣加茯苓半夏治之諸證漸愈又用加味歸脾湯兼服而安　陳癸丑春有一婦人年四十一二其證語言氣短足弱行得數步則口若含霜七十日內三次經行則口冷頭目眩暈足冷則透心冷痛每行則口中冷氣不相續有時身中熱而亦翕然而熱身體不仁不能行步手足不隨不能俛仰冷痺骨疼有時悲傷夢與前夫相隨則上氣奄然而極心驚志意不定恍惚多忘却能食如此僅一年許醫者投熱藥則面翕然而熱氣滿胸中咽中塞悶絕投冷藥則瀉又一醫者以十全湯服之則發[illegible]心

驚[illegible]跳一劑以雙和湯服之覺面上與腹中如火熚心愈驚欲吐不吐大便秘裏急後重求僕診之六脉弦緩喜見於春此是可治之疾未供藥間忽然吐瀉瀉後覺肛門如火雖瀉却不多僕且與俞山人降氣湯入服次日診之脉差有力云服藥後覺鼻熱心煩悶齒噤與參蘇飲入服黃連圓壹兩越三日云服藥後如故與茯苓補心湯服皆無効僕以脉證詳之只是排風湯甚對或曰何以知之一能食飲此風飢也二七十日三次經行此是榮經有風血得風散也三頭目眩此肝風也四面赤翕然而熱悲傷此心風

也五身體不仁不能行步夢與前夫相隨此脾風也六手足不隨腰痛難俛仰冷痺骨疼此腎風也因令人心驚恍忽多忘其排風湯證也或曰風脉當浮今脉弦緩微弱恐非風也予曰風無一定之脉大抵此證虛腎生風然排風湯藥品有十全大補湯料亦有十補之資却不僭燥供十服越三日云服有効脉亦差勝只是腹中如烟生微熱[illegible]其是風證再與排風湯服加[illegible]黃清心丸[illegible]之越三日云服前藥大煩躁發熱[illegible]不能支時與秘傳降氣湯[illegible]裏虛驚大便

滑泄頻數脉尚弱與五積散加人參鹽煎[illegible]尤仰愈但頭眩痛重不能久立久坐再與排風湯嘆然而安矣　繆安人年六十忽中風不省人事無汗有痰呆醫爲不可治召僕診之脉浮緩脾脉溢關此真風脉先以參蘇飲六服寬氣下痰次以木香煮散而愈　馬觀文夫人於七月間病氣弱倦怠四肢厥逆惡寒有汗少飲食一醫作伏暑一醫謂虛寒治皆無効召僕診之六脉雖弱而兩關右甚馬問是何證僕曰六脉雖弱而關獨甚此中焦寒也中焦脾也脾胃既寒不但有此證必有腹痛吐瀉今四肢厥冷脾屬

四肢是脾胃虛冷無疑焉曰未見腹痛吐瀉之證合用何治僕曰宜附子理中湯未服藥間旋即腹痛而瀉莫不神之即投此藥而瘥

防風散　治婦人中風言語蹇澁四肢拘急身體壯熱頭疼目眩心胸不利

防風去蘆壹兩　石膏貳兩半　麻黃去節
漢防己去皮[illegible]　細辛去苗　黃芩
川升麻　當歸　桂心
芎藭　赤茯苓　甘草炙
羌活去蘆各半兩

右為麤散每服八錢水一中盞半煎至一大盞去
滓入淡竹瀝一合更煎一兩沸溫服不拘時

芎藭散 治婦人卒中風四肢不仁善笑不息

芎藭壹兩半 石膏貳兩半 當歸炒去蘆
麻黃去節 秦艽去蘆 乾薑炮
桂心各壹兩 杏仁貳拾枚麩炒 黃芩壹兩

右為麤末每服八錢水一中盞半煎至一大盞去
滓溫服不拘時候日進二三服

附子散 治婦人中風筋脈拘急四肢疼痛言語蹇
澁心胸不利

附子炮去皮臍 細辛各柒錢半 當歸去蘆炒
芎藭 前胡去蘆 枳殼麩炒去瓤
黃芩 白鮮皮 茯神去木
羌活去蘆 杏仁麩炒 漢防己去皮
甘草炙 麻黃去節 桂心各半兩

右為麤末每服五錢水一中盞半生薑五片煎至
一大盞去滓不拘時溫服

羌活散 治婦人中風筋脈拘急肢節疫疼言語蹇
澁項目不利

羌活去蘆 天麻各壹兩 芎藭

酸棗仁各柒錢半微炒 蔓荊子 白附子炮
柏子仁 牛膝酒浸 桂心
薏苡仁 當歸炒去蘆 羚羊角屑
烏蛇肉酒浸炒令黃 蟬殼各半兩 麝香一分研入

右為細末入研麝香令勻每服一錢豆淋酒調下無時

南星散 治婦人中風牙關緊急四肢強直心胸痰
涎閉塞不利

天南星炮製 雄黃 半夏湯洗七次薑製
赤箭各半兩 川烏頭炮去皮臍 桂心
蝎梢半生半炒各壹錢 麝香一分

右為細末入研麝香令勻每服一錢豆淋酒調下日進

三服不拘時候

木香煮散 治左癱右瘓并素有風濕諸藥不效常
服調氣進食寬中

羌活 麻黃去節各 防風去蘆
白朮 陳皮 黑附子炮
南木香 檳榔 牛膝
大川烏炮 草豆蔻連皮煨 杏仁去皮麩炒
人參 白茯苓 川芎
當歸 甘草 桂心各半兩

右㕮咀每服四錢水一大盞半生薑五片煎至八分去滓熱服大便不通加大黄心腹脹加苦葶藶滑石膈上壅滯咳嗽氣促加半夏川升麻天門冬知母

右古方專主婦人中風[illegible]其中外邪不宜輕用[illegible]證治方藥詳見雜病本門男婦初無二治也

角弓反張 大夫婦人角弓反張者足體虛受風風入諸陽之經人之陰陽經絡周環於身風乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀宜服小續命湯(中風 八下科二 六二六)薛仲景先生云太陽病發汗太多致痓風病下之則痓三因方云氣血內虛風寒濕熱所中則痓以風能散氣故有汗而不惡寒曰柔痓寒能澀血故無汗而惡寒曰剛痓非專於風濕因內虛發汗亡血筋無所榮而然乃虛象也竊謂傷寒汗下過度與產婦潰瘍等病及因尅伐之劑傷損氣血而變若金衰木旺先用瀉青丸[illegible]後用異功散[illegible]腎水虛用六味丸[illegible]肝火旺先用加味小柴胡湯[illegible]次用加味四物湯發熱用加味逍遙散若木侮脾土用補中益氣湯[illegible]加芍藥山梔脾經鬱結用加味歸脾湯(雜病健忘)脾土濕熱用大承氣湯(傷寒胃實)大凡病後氣血虛弱用參朮濃煎佐以薑汁竹瀝時時用之如不應用十全大補湯(雜病虛勞)更不應加附子或用參附湯緩則不救(人參一兩附子[illegible])

白僵蠶散 治婦人中風角弓反張口噤不能言皮膚頑麻筋脉抽掣

白殭蠶(炒) 麝香(一錢半另研) 烏蛇肉(酒浸炒令黃)
蟬殼(炒) 桑螵蛸(炒) 犀角屑
天麻 獨活(去蘆) 天南星(炮)
川烏頭(炮去皮臍) 白附子(炮) 硃砂(另研水飛)
防風(去蘆各半兩)

(中風 八下科二 六七)

右為細末入研藥令勻每服二錢溫酒調下不拘時日三服

羚羊角散 治婦人中風角弓反張筋脉拘急言語蹇澀心神煩悶

羚羊角(屑) 鹿角膠(搗碎炒令黃燥) 赤箭
酸棗仁(炒) 薏苡仁(各一兩) 白附子(炮)
芎藭 當歸(炒去蘆) 人參(去蘆各七錢半)
羌活(去蘆) 白鮮皮 地骨皮
柏子仁 蔓荆子 犀角屑(各半兩)

牛黄另研　麝香各一錢半另研

右為細末入研藥令勻每服一錢煎薄荷湯調下日進三服無時

紫湯　治婦人中風腰脊反張如弓之狀

雞糞白一升炒黄　大豆一升炒熟　防風一兩去蘆

右為麄末每服五錢酒水各一中盞煎至六分去滓溫服不拘時候

烏蛇丸　治婦人中風角弓反張或身體強直牙關緊急

烏蛇肉酒浸去皮　犀角屑　白附子炮

天麻各去蘆　半夏湯洗七遍薑製　天南星炮

麻黄去節　桂心　獨活去蘆

白僵蠶炒　晚蠶沙炒　乾蝎微炒各半兩

麝香一錢半另細研

右為細末入研麝令勻煉蜜和搗二三百下丸如梧桐子大每服三十丸豆淋酒送下日二服無時

餘並詳雜病癃門

愚案夫婦人中風口噤者是體虛受風風入頷頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頷頰足陽明之筋上夾於口而風挾冷乘虛入其經則筋攣故引牙關急而口噤也　薛前證若風邪客於手足陽明經口眼喎斜用秦艽升麻湯(方見中風)若風熱傷氣用省風湯(方見中風)當與後方同用　一婦人因怒經事淋瀝半月方竭遇怒其經即至甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰痙搐搦瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡湯加熟地山梔鈞藤治之後不復發　一婦人素陰虛患遍身瘙癢誤服祛風之藥口噤抽搐肝脈洪數余曰肝血為陰為水肝氣為陽為火此乃肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝火用四物湯加五味子柴胡山梔生甘草熟搐頓止又以八珍湯加麥門五味鈞藤炙草調理而痊

天南星散　治婦人中風口噤四肢拘急或痰氣上壅

天南星炮　白附子炮　黑附子炮

烏蛇肉酒浸炙　全蝎炒等分

右為細末每服半錢以生薑汁溫酒調不拘時拗開口灌之

走馬散　治婦人中風口噤四肢強直

附子炮去皮臍　天麻各半兩　桂心

石膏細研如粉　麻黄去節　川烏頭炮去皮臍

天南星炮　蝎梢炒　麝香另研

右為細末入麝香研令勻每服二錢豆淋酒調下不拘時斡開口灌之

烏蛇散 治婦人中風口噤

烏蛇肉（酒浸） 乾蝎（炒） 白殭蠶（炒）

天南星（炮） 天麻（各半兩） 膩粉（另研半錢）

右為細末入膩粉研勻每服二錢生薑酒調下斡開口灌之

白朮酒 治婦人中風口噤言語不得

白朮（兩） 黑豆（各炒熟 兩）

右以酒四升煎至二升去滓分四服斡開口灌之

又方 治婦人中風口噤舌本縮語言難

[illegible] 細研以醋二升煎至一升塗頰頷下效

按巢氏論曰脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉系舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也

喉嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故謂之中風失音不語[illegible]若醉臥當風使人發瘖不能言也（愚按[illegible]心經當）清心火若因濕痰舌強當清脾熱若因[illegible]牙關緊急當清肝火若因風痰當導痰涎若因虛火上炎當壯水之主若因氣虛厥逆當益火之源若因腎虛舌瘖而不語當補腎氣 一婦人因怒仆地痰湧不語灌牛黃清心丸稍甦用神仙解語湯加山梔柴胡桔梗漸愈又用六君子加柴胡山梔枳殼而痊 一婦人忽然不語半年矣諸藥不應兩尺浮數先用六味丸料加肉桂數劑稍愈乃以地黃飲子二十餘劑而痊男子多有此證亦以此藥治之（方論並見中風）

神仙解語丹 治心脾經受風言語謇澁舌強不轉涎唾溢盛及療淫邪搏陰神內鬱塞心脉閉滯暴不能言

白附子（炮） 石菖蒲（去毛） 遠志（去心甘草水煮十沸）

天麻 全蝎（去毒） 羌活

白殭蠶（炒） 南星（牛膽釀[illegible]） 木香（半兩）

右為細末煮麪糊丸如梧桐子大量入辰砂為衣每服二十丸至三十丸生薄荷湯吞下無時

防風湯 治中風內虛脚弱語謇

石斛（一兩半） 乾地黃 杜仲（去皮切 薑汁炒）

丹參（各一兩） 防風 [illegible]

麥門冬（去心） 桂心 川獨活（各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半棗二枚煎至八分去

滓溫服

竹瀝湯　治中風入肝脾經年四肢不遂舌強語蹇

威靈仙　附子炮　桔梗

蔓荊子　防風　枳殼去穰麩炒 一

川芎　當歸各等分

右㕮咀每服肆錢水壹盞竹瀝半盞薑五片煎至捌分溫服一日四服忌茶

地黃飲子等方詳雜病本門

風痺麻木之症　夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而爲痺風多者爲風痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起

女科二　七十二

於手足而循行於身體風寒之氣客於肌膚始爲痺復傷陽經隨其虛處而停滯與血氣相搏血氣行則遲緩故風痺而復手足不隨也　靈樞經云邪之所湊其氣必虛前證若風邪淫旺或怒動肝火血燥筋攣用加味逍遙散脾肺氣虛肌膚不仁手足麻木用三痺湯若腎水虧損不能滋養筋骨或肝脾血虛而筋痿痺用六味丸服燥藥而筋攣者用四物生甘草氣血俱虛用八珍湯何醫林集要等方新刊丹溪心法附錄云若人大拇指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣三年內必有大風之證宜先服八風湯天麻丸防風通聖散以預防之殊不知河間云風者病之末也所以中風有攤瘓者非謂肝木之風內中亦非六淫風邪外襲良由五志過極心火熾盛腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏憒筋骨無用而卒倒無知也治當以固元氣爲主若遽服八風等藥則反傷元氣適足以招風取中　一婦人因怒吐痰胸滿服二陳順氣化痰之劑半身不遂內熱口乾形氣殊倦余視之乃肝木熾盛而侮脾土也用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸喜其慎疾年餘而愈

一孀婦胸脇脹痛內熱晡熱月經不調肢體痠麻

女科二　七十三

不時吐痰或用清氣化痰藥喉間不利白帶腹脹又用清熱理氣藥胸膈不寬肢體時麻余曰此本鬱怒傷肝脾前藥傷甚耳朝用歸脾湯以解鬱結生脾氣夕用加味逍遙散以生肝血清肝火百餘劑而愈後因怒肢體復麻用補中益氣加山梔茯苓半夏而痊後復怒病再作月經如注脈浮洪而數此肝火傷脾不能攝血所致也用六君芎歸炮薑一劑而血止用補中益氣加炮薑茯苓半夏四劑而胃醒更用歸脾湯逍遙散調理而痊　一婦人頭暈吐痰用化痰理氣藥肢體或麻服祛風化痰藥肢體常麻手足或冷

或熱此脾土虚而不能生肺金用補中益氣加茯苓半夏炮薑二十餘劑脾氣漸復諸證稍愈更用加味逍遙散三十餘劑而愈後因怒吐痰自服清氣化痰丸飲食不進吐痰甚多胸脇脹滿余用六君子倍加參朮少加木香數劑而康

三痺湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾

川續斷 杜仲(去皮薑汁炒去絲) 防風(去蘆)
桂心 華陰細辛 人參(去蘆)
白茯苓(去皮) 當歸(去蘆) 白芍藥
甘草(各壹兩) 秦艽(去蘆) 生地黄
川芎 川獨活(各半兩) 黄芪(去蘆)
川牛膝(酒浸各壹兩)

右㕮咀或為末每服捌錢水貳盞生薑伍片棗壹枚煎至壹盞去滓熱服無時候但腹稍空服有人病左臂不隨後已痊乎而手指不便無力試諸藥不效服此藥一料而愈

獨活湯 治婦人風痺手足不隨身體疼痛言語謇澁筋脉拘急並宜服之

獨活(去蘆) 桑寄生 牛膝(酒浸)
秦艽(去蘆) 赤茯苓(各壹兩) 桂心

防風(去蘆) 附子(炮去皮臍) 當歸(去蘆炒)
生乾地黄(各壹兩) 杜仲(去絲炒) 細辛(去苗)
芎藭 赤芍藥(各柒錢半) 甘草(炙半兩)

右為㕮咀每服捌錢水壹中盞半煎至壹大盞去滓溫服無時

烏蛇散 治婦人風痺手足頑麻筋脉搐搦口眼不正言語蹇澁

烏蛇肉(酒拌炒) 土蜂兒(炒) 天南星(炮)
天雄(炮去皮臍) 赤箭 麻黄(去節)
薏苡仁 芎藭(各半兩) 羚羊角屑
乾蝎(微炒) 桑螵蛸(微炒) 桂心
朱砂(細研水飛各半兩) 當歸(去蘆炒) 酸棗仁(炒)
柏子仁(各壹錢半)

右為細末入硃砂藥研勻每服壹錢食前溫酒調下

東垣羌活湯 治濕熱身重或腰痛麻木小便赤澁下焦痿軟不能行履

羌活 防風 柴胡(各壹錢)
藁本 獨活 茯苓
澤瀉 豬苓 黄芪(炒)
甘草(炙) 陳皮 黄蘗(酒炒)

黃連　芩朮　升麻

川芎各分　右水煎服

甘草附子湯　治風濕相搏骨節煩疼不時抽痛不能俯仰抑之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或微腫痛

甘草炙，各二兩　附子一枚，炮去皮　白朮炒，各三兩　桂枝四兩

右每服伍錢水煎

八珍湯　治肝脾氣血俱虛不能養筋以致筋攣骨痛或不能行履或發熱晡熱寒熱往來等證

加味逍遙散　治肝經風熱血燥筋攣肢體不遂內熱晡熱等證　八珍方見雜病虛勞，本方見本科調經

[illegible]藥隱老人云昔古治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用麻黃令人不得慮虛凡以風邪不得汗則不能泄也然此治中風無汗者爲宜若治自汗者更用麻黃則津液轉使脫泄反爲大害中風自汗仲景雖處以桂枝湯至於不住發搐口眼瞤動遍身汗出者豈勝對治當此之時獨活湯續命煮散復榮衛却風邪不可闕也　[illegible]若腠理不固而自汗者用桂枝湯防風白朮牡蠣湯若過服風藥而自汗者用白朮防風湯若服發汗藥氣虛發而自汗者用芪附湯若非發汗用補中益氣湯送六味丸如不應用當歸六黃湯

獨活湯　治風虛昏憒不自知覺手足瘛瘲坐卧不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

川獨活　羌活　人參

防風　當歸　細辛去苗

茯神去木　半夏湯泡七次　桂心

白薇　遠志去心　菖蒲

川芎各五錢　甘草炙，各

右㕮咀每服捌錢水一盞半薑伍片煎柒分去滓溫服不拘時候

續命煮散　治風氣留滯心中昏憒四肢無力口眼瞤動或時搐搦亡失津液渴欲引飲此能扶榮衛去虛風中風自汗及産後中風自汗尤宜服之

防風　獨活　當歸

人參　細辛　葛根

芍藥　川芎　甘草

熟地黃　半夏　遠志去心

荊芥穗各半兩　桂心去粗皮

右㕮咀每服伍錢水壹盞半薑叁大片煎至柒分去滓溫服不拘時汗多不止者加牡蠣粉壹分半

衍義防風白朮牡蠣散　治中風自汗不止

白朮　牡蠣煅　防風各等分

為末酒調下米飲亦可日二服汗即止如不止可服黃芪建中湯

偏枯　樂隱老人云偏枯者其狀半身不隨肌肉枯瘦骨間疼痛神智如常名曰偏枯也原其疾之由皆因陰陽偏虧臟腑怯弱經絡空虛血氣不足當風

衝坐風邪乘虛而入內經云汗出偏沮使人偏枯詳其義乎如樹木或有一邊津液不蔭注而先枯槁然後被斧斤所害人之身體或有一邊血氣不能榮養而亦偏枯然後被風所苦其理顯然王子亨云舟行於水人處於風木能泛舟而亦能覆舟風能養體而亦能害體蓋謂船漏水入體漏風傷古人有云醫風先醫血血行風自滅是也治之先宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風湯增損茵芋酒續斷湯　天賊風偏枯者是體偏虛受風風客於半身也人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半體名為偏風也

其風邪入深真氣去邪氣留發為偏枯此[illegible]損為風所客令血氣不相周榮於肌故令偏枯也[illegible]風先醫血此論得之大抵此證多因胎前產後失於調養以致精血乾涸肝木枯槁治法當滋其化源者之作氣通天論曰風客淫氣精乃亡邪傷肝也陰陽應象大論曰風氣通於肝風搏則熱盛熱盛則水乾水乾則氣不榮故精乃亡此風病之所由作也

一婦人性善怒常自汗月經先期余以為肝火血燥不信乃泥用降火之劑反致月經過期復因勞怒口噤呻吟肢體不遂六脈洪大而目赤色用八珍參

門冬五味子山梔丹皮數劑漸愈兼用逍遙散六味丸各三十餘劑全愈

大八風湯　治中風偏枯失音半身不隨時復恍惚

當歸去蘆　杏仁麩炒　甘草炙

桂心　乾薑炮各貳兩　五味子

升麻各半兩　川烏頭炮去皮臍　黃芩

芍藥　獨活　防風各去蘆

川芎　麻黃去節　[illegible]

人參去蘆　石斛酒浸洗少　[illegible]

石膏　黃[illegible]　[illegible]

大豆壹兩去皮炒
右為㕮咀每服伍錢水貳盞酒壹合煎至壹盞去
滓溫服恍惚者不用酒煎　一方無茯神有遠志
赤茯苓
[illegible]肉[illegible]酒　治手足不遂肌肉乾燥漸漸細瘦或
時有痛痺名偏枯
肉蓯蓉　川烏頭[illegible]　石楠葉
防風　川椒炒出汗　女萎
附子炮　北細辛　獨活
巻柏　肉桂　天雄炮去皮

秦艽　防己[illegible]　躑躅花炒
當歸　生乾地黃[illegible]　芍藥各壹兩
右㕮咀酒貳斗漬之冬七日夏三日春秋各五日
初服壹合漸增之以知為度令酒氣相續
續斷湯　治偏枯少血
當歸[illegible]　陳皮去白　芍藥
細辛去苗[illegible]　生乾地黃貳兩
右㕮咀每服伍錢水貳盞煎至捌分去滓溫服臟
寒多利者入熟附子壹兩和前藥服之
補遺全生虎骨散[illegible]　治半身不遂肌肉乾瘦忌用麻
黃發汗恐津液枯竭惟當潤筋養血消風
當歸貳兩　赤芍藥　續斷[illegible]
白朮　藁本　虎骨[illegible]各
烏蛇肉半兩[illegible]
右為末每服貳錢溫酒調下骨痛加生地黃壹兩自利
加天雄半兩
虎脛骨酒　治中風偏枯四肢不隨一切風痺筋脈
攣疼
石斛　石楠葉　防風
虎脛骨炙　當歸　茵芋葉

杜仲炒　牛膝[illegible]　續斷炒[illegible]
芎藭　巴戟去心　狗脊去毛各壹兩
右以絹囊盛藥用酒壹斗漬拾日每服壹盞溫飲
偏風口喎　夫婦人偏風口喎者是體虛受風風入於
夾口之筋也足陽明之筋上夾於口其筋偏虛風因
虛而乘之使其筋偏急不調故令口喎僻也　醫一
婦人懷抱鬱結筋攣骨痛[illegible]一核服烏藥順
氣等藥口眼歪斜臂難伸舉[illegible]食多內熱痛熱食
少體倦余以為鬱火傷脾[illegible]用加味歸脾湯
二十劑形體漸健飲食[illegible]加味逍遙散十餘

劑痰熱少退喉核少消更用升陽益胃湯數劑諸症漸愈但臂不能伸此肝經血少而筋攣耳用六味地黃丸以滋腎水生肝血而愈

防風湯　治卒然口喎斜言語牽急

防風去蘆壹兩　羌活去蘆半兩　甘草炙貳錢半

右為㕮咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞去滓入麝香研壹字溫服

深師續命湯　療中風卒暴諸疾卒死不知人補虛起死神方

人參　防己　麻黃去根節

芎藭　川芎　甘草

黃芩　白朮各半兩　桂心

附子炮　防風各壹兩　生薑伍兩

右切以水壹斗貳升煮取叁升分為叁服不差更作忌海藻菘菜桃李葱生菜雀肉豬肉

防風散　治婦人中風言語謇澁肢節疼痛皮膚不仁

防風　羌活各去蘆　當歸去蘆酒炒

天南星炮　天麻　桂心

芎藭　烏蛇肉酒浸　白殭蠶炒

桑螵蛸炒各半兩　麝香研　朱砂各貳錢半細研水飛

麻黃去根節壹兩半

為細末入研藥令勻每服壹錢溫酒調下不拘時

千金方

治口眼喎斜

炒大豆叁升令焦以酒叁升淋取汁頓服

用蓖麻子米粒去皮研細作餅右喎安在左手心左喎安在右手心卻用銅盂盛熱湯坐於藥上候正即洗去用巴豆不用

飛尸血厥

夫飛尸者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見尸喪聞哀哭便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沉得風雪便作沉尸者纏骨結臟衝心脇每發絞切遇寒冷便作注尸者舉身沉重精神錯亂常覺昏廢每節氣至變輒成大惡皆宜用忍冬葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如雞子大日三服

人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移時方寤此由汗過多血少氣并於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜服白薇湯倉公散

丹溪云凡人忽手足逆冷肌膚起如米粒頭面青黑精神恍惚或錯言妄語或牙關緊急或昏寐仆倒吊死問喪入廟登塚多有此病先以蘇合香丸灌之次服調氣散 中氣雜病 平胃散 中食雜病 玉機微義云卒厥飛尸客忤鬼擊口噤用麻黃湯 太陽傷寒 寒厥表熱裏寒則下利清穀食入則吐脉沉手足冷用四逆湯 傷寒厥 熱厥腹滿身重難轉面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脉沉滑用白虎湯 雜病發熱 錦衣楊永興舉家避瘄有僕沉醉失避者既而神思昏昧遍身青傷各煎金銀藤冬葉湯灌之愈　一婦人忽昏憒發譫語自云為前謀賴某人銀兩某神責我將你起解往城隍理問兩脚踝膝髖處皆青腫痛不可忍口稱苦楚次日方甦痛尚不止用金銀藤兩許水煎服即愈　一婦人入古墓患前證以紫金錠磨汁灌之即甦通政余子華太常汪用之皆因往弔而卒死喪家想即是證也

太乙神精丹 方見雜病[illegible]　蘇合香丸 方見雜病卒中

雄硃散 方見雜病[illegible]

白薇湯

白薇　當歸 各壹兩　人參 半兩

甘草 [illegible]

右㕮咀每服伍錢水二盞煎至一盞溫服

倉公散　治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血即死不知人及臥魘齧脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂末 [illegible]　藜蘆末

雄黃 研　礬石 煅研各一分

右為細末研停用少許吹入鼻中得嚏氣通便活

末嚏再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂角者
為正
補遺内鼻散　治尸厥脉動而無氣氣閉不通靜而
若死名卒厥
石菖蒲（去毛為末）
右每用二字内鼻中吹之令入仍以桂末安舌下
硫黄散　治尸厥奄然死去四肢厥冷不省人事腹
中氣走如雷鳴
焰硝（半兩）　硫黄（壹兩）
右細研分三服酒調灌下如人行五里又進一服
不過三服即甦

瘈瘲

醫學綱目云瘈者筋脉急也瘲者筋脉緩也急則
引而縮緩則縱而伸或縮或伸動而不止者名曰瘈
瘲俗謂之發搐是也凡癲癇風痙破傷風三證皆能
瘈瘲但癲癇則仆地不省風痙瘈瘲則角弓反張破
傷風瘈瘲則有瘡口竊謂瘈者屬肝經風熱血燥或
肝火妄動血傷瘲者屬肝經血氣不足或肝火汗多
亡血所致手足伸縮不已抽搐不利若因風熱血燥
用羚羊角散（[illegible]）加鈎藤山梔若肝火妄動用加味
四物湯（[illegible]）加鈎藤鈎山梔若肝經血氣不
足用八珍湯（[illegible]）加鈎藤鈎山梔若肝火亡
血用加味逍遥散（[illegible]）加鈎藤鈎山梔如不應須用六
味丸（[illegible]）以補腎水生肝木為主佐以前劑治之若
其脉長弦者是肝之本脉則易治其脉短澀者是肺
金剋肝木也則難治其面色青中見黑者是水生木
也當自愈青中見白者是金剋木也必難愈　一婦
人素口苦月經不調或寒熱妊娠五月兩臂或拘急
或緩縱此肝火傷血所致也用四物加柴胡山梔丹
皮鈎藤鈎而愈　一妊婦因怒寒熱頸項動掉四肢抽
搐此肝火血虛風熱用加味逍遥加鈎藤鈎數劑痊

顫振

黃帝曰人之顫者何氣使然岐伯曰胃氣不實則諸脈虛諸脈虛則筋脈懈惰筋脈懈惰則行陰用力不復故為顫因其所在補分肉間　綱目云顫振與瘈瘲相類瘈瘲則手足牽引而或伸或屈顫振則但顫動而不伸屈也胃虛有痰用參朮以補氣茯苓半夏以行痰如實熱積滯用張子和三法　［按］顫振者掉眩也易曰鼓萬物者莫疾乎風鼓之為言動也大抵掉眩乃風木之搖運也諸風掉眩皆屬于肝治法若肝木實熱用瀉青丸（方見[illegible]）肝木虛熱用六味丸（方見[illegible]）

肺金克肝木用瀉白散（方見[illegible]）肝木虛弱用逍遙散加參朮釣藤釣脾血虛弱用六君子湯（方見[illegible]）加芎歸釣藤胃氣虛弱用補中益氣湯（方見[illegible]）加釣藤若產後顫振乃氣血虧損虛火益盛而生風也切不可以風為論必當大補斯無誤矣　一婦人性善怒發熱經水非過期則不及肢體倦怠飲食少思而顫振余謂脾氣不足肝經血少而火盛也午前以調中益氣湯加茯苓貝母送六味丸午後以逍遙散送六味丸兩月餘而愈　一婦人身頭振口妄言諸藥不効余以為鬱怒所致詢其故盖為素嫌其夫而含怒久矣投以小柴胡湯（方見傷寒少陽）稍可又用加味歸脾湯（歸脾湯加柴胡山梔）而愈

交加散　治痰瘀或顫振或產後不省人事口吐痰涎

當歸　荊芥穗（各等分）

右為細末每服三錢水一盞酒少許煎至七分灌下咽即有生理

增損柴胡湯　治產後或經適斷致手足牽搐咬牙昏冒異證

柴胡（捌錢）　黃芪（炒伍錢）　黃芩（炒）

石膏（各肆錢）　半夏（叁錢）　知母

甘草（炙各貳錢）

右為麄末每服半兩薑五片棗四枚水煎溫服

本事青鹽丸　治肝腎虛損腰膝無力顫振嚲曳

茴香木（叁兩）　兎絲子（肆兩）　乾山藥（貳兩）

青鹽（壹兩）

又先將兎絲子洗淨無灰酒浸曬七日冬天近火煨炙乾另為細末和匀酒糊丸梧子大每服五七十丸溫酒或鹽湯下常服壯筋力進飲食　一婦人素患足嚲曳服此藥履地如故

省事星附散　治中風能言而手足嚲曳脈虛浮而數

天南星製同半夏　半夏薄切片薑汁浸透　黑附子炮
白附子炮　川烏頭炮　白殭蠶炒
沒藥　人參　白茯苓各等分

右爲麤末每服二錢酒水各一盞同煎至八分去滓熱進三二服汗出即瘥　在桐廬有患此證用前藥二服得汗手足即能舉動

三因獨活散　治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪使上氣不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目昏

獨活　地骨皮　細辛
芎藭　菊花去根　防風去叉
甘草炙各等分

右爲麤末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓煎服清汁六分入竹瀝少許再煎一二沸食後溫服日二服

世傳茯苓丸　治手臂抽牽或戰掉不能舉物服此藥立愈又治脚氣虛弱痰邪相搏停伏中脘以致臂內筋脈攣急而痛

茯苓　半夏各貳兩　枳殼麩炒去瓤半兩
風化朴硝壹兩

右爲末薑汁糊丸桐子大每服二十丸食後薑湯下

驚悸（矢一心神不安）

婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神爲諸臟之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛襲之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變恍惚而憂懼也（[illegible]）　諸丹溪先生云驚悸者血虛用硃砂安神丸痰迷心竅用定志丸怔忡者屬火屬痰思慮便動者屬虛時作時止者火動也假如病因驚而致驚則神出其舍痰乘而入矣蓋人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所由生也治當調養心血和平心氣而已金氏婦若月赴筵因半夫失序自愧成病言語失倫兩脉弦數予曰當補脾導痰清熱不信以數巫者噴水呪之而死或謂病既無邪以邪治之何至於死予曰若月赴筵外受蒸熱辛辣適口內傷[illegible]而況背有積痰加之愧悶其痰愈盛又驚以法[illegible]其神而氣血不寧噴以法水閉其肌膚而汗不得泄內熱則陰既銷而陽不能獨立不死何待[illegible]先生云若膽氣虛寒用茯神湯膽氣實熱用酸棗仁丸心氣虛熱用定志膏茯苓補心湯心氣[illegible]砂安神丸茯神散　文學歸[illegible]內人月事不及則忽崩血[illegible]憤發熱不寐或謂血熱妄行投以寒劑益甚或謂肝戍受傷投以止血亦不効余曰此脾氣虛弱無以統攝故耳法當補脾而血自止用補中益氣湯（[illegible]）加炮薑不數劑而驗惟終夜少寐驚悸別服八物湯不効余曰離矣乃與歸脾湯（[illegible]）加炮薑以補心脾遂如初　一婦人勞則心跳怔忡寒熱往來用歸脾湯爲主佐以八珍湯諸證漸愈又用加味逍遙散寧志丸而安後復作服歸脾定志二藥即愈　一婦人患驚悸怔忡日晡發熱月經過期飲食少思用八珍湯加遠志山藥酸棗仁三十餘劑漸愈佐以歸脾湯[illegible]後因勞役發熱食少體倦用補中益氣湯又因怒適月經去血不止前證復作先以加味逍遙散[illegible]退經止又用養心湯治之而瘥　一婦人驚悸[illegible]無自汗盜汗飲食不甘怠惰嗜臥用歸脾湯而愈[illegible]年餘懷抱鬱結患前證兼衄血便血仍用前湯而愈

茯神散　治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神（去木）　人參（去蘆）　龍齒（另研）
獨活（去蘆）　酸棗仁（各壹兩微炒）　防風（去蘆）
遠志（去心）　桂心　細辛（去苗）
白朮（[illegible]各[illegible]）　[illegible]　乾熟地（[illegible]各[illegible]）

右㕮咀每服五錢水一中盞半煎至一大盞去滓
溫服不拘時候

龍齒丸　治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不
安

龍齒另研　茯神去木各　硃砂研水飛
人參去蘆　當歸去蘆　天麻各半
檳榔　防風去蘆　生乾地黃
犀角屑各半兩　遠志去心　赤箭各半
麝香另研各貳錢

右爲細末煉蜜和擣三五百下丸如梧桐子大每

服二十丸薄荷湯送下不拘時

琥珀散　治婦人血風驚悸

琥珀研　沒藥　木香
當歸　芍藥　白芷
羌活　乾地黃　延胡索
川芎各半兩　土瓜根　牡丹皮去心
白朮　[illegible]

右爲末每服貳錢水一盞[illegible]酒半分再
煎少時熱服[illegible]

茯苓補心湯　治心氣不足善悲愁怒衄血面黃五
心煩熱或咽喉痛舌本作強

茯苓肆兩　桂心　甘艸炒
麥門冬去心各叁兩　紫石英煅　人參各壹兩
大棗貳拾枚　赤小豆貳拾肆粒

右用水七升煎二升半分三服

茯神湯　治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨
處胸中煩悶

茯神去木　酸棗仁炒　黃芪炒
柏子仁炒　白芍藥炒　五味子揀炒各
桂心　熟地黃自製　人參壹兩
甘草炒各半兩(?)

右每五錢[illegible]水煎服

酸棗仁丸　治膽氣實熱不得睡卧神思不安驚悸

茯神去木　酸棗仁[illegible]　遠志去心
柏子仁炒　防風各壹兩　枳殼麩炒
生地黃杵膏各半兩　青竹茹貳錢半

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服七八十丸白湯下

定志丸　治心神不定恍惚不樂或譫言鬼怪喜笑
驚悸

人參　茯苓各壹兩伍錢　菖蒲
遠志去心各壹兩
右爲末蜜丸如前服
養心湯　治心血虛驚悸怔忡不寐或盜汗無寐發
熱煩躁
黃芪炒　白茯苓　茯神去木
半夏麯　當歸酒拌　川芎各半兩
辣桂去皮　柏子仁　酸棗仁炒
五味子杵炒　人參各貳錢　甘草炙肆錢
右每服三五錢薑棗水煎服

硃砂安神丸　治心經血虛頭常心神驚悸等證
硃砂飛過伍錢　黃連酒洗陸錢　甘草炙伍分
生地黃　當歸各壹錢伍分
右爲末飯糊爲丸每服十五丸如一二服不應當
服歸脾湯補之
治嬰茯苓散　治心經實熱口乾煩渴眠卧不安或
心神恍惚
茯神　麥門冬各壹兩去心　甘草
升麻各伍錢　人參　紫菀
桂心各半兩　知母　赤石脂各兩半

淡竹茹伍錢
右每服壹兩水煎
失血心神不安　薛前證若脾肝鬱熱用加味逍遙散
脾肝鬱結用加味歸脾湯脾胃虛弱氣血不足用八
珍湯十全大補湯脾肺虛弱氣血不足用補中益氣
湯六君子湯痰氣鬱滯用六君桔梗貝母如不應審
係氣虛但補脾胃如不應用獨參湯如惡寒發熱屬
氣血俱虛內熱晡熱屬血虛竹瀝湯面赤足血脫煩躁
皆宜甘溫之劑以補陽氣而生陰血經云血脫補氣
若用寒涼之劑以降火則誤矣仍審所屬之因治之

寧志膏　治婦人因失血過多心神不安言語失常
不得睡卧
辰砂　酸棗仁炒　人參
白茯神去木　琥珀各壹分　滴乳香壹錢
右爲末和停每服壹錢濃煎燈心棗湯空心調下
[illegible]
茯苓補心湯　婦人以血旺氣衰爲本心主血肝藏
血今血衰而氣盛者由心氣虛耗不能主血又不
能制乎肺金使肺金得以乘乎肝木肝之虧損則
血不能[illegible]月事不調矣此

方專補心元之虛抑其肝氣之乘調和榮衛滋養
血脈其疾自然平復矣
即參蘇飲內除木香與四物湯對分勻和以薑棗
煎每服四錢食前溫服　參蘇飲方見發熱　四物湯
方見通治

妙香散　治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗等
證
甘草炒伍錢　遠志去心炒　山藥薑汁炙
茯苓　茯神去木　黃芪各壹兩
人參　桔梗各伍錢　辰砂另研叁錢
麝香另研貳錢　木香貳錢伍分
右為細末每服貳錢溫酒調下

半夏湯　治膽腑實熱精神恍惚寒熱泄瀉或寢汗
憎風善太息
半夏壹錢伍分　黃芩　遠志去心各壹錢
生地黃貳錢　秫米壹合　酸棗仁三十粒炒
縮砂仁壹錢伍分
右作一劑長流水煎服

獨參湯　治元氣虛弱惡寒發熱或作渴煩躁痰喘
氣促或氣虛卒中不語口噤或痰涎上湧手足逆

冷或難產產後不省喘急用好人參二兩或三四
兩加炮薑五錢水煎徐徐服蓋人參性寒故以薑
佐之如不應急加附子

顛狂

大夫婦人顛狂病者由血氣虛受風邪所爲也人稟陰陽之氣而生而風邪入幷於陰則爲顛入幷於陽則爲狂陰之與陽有虛有實隨其虛時爲邪所幷則發也顛者卒發意不樂直視仆地吐涎沫口喎目急手足撩戾無所覺知良久乃甦狂者少臥不飢自高賢也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休故曰顛狂也　素問云陽厥狂怒飲以鐵落狂怒出於肝經肝屬木鐵落金也以金制木之意予嘗治一女人眼見鬼物言語失常循衣直視衆醫多用心藥治之無效予投養正丹二貼煎乳香湯送下以三生飲佐之立愈又一男子亦曾病此證亦用此藥收効且養正丹現有一方抱膽丸無異抱膽丸內無硫黃有乳香也　辯劉宗厚先生云有在母腹中受驚者或有聞大驚而得者蓋驚則神不守舍舍空則痰涎歸之或飲食失節胃氣有傷痰停胸膈而作當尋火尋痰因元氣者須痰膠固上膈必先用吐法若在腸胃亦須下之竊謂此證若因元氣虛弱或痰盛發熱等皆是虛象如慢驚然無風可祛無痰可逐但補脾胃氣健旺神智自清痰涎自化若誤用辛散祛逐腦

劑之劑必爲敗證　一婦人素清苦因驚而顛發風痰等藥愈甚余用參芪歸术濃煎佐以薑汁竹瀝服三斤餘方愈

防風散　治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌笑無度或心神恐懼或言語失常

防風　茯神去木　獨活
人參　遠志去心　龍齒研
菖蒲去毛　石膏　牡蠣各壹兩
秦艽　禹餘粮　桂心各半兩
甘草炙錢半　蛇蛻壹尺炙

右爲粗末每服三錢水一盞半煎七分去滓溫服

又方

羚羊角屑　人參　生乾地黃各柒錢半
獨活　遠志去心　菖蒲去毛
防風各半兩　茯神去木　石膏
麥門冬去心　龍齒別研　白鮮皮各壹兩

右爲粗末每服五錢水煎溫服無時

牛黃清心丸亦可用方見中風

餘詳雜病本門

血風煩悶

夫婦人血風煩悶者由腑臟勞傷血氣虛而風邪入之搏於血脉使氣不通而否澀則生於熱或肢節煩疼口乾少卧皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也〔醫〕前證多屬肝脾血虛發熱宜參照前與熱方論中治

酸棗仁散 治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁飲食減少並皆治之

酸棗仁 赤芍藥 赤茯苓去皮
當歸去蘆 紅花子 生乾地黃
羚羊角鎊各壹兩 防風去叉 羌活去蘆
牛膝酒浸 芎藭 桂心
地骨皮 麥門冬去心 甘草炙各半兩

右為㕮咀每服八錢水一盞半生薑柒片薄荷柒葉煎至壹大盞去滓溫服不拘時

紫石英散 治婦人血風煩悶心神恍惚睡卧不安

紫石英壹兩 茯神去木 麥門冬去心
人參去蘆 遠志去心 酸棗仁
當歸去蘆 黃芩各柒錢半 羚羊角屑
防風去蘆 黃芪各半兩 甘草炙

右為㕮咀每服……生薑伍片棗貳枚煎至壹大盞去滓溫服不拘時

當歸散 治婦人血風潮熱

當歸去蘆貳兩 芍藥 玄胡索
熟地黃各壹兩 大黃蒸柒錢半 桂心半兩
甘草炙貳錢

右為細末每服壹錢水壹盞入乾胭脂壹錢同煎至陸分去滓食後溫服

赤芍藥散 治婦人氣血不和心胸煩悶不思飲食四肢少力頭目昏眩身體疼痛

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥
白芷

右為細末每服貳錢水壹盞生薑壹片棗壹枚同煎至柒分溫服食後臨卧

血風攻脾不能食

夫脾胃為中州意智之臟也其肝心肺腎皆受脾之精氣以榮養脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經云四時皆以胃氣為本也婦人氣血不調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在內攻於脾胃脾胃既虛為邪所乘不能消化五穀故不能食也

愚按經云胃乃脾之剛脾乃胃之柔傷胃則脾無所稟受傷脾則不能為胃運化是以脾胃為之表裏藉飲食以滋養百脈者也竊謂前證若飲食所傷六君子湯加[illegible]若勞役所傷補中益氣湯若風寒所傷用人參養胃湯若大便不實六君加柴胡升麻若口吐清水或大便不實用六君子湯加木香若痞脹或肚腹不利不食[illegible]湯若鬱怒傷損肝脾歸脾湯命門火衰不能生土用八味丸仍參諸經錯雜之證而治之假如不能食而肌肉削乃脾胃經本病也[illegible]而弱乃脾胃之不足若見弦緊或四肢滿悶[illegible]此肝之脾胃病也若兼洪大或肌熱煩渴[illegible]此心之脾胃病也若兼浮濇或氣短[illegible]咳嗽痰涎此肺之脾胃病也若兼沉細或[illegible]恐善欠泛[illegible]之腎之脾胃病也各當於本經藥中[illegible]之治法

也　一婦人停食飽悶或用人參養胃湯[illegible]丸而泄瀉吐痰腹中成塊又與二陳黃連枳實反加腹脹不食余以為脾胃氣虛不能消磨用補中益氣加茯苓半夏五十餘劑脾胃健而諸證悉愈　一婦人飲食每用碗許若稍加非大便不實必吞酸噯腐或用二陳黃連枳實反加內熱作嘔余曰此末傳寒中不信仍作火治虛證悉至[illegible]不止余用六君加炮薑木香數劑諸證漸退[illegible]補中益氣加炮薑木香茯苓半夏數劑全愈後因飲食勞倦兼以怒氣飲食頓少元氣頓怯仍用前藥更加發熱脈洪大按之而虛用八味丸如無此命門火衰[illegible]補中益氣加薑桂及八味丸兼服兩月餘諸證悉愈若用中氣虛弱用人參理中湯或六君子加木香炮薑不應用左金丸[illegible]或越鞠丸[illegible]虛寒加附子[illegible]無有不愈　一婦人飲食後或腹脹或吞酸[illegible]服枳术丸飲食日少胸膈痞滿腿內酸痛畏見風寒[illegible]用養胃湯腿痛浮腫益甚月經不行余以為鬱結所傷脾虛濕熱下注侵晨用四君子芎歸二陳[illegible]後以前湯送越鞠丸[illegible]服兩月餘而經行　一婦人[illegible]或經候不

竊此中氣虛而不能施化也用六君子加砂仁香附煨薑而飲食進更以六君子歸脾桔梗而經自調　一婦人年三十餘忽不進食日飲清茶水果三年餘矣余謂脾氣鬱結用歸脾加吳茱萸四劑遂飲食如常若人脾腎虛而不飲食當以四神丸治之

一婦人不進飲食二年矣日飲清茶果品之類肝脾二脉弦浮按之微而[illegible]余謂肝脾氣鬱用六君子加木香吳茱下痰積甚多[illegible]漸進形體始瘦附朮月餘仍服六君之類而康

草豆蔻散　治婦人血風氣攻脾胃嘔逆不納飲食

草豆蔻去皮　白茯苓去皮　枇杷葉炙

半夏湯洗七次切作片各七錢半　高良薑

白朮去蘆　縮砂仁　桂心

木香　青橘皮去白　甘草炙各半兩

人參去蘆各一兩

右㕮咀每服五錢水壹中盞生薑七片煎至壹大盞去滓溫服不拘時候

訶梨勒散　治婦人血風氣攻脾胃腹脇妨悶四肢煩疼或時[illegible]不[illegible]食

訶梨勒皮　陳橘皮去白各壹兩　半夏湯洗七次切片

人參去蘆　桂心　白朮去蘆

細辛去苗土　當歸炒去蘆　甘草炙各半兩

藿香　赤茯苓去皮　芎藭各三錢

右製煎服法同前

神麴丸　治婦人血風氣攻脾胃腹脇脹滿不思飲食

神麴　白朮各一兩去蘆　附子炮去皮臍

枳實麩炒　訶梨勒皮　桂心

白茯苓　木香　陳橘皮去白

人參各半兩去蘆　桔梗去蘆　乾薑炮各半兩

右為細末以酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服叁拾丸空心食前生薑湯下日進二服

進食散　[illegible]治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾胃虛全不入食者只兩服能食[illegible]

[illegible]不食[illegible]良薑

青皮　陳皮　甘草

桂心　川烏頭炮去皮尖各貳錢半

草豆蔻仁[illegible]

為細末每服[illegible]錢水壹盞生薑[illegible]片煎七分溫服

身體骨節疼痛

夫婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風冷所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣與正氣交擊故令疼痛也　薛己按東垣先生云飲食失節脾胃虛弱乃血所生病故口中津液不行若火熱來乘土位故肢體[illegible]湯若肝經血熱用四物[illegible]羌活黃芩黃[illegible]用逍遙散[illegible]山梔川芎風濕痰用四物[illegible]羌活蒼朮風濕傷脾用羌活勝濕湯[illegible]用清燥湯[illegible]氣鬱用歸脾用四君木香枳殼[illegible]胃氣受傷用補中益氣湯[illegible]瘀血流注用四物[illegible]骨痛筋攣用當歸沒藥丸[illegible]倦怠無力用補中益氣[illegible]羌活川芎

一婦人自汗盜汗發熱晡熱[illegible]少食月經不調[illegible]痰甚多二年後遍身作痛[illegible]氣虛而風寒所乘用小續命湯疼痛[illegible]又[illegible]加味歸脾三十餘劑諸證悉愈　一婦人[illegible]其素有痛風遇勞必作用衆手重按痛稍止[illegible]俱虛用十全大補[illegible]加獨活而痛愈用六味丸[illegible]逍遙散而經調　一婦人肢體作痛[illegible]或赤白發熱惡寒吐瀉食少[illegible]月經[illegible]或如崩漏或痰盛喘嗽頭目眩痛或五心煩熱口渴飲湯或健忘驚悸盜汗無寐等證臥牀年許悉屬肝脾虧損氣血不足所致用十全大補加味歸脾兼服月餘諸證悉痊

芎藭散　治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎[壹兩]　赤茯苓[去皮]　赤芍藥
酸棗仁[炒]　桂心　當歸[去蘆]
木香　牛膝[去苗酒浸各]　羌活[去蘆]
枳殼[麩炒]　甘草[炙各半兩]

右為㕮咀每服叁錢水壹大盞生薑五片煎至壹[illegible]去滓熱服不拘時候

海桐皮散　治婦人血風身體骨節疼痛

海桐皮　桂心　白芷
當歸[去蘆]　漏蘆　川芎
羚羊角屑[各壹兩]　赤芍藥　沒藥[另研]
川大黃[炒]　木香　檳榔[各半兩]

右為細末每服貳錢溫酒調下不拘時

虎骨散　治婦人血風攻疰身體疼痛

虎脛骨[酥炙壹兩半]　麝香[貳錢半另研]　桂心

川芎　海桐皮　當歸去蘆
牛膝酒浸　天麻　附子炮去皮臍
骨碎補　沒藥另研　琥珀另研各
羌活去蘆　木香各兩半

右爲細末入研藥令勻每服貳錢溫酒調下不拘時候日進貳服

何首烏散　治婦人血風身體骨節疼痛或手足麻痺腰膝沉重舉拽不隨並皆治之

何首烏　羌活去蘆　當歸去蘆炒
赤箭　附子炮去皮臍　桂心
赤芍藥　芎藭　羚羊角屑各壹錢半
威靈仙　牛膝酒浸各半兩　防風去蘆半兩

右爲細末每服貳錢豆淋酒調下不拘時

通靈丸　治男子婦人手足疼痛風走注痛不可忍

白附子炮　僵蠶炒去絲各　全蝎炒半兩
麝香壹字另研

右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服貳叁十丸溫酒送下日進叁服不拘時

當歸沒藥丸　治婦人血風血氣腹脇刺痛筋攣骨痺手足麻木皮膚瘙痒並皆治之

當歸去蘆　五靈脂炒各壹兩　沒藥另研半兩

右爲細末醋糊和丸如梧子大每服叁拾丸空心溫酒送下生薑湯亦可日進貳服

四生丸　治血風骨節疼痛舉臂不起行履艱難遍身麻痺

白僵蠶炒　地龍去土　白附子生
五靈脂炒　草烏頭去皮尖生各等分

右爲細末以米糊和丸如梧子大每服貳拾丸溫酒送下或作末酒調半錢亦可日進貳服不拘時候

羚羊角散　治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑　酸棗仁炒　生乾地黃
檳榔各壹　五加皮　防風
赤芍藥　當歸　骨碎補炒去毛
海桐皮　川芎各叁錢半　甘草半兩

右爲末每服貳錢溫酒調下

羌活勝濕湯　治頭痛脊痛腰似折項似拔

羌活　獨活各壹錢　藁本
防風　甘草炙各五錢　蔓荊子
川芎各貳分

右水煎服如身重腰沉沉然是濕熱也加黃蘗壹錢附子半錢蒼术貳錢

走疰痛

大夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫易皮膚卒然掣痛遊走無有常處故名為走疰也加減小續命湯主之

薛東垣云若人身體沉重走疰疼痛此濕熱相搏或風熱鬱而不得伸附著於有形也是證多因飲食起居失節或因七情勞役失宜脾胃虧損腠理不密外邪所侵以致內熱晡熱自汗盜汗或經候不調飲食不甘治法濕熱腫痛者清燥湯（雜病傷暑）兼痰佐以二陳湯（雜病痰飲）肝火作痛者加味逍遙散脾鬱作痛者加味歸脾湯血虛作痛者四物湯氣虛作痛者四君子湯氣血俱虛者八珍湯俱加羌活川芎月經先期而痛者加味逍遙散頭眩倦怠而痛者補中益氣湯大抵按之痛甚者病氣實按之痛緩者元氣虛勞役而痛者亦元氣虛也飲食失宜而痛者脾氣虛也惱怒而痛者肝火盛也若晝輕而夜重者血分病也 一婦人歷節發熱作渴飲食少思月經過期其脈舉之洪大按之微細用附子八物湯四劑而痛止用加味逍遙而元氣復用六味丸而月經調 一婦人體肥胖善有熱月經先期患痛風下體微腫痛甚則小便[illegible]緩此風濕血虛有熱用羌活勝濕湯二劑腫痛漸愈用清燥湯數劑小便漸清因加味逍遙散內熱漸愈又為飲食停滯發熱仍痛面目浮腫用六君加柴胡升麻而愈又因怒氣小腹痞悶寒熱嘔吐用前藥加山梔木香而安惟小腹下墜似欲去後此脾氣下陷用補中益氣而愈後因勞役怒氣作嘔吐痰遍身腫痛經行寒熱此肝木侮脾土用六君加柴胡山梔腫痛嘔吐悉退後用補中益氣而安 一婦人飲食少思畏風寒患痛風嘔吐寒熱脈弦緊用附子八物湯（雜病）四肢痛愈用獨活寄生湯而腰痛漸痊惟兩膝腫痛用大防風湯而痛漸愈用歸脾逍遙而元氣復

沒藥散 治婦人血風走疰肢節疼痛發時來往不定

沒藥（另研） 乳香（另研） 芎藭
當歸（炒去[illegible]） 桂心 [illegible]（去蘆）
木香（各半兩） 白芷 琥珀（另研）
地龍（去土七錢炒） 安息香（另研） [illegible]（各一錢半）

為細末入研藥和勻每服二錢溫酒調下不拘時

琥珀散 治婦人血風走疰疼痛來往疼痛

琥珀（另研） 當歸（去蘆） [illegible]

羌活去蘆　川大黄濕紙裹煨各柒錢半
桂心壹兩　沒藥另研　血竭另研
乾漆炒烟盡　玄胡索　防風去蘆
羚羊角屑各半兩
右為細末每服貳錢温酒調下不拘時候日進貳服

虎骨散　治婦人血風走疰疼痛痛不可忍
虎脛骨酥炙貳兩　乾蝎炒　琥珀另研各半兩
當歸炒　威靈仙　牛膝酒浸
羌活去蘆　桂心各壹兩　漏蘆去蘆
芎藭　沒藥另研各柒錢半
右為細末每服貳錢温酒調下不拘時候日進貳服

[illegible]散　治婦人血風走疰疼痛
雄黄研水飛　血竭另研　赤箭
側子炮去皮臍　桂心　沒藥另研
木香　白芥子　地龍去土炒
蛜蝌各半兩生用　麝香貳錢半另研　烏蛇貳兩酒浸去皮骨炒微黄
右為細末入研藥更研令勻每服貳錢熱酒調下不拘時候日進貳服

漏蘆散　治婦人血風走疰疼痛無有常處
漏蘆　當歸　牛膝各叁分
桂心　地龍去土　防風
羌活　白芷　沒藥研
甜瓜子各半兩　虎脛骨酥炙　敗龜板醋炙各壹兩
右為細末每服貳錢熱酒調下無時

四生丸見前

麝香丸　治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲齧晝靜夜劇及一切手足不測疼痛
大八角川烏頭炮去皮臍　生全蝎貳拾箇
生黑豆貳拾粒　生地龍去土半兩
為細末入麝香半字同研糯米糊為丸如菉豆大每服七丸甚者拾丸夜卧令膈空温酒吞下微出冷汗一身便瘥許學士云予得此方凡是歷節及不測疼痛一二服便瘥在歙州日有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發如蟲齧其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服効

芍藥知母湯　治諸肢節疼痛身體魁瘰脚腫如脫頭眩短氣温温欲吐
桂心　知母　防風各肆兩
芍藥　麻黄去根節　[illegible]各叁兩

附子貳兩炮
右㕮咀每服四錢水壹盞半生薑五片煎七分去
滓空心服　一方有白朮川芎杏仁半夏
附子八物湯　治風歷節疼痛四肢如鎚鍛不可忍
附子　乾薑　芍藥
茯苓　人參　甘艸
桂心各叁兩　白朮肆兩
右㕮咀每服四大錢水貳盞煎七分去滓食前服
一方去桂用乾地黃貳兩
獨活寄生湯方見腰痛門

小續命湯　治白虎歷節痛不可忍方見中風
陳一婦人先自兩足踝骨痛不可忍次日流上於
膝三日流於髀骨甚痛至於[illegible]流於肘肘流於
後溪或如鎚鍛或如虫噬[illegible]静夜劇服
諸藥無効召僕診之六脉[illegible]歷節證也
非解散之藥不能愈但用小續命湯一劑而瘥
又鄧安人夏月亦病歷節[illegible]諸藥無効召
僕診之人迎[illegible]得合先服酒
蒸黃連丸[illegible]一服即愈自後
與人良驗

治婦人血風走疰腰腳骨節疼痛不可忍
附子生　黃[illegible]　杏仁研
桂心　當歸　芸薹子
羌花　巴豆去皮各[illegible]兩　松脂壹兩
右為細末鎔黃蠟五兩攪和諸藥捏作片子包裹
痛處立効
又方
羌花　桂心各壹兩　漢椒貳兩
桑根白皮叁兩　芸薹子　柳蚛屑各伍兩
右為細末用醋一升拌和炒令熱用青布裹熨痛
處冷即更入醋炒用之

治婦人血風走疰腰腳膝疼痛
天仙子　川烏頭生　附子生各壹兩
右為細末以酒煮成膏攤於帛上裁貼痛處[illegible]
者不過三上効

頭目眩暈

[大]婦人頭眩由氣虛風入於腦循脈引於目系目系急而然也邪甚則必顛素問云頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎徇蒙招搖目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則在肝下虛者腎虛也故腎厥則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則暈徇蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀故肝厥頭痛不同也 [薛]丹溪先生云眩者言其黑運旋轉其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟船之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也若風則

有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也若鬱結生痰而眩暈者此七情虛火上逆也若淫慾過度而眩暈者此腎虛氣不歸源也若吐衄漏崩而眩暈者此肝虛不能攝血也有早起眩暈須臾自定者元氣虛也正元飲(雜病自汗)下黑錫丹(雜病頭痛)傷濕頭重用腎著湯(傷濕)加川芎有痰用青州白丸子(雜病[illegible])頭風風熱也久則目昏偏頭風相火也久則目藥使疏散宜出血以開表之竅謂前證肝虛頭暈用鈎藤散腎虛頭暈六味丸(雜病虛勞)頭暈吐痰養正丹不應八味丸(雜病虛勞)血虛四物參苓白朮不應當歸補血湯(雜病勞倦)氣虛四君歸芪不應補中益氣湯(雜病勞倦)肝木實瀉青丸(雜病頭痛)虛用地黃丸(雜病虛勞)不應川芎散脾氣虛二陳參朮柴胡升麻不應益氣湯加茯苓半夏脾胃有痰半夏白朮天麻湯風痰上涌四神散發熱惡寒八物湯(雜病虛勞)七情氣逆四七湯傷濕而暈除濕湯(雜病中濕) 一婦素頭暈不時而作月經遲而少此中氣虛弱不能上升而頭暈不能下化而經少用補中益氣湯而愈後因勞仆地月經如涌此勞傷火動用前湯加五味子一劑而愈前證雖云氣無所附實因脾胃虧損耳 一婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下

詳下嘈雜門

養正丹 治虛風頭眩吐涎不已蓋此藥升降陰陽補接真氣非止頭眩而已

黑鉛 水銀 硫黃(研) 朱砂(研各壹兩)

右用建盞一隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳枝子打停取下歇少時入前味打停候冷取下研為粉以糯米軟飯丸如菉豆大每服叄拾丸棗湯吞下空心食前日貳服

鈎藤散(本事) 治肝厥頭暈清頭目

釣藤　陳皮去白　半夏湯洗柒次切片子
麥門冬去心　茯苓去皮　茯神去木
人參去蘆　甘菊花　防風去蘆各半兩
甘草炙貳錢半　石膏壹兩
右㕮咀每服四錢水壹盞半生薑七片煎至壹盞
去滓熱服日進貳服
問

獨活散　治婦人風眩頭疼嘔逆身體時痛情思昏

獨活壹兩　白朮去蘆　防風去蘆
細辛去苗　人參去蘆　川芎
荊芥各壹錢半　半夏湯洗柒次切片子　炙甘草
赤芍藥各半兩　石膏壹兩
右㕮咀每服八錢水壹中盞半生薑七片薄荷七
葉煎至壹大盞去滓溫服不拘時

川芎散　治風眩頭暈

川芎　山藥　白茯神去木
甘菊花野菊不用　人參去蘆各半兩　山茱萸肉壹兩
右爲細末每服貳錢溫酒調下不拘時候日進叁
服

四神散　治婦人血風眩暈頭痛

菊花　當歸去蘆　旋復花
荊芥穗各等分
右爲細末每服貳錢水壹盞葱白叁寸茶末壹錢
煎至七分通口服良久去枕仰卧少時

斗門方　治血風頭旋或不知人事用喝起草嫩心
陰乾爲末酒服貳錢其功甚效即前蒼耳散
又方治頭旋如天動地轉名曰心眩腦鬱宜用細[illegible]用藜
[illegible]尊菊拌勻勒如骰子大瓦上焙乾[illegible]微
[illegible]竹茹煎湯調下此去痰之法當[illegible]用

子142-163

頭痛

薛東垣云足太陽頭痛脈浮緊惡風寒川芎羌活獨活麻黃為主少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主足陽明頭痛身熱目疼鼻乾惡寒發熱脈浮緩而長升麻湯或石膏白芷為主手太陰頭痛有痰體重或腹痛為痰癖脈沉緩蒼朮半夏南星為主足少陰經頭痛足寒氣逆為寒厥脈沉細麻黃附子細辛湯為主足厥陰頭項痛或吐涎沫厥冷脈浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛痰厥頭痛半夏白朮天麻湯厥逆頭痛羌活附子湯如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而治若脈亂而病見不一且補胃為主一婦人因勞耳鳴頭痛體倦用補中益氣加麥門五味而痊三年後得子因飲食勞倦而發益甚月經不調晡熱內熱自汗盜汗用六味地黃丸補中益氣湯頓愈經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也故脾胃一虛耳目九竅皆為之病一婦人兩眉稜後痛後交太陽而青怒此肝經風熱之證用選奇湯加山梔天麻黃芪

半夏黃芩而愈此證失治多致傷目或兩耳出膿危矣

旋覆花湯　許叔微云婦人患頭風者十居其半每發必掐聤如在舟車上蓋因血虛肝有風邪襲之爾宜常服旋覆花湯此方修合服之比他藥其效

川芎　當歸　羌活
旋覆花　細辛　蔓荊子
防風　石膏　藁本
荊芥穗　半夏麴　乾地黃
甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎至七分食後溫服日進二服

七生丸　治男子婦人八般頭風及一切頭痛痰厥氣厥伏痰傷寒傷風頭痛不可忍者並皆治之

川烏頭　草烏頭　天南星
半夏　川芎　白芷
石膏

右為細末研韭菜自然汁丸如梧桐子大每服七丸加至十九丸細茶下日進二服

藥隱老人云若頭痛連齒時發時止連年不已此由風寒中於骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒亦痛謂之厥逆頭痛宜白附子散灸曲鬢穴此穴在耳上將耳掩前正尖上可灸七壯左痛灸左右痛灸右

白附子散

白附子（炮去皮）一兩　烏頭（炮去皮）　天南星（炮）

麻黃（不去節）各半兩　乾薑（炮）　辰砂（研各貳錢半）

全蠍（炒）伍枚　麝香（另研）

右為細末每服壹錢溫酒調下不拘時候

治頭風痛不可忍

硝石　人中白　腦子（各等分）

右研令極細每用一字搐入鼻中

川芎茶調散　治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛

薄荷（捌兩）　川芎　荊芥（各肆兩）

羌活　白芷　防風

甘草（炙各貳兩）　細辛（壹兩）

右為末每服貳錢食後茶清調下

如聖餅子　治男婦氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目瞑耳聾常服清頭目消風化痰暖胃

防風　生半夏　天麻（各半兩）　天南星（洗）

川烏（去皮尖）　乾薑（炮各壹兩）　川芎　甘草（炙各貳兩）

為細末湯浸蒸餅和丸如芡實大捻作餅子日乾每服伍餅同荊芥穗細嚼茶酒湯任下無時

若頭痛筋攣骨重少氣噦噫腹滿時驚不嗜臥欬嗽煩冤其脈舉之則弦按之石堅由腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥頭痛宜玉真丸與硫黃丸

玉真丸

硫黃（貳兩）　硝石（壹兩另研）　石膏（煅研）　半夏（湯洗各壹兩）

右研令停勻生薑自然汁打糊圓如梧子大生薑湯下參拾圓　一方無半夏有天南星

硫黃丸　治頭痛不可忍或頭風年深暴患無所不治服此除根

硝石（壹兩）　硫黃（貳兩）

右研令極細滴水丸如指頭大每服一丸空心蠟茶清嚼下

當丸[illegible]不中[illegible]下咽即洒然

治傷冷以艾湯下

裕陵傳王荊公偏頭疼方云[illegible]用生蘿蔔汁蜆殼仰[illegible]注[illegible]左痛注右[illegible]或兩鼻皆注亦可數十年[illegible]一注而愈

心痛

夫婦人血氣心痛者由臟腑虛血氣不調風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者成疹者心為諸臟之主而主於神其正經不可傷傷之而痛者名為真心痛朝發夕死夕發旦死心之支別絡為風冷所乘而痛者故痛發乍輕乍甚而成疹者也　師前治其邪所傷或飲食停滯消導之肝火妄動者平之脾氣鬱結和解之仍與後六證分類同用

一婦人久患心痛飲食少思諸藥到口即吐予以為脾土虛弱用白朮一味同黃土炒去土每服一兩以米泔煎徐徐服少許數日後自能大飲用三斤餘而安　上舍陳履學長子室素怯弱產後患瘧瘧年餘不愈因執喪旬月每欲眩仆一日感氣忽患心脾高腫作疼手不可按而嘔吐不止六脉微細或見其形實誤認諸痛不可補氣乃用青皮木香五味吳茱萸等藥而愈繼復患瘧且墮胎又投理氣行血之藥病雖去元氣轉脫再投參芪補劑不應矣六脉如絲欲絕迎予診之曰形雖實而脉虛極反用理氣之劑損其真氣故也連投參芪歸朮附子薑桂二劑間用八味丸五日復元食漸甘六脉全復此證若心脾疼痛時即服此等藥瘧亦不作矣

大烏藥散　治婦人血氣攻心痛發歇不定

烏藥　莪茂　桂心
當歸炒　桃仁　青皮
木香各等分

為末每服二錢熱酒調下

阿魏丸　治婦人血氣攻心疼痛及一切積冷氣

當歸　桂心　青皮
附子炮　阿魏麪裹煨令麪熟為度　白朮
川芎各壹兩　吳茱萸炒　木香
乾薑各半兩　檳榔　肉豆蔻煨
延胡索　莪茂各壹兩　朱砂七錢研

右為末先以醋煮阿魏成膏和藥末搗熟杵丸如梧桐子大每服二拾丸食前熱酒下

雞舌香散　治男子婦人九種心痛一切冷氣

良薑　桂心　赤芍藥

右為細末每服二錢水一盞入鹽少許煎七分溫服鹽湯點亦可血氣痛當歸湯調下忌生冷

應痛散　治心脾痛不可忍者婦人血氣亦治心脾

痛尤劾前方皆只得推心用醋煎當歸湯調亦可

乙丑年春初次女年十五經脉不行初一日心痛叫怪呻吟不止脉沉緩兼細以蒼朮香附丸保丸沉香丸理中丸訶子散七氣湯皆無効余思之此必升蟲所致作疾非為方丸痛丸則不可遂合與服二三丸即愈矣

陳氏天神丸　治婦人血氣不和作痛不止及下血無時月水不調

真蒲黃炒　乾漆燒少

右等分爲細末煉蜜丸如梧子大每服叄拾丸空心溫酒下如不能飲米飲吞下兩服即止

陳自華抽刀散　治婦人血風血氣等疾或興或剝機宜採惺云見一道人用此方療痛不一而足遂以爲獻且是奇妙

五靈脂炒　莪朮　桂心

芸薹子下炒各附

右爲末每服二大錢酒半盞水半盞煎至八分疾作熱服

失笑散治產後心痛　訶子散見上治心疝　亦妙

靈苑方　治婦人卒血氣心痛只用生五靈脂爲細末每服二錢酒一盞煎沸熱服

局方四七湯加良薑又沉香降氣湯分心氣飲皆治心痛良三方並見雜病諸氣

心腹痛

一婦人血氣心腹疼痛，由臟腑虛弱，風邪乘於其間，與真氣相擊而痛，其痛隨氣上下，或上衝於心，或下攻於腹，故云血氣攻心腹痛也。前證若氣滯血瘀用沒藥散，勞傷元氣用補中益氣湯（方見勞傷），肝脾鬱結用四七湯（方見），怒動肝火用小柴胡湯（方見熱入血室），肝脾血虛用四物湯，脾肺氣虛用四君子湯（方見經候不調），中氣虛弱用補中益氣湯，氣血俱虛用八珍湯（方見）。

一婦人每怒心腹作痛，久而不愈，此肝火傷脾氣也。用炒山梔一兩、生薑五片，煎服而痛止；更以二陳加山梔、桔梗，乃不再發。

一婦人懷抱鬱結，不時心腹作痛，諸藥不應，用歸脾湯，倍加炒山梔而愈。

陳湖陸小村母久患心腹疼痛，每作必胸滿嘔吐，手足俱冷，面赤唇麻，咽乾舌燥，寒熱不時，月餘竟夕不安，其脈洪大，衆以痰火治之，屢止屢作。迨乙巳春，發頻而甚，仍用前藥反劇，此寒凉損真之故，內真寒而外假熱也。且脈息洪弦而有怪狀，乃脾氣虧損，肝木乘之而然，當溫補胃氣，遂用補中益氣湯加半夏、茯苓、吳茱萸、木香，一服熱躁微減，洪脈頓斂，怪脈頓除，諸證釋然。

三神丸　治室女血氣腹中刺痛，痛引心端，經行澀少，或月水不調，以致疼痛。

橘皮（貳兩）　當歸（酒浸炒）　玄胡索（醋炒，各一兩）

右為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服五十丸，空心溫酒送下。

沒藥散　治一切血氣臍腹撮痛，及產後惡露不下，兒枕塊痛。

沒藥　血竭　桂心
玄胡索　當歸　蒲黃
紅花　乾漆（炒烟盡）　木香
芍藥（各等分）

右為細末，每服貳錢，食前溫酒調下。

大延胡索散　治婦人血氣攻心腹疼痛。

延胡索　當歸　川芎
桂心（各一錢半）　木香　枳殼
赤芍藥　桃仁（各一兩）　熟地黃（壹兩）

右㕮咀，每服叁錢，水壹盞，薑叁片，煎至七分，去滓熱服。

琥珀散　治婦人血氣攻心腹，煩躁悶亂，疼痛不止。

琥珀（另研）　沒藥（另研）　當歸（炒）

赤芍藥　牡丹皮　延胡索
蒲黃　莪茂　桂心各等分

右爲末每服壹錢溫酒調下

瑞金散　治婦人血氣撮痛月經不行預先嘔吐疼痛

玄胡索　牡丹皮　紅花各壹錢
片薑黃貳錢半　赤芍藥　莪茂
川芎　當歸各壹錢半　官桂半錢

右壹服水壹鍾酒壹鍾同煎至壹鍾食前服

牡丹散　治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛不思飲食

牡丹皮　玄胡索　官桂各壹錢
京三稜　當歸各壹錢半　莪茂
赤芍藥　牛膝各貳錢

右壹服法同前

八(?)散　治血氣心腹疼痛立驗

當歸　厚朴　芍藥
枳殼製　人參各肆分　甘草
茯苓各伍分　肉豆蔻[illegible]分

右爲末水貳升[illegible]八合[illegible]心分叁服

又八仙散[illegible]　治證同前

[illegible]　當歸[illegible]
[illegible]錢

右同研令停每服壹錢溫酒調下

玄胡索湯　治婦人室女七情所感血與氣并心腹疼痛或連腰脅甚作搐搦一切血氣經候不調並宜服之

玄胡索　蒲黃　赤芍藥
片薑黃　當歸去蘆各壹錢半　乳香
木香不見火　官桂不見火　沒藥各壹錢

甘草半錢

右作壹服水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾食前服

大効琥珀散[illegible]　治婦人心膈迷悶腹臟撮搐疼痛氣急氣悶月信不調等疾

烏藥　莪茂各壹兩　當歸壹兩

右並生爲細末溫酒調一錢服服後以食壓之忌生冷油膩等物如是產後諸疾炒生薑酒調下

治血氣不調臍下痛

桑耳　蓬蘭子　桂心
土瓜根　川芎各肆分　甘草壹分

牛膝 赤茯苓各五分 大黃

白芍藥各陸分 乾地黃捌分

右為末煉蜜丸如梧桐子大臘湯吞下貳拾丸

蠲痛散 治婦人血氣刺痛

荔枝核燒存性半兩 香附子去毛炒壹兩

右為細末鹽湯米飲調下貳錢不拘時候

沒藥散 治婦人血氣疼痛不可忍者出導方

紅花 沒藥研 延胡索炒

當歸各等分

右為末每服貳錢童便半盞酒半盞同煎至六分

熱服用燒赤秤錘淬過調服亦可常服只用温酒

蓽蒲丸 治婦人脾血積氣及心脾疼

蓽蒲 吳茱萸炮 香附子炒去毛各肆兩

右三味並剉細以釅醋五升煮乾為度焙乾研細

末以好神麯打糊為丸如梧桐子大空心食前以

淡醋湯吞下四五拾丸日叁服橘皮湯下亦好

手拈散 治血氣心腹疼痛

草菓 玄胡索 五靈脂

沒藥各等分

為末每服貳錢温酒調服

○香枳朮丸 破滯氣消飲食開胃進食消化痰涎

木香 枳實炒各壹兩 白朮貳兩

右每服五錢薑棗水煎服

木香化滯湯 治脾胃虛弱飲食停滯腹脹作痛或

心下痞滿不思飲食者憂怒飲食而致者尤宜用

之

木香 紅花各貳錢 橘皮

當歸尾 枳實麩炒各貳錢 柴胡肆錢

草豆蔻 甘草炙各伍錢 半夏壹兩

右每服叁五錢薑水煎服

小腹痛

夫婦人小腹疼痛者，此由胞絡之間夙有風冷，搏於血氣，停結小腹，因風虛發動，與血相擊，故痛也。（陳）

前證若氣寒血結，用威靈仙散；氣滯血凝，用當歸散；肝經血虛，用四物湯加參朮柴胡；肝經濕熱，用龍膽瀉肝湯；肝脾氣虛，用六君子湯加柴胡芍藥；肝脾虛寒，用六君子加柴胡肉桂；若兼嘔吐，加木香；四肢逆冷，再加炮薑。通府張孟威一云其妹小腹痛，服附子理中湯，附子服過八十餘枚，此乃沉寒痼冷之甚，不多有者。

威靈仙散 治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

威靈仙（壹兩）　當歸　沒藥

木香　桂心（各半兩）

右為細末，每服壹錢，熱酒調下，無時服，忌茶。

當歸散 治婦人久積血氣，疞刺小腹疼痛，四肢無力，不能飲食。

當歸（炒）　赤芍藥　劉寄奴

沒藥　枳殼　延胡索（各等分）

右為細末，熱酒調下壹錢，無時候。

通氣丸（[illegible]） 治婦人血刺小腹疼痛不可忍

莪朮（[illegible]）　桂心（各[illegible]）　[illegible]

為細末，[illegible]丸如[illegible]子大，每服[illegible]

醋湯下。[illegible]

石灰散 治婦人血氣痛不可忍者，除石灰外[illegible]

右取猪胰脊血上，置於湯上煖，用杖子攪停，後用

石灰於火上炒令黃，為末，羅過，每壹錢同血攪停

放溫服，立愈。

子，[illegible]川紫金皮為細末，醋糊丸如櫻桃大，又治婦人

血氣小腹疼痛，以溫酒磨下壹丸，及有心腹痛者

亦良。

吳茱萸湯 治婦人素虛，又為風冷乘，氣停滯，腹脇刺痛

吳茱萸（湯洗）　當歸（去蘆各[illegible]）　桔梗（去蘆）

細辛（去苗）　防風（去蘆）　乾薑（炮各壹錢）

熟地黃（貳錢）　甘草（炙半錢）

右作壹服，水貳鍾，煎至壹鍾，空心服。

椒紅丸 治婦人血氣不調，臟腑積冷，臍腹疞痛，肌體日瘦。

椒紅　沉香　當歸（去蘆）

訶黎勒（煨去核）　莪朮　附子（炮去皮臍）

白芷 各壹兩 肉豆蔻 良薑

丁香 各半兩 麝香 貳錢半另研

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服叁拾丸空心用溫酒送下

大腹皮飲 治婦人血瘕單腹痛

大腹皮 防巳 木通

桑白皮 厚朴 瓜蔞

黃芪 陳皮 枳殼 麩炒

大黃 各壹錢 青皮 壹錢半 五味子 半錢

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾入酒半盞再煎一二沸去滓食前服

項筋強痛

陳良甫云婦人項筋拘攣強痛每得此疾[illegible]而實鮮然方冊中所載亦少縱有言之[illegible]予考之然既有是疾必有是方何古人言此疾[illegible]且[illegible]又無的然之論耶之必是挾諸疾而生所以絕無專門予因暇日摭古名方以備檢閱然自愧學識淺鄙未必全備博學之士見其遺缺尚冀補而完之

夫頸項之處乃係足太陽膀胱之經又[illegible]足少陰腎之經蓋腎與膀胱爲表裏故也以感外邪論之則有太陽經先因感風又感寒濕致令外發發熱惡寒與傷寒相似頸項強急腰背反張如中風狀痰癡口噤其身微几几古人以痙病治其脈沉遲弦細新產血虛多汗出喜中風亦有此證謂之痙[illegible]中風痙不能遽 又有挫枕轉項不得者與[illegible]七服追風散仍與急風散摻項上 若因被風吹頸[illegible]太陽并腦俱痛項背筋脈拘急可與[illegible]椒桂丸 前木瓜治項筋強痛不可轉側以木瓜煎

[illegible]前證若因肝木自旺用瀉青丸 精血不足六味丸 風熱淫肝加味逍遙散 怒動肝火加味小柴胡湯 血虛入肝[illegible] 加味四物湯[illegible]

腎不能生肝木宜六味丸滋腎水生肝木（腰痛）
大抵肝火旺則肝血虛而筋燥頸項強急腰背反
張或四肢攣拳或頸項等處結核　一婦人耳內
耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火
傷脾胃用四君加柴胡升麻黃芪芍藥而愈後因勞
役怒氣嘔吐脇脹用六君子湯加山梔柴胡而安
一婦人因怒寒熱作渴左目緊小頭項動搐四肢抽
搐遍身疼痛此血虛肝熱則生風也用加味逍遙加
鈎藤鈎數劑諸證漸愈又用八珍湯而痊

追風散　治年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血
氣衰弱風毒之氣上攻頭痛頭眩目暈心忪煩熱
百節酸疼腦昏目痛鼻聲重項背拘急皮膚瘙
痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血
風攻注頭目昏痛皆治之

川烏（炮去皮臍）　防風（去蘆）　石膏（煆）
川芎　甘草（炙）　荊芥穗
白僵蠶（炒去絲嘴）　天南星（炮）　羌活
天麻　地龍　白附子（炮）
全蝎（去毒炒）　白芷（各半兩）　草烏頭（炮去皮尖各壹兩）
沒藥（研）　乳香（研）　雄黃（研各貳錢半）

右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及臨
臥服常服清頭目利咽膈消風化痰

急風散

草烏頭（叁兩一半燒存性於醋內淬令冷一半生用）　丹砂（另研壹兩水飛）
黑豆（壹兩炒去皮）　麝香（另研貳錢半）

右為細末入研藥勻停酒調塗痛處

蝎附散　治一切風邪頭痛夾腦風痰涎壅盛嘔逆
惡心口吐清水暗風旋暈眼見黑花牙關緊急口
眼瞤斜面目瞤動頭項拘急肩背引疼耳痒目昏
四肢麻木及沐浴出浴感風邪頭目昏痛兩太陽
疼痛連年頭風服諸藥無效並皆治之

全蝎（炮）　雄黃（水飛）　硃砂（水飛各壹錢半）
附子（炮去皮臍）　川烏頭（炮去皮臍）　麻黃（去節）
天南星（炮裂）　防風（去蘆）　白殭蠶（炒各貳錢）
藁本（去蘆土）　白芷（各半兩）

右為細末每服半錢葱茶調下食後孕婦不可服
京城之時用此藥兼嚼如聖餅子治眼羞明多
淚見物不明有効　一方用白附子蝎稍

木瓜煎

宣州木瓜　沒藥（貳兩研）

乳香（貳錢半另研）

右二味入木瓜中用蓋子合了竹簽定之飯上蒸三四次爛研成膏子每服三匙生地黃汁半盞熱灰好酒二盞調和服之　有人患此病自午後發黃昏時定予曰此患必先從足起經言十二經絡各有筋惟足下少陰之筋自足至頭大抵筋者肝之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於是時予按此方三服而愈

餘證治論方俱詳雜病本門

兩脇[illegible]痛

脈夫婦人兩脇[illegible]痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷之氣客於腸胃傷於胞絡之間與血氣相搏[illegible]脅邪下交[illegible]故令兩脇脹痛也　薛東[illegible]云兩脇作痛口苦若乾寒熱往來發熱吐酸[illegible]肝膽[illegible]腹引急痛此肝木之妄行也[illegible]若暴怒傷血用小柴胡芎歸山梔若氣虛用四物參术柴胡若久怒傷氣用六君芎歸山梔若氣血俱虛用六味地黃丸若經行腹痛寒熱晡熱或月經不調發熱痰咳少食嗜臥體痛用八珍柴胡丹皮若脇脹發

熱口渴唾痰或小便淋瀝頸項結核或盜汗便血諸血火旺用六味丸若兩脇作脹視物不明或筋脈拘攣面色青小腹痛或小便不調用補肝散若鬱用香燥之劑反傷清和之氣則血無所生諸病作矣肝藥[illegible]用推氣散小兒[illegible]丸芎歸[illegible]丸控[illegible]用[illegible]皆病氣元氣俱實之[illegible]之　一婦人性急吐血發熱兩脇脹痛日晡[illegible]此[illegible]血俱虛也朝用逍遙散倍加炒黑山梔黃芩貝母桔梗麥門冬夕以歸脾湯送地黃丸而愈

一婦內熱晡熱[illegible]痰痞不時吐痰或用清氣

化痰炙疾間不利胸膈腹脹用行氣破血藥胸痛不利肢體時麻此鬱怒傷肝脾而藥益甚也予則朝用歸脾湯以解鬱結生脾氣夕用加味逍遙散以清肝火生肝血月餘而愈後因怒飲食日少肢體時麻此乃肝火侮土用補中益氣加山梔茯苓半夏而痊又飲食失調兼有怒氣肢體麻甚月經如注脈浮洪而數此脾受肝傷不能統血而致崩肝氣虛損而血脉大傷用六君加芎歸炮薑而血崩止又用補中益氣加炮薑茯苓半夏而元氣復更用歸脾湯逍遙散調理而康

靈寶散　治婦人血氣攻刺痛引兩脇

丁香　木香　乳香

玄胡索　當歸　白芍藥各等分

右為細末每服弍錢食前溫酒調下

草豆蔻散　治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛

草豆蔻　訶子肉各壹兩　桂心

苦梗　厚朴各三分　甘草壹分

川芎　當歸　乾薑

檳榔各半兩

右為粗末每服肆錢水壹盞半煎柒分去滓食前熱服

菴䕡子散　治婦人臟腑虛冷宿冷氣攻兩脇脹痛坐卧不安

菴䕡子　延胡索　桃仁

琥珀　當歸　桂心各壹兩

赤芍藥　木香　沒藥各半兩

右為末每服弍錢溫酒調下

人參紫金丸　治婦人榮衛不和心腹刺痛胸膈脹滿不進飲食

紫金皮　蒼朮　石菖蒲各壹兩

香附子壹兩　人參半兩　木香叁錢

右為末米糊丸如梧子大食後薑湯吞下叁拾丸

氣針丸　治久積風壅踈利氣滯空胸膈止刺痛

木香　青皮去白　大黃炮

檳榔各壹兩　黑牽牛弍兩半生半炒

右為末煉蜜丸如梧子大溫水下叁拾丸　鄧安人年五十忽然氣痛投神保丸愈不一二日再痛再服神保丸六七十粒大腑不通其疾轉甚亦有要用沉香木香茴香芍藥而未敢投痛甚則築心築背築之兩脇似有兩柴上下揬定心脇叫聲徹

天台子診之六脈沉伏乍來乍去眾醫問何如予曰
夫九痛之脈亦可準也但以證辨用藥耳其人[illegible]
肥倍問其大便數日不通余曰實痛也其不必服
但以人按之痛甚手不可向邇此大實也經云大
滿大實者可下之用氣針丸伍陸百粒是晚愈
又己未在錢陵有家將妻內人病心脇脹痛眾
醫投木香沉香檳榔大腹青皮縮砂之類益甚召
予診之六脈弦緊而和不似痛脈但診之時兩手
如火以此知其實痛也眾問如何治療予曰大凡
心腹有痛不可便作虛冷治之有一醫答曰非冷

即何熱即生風冷生氣是也予曰不然難經云虛
則痒實則痛又仲景云腹痛者桂枝加芍藥湯痛
甚者桂枝加大黃湯提綱曰剛痛系弱予曰有可
辨也通痛時使一婢按之若痛止是虛寒證也按
之轉甚手不可近此實痛也即令婢按之手不可
近呼呼異常予曰此實熱無可疑者當用大柴胡
湯治之眾不從予責狀而投之入服愈
治脇肋痛木通散亦可治男子
心下脇肋小腹疼痛皆系有積寒而溫暖湯散亦可
未治甚者以溫藥下之心下與小腹痛皆此證並有劾
方而脇肋下痛[illegible]治法此
木通散　治脇肋苦痛偏劾併心下脇肋并少腹牽
引痛者皆主之
木通去皮　青皮去白　川楝子去核
以上三味用巴豆半兩炒黃去巴豆不用
蘿蔔子
舶上懷香炒　莪茂　木香
滑石各半兩
右為細末煎葱白酒調下三錢一盞服愈甚者不過再
服

三脘散　治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫
便秘澀兼治脚氣
大腹皮　紫蘇　沉香
乾木瓜　獨活各一兩　白朮
川芎　木香　甘草
陳皮　檳榔各參分
右㕮咀每服五錢水一盞煎至柒分去滓空心熱
服日中再服　戊午秋在京城有一婦人中焦虛
痞脹膨脇痛大便秘結六脈虛弱諸醫服藥無效
予設此藥不終劑而愈
補遺局方青木香丸沉香降氣湯小烏沉湯四磨湯

治百用

當歸龍薈丸〔一名四〕治肝火胸脇脹痛或發寒熱或頭
目作痛或大便不實或小便淋秘或小腹疼痛及
一切肝火之證
黃連〔...〕 吳茱萸〔...〕
右爲末粥丸白朮陳皮湯下
當歸龍薈丸 治肝經實火胸脇脹痛或大便秘結
小便澁滯凡屬肝經實火皆宜用之
當歸 龍膽草〔炒焦〕 梔子仁〔炒〕
黃連〔炒〕 黃芩〔壹兩〕 大黃〔炒〕
蘆薈 青黛〔各伍錢〕 木香〔貳錢〕
麝香〔另研〕
右爲末用神麯糊丸桐子大每服貳拾丸薑湯下
□□散 治肝脾經氣血俱損脇脹作痛或脇脹
小便實□□□或□□作痛經候不調
山茱萸肉 當歸 五味子
山藥 黃芪〔炒〕 川芎
木瓜 熟地黃〔自製〕 白朮〔...〕
獨活 酸棗仁〔炒各肆兩〕
右爲末每服五錢煎水煎服

腰痛

薛隱老人論曰夫腎主於腰女人腎藏繫於胞絡
腎虛外感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有
五種之說如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎服
脾胃氣虛及寒濕腰痛宜五積散〔中寒雜病〕加桃仁如虛
損及五種腰痛服青娥丸〔雜症腰痛〕神應丸〔全上〕皆可用
也如氣滯腰痛服如神湯必效 薛陳無擇先生云
若形體虛羸面色黧黑腿足痿軟不能行立此失志
所爲也腹急脇脹目視䀮䀮宗筋弛縱白淫下注此
鬱結所爲也肌肉不仁飲食不化腸胃脹滿閉墜腰
脇此憂思所爲也皆屬內若腰冷作痛身重不渴小
便自利飲食如故因勞汗出腰帳脇痛或墜墮血滯
或房勞精竭皆屬不內外因也竊謂前證失志腎虛
熱者六味丸〔...〕腎虛寒者八味丸〔...〕鬱怒傷肝
實用龍膽瀉肝湯〔...〕虛用六味丸補肝散〔...〕憂
慮傷脾者歸脾湯〔...〕逍遙散〔...〕腎著者寒則朮附
湯〔...〕虛則腎著湯〔全上〕腰膝痛者宜杜仲湯摩腎散
〔...〕瘀血滯者如神湯舒筋散房勞腰痛者青娥丸
〔...〕補丸〔...〕 一婦人腰痛三年矣每痛必面青頭
暈目緊余以爲肝火氣虛用補肝散而愈三年後因

勞後思頭痛兼惡心用補中益氣湯[諸病例] 加茯苓
半夏蔓荊子而愈、一婦人苦腰痛數年不愈余用
白术一味大劑服不三月而痊乃胃氣虛閉之證故
用白术也

如神湯　治男子婦人氣虛腰痛[一方有杜仲續斷當歸]

玄胡索　當歸[去蘆]　桂心[等分]

右為細末每服叁錢溫酒調下甚者不過數服

獨活寄生湯　夫腰痛者皆由腎氣虛弱臥冷濕地
當風所得不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩
弱疼重或腰痛拘攣脚膝重痺宜急服之

獨活[叁兩]　桑寄生　續斷
杜仲[炒去絲]　北細辛　川牛膝
秦艽　茯苓　白芍藥
桂心　川芎　防風
人參　熟地黄　當歸[各貳兩]

右㕮咀每服叁錢水壹盞半煎至七分去滓温服空
心氣虛下利除地黄并治新產腹痛不得轉動及
腰脚攣痛痺弱不得屈伸此藥最能除風消血肘
後有附子故無寄生人參當歸粉草近人將治歷
節風脚氣流注亦効

舒筋散　治腰痛神效閃挫亦良

玄胡索[炒]　杜仲[炒去絲]　官桂[去粗皮]
羌活　芍藥[各等分]

右為末酒調下貳錢

又方　橘核炒香研酒調下青木香丸[方見]

又方　天羅布瓜子仁炒焦擂酒熱服留查炒熱封
痛處効

腰腳疼痛

夫腎主於腰腳，女人腎藏繫於胞絡，若勞傷腎氣，風冷之客於胞絡，邪氣與真氣交爭，故令腰腳疼痛。[illegible]也，治當以補元氣為主，佐以祛邪之劑。

愚按：前證若[illegible]感寒邪乘襲，手足俱冷，頭痛惡寒，或嘔吐頭[illegible]之證，宜用本方。若氣血虛弱，寒邪所感，惡寒發熱，頭痛作瀉，或嘔吐腹痛等證，宜用五積散（[illegible]）。若元氣虛弱，濕熱所傷，兩腿腫痛，寒熱身疼，或嘔吐不食等證，宜用檳蘇敗毒散（[illegible]）。若脾胃虛弱，元氣下陷，太陰濕熱，嘔吐發熱，頭痛而渴，體倦等證，宜用補中益氣湯（[illegible]）。若足三陰精血損傷，陰火內動，內熱晡熱，作渴痰盛，小便頻數等證，宜用六味地黃丸（[illegible]）。若足三陰陽氣虛敗，惡寒發熱，手足俱冷，吐痰不食，二便滑數等證，宜用八味地黃丸（[illegible]）。

一婦人先腰疼作痛，後兩腿亦痛，余以為足三陰虛寒，外邪所傷，用小續命湯及獨活寄生湯，或作或止。所用飲食極熱，腹中方快。余曰：邪氣去而元氣虛寒也。診其脈果沉細，用養[illegible]散（本條），漸愈；又用十補丸（虛勞）而痊。

一婦人所患同前，但發熱作渴，喜冷飲食，脈洪數，按之[illegible]遲濇。余以為血虛有熱，用羚羊角散（身體[illegible]）去檳榔，加白朮、茯苓數劑，更用加味逍遙散（[illegible]）而[illegible]。

一婦人患前證，或腿膝作痛，脈浮數，按之[illegible]，元氣虛而風濕所乘，用獨活寄生湯頓愈，又用八珍湯而安。

一婦人因怒患前證，寒熱往來，口苦不食，晡熱內熱，余以為肝火血虛，先用小柴胡湯加山梔頓愈，又用加味逍遙散而瘳。

一婦人患前證，寒熱頭痛，殊類傷寒，此寒邪之證，用檳蘇敗毒散而安，又用補中益氣調補而愈。

虎骨丸　治婦人血風攻注，腰腳骨節疼痛不可忍。

虎脛骨（酥炙）　敗龜（酥炙）　檳榔
牛膝（酒浸）　當歸（去蘆）　川大黃（炒）
木香　桃仁（去皮炒）　海桐皮（各半兩）
防風（去蘆）　附子（炮去皮）　赤芍藥
桂心　血竭　沒藥（另研）
地龍（去土炒各一兩）

右為細末，煉蜜和搗三五百下，丸如梧桐子大。每服三十丸，空心食前溫酒下，日三服。

仙靈脾散　治婦人血風攻注，腰腳疼痛。

仙靈脾　桃仁（去皮炒）　檳榔（各壹兩）
羌活（去蘆）　[illegible]皮　牛膝（酒浸）

當歸去蘆炒 芎藭 骨碎補去毛
玄胡索 桂心 枳殼去瓤麩炒
木香 菴蕳子各柒錢半 蛜蝌微炒半兩
麝香另研貳
右為細末每服貳錢食前用豆淋酒調下日進二
服
藁本散 治婦人血風流注腰脚疼痛不可忍
藁本去蘆壹兩半 狗脊 天麻
骨碎補 桂心 没藥另研
血竭研 蟬殼微炒各壹兩 虎脛骨醋炙

敗龜醋炙 穿山甲各貳兩醋炙 麝香半兩另研
右為細末入麝香拌勻每服貳錢生薑豆淋酒調
下空心食前日二服
敗龜散 治婦人風毒流注腰脚疼痛行步艱難
敗龜酥炙 虎脛骨酥炙各壹兩 白僵蠶炒
薏苡仁 當歸去蘆 杜仲去絲
地龍去土 桂心 乳香另研各貳錢半
没藥另研
右為細末每服貳錢食前溫薄荷酒調下
骨碎補散 治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇拘急
並宜服之
骨碎補炒 萆薢酒浸 牛膝酒浸
桃仁麩炒 海桐皮 當歸去蘆
桂心 檳榔各壹兩 赤芍藥
附子炮去皮臍 川芎各柒錢 枳殼麩炒
右為㕮咀每服五錢水一大盞半生薑叁片棗壹
枚煎至一大盞去滓溫服
附子散 治婦人腰脚積年疼痛不瘥
附子炮去皮臍 桂心 没藥另研
威靈仙 乾漆炒去煙 牛膝酒浸各壹兩

右為細末每服貳錢溫酒調下食前日進二服
養腎散 治腎經虛弱風寒所侵以致腰脚疼痛不
能步履
蒼朮 乾蝎炙錢 天麻
草烏頭炮去皮尖 黑附子炮去皮臍各貳錢
右為末每服一錢酒調服麻痺少時隨愈孕婦勿
服此治風寒傷腎膀胱虛寒之良藥用之得宜殊
有神効

臂痛

夫婦人臂痛，筋脉攣急不得屈伸，遇寒則劇，由肝虛為風寒邪氣流於血脉，客於經絡，搏於筋，筋不榮則乾急而痛。其脉緊細，宜服柏子仁丸、舒筋湯。若臂痛不能舉，或左或右，時復轉移一臂，由中脘伏痰，脾氣滯而不行，上與氣相搏，四肢皆屬於脾，脾氣滯而氣不下，上攻於臂，故痛。其脉沉細，宜茯苓丸、控涎丹。

愚按：前證若肝血虛，用加味逍遙散；中氣虛，用補中益氣湯；血氣俱虛，用八珍湯；風熱血燥，用秦艽地黃湯；脾腎虛寒，用柏子仁丸；脾胃實熱，用茯苓丸；水不能生木，用六味丸；逍遙散怒動肝火，用小柴胡加川芎、當歸；眩暈晡熱，用四物、柴胡、丹皮；晡熱月經不調，用加味逍遙散；食少體倦無寐盜汗，用加味歸脾湯。

先太宜人徧身作痛，筋骨尤甚，不能屈伸，口乾目赤，頭眩痰壅，胸膈不利，小便赤短，夜間殊甚，遍身作痒如蟲行，此屬肝腎氣虛而熱也。用六味地黃丸料加山梔、柴胡而愈。

柏子仁丸

柏子仁　乾地黃（各貳兩，白酒浸）　茯苓

枳殼（去穰麩炒）　覆盆子（炒）　北五味子（炒，杵）

附子（炮）　石斛（去根，酒蒸炒）　鹿茸（酥炙）

酸棗仁（一炒）　桂心　沉香

黃芪（蜜水炙，各壹兩）

右為細末，煉蜜為丸，如梧桐子大，空心酒下叄拾丸。

舒筋湯　治臂痛，又名五痺湯，亦治腰下疾。

片子薑黃（四兩）　甘草　羌活（各壹兩）

白朮　海桐皮　當歸

赤芍藥（各貳兩）

右為粗末，每服叄錢，水一盞半，煎七分，去滓，溫服。如腰以下疾，空心服；腰以上疾，食後服。

茯苓丸　治臂痛不能舉，或左或右，時復轉移，由伏痰在內，中脘停滯，脾氣不行，上與氣搏，四肢屬脾，脾滯而氣不下，故上行攻臂，其脉沉細者是也。後人謂此臂痛乃痰證也，用以治痰，無不效者。予嘗以此藥治人，隨服隨愈，世所謂痰藥多矣，未有立效如茯苓丸速也。

茯苓（壹兩）　半夏（貳兩）

風化朴硝（半兩）　枳殼（半兩，去穰麩炒）

右為末，薑汁煮糊丸，如梧子大，生薑湯下貳拾丸。

食後服

控涎丹　凡人忽患胸背手足頸項腰胯隱痛不可忍連筋骨牽引釣痛坐臥不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走疰便用藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚欲爲癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰涎伏在心膈上下變爲此疾或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流唾涎手脚重腿冷脾氣脉不通誤認爲癱痪亦非也凡有此疾但以此藥不過數服即愈

甘遂去心　大戟去皮　眞白芥子炒各等分

右爲細末糊丸如梧桐子大臨臥淡薑湯下五七丸如痰猛再加至十丸

白芥子散　治臂痛牽引背胛或輟或作由榮衛循行失度痰滯經絡或似癱痪

眞白芥子　木鼈子各三兩麩炒　沒藥另研

桂心　木香各半兩

右爲末每服一錢溫酒下　愚按前二方脾氣虛弱者必佐以六君子湯中氣虛弱者必佐以補中益氣湯氣血虛者必佐以八珍湯脾氣鬱滯者必佐以歸脾湯肝經□□□氣□者必佐以逍□□□□□皆用前方治之□□□□□□□益甚不可□□

流氣飲　治七情□滯胸膈痞悶咽喉不利□□□□□□□□不調或氣攻□背脇肋作痛或脚氣喘急□□□□□元氣本虛者宜用此藥□之

紫蘇葉　黃芪炒　青皮去白

當歸　半夏□□　烏藥

芍藥炒　茯苓　桔梗

防風各伍錢　川芎　陳皮各□錢

枳實麩炒　木香□□□錢　甘草□□□□

大腹子□□各□兩

右每服半兩薑棗水煎服

四物湯　治血滯中風血虛手足不遂如臂痛加紅花煎

交加散加木瓜牛膝治冷痹有臂作痛即人參敗毒和五積散

烏藥順氣散加羌活木瓜治外邪氣滯筋骨作痛或痰氣不利方見雜病中氣

芩連地黃湯　治肝膽經風熱血燥肩背疼痛或筋脉引急或時牽痛其□□□□□□寒熱晡熱月經

不調或肢體痠痛等證

秦艽　熟地黃自製　當歸各壹錢

川芎　芍藥　牡丹皮

白朮　茯苓各壹錢伍分　鈎藤鈎壹錢

柴胡　甘草炙各叁分

右水煎服

脚氣

陳臨川云凡頭痛身熱肢節痛大便秘或嘔逆而脚屈弱者脚氣也輕者可與香蘇散加木瓜檳榔生薑煎服然後隨證治之要知有脚氣之人先從脚起或先緩弱疼痹或行起忽倒或兩脛腫滿或脚膝枯細或心中忪悸或小腹不仁皮頑不知疼痛或寒熱轉筋或見食嘔逆惡聞食氣或胸滿氣急或遍體酸痛皆脚氣之候黃帝所謂緩風濕痺是也頑弱為緩風疼痛為濕痺寒中三陽所患必冷小續命湯主之[illegible]薑汁最妙暑中三陰所患必熱小續命湯去附子減桂一半大煩躁者紫雪最良若無紫雪以白合薄荷煎冷水調服極妙大便秘者脾約丸麻仁丸三和散主之仍針灸為佳服補藥與湯淋洗皆醫家之大禁也　夫婦人脚氣與丈夫不同男子則腎臟虛弱為風濕所乘女子以胞絡氣虛為風毒所搏是以胞絡屬於腎也腎上於腰脚又肝脾腎三臟經絡起於足十趾若臟腑虛損則風邪先客於脚從下而上動於氣故名脚氣也此皆由體虛或當風取涼或久坐卑濕或產後勞損或憂怒悲傷肝則心氣不足致月候不通因其衰傷風毒傳入筋骨則令皮膚不仁

筋骨疼痛股髀不隨筋脉拘攣或時冷或時熱腫滿或兩脚痺弱或舉體轉筋目眩心煩見食嘔吐精神昏憒股節煩疼小便赤黃大便秘澀如此證候其婦人脚氣療之與丈夫不同以其氣血不調胎姙産損傷之是以療婦人及室女殊別即其義也

證

嚴用和先生云前證初患不覺因他病乃發先從脚起或緩弱痺痛不能行履或兩脛腫滿或足膝細小或心中忪悸或小腹不仁或舉體轉筋或見食作嘔或洞滿氣急徧體酸痛其脉浮而弦者因於風濡而弱者因於濕洪而數者因於熱遲而濇者因於寒男

子由於腎氣虧損女子血海虚弱七情所致竊謂前證若足三陰虚弱用還少丹（雜病虚勞）若脾氣虚寒用八味丸（雜病虚勞）若飲食停滯腎腿痠脹浮腫作痛此脚氣下陷用六君子（雜病虚勞）少加柴胡升麻不應須用八味丸若發熱口渴月經不調兩腿無力此足三陰血虚火燥用六味八味二丸兼服前證西方之人多患之因其食乳酪脾胃壅滯脛足腫滿至於南方亦有因膏粱厚味濕熱下注而患者故古人謂之壅疾所用之方多疎通發散之劑然或於房勞過度虧損三陰治法又當以固本為主故云六物附子為元氣虚弱寒邪內使之聖藥

大腹皮散　治婦人風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶並宜服之

大腹皮　桑白皮　木通（去皮）
羌活（去蘆）　赤芍藥　荆芥
獨活（去蘆）　青橘皮（去白）　乾木瓜（各壹兩）
枳殼（去瓤麩炒）　紫蘇葉（各兩）

右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片葱白七寸煎至一大盞去滓食前溫服

紫蘇飲　治婦人風毒脚氣心腹痞塞痰飲停積不

思飲食脚重虚腫

紫蘇葉　木通（去皮）　茴香
桑根白皮（各壹兩）　獨活（去蘆）　羌活（去蘆）
乾木瓜　青橘皮（去白）　甘草（炙各半兩）
大腹皮（半兩）　枳殼（去瓤麩炒半兩）　荆芥（半兩）

右㕮咀每服八錢水一大盞半生薑五片連鬚葱白三莖煎至一大盞去滓溫服不拘時日進二服

四白散　治男子婦人血虚發熱夜多盗汗不進飲食四肢羸瘦筋脉拘攣脚痛不能行立

黃芪（去蘆）　[illegible]　益智仁

陳皮去白　藿香　白扁豆
白朮去蘆各壹兩　白茯苓去皮　白豆蔻仁
人參去蘆　甘草炙　天台烏藥各半兩
芍藥壹兩半　檀香　沉香各貳錢半
右爲細末每服叁錢水壹盞生薑叁片棗子壹枚
煎至七分和柤溫服日進二服諸證減退只有脚
攣痛不能行服蒼朮丸治之
蒼朮丸　大治乾濕脚氣筋脉拘攣疼痛不能行履
兼補下部
乳香另研　没藥各貳錢另研　川牛膝酒浸
青鹽各半兩另研　熟艾肆錢糯米糊研末　全蝎壹錢炒研
川烏頭去皮臍壹錢炮
右件爲細末入研藥令勻用大木瓜壹枚切一頭
留作蓋去瓤入上件藥於木瓜內將蓋簽定安於
黑豆中蒸令極爛取出去皮連藥研成膏却入生
蒼朮末不以多少拌令得所丸如梧桐子大每服
五十丸空心用木瓜湯下或溫鹽酒亦得日進三
服忌血與蒜
餘證方論並可雜病本門

癮疹瘙痒

[本]夫婦人體虛爲風邪氣客於皮膚復傷風寒所以
則發風瘙癮疹若赤疹者由寒濕客於肌中極熱熱
結則成赤疹也得大熱則發取冷則瘥也白疹者由
風氣客於肌中熱熱與風相搏則成白疹也得天陰
雨冷則發出風傷亦發得晴暖則減着衣煖亦瘥脈
浮而洪浮即爲風洪則爲氣風氣相搏則生癮疹身
體瘙痒凡人汗出不可當風露卧及浴後出見使人
身振寒熱以生風疹也　藥隱老人云治婦人遍身
時發瘙痒或赤腫癮疹五心煩熱血風攻疰與人參
荊芥散方見血風攻疰　消風散方見頭風　四物湯方見通用　加荊芥或人參
當歸散或逍遙散兼服導赤丸如不退者食後服皂
角丸氣虛老人不可久服如服皂角丸不退者此凝
滯熱甚者宜先服青木香丸二兩服以開氣道服蒺
藜散立効　薛前證有身發疙瘩或如丹毒痒痛不
常或服木淋漓發熱煩渴或頭目昏眩日晡益甚或
寒熱發熱月經不調皆肝經風熱血燥用加味逍遙
散方見通用爲主佐以四君芎歸若怒身發疙瘩痛痒寒
熱乃肝火血燥用加味小柴胡湯方見熱入血室　氣血俱虛用
八珍加柴胡牡丹皮若夜間發熱作渴譫語乃熱入

血室用小柴胡湯加生地黃血虛四物合小柴胡後用加味逍遙散調理若鬱結食少體倦內熱晡熱乃肝經血燥用加味歸脾湯寒熱加山梔熱熾膚黃者遊走搔痒乃血風走注用何首烏散血虛逍遙散風熱消風散若專用風藥復傷陰血必致筋攣等證 一婦人身發疙瘩或如丹毒痒痛不常搔碎成瘡膿水淋漓發熱煩渴頭目眩暈日晡益甚此血虛內熱之證也以當歸飲加柴胡山梔仁治之而愈 一婦人患前證肢體疼痛頭目不清自汗盜汗月水不調肚腹作痛食少倦怠先用人參荊芥散後用逍遙散治之而痊 一婦人因忿怒身發疙瘩憎寒發熱余謂肝火用小柴胡湯加山梔黃連治之而愈後口苦脇痛小便淋漓復用前藥全愈 一婦人患前證發熱夜間譫語此血分有熱以小柴胡湯加生地黃治之血安後用四物加柴胡山梔丹皮而熱退又用逍遙散全愈 一室女年十四歲天癸未至身發赤斑痒痛左關脈弦數此因肝火血熱以小柴胡湯加山梔生地黃牡丹皮治之而愈若因怒而致者又當治以前藥

何首烏散 治婦人血風皮膚瘙痒心神煩悶及血風遊走不定並宜服之

何首烏 防風 白蒺藜炒
枳殼 天麻 殭蠶炒
胡麻 茺蔚子 蔓荊子各等分

右為末每服貳錢煎茵陳湯調下無時

蒺藜散 治婦人風瘙皮膚中如蟲行及生癮疹搔之作瘡面腫心煩並宜服之

白蒺藜炒 荊芥炒 羚羊角屑各錢半
黃芩 人參去蘆 苦參去蘆
蛇床子 秦艽去蘆 防風去蘆
麻黃去節 當歸炒去蘆 甘草炙
枳殼去穰麩炒 細辛去苗各半兩

右㕮咀每服五錢水壹中盞半煎至壹大盞去滓溫服不拘時日進二服

治婦人風痒癮疹不瘥

蒼耳花葉子各等分

右為細末每服貳錢豆淋酒調下不拘時候日進二服

治癮疹

右用白礬不以多少為末酒調下已試有驗

治皮膚有風熱遍身生癮疹

牛蒡子（水煮一兩焙乾） 浮萍（蒸過焙乾各等分）

右為細末每服貳錢薄荷湯調下日二服

又治風氣客於皮膚搔之不已

蟬蛻（洗） 大葉薄荷

右等分為細末每服貳叁錢溫酒調下無時

又方

露蜂房（洗過蜜炙） 蛇蛻（洗炙令焦各等分）

右為細末每服壹貳錢溫酒調下不拘時

治婦人風瘙癮疹身癢不止宜用淋漬方

馬蘭 羌蔚子 白蒺

白蒺藜 茵芋 羊桃根

凌霄花 蒴藋根（各貳兩） 萆麻葉（各壹兩）

右㕮咀以水貳斗煮取壹斗去相於避風處洗之

又方

凌霄花（叁兩） 蒴藋根（半斤）

右件藥以水七升煮取叁升濾去滓入朴硝末貳兩攪勻以綿蘸頻拭於疹上後煮槐柳湯浴之

又方 以蒴藋水磨白礬塗之

女科證治準繩卷之二

女科證治準繩卷之三

金壇王肯堂輯　門人新安閔參訂校

雜證門下

痰飲

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胸膈所成也人皆有痰少者不能為妨多者成患但胸膈有痰飲停於胸中則令眼暗亦令頭眩頭痛　藥隱老人評曰夫痰之為害多因外感五邪（五邪者寒暑燥濕風也）內傷七氣（七氣者喜怒憂思悲恐驚也）因五邪而得者得風為風痰得寒為寒痰得暑者為暑痰因七氣所傷多因婦人情性執着不能容忍而有此證豈特只因風冷而成

哉所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液淚汗涕唾身中滋者敗濁變而成痰聚間而為害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎飲沫四種相類宜細辨調治因風而生痰者宜服三生飲（見暴厥）星香飲（見中風）青州白丸子（見中風）化痰丸（[illegible]）因寒冷而得者宜服降氣湯（見氣）黑錫丹（見雜病）養正丹（見頭痛）因熱而得者宜服金沸草散（見咳嗽）柴胡半夏湯（本條）因暑而得者消暑丸（見傷暑）因氣滯不調鬱結而成者宜服參蘇飲（見發熱）四七湯（見氣）二陳

湯方見雜病痰在上者以瓜蒂散吐之在下者以控涎丹方見雜病利之雖曰可吐可下亦要觀人之盛衰察脉之虛實方可投之切記不可猛吐峻下所以勿傷正氣有金虎碎痰之戒也　婦人脅痛者肝經恚怒用小柴胡湯方見傷寒肝經風熱用鈎藤散方見頭目肝脾氣虛用川芎散方見經閉肝經鬱結用濟生歸脾湯方見健忘鬱怒傷肝脾用加味逍遙散方見經病脾虛痰逆用白朮半夏天麻湯方見頭脾氣虛弱用六君子益氣湯肺氣鬱滯用二陳方見痰飲加貝母桔梗陰虧水泛用六味地黃丸方見虛勞腎虛陰火加減八味丸方見虛勞腎虛火不歸源八味丸方見虛勞仍兼前藥互相用之　婦人內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下或用化痰理氣藥前證益盛肢體或麻又用祛風化痰藥肢體常麻手足或冷或熱此脾土不能生肺金也余用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑二十餘劑漸愈又用加味逍遙散三十餘劑全愈後因怒吐痰胸痞或用清氣化痰丸食少痰甚胸膈脹滿脉或浮大或澀細余以六君倍用參朮少加木香而康　一婦人咳嗽脅痛或用清肺化痰降火等劑久不愈更加內熱晡熱若兩脅或小腹內熱其咳益甚小便自遺余曰此屬肝經血虛火動用六味丸加五味子滋

腎水以生肝血用補中益氣生脾土以滋肺金而平愈

旋覆花湯　治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花　枇杷葉去毛炙　川芎
細辛去苗　藿香　桂心
枳殼去瓤麩炒　前胡去蘆　人參去蘆
半夏湯製各半兩　甘草炙　羚羊角屑
赤茯苓各柒錢去皮　羌活去蘆各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎至一大盞去滓溫服食遠日進二服

天南星丸　治婦人風痰心膈壅滯

天南星湯製　白附子炮　皂角仁炒黃
半夏麴各半兩炒　白礬枯各伍錢

右為細末酒煮麵糊丸如梧子大每服貳拾丸煎生薑薄荷湯送下食後臨睡日進二服

大半夏湯　治痰飲脾胃不和咳嗽嘔吐飲食不入

半夏　白茯苓　生薑各貳錢

右每服煎服胃痞加陳皮湯泡去白

導痰湯　治痰涎壅盛胸膈痞塞或咳嗽惡心飲食少思

半夏貳錢　南星　枳實麩炒
茯苓　橘紅壹錢　甘草伍分
右用薑拾片水煎服
瓜蒂散　療病痰胸膈痞塞頭不痛項不強寸脈微浮胸中痞鞕氣衝咽喉不得息者此為胸中有痰也當吐之宜此法方見
柴胡半夏湯　治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱榮衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜臥少力飲食無味兼治五嗽痰癖
柴胡捌分　半夏叄兩半　人參去蘆
甘草　黃芩　麥門冬各去心
白朮壹兩
右㕮咀每服伍錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎至捌分去滓服

咳嗽

夫婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也肺為四臟之華蓋內統諸臟之氣外合皮毛若為寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳也大抵治咳不可一槩當以脈證之消息脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澀者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不安者也　丹溪云春是木氣上升夏是火氣炎上秋是濕熱傷肺冬是風寒外來當發散行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗杏仁痰飲隨證加藥勞嗽宜四物加竹瀝薑汁乾咳嗽難治此證乃痰鬱火邪也用苦梗開之身用補陰降火不已則成勞上半日多嗽者胃火也用貝母石膏午後嗽者陰虛也用四物加炒黑黃蘗知母黃芩嗽者火氣浮於肺也用五味子五倍子五更嗽者飲食之火流於肺也以貝母軟石膏肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血氣滯而病宜養血疏肝清痰用四物加桃仁訶子青皮竹瀝之類嗽而脅下痛宜疏肝氣以青皮挾痰實者白芥子之類血碍氣作嗽者桃仁大黃薑汁丸服治嗽多用生薑以其辛散故

也痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用滋陰分之劑若嗽多用粟殼不必疑但要去病根此乃收後藥也[illegible]午前嗽屬胃火盛用竹葉石膏湯（方見[illegible]）胃氣虛用補中益氣（方見虛勞）加炒山梔午後嗽屬陰血虛用四物黃蘗知母（[illegible]）腎水虛用六味地黃丸（方見虛勞）加黃蘗[illegible]嗽用四物五味麥門并前丸五更嗽用六君子（方見虛勞）不得眠及兩脇下痛用六味地黃補中益氣若因氣虛腠理不密六淫所侵當祛外邪[illegible]若因心火太過當伐肝木而滋肺金若肺金氣虛當補脾土

而生肺氣若因腎水虧損虛火炎上當補肺腎以滋化源大抵風邪胃火此實熱為患易治惟肺腎虧損此真臟為患最難調治　一婦人素勤苦冬初咳嗽發熱吐血盜汗遍身作痛或寒熱往來用化痰降火之藥口噤筋攣此血本虛而藥損之耳余用八味丸（[illegible]）為主佐以補中益氣麥門五味山藥年餘而愈　一婦人咳嗽發熱嘔吐痰涎日夜約五六碗喘咳胸痞燥渴不食崩血如涌此脾土虛寒用八味丸及附子理中湯（方見中寒）而愈　一婦人不得於姑患嗽胸膈不利飲食無味此脾肺俱傷痰鬱於中也先用歸脾湯（[illegible]）加山梔撫芎貝母桔梗諸證漸愈後以六君加芎歸桔梗間服全愈　一婦人咳嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐余謂早間多痰乃脾虛飲食所化夜間喘急乃肺虛陰火上衝用補中益氣加麥門五味而愈　一婦人患咳嗽脇痛發熱日晡益甚余曰此肝脾虛熱而傷肺也用加味逍遙散（[illegible]）加熟地黃治之而愈後因怒氣勞役前證仍作兼太陽痛或寒熱往來或咳嗽遺尿此肺氣虛而尿脬失制也仍用前散及地黃丸而瘥　一婦人久咳嗽面色萎黃或時晄白肢體倦怠飲食少思稍多則瀉此脾土

虛而不能生肺金朝用補中益氣湯夕用六君子湯為主間佐以八珍湯（方見虛勞）二月餘漸愈後感寒邪喘嗽胸腹作脹飲食不入四肢逆冷此中氣尚虛不能充皮毛肥腠理司開闔之所致也遂用六君加生薑桔梗而愈

[illegible]曰經曰微寒為嗽寒甚為腸澼古人立方治嗽未有不本於溫藥如乾薑桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發散以此推之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因咳為肺痿又實則為肺癰虛則為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因

服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脉數發熱咳
嗽咽血病至於此亦已危矣古人立方亦用温藥如
建中之類今人但見寒熱咳嗽率用柴胡鼈甲門冬
苦寒之藥旋雖受斃而不知非可爲治也不可
進以温藥亦須妙以湯丸委曲調治無爲兩夯致傷
人命　節齋云陰分嗽者多屬陰虛肺脹不得眠
者難治肺痿專主補氣養血清金肺氣有餘者宜瀉
之以桑白皮爲主半夏茯苓佐之瀉其有餘補其不
足肺燥者當潤之屬熱者大力子桔梗知母雞子清
聲啞者屬寒也細辛半夏生薑肺虛者人參阿膠爲

主陰不足者六味地黄爲要藥或知母茯苓湯、
陰虛氣喘四物加陳皮甘草以降其氣補其陰綱
前咳嗽而鼻塞聲重風邪傷肺也用參蘇飲發散風寒面
赤喘嗽火尅肺也人參平肺散清熱寒熱交作肝氣
不和也四柱加知母柴胡桔梗咳喘短氣肺虛也人
參補肺湯喘滿體倦少食脾虛也參术補脾湯本條口乾
咽燥虛火上炎也六味丸大凡發熱喘嗽或咳唾膿
血飲食不入急補脾胃滋腎不多有得生者脉浮大
而面色赤者皆難治脉浮短澀者可療
經曰感於寒微則爲咳甚則爲泄蓋肺主氣合於皮

毛邪傷皮毛則咳爲肺病傳於各臟以時受邪肺爲
嫩臟邪易傷而難治其嗽有肺心脾腎肝風寒支飲
膽之十種亦有勞欬者世俗謂之邪嗽孫真人謂之
注嗽此因酒色過度勞傷肺經重者咯唾痰血輕者
時發時瘥或先嘔血而後欬嗽或先咳嗽而後見血此又
挾邪傳疰孫真人用通氣丸要與鬼交用斷瀨丸蛤
蚧天靈蓋桃柳枝安息香之類若肺中有蟲入喉癢
嗽須以藥含化其蟲即死嗽即止　東垣先生云
咳而兩脇痛不能轉側兩胠滿屬於肝臟用小柴胡
湯咳而嘔苦水屬膽腑黄芩加半夏生薑湯咳而喉中

如梗狀甚則咽腫喉閉屬心臟桔梗湯咳而大便失
氣屬小腸腑芍藥甘草湯咳而右脇痛陰引肩背甚
則不可動動則咳劇屬脾臟升麻湯咳而嘔嘔甚則
出長蟲屬胃腑烏梅丸咳而喘息有聲甚則唾血屬
肺臟升麻湯咳而失尿屬大腸腑麻黄附子細辛湯
咳而遺溺屬膀胱茯苓半夏湯咳而不止三焦受之
其狀腹滿不食涕唾而目浮腫氣逆異功散用之對
證其效如神　一婦人患前證晡熱內熱寒熱往來
作渴盜汗小便頻數其經兩三月一行此肝脾氣血
虛損用八珍湯六味丸六十餘劑諸證漸愈其經兩

月一行仍用前二藥間以加味逍遥散各三十餘劑
後恚怒適經行去血過多諸證悉至飲食少思腹脹
氣從用十全大補湯數劑漸愈仍用前藥調補漸安
復因喪子胸腹不利食少內熱盜汗便血無寐用加
味歸脾湯仍兼前藥而愈　一婦人患前證不時發
熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚盜汗口乾兩
足如炙遍身皆熱昏憒如醉良久熱止方甦或晡熱
至旦方止此陰血虛而陽氣弱也余朝用六味丸料
夕用十全大補湯月餘諸證稍愈更兼以補中益氣
湯兩月餘而愈

黃芪散　治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾

黃芪肆兩　甘草貳兩

右為細末湯點壹貳錢服日三服　一方甘草壹
兩黃芪六兩名黃芪六一湯只㕮咀水煎服

蛤蚧丸　治婦人咳嗽不止漸成勞氣

蛤蚧壹對酥炙　紫菀　款冬花
鱉甲炙　貝母去心　皂角子仁炒各壹兩
杏仁炒去皮尖壹兩半

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服貳拾丸淡薑
湯吞下

含化丸　昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成
肺勞服此安寇宗奭方

枇杷葉去毛　桑白皮　款冬花
木通　紫菀　杏仁各等分
大黃減半

右為細末煉蜜丸如櫻桃大食後夜臥含化壹丸

[illegible]湯　治諸嗽久不瘥

[illegible]　北五味子　黃芩
乾薑[illegible]　陳皮各壹　半夏
桑白皮　桂心　北柴胡各半兩[illegible]

[illegible]　木香　甘草各貳錢

右為粗末每服五錢水壹盞半杏仁七枚去皮尖
碎之生薑貳片煎柒分去滓熱服　黃師文云戊
申冬有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一投而
瘥以此治諸嗽悉皆愈

定喘湯　治丈夫婦人遠年近日肺氣咳嗽上氣喘
急喉中涎聲胸滿氣逆坐臥不安飲食不下及治
肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治
之

半夏麴炒　阿膠炒　甘草各[illegible]

罌粟殼（炒製） 北五味子 桑白皮
麻黃（去節，各壹兩） 人參（各貳錢半）

右㕮咀，每服叁大錢，薑叁片，烏梅半箇，水壹盞半，煎至七分，去滓，漸漸溫服，食後臨卧，日二服。

補肺湯 治證同前（滄州李官人宅，又名清金湯）

罌粟殼（製，壹兩） 人參 粉艸（各半兩）
陳皮 茯苓 杏仁（製）
白术 明阿膠（炒） 北五味子
桑白皮 薏苡仁 紫蘇葉（各壹兩）

右㕮咀，為末，每服叁大錢，水壹盞半，薑叁片，棗貳枚，烏梅半箇，煎至壹盞，臨卧溫服。 更加百合、貝母、法半夏、款冬花（各壹兩），服之良驗。

金不換散 治男子女人肺胃虛寒，久嗽不已，喘促滿悶，咳嗽涎盛，腹脇脹滿，腰背倦痛，或虛勞冷嗽，咯紅痰，及遠年近日一切喘嗽，諸藥不効者，並治之

罌粟殼（半兩，製） 杏仁（製） 甘草（各叁錢）
枳殼（肆錢）

右㕮咀，每服叁錢，水壹盞半，薑叁片，烏梅半箇，煎至八分，食後臨卧漸漸熱服。

許元林先生方：乙卯年七月，僕曾治一婦人咳嗽不已，服諸藥無効，漸成勞瘵，求予診之，六脉濡弱，以憂思之，此是血弱，又因憂感太過而成斯疾，合用當歸等藥治之，必愈。遂先用古今錄驗橘皮湯寧心，服蘇子降氣湯，徐用金釵石斛、熟地黃丸、當歸丸調理得安。 又治一婦人時行感熱咳嗽，遂用小柴胡湯去人參、薑、棗，只加北五味子煎服愈。

古今錄驗橘皮湯 療春冬傷寒，秋夏冷濕，咳嗽，喉中作聲，上氣不得下，頭痛方

陳橘皮 紫菀 麻黃（去根）
杏仁（製） 當歸 桂心
甘草 黃芩（各等分）

右㕮咀，每服五錢，水壹盞半，煎至壹盞，去滓，熱服。

深師四滿丸 治上氣嗽飲，嗽燥嗽，冷嗽，邪嗽，謂之五嗽

乾薑（炮） 桂心 款冬花
芎藭 紫菀（各貳兩） 芫花根皮（伍錢）
蜈蚣（壹條，去頭足，炙） 細辛 甘草（炙）
鬼督郵 人參 半夏（湯洗，各壹兩）

右為末煉蜜丸大豆許每服五丸米飲下日三服未應加至七八丸

團魚丸 治骨蒸勞嗽累効

貝母　前胡　知母

杏仁　柴胡各等分　生團魚貳箇

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥焙乾為末用骨更煮汁壹盞和藥丸梧子大每服貳拾丸煎黃芪六一湯空心送下病既安仍服黃芪六一湯調理

參术調中湯 瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

黃芪肆分　桑白皮伍分　人參

炙甘草　青皮　白茯苓各叁分

五味子拾伍分　白术叁分　地骨皮

麥門冬　陳皮各伍分

右水煎服

[illegible]化丸家製 清肺止嗽定喘化痰

清荷葉肆兩　桑白皮　天門冬去心

麥門冬去心　知母去毛皮　百部

貝母去心　柿霜各貳兩　枇杷葉去毛蜜炙

訶子肉　阿膠　橘紅

紫菀　款冬花各壹兩半　[illegible]

栝蔞皮瓤　黃芩　杏仁[illegible]

白茯苓　玄明粉　鉛白霜

桔梗各壹兩　旋覆花　馬兜鈴

五味子各錢半　硼砂伍錢　冰片[illegible]

右為極細末梨膏為丸如無梨膏則以白蜜竹瀝梨汁熬至滴水不散為度丸如龍眼大噙化壹丸

參芪補脾湯 治肺證因脾氣虛弱咳唾膿涎中滿不食宜熟服此藥以補脾土生肺金

人參　白术各貳錢　黃芪炙錢半

茯苓　當歸　陳皮各壹錢

升麻叁分　五味子肆分杵　炙甘草伍分

右薑水煎服

喘滿

歧伯曰夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者則著而為病也原其之由皆本於肺與氣[illegible]喘有[illegible]汗而喘者宜麻黃[illegible]表[illegible]汗後[illegible]而喘有潮熱者宜承氣湯若長[illegible]下利藥利遂不止脈促喘而汗出者宜[illegible]連湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黃杏子甘草石膏湯若表邪未解心下停水發熱而喘或噎者小青龍湯去麻黃加杏仁主之若陰證喘促者四肢逆冷脈息沉細或寸大尺小或六脈促疾或心下脹滿結硬若冷汗自出或大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜返陰丹主之[illegible]人[illegible]喘者以含于散如感寒伏熱而喘者以華蓋散九寶湯[illegible]若暴寒向火覆衣被過當傷熱肺實而喘促者其狀多有熱證宜洗心散冷水調服若因氣宇不調痰盛喘促者宜四七湯兼宜桔梗湯

葶藶煎服若涎多而喘者宜千緡湯橘皮半夏湯若不得臥臥即喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則浮而開使氣不得通流其脈沉大宜神秘湯肺之積名曰息賁在右脇下大如杯令人洒淅寒熱喘咳發癰疽宜棗膏丸若上氣喘者神授湯若上盛下弱而喘促者宜蘇子降氣湯吞黑錫丹若氣實之人稟來原賦太厚不任熱藥者不可輕投丹劑及諸熱藥但以秘傳降氣湯分心氣飲論之何其不出於此矣若素有脚氣而喘者當作脚氣治之又有骨蒸勞喘自有專門不敢濫及

【附】東垣云肺金受邪由脾胃虛弱不能生肺乃所生受病故咳嗽氣短氣上皮毛不能禦寒精神少而渴情慘不樂皆陽氣不足陰氣有餘也治法若肺氣虛弱用四君子加枳殼半夏脾虛不能生肺調中益氣湯七情氣結四七湯脾經鬱結歸脾湯脾氣虛弱人參補肺散肺經火盛人參平肺散腎水敗涸六味地黃丸真陽虛損八味丸或兼小便不利為害尤速非二丸不能救一婦人傷風寒作喘或用表散愈而復患仍用前藥其證益甚飲食少思胸腹不利此因脾肺氣虛也予先

用六君子湯加桔梗漸愈又用補中益氣湯而痊
一婦人患前證屬命門火虛不能生脾土用補中益
氣湯八味地黃丸而痊後復患其喘益甚用前藥不
應遂用黑錫丹二服喘止仍用前二藥而諸證痊凡
屬邪氣有餘者其證易識治效亦速其屬元氣不足
者變證不一效非可以旦夕期也

杏子散 治諸臟相乘喘急

杏仁去皮尖麩炒黃細研如膏 麻黃根爲細末等分

右和勻煎橘皮湯調下貳錢無時

橘皮半夏湯 治肺胃虛弱好食酸冷寒痰停積
嘔逆惡心涎唾稠黏或積吐粥藥不下手足逆冷
目眩身重又治傷寒時氣欲吐不吐欲嘔不嘔昏
憒悶亂或飲酒過多中寒停飲喉中涎聲乾噦不
止

陳皮去白 半夏煮各[illegible]兩

右件爲麤散每服叁錢生薑叁片水貳盞煎至壹
中盞去滓溫服不計時候兩服滓併一服再煎服

棗膏丸 治息賁在右脅下大如杯令人洒淅寒熱
喘咳

甜葶藶炒紫 陳皮 苦桔梗各等分

右爲末棗肉丸桐子大每服數丸白湯下[illegible]
上六人常停飲水積食已必嚏濁喘覺胸系急服
此良驗

神授湯 治上氣喘急不得臥

橘紅 苦梗 紫蘇
人參各壹錢 五味子各伍分

右薑水煎服

治婦人喘促虛腫快利小便即瘥
用生薑貳兩取汁白麵叁兩以薑汁搜作小劑大
半夏拾箇打碎入麵中作餅炙熟作黃色爲末溫
熟水調下壹錢以小便通利爲度

天門冬丸楊氏家傳 治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口
乾引飲面目浮腫

天門冬拾兩去心 麥門冬捌兩去心 生地黃叁斤取汁爲膏

右二味爲末入地黃膏和丸如梧桐子大每服五
拾丸逍遙散中去甘草加人參煎湯送下或服王
氏博濟方中人參荆芥散亦可如面腫不已經曰
面腫曰風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡
飲子去大黃故論曰治臟者治其俞治腑者治其
合浮腫治其經治俞者治其土也治合者亦治其

土也如兵家圍魏救趙之法也

人參補肺湯　治肺腎水不足虛火上炎咳唾膿
血發熱作渴小便不調

人參　黃芪炒　白朮
茯苓　陳皮　當歸各壹
山茱萸去核　山藥各貳錢　五味子杵
麥門冬去心　甘草炙各柒分　熟地黃自製壹錢伍分
牡丹皮壹錢

右薑水煎服

人參平肺散　治心火尅肺金患肺痿咳嗽喘嘔痰
涎壅盛胸膈痞滿咽膈不利

人參　青皮　茯苓
天門冬　陳皮　地骨皮各壹錢
甘草炙伍分　知母柒分　五味子杵拾粒
桑白皮炒壹錢

右薑水煎服

嘔吐

大夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理所爲也
胃爲水穀之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃
胃氣逆則令嘔吐也　大嘔吐之疾非特脾胃虛冷
而嘔吐也亦有胃熱而嘔者亦有胃中冷胃口熱而
吐者亦有痰盛而嘔者亦有血弱而嘔者經云無陰
則嘔是也不可以一槩用藥如胃冷而嘔吐宜用局
方人參丁香散理中丸及許仁則半夏丸人參七味
丸如胃熱而嘔吐者宜用小柴胡湯蘆根湯竹茹湯
槐花散如胃中冷胃口熱而嘔吐者宜用局方藿香

正氣散生薑棗子煎沉冷服仰止如痰盛嘔吐者宜
局方半夏湯茯苓湯二陳湯如惡阻兼用茯苓丸白
有專門如血不歸源而嘔吐者用十全大補[illegible]加
陳皮半夏藿香薑棗煎服或有腳氣而嘔者自有專
門不濫及　薛按東垣先生云前證內有故寒與新穀
俱入於胃新故真邪相攻氣併相逆復出於胃故爲
噦屬手太陰濁是少陰又云胃因氣逆爲噦夫嘔吐
噦者俱屬於胃以其氣血多少爲異耳如嘔者陽明
也陽明多血多氣故有聲有物血氣俱病也仲景云
嘔多雖有陽明證慎不可下孫真人云嘔家多服生

薑爲嘔家之聖藥也氣逆者必散之故以生薑爲主吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲爲血病也有食入則吐以橘皮去白主之噦者少陽也多氣少血故有聲無物乃氣病也以薑製半夏爲主若脾胃虛弱寒邪所客飲食所傷者用六君丁香藿香生薑之類若胃中有熱膈上有痰用二陳山梔黃連生薑若久病胃虛嘔而不納穀者用生薑參朮黃芪香附之類亦有痰膈中焦食不得下者有氣逆而嘔者有氣鬱於胃口者有食滯於心肺之分而復出者有胃口有火與痰而嘔者若注船大吐渴飲水者即死童

便飲之最妙前論云血不歸源而嘔用十全大補湯誠發前人之未發愚常用屢効此論與王安道所論少異宜參看

先太宜人飲食後聞外言忤意嘔吐酸水內熱作渴惟飲冷水氣口脉大而無倫面色青赤此肝脾鬱火投之以藥入口即吐第三日吐宿食第七日吐酸黃水十一日吐苦水脉亦洪大仍喜飲冷以黃連煎湯冷飲少許至二十日加白朮茯苓二十五日加陳皮二十七日加當歸炙草至六十日始進米飲半盞漸進薄粥調理得痊　府庠沈姬文母患脾虛中滿痰嗽發熱又食濕麵冷茶吞酸嘔吐絶食誤服芩

連青皮等藥益加寒熱口乾流涎不收聞食則嘔數日矣迎治余曰脾主涎此脾虛不能約制也欲用人參安胃散惑於衆論以爲胃經實火宿食治之病日增劇忽思冬瓜食如指甲一塊頓發嘔吐酸水不止仍服前藥愈劇復邀視之則神脫脉絶瀕死矣惟目睛尚動余曰寒淫於內治以辛熱然藥不能下矣急用艾附子炒熱熨臍腹以散寒回陽又以口氣補接母口之氣又以附子作餅熱貼臍間時許神氣少甦以參朮附子爲末仍以是藥加陳皮煎膏爲丸如粟米大入五七粒下口隨津液嚥下即不嘔二日後

加至十粒諸病少退甘涎不止五日後漸服前劑一二匙胃氣少復乃思粥飲後投以參朮等藥溫補脾胃五十餘劑而愈　孫一婦人三十五歲無子恐夫娶妾致鬱經不行者三月矣病腹痛惡心諸醫皆云有孕其夫亦粗知醫舉家欣喜治以安胎行氣止痛之藥服三五十貼不効痛苦益甚凡未申時發寒熱腹中有塊如彈子大者二三十枚翻騰作痛行動則水聲漉漉痛極則吐酸水五六碗吐盡則痛息而寒熱除痛亦不作明日亦然又作瘧治轉劇召予診左手弦尺濇右手濡弱重取則滑尺同左時經已五月

不行矣予曰此鬱病也豈有消脉成孕之理若不急
前者當殆矣其夫亦悟乃為製方以二陳加香附山
梔撫芎玄胡當歸紅花之類藥進而漸止連與四貼
皆效但藥止則病發如故調治一月不能除根予因
偕沐察見先師黃古潭先生先生乃諭予曰此鬱火
病也其病起于忤鬱盖肝主謀慮膽主決斷謀不決
則鬱生膽鬱生則木旺木盛則凌脾脾傷則不能運化
精微而生氣血以故月水不來也肺金失於母養則
肅殺之令不行木寡于畏而侮所不勝是以直衝犯
清道以作吐也吐後諸證皆減者木升而火息也為

裁一方以黃芪五錢柴胡叁錢白芍藥貳錢甘草壹
錢陳皮貝母枳實各五分薑叁片一劑而寒熱除再
劑而痛減吐止木鬱亦絕七日不發其夫喜曰是何
神速也乃拉予復請命于先生先生曰夫寒熱者少
陽膽也吐發者厥陰肝也痛而腹塊翻騰者火盛激
動其水如鍋中湯滾沸沸騰是也吐多則肺金愈
傷故用黃芪補肺金為君使得以制肝木以柴胡瀉
肝乃臣以升發其膽火經曰木鬱則達之達是通達
之義夫木性上升者也既鬱則不升故用柴胡升發
膽肝之清氣使衝開其鬱結以復其常又曰過者折
之以其畏也所謂瀉之補肺抑肝正謂此也又曰泄
其肝者緩其中以甘草緩中為佐又曰木位之下
瀉以酸以白芍藥于脾中瀉木為臣病久生鬱鬱久
則生涎以貝母陳皮枳實開鬱逐涎為佐使然後金
得其正木得其平土得其安由是病去而愈速前方
用山梔黃連之類皆降下之藥火勢正熾豈區區寒
涼所能抑哉故經曰輕者正治重則從其性而升之
但凡治病要當識得此意

益智子散　治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不
下食四肢無力

益智（壹兩）	附子（炮）	縮砂仁
丁香	厚朴	黃芪
白朮	白茯苓	陳皮
川芎	良薑	藿香葉
當歸（各七錢半）	人參	桂心（各半兩）

右㕮咀每服叁錢薑叁片棗壹枚水壹盞煎至七
分去滓無時溫服

丁香散　治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水
穀不消

丁香　白朮　縮砂仁

草果仁　橘皮各柒錢半　當歸
白豆蔻　藿香葉　神麯
訶子皮　甘草各半兩　人參壹兩
右爲細末每服貳叁錢煎薑棗湯調下
竹茹湯　治胃熱嘔吐
乾葛叁兩　半夏湯洗七次薑汁半盞漿水壹升煮耗一半取出柒錢半
甘草炙錢半
右㕮咀每服五錢水貳盞薑叁片竹茹雞彈大棗
子壹枚煎至壹盞去滓溫服　許學士云胃熱者
手足心熱政和中一宗人病傷寒得汗身涼數日

後忽嘔吐藥與飲食俱不下醫者皆用丁香藿香
滑石等藥下咽即吐予曰此正汗後餘熱留胃脘
孫兆竹茹湯正相當爾亟治藥與之即時愈
良方槐花散
皂莢　白礬　槐花炒令黃黑色
甘草各等分
右爲細末白湯調下貳錢
許仁則半夏丸　療積冷在胃嘔逆不下食方
半夏壹斤湯洗七次焙　小麥麵壹升
右擣半夏爲散以水搜麵丸如彈子大以水煮令

麵熟則是藥成初吞四五丸日二服稍加至十四
五丸旋煮旋服此覺病減欲更合服亦佳忌羊肉
餳
又依前半夏丸雖覺漸損然病根不除欲多合前丸
又慮藥毒不可久服欲不服又恐病滋蔓宜合人
參七味丸服之
人參七味丸
人參　白朮各伍兩　厚朴炙
細辛各肆兩　生薑切炒兩　橘皮叁兩
桂心貳兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大飲下拾丸漸加至
貳拾丸與半夏丸間服亦可忌桃李雀肉生葱生
菜
補遺治男子婦人一切嘔吐五苓散內除桂加半夏
末如桂分兩每服壹錢以生薑自然汁調搜和如
麵候半時久再以白沸湯一小盞調開溫服五苓散方見傷寒準繩渴門
青金丹　治一切嘔吐不已
硫黃貳錢　水銀壹錢
入銚內慢火熬化以木篦子撥炒成砂再入乳鉢

研黑不見星以薑汁糊丸如菉豆大每服貳叁十
丸米飲下

人參安胃散　治脾胃虛熱嘔吐泄瀉或飲食不入

人參（貳錢）　黃芪（炒貳錢）　生甘草
炙甘草（各伍分）　白芍藥（柒分）　白茯苓（肆分）
陳皮（叁分）　黃連（炒貳分）

右水煎服

霍亂

大嘔吐而利者名霍亂也原疾之由皆因腸胃虛冷飲食過度觸冒風冷使陰陽不和清濁相干致令揮霍變亂也或先心痛而吐者或先腹痛而利者或吐利俱作者或頭痛身體壯熱而脉浮洪者或陽氣暴絕而手足逆冷而脉息微絕者治之當分陰陽察其虛實辨其冷熱觀其脈息熱者涼之冷者温之以平為期百問云凡霍亂吐利熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸吐利已汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕者通脉四逆加豬膽汁湯夏月間中暑霍亂大煩渴四肢逆冷冷汗出脚轉筋者香薷散濃煎沉冷服即効（凡霍亂之脉浮洪者易治微遲不語氣少者難治）　薛賈元良先生云暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心胞絡之經其證頭疼口乾面垢自汗倦怠少氣或背寒惡熱甚者迷悶不省或霍亂吐利喘咳腹痛或下血發黃生瘀等證治法清心火利小便為主若自汗熱甚用白虎湯若頭疼惡寒用十味香薷散泄瀉煩渴飲水吐逆用五苓散熱甚煩渴用益元散清之若表解裏熱甚者用黃連解毒湯脉微下利作渴喜溫或厥冷不省人事宜竹葉石膏湯加熟附半枚

冷飲矣以來復用五苓散治之故東垣云脾胃虛弱遇夏月淫雨身重短氣甚則四肢痿軟脚欹眼黑皆滋肺氣以補水之源是以五月常服五味子人參麥門冬之劑爲熱傷元氣故爾丹溪所謂夏月伏陰在內也蓋人之腹屬地巳月六陽盡出於地之上矣是人之陽氣亦浮于肌表散于皮毛而腹中之陽虛矣又加以凉亭水館大扇風車寒泉水果冰凉之物自內及外不用溫熱病所由生陳無擇云凡中暍切不得用冷藥惟用溫養得冷即死道途無湯即以熱土熨臍中消以熱尿即甦深可見矣內經曰脈虛身熱

得之傷暑雖經曰傷暑得之爲正邪火曰病也當惡寒其病身熱而煩心痛其脈浮大而散傷寒論曰太陽中暍者身熱頭痛而脈微弱或發熱惡寒而脈弦細芤遲大抵寒傷形熱傷氣蓋傷氣而不傷形則氣消而脈虛弱故先哲立法夏月宜補良有以也前證若內有所積外有所感用二陳湯加減治之或雜治子搗碎服而吐之若飲米湯即死云云同前論若轉筋不住男子以手挽陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也乾霍亂不得升降必在須臾當以鹽湯吐之後以二陳湯加川芎蒼朮防風白芷薑煎服若發

悶而不通加枳殼若食瓜果飲冷乘風霍亂用六和湯倍加藿香大凡中暑而亡者皆因元氣虛弱其邪乘之以致泄瀉陽氣暴脫實爲陰寒之證宜急補其陽庶得保生緩則不救其他洸爲者熱投以寒藥鮮不誤事愚故以回陽固本之方繼之於後

加減理中丸　治霍亂臨時方亦可治男子

人參　白朮　乾薑

甘草炙各等分

右爲細末煉蜜爲丸每兩作五丸取湯和壹丸服之日夜服　吐多利少者取枳實炙去穰四

破水煮取壹升和壹丸服之吐少利多者加乾薑壹累　吐利乾嘔者取半夏半兩泡洗去滑水貳升煮取壹升和壹丸服　若體疼痛不可堪者取桂參枚水貳升煮壹升和壹丸服　吐利大極轉筋者以韭汁洗腹腎從胸至足踝勿逆仰其

若體冷微汗腹中寒取附子壹枚炮去皮四破以水貳升煮取壹升和壹丸服　吐利悉止脈不出體猶冷者可服諸湯補之

四順湯　治霍亂吐利腹痛手足逆冷脈微欲絕

附子壹枚炮去皮臍　乾薑各炙　人參

甘草（各壹兩）

右㕮咀水煎服

四逆加豬膽汁湯　治吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絶者

甘草（貳兩）　乾薑（壹兩半）　附子（壹枚生用）

豬膽汁（半合）

右三味㕮咀每服五錢水壹盞煮至貳盞去滓內豬膽汁分二次温服其脈即來

香薷散　治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥鱠生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取凉而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有先心痛而吐者或先腹痛而利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而後吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷脈微欲絶者或煩悶昏塞欲死者姙婦霍亂吐利此藥悉能主之

香薷葉（壹兩）　白扁豆　厚朴（各貳兩）

右㕮咀每服半兩水壹大盞酒壹分慢火濃煎至六分去滓井中沈令冰冷頓服無時候連併二三服立見神効（蘇光祿方中名香薷飲　自閣同有[illegible]扁豆）

訶子散　治老幼霍亂吐利一服取効又治九種心痛及心脾冷痛不可忍

訶子皮　甘草　厚朴

乾薑　草菓仁　陳皮

良薑　伏苓　神麴

麥門冬（各等分）

右為細末每服貳錢候發刺痛不可忍用水壹盞煎七分入鹽服急則鹽點

胡椒湯　治霍亂吐利甚妙

胡椒（四十九粒）　菉豆（壹百四十九粒）

右為細末每服貳錢木瓜煎湯調下

補遺　凡霍亂身熱脈浮洪而渴者此必胃有熱宜竹葉湯吐止然後以五苓散不換金正氣散六和湯等治之或若陽氣暴絶四肢逆冷脈微欲絶可用理中湯理中丸治中湯之類甚者加附子如中暑霍亂吐利者以香薷散入半夏少許用生薑自然汁搜藥劑入銅銚炒乾再入好紅麴酒又搜潤藥又炒乾却入水壹盞半煎七分去滓井中浸冷服效

翻胃吐食

〔薛〕病機云吐有三曰氣積寒也皆從三焦論之上焦吐者從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝胸發痛其治法當降氣和中中焦吐者從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脈浮而匿其證或先痛而後吐或吐而後作痛治法當以小毒藥去其積檳榔木香行其氣下焦吐者從於寒地之道也其脈沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清大便秘而不通治法當以毒藥通其秘塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令

大便秘結而自愈也王太僕曰食不得入是有火也食入反出是無火也又發明曰噎者六腑之所主陽也氣也塞者五臟之所主陰也血也二者皆由陰中伏火而作也劉宗厚先生曰若三焦傳化失常所致主於氣也若血枯胃脘乾槁所致因於血也塞猶填塞不通之義故發明有治幽門不通噎塞不便通幽湯例蓋陽無陰不能通化陰之失位而陽伏其中傳化不變而反上行矣故前證或由飲食起居七情虧損脾胃痰飲停滯中氣不運當以補中益氣湯（發劑方條）為主若鬱結傷脾用歸脾湯（見補）加枳殼桔梗若恚怒傷肝用小柴胡湯（傷寒少陽）加梔苓參朮脾氣虛弱用六君子（新病虛勞）加山梔枳殼氣血俱虛用八珍湯（即雜內入）（湯□）加山梔半夏若用行氣之藥胸膈痞悶用六君芎歸之類若過用香燥之劑而大便結燥用四物（□通）參朮之類若飲食不能入用六君山梔吳茱萸治黃連若食入而反出用六君炮薑白荳蔻黃連製吳茱萸若痰滯而食反出六君枳殼桔梗若飲食少思大便不實胸膈痞悶吞酸噯腐食反不化是為脾胃虛寒用東垣神眞丸或八味丸（虛勞）若發熱煩熱身惡風寒腹與其食或手足俱冷胸滿腹脹是內眞寒外假

熱用神效附子丸（本條）或八味丸大凡嘔吐善食喜飲冷水是為有火嘔吐少食喜飲熱湯是為無火當審其因而治之

一婦人患前證胸腹痞悶得去後或泄氣稍寬余曰此屬脾氣鬱結而虛弱也當調補為善不信乃別用二陳枳實黃連之類不應又用香燥破氣前證益甚形氣愈虛余用加味歸脾湯（方即加本）（加山梔）調治半載而痊

一婦人患前證胸脇脹悶或小腹不利或時作痛小便澀滯余曰此肝火血虛也當清肝火生肝血養脾土生肺金以余言為迂別服利氣化痰之劑前證益劇虛證蜂起余用加味逍遙

散（兩劑）加味歸脾湯兼服尋愈　一婦人患吐痰發熱
足常冷飲食少思余曰此肝脾鬱怒兼命門火衰之
症另服化痰利氣之劑胸腹愈脹又服峻利疏導之
劑余曰非其治也必變脾虛發腫之證急服金匱加
減腎氣丸庶有可救不信反服沉香化氣等丸果發
腫而歿

白礬散　治婦人翻胃吐食千金翼云不特治婦人
男子亦可服一斤以上為妙

白礬（以赤石脂升煅上令赤入醋內浸令再煅再浸以醋盡為度取壹兩研）
乾薑（炮貳錢半）

右為細末每服一錢米飲調下甚者貳錢

白芷散　治婦人翻胃吐食

右用白芷壹兩切作片瓦上炒令黃為細末用豬
血二十文切片以沸湯泡七次將血蘸藥喫七片
如病藥末留後次用

人參丸　治脾胃虛弱不進飲食反胃嘔吐

白茯苓　縮砂仁（各貳兩）　丁香（壹兩）
陳倉米（壹升用黃土炒米熟去土不用）

右為細末薑汁法丸梧子大每服六七十丸食後
生薑湯下

青金丹　治嘔吐反胃等證每用參拾丸煎生薑陳
皮湯吞下（方見嘔吐）

五苓散　治反胃發渴加半夏每四錢生薑五片煎
溫服（方見傷寒門）

東垣補真丸

肉蓯蓉（酒浸）　胡蘆巴（炒）　附子（炮去皮）
陽起石（煅）　肉豆蔻（麵裹煨）　兎絲子（淨洗酒浸）
川烏（炮去皮）　沉香　五味子（各伍錢）
鹿茸（酒炙炒）　巴戟（去心）　鍾乳粉（各壹兩）

右為細末用羊腰子兩對治如食法葱椒酒煮搗
爛入酒糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲鹽
湯任下

神效附子丸　治脾腎虛寒嘔吐或反胃噎嗝
黑附子重壹兩肆伍錢端正底平尖圓壹枚灰火
炮皮裂入生薑自然汁內浸潤曬乾仍炮再入汁
浸潤仍曬再炮用盡薑汁半碗為度却去皮臍末
之以人參煎和丸如黍米大每服數丸津唾咽下
胃氣稍復飲食稍進投以溫補之劑

血膈

〔鑑〕婦人血膈若氣逆而血滯用流氣飲〔方見脅痛〕若恚怒而血逆用小柴胡湯〔方見傷寒少陽〕加山梔丹皮血虛用四物湯〔方見血證〕參朮柴胡山梔丹皮若鬱結而血傷用加味歸脾湯〔方見健忘〕兼加味逍遙散〔方見經閉〕脾虛不能生血用六君子加歸芎胃虛不能生血用補中益氣湯〔方見勞傷〕若肝虛而不能藏血用補肝散〔方見脇痛〕如不應兼以六味丸若因脾肺虛用補中益氣湯如不應用六君子加芎歸　一婦人患前證胸膈痞悶余曰此屬脾經血虛遂用四君加芎歸調補脾氣尋愈又因怒兼

胸膈痞悶頭目不清月經旬餘未止用加味逍遙散加鈎藤治之復痊　一婦人患前證胸膈作痛面青目劄小便頻數或時寒熱此肝氣滯而血凝先用失笑散一服痛止又用加味逍遙散而愈　一婦人所患同前悉用行氣破血之劑以致不起

牡丹煎　治婦人血膈

牡丹皮　苦參　貝母〔去心〕

玄胡索　白芍藥〔各等分為細末〕

煉蜜丸梧子大每服拾伍貳拾丸米飲吞下無時

摘刀散　治婦人血風血氣血膈等證〔方見血崩〕

鼻衂

〔大全〕夫婦人鼻衂者由傷動血氣所致也凡血氣調和則循環表裏經絡澀則不散若勞傷損動因而生熱氣逆流溢入於鼻者則成鼻衂也只有產後見衂者不可治　凡鼻衂雖多因熱而得此疾亦有因怒氣而得之者曾治趙恭人鼻衂不止諸治不差石子治先用蘇合香丸四粒次用五苓散濃煎白茅花湯調服即止次用芎歸湯調理又有一宦室男子鼻血不止六脈洪數究竟云服丹藥太過遂用黃連黃芩大黃為末水煎服之愈　〔薛〕前證若熱鬱於胃

經用犀角地黃湯若伏暑於內用黃連香薷飲若大怒血蓄於上用小柴胡湯若脾損不能攝血歸源用歸脾湯大凡雜證見血多因陰分鬱熱或內有所傷皆屬五志內動經曰諸見血身熱脈大者難治是火邪勝也身涼脈靜者易治是正氣復也仍與後證同用　一婦人經素不調因怒衂血此肝火熾盛用加味小柴胡加紅花二劑血止又用加味逍遙散八珍湯兼服三十餘劑經行如期

一婦人鬱結而患前證用加味歸脾湯其血漸止飲食漸進用加味逍遙散元氣漸復寒熱漸止

後因怒仍衄寒熱往來用小柴胡湯（少陽太陽）加芎歸丹皮而愈　一婦人因勞衄血服涼血之劑更致便血或以血下爲順仍用治血余曰此因脾氣下陷而血從之當升補脾氣庶使血歸其經不信果血益其余朝用補中益氣（准加勞倦）夕用加味歸脾而愈此證用寒涼止血不補脾肺而死者多矣

刺薊散　治婦人鼻衄血流不止

刺薊（貳兩）　桑耳　亂髮灰

艾葉（少各壹兩）　生地黃（貳兩）　蒲黃（各壹兩）

右爲細末每服貳錢粥飲調下無時

伏龍肝散　治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆治之

伏龍肝　生地黃（各壹斤）　竹茹（壹升）

芍藥　黃芩　當歸

川芎　桂心　甘草（炙各貳兩）

右㕮咀以水壹斗三升煮竹茹減三升內藥煮取三升分爲三服千金方無桂心

有問有茅花湯以白茅花濃煎飲之立止

一方搗生白茅根取汁壹合飲之止

又方　取生葱心塞鼻中即定若因刺著斧刀斧所傷血不止者並用之立定

又方　取釜底墨細研入鼻中

又方　取亂髮灰細研以竹管吹入鼻中立止

又方　取龍骨爲末吹入鼻中立止

四物湯加側栢生地黃治虛熱吐血甚効若脾經血虛須用四君加芎歸若脾經氣鬱須用歸脾湯若肝腎虧損須用六味丸若氣血俱虛須用十全大補湯

犀角地黃湯　治熱鬱不解泛行經絡或流腸胃隨氣涌泄以致衄血吐血或爲便血並皆治之若實熱

熾甚加炒黃芩若去血過多或脾肺之氣虧損不能攝血歸源者急用四君子湯懷抱鬱結者用歸脾湯

枇杷葉散　治暑毒攻心衄血嘔血或吐瀉作渴黃連香薷飲亦可

吐血

夫婦人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於經絡內榮於臟腑若傷損氣血經絡則血虛行失於常理氣逆者吐血又怒則氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內傷氣逆上者皆吐血也 [附]治前證若脾經鬱熱用犀角地黃湯脾胃伏暑用黃連香薷飲心脾鬱熱用生地黃湯心氣耗損用茯苓補心湯脾氣勞傷用雞蘇散思慮傷脾用歸脾湯暴怒肝火用加味小柴胡湯又怒肝傷六味地黃丸脾肺虛熱用麥門冬飲肺腎虛熱用六味地黃丸氣血

俱虛用十全大補湯經云肺朝百脈之氣肝統諸經之血必用甘溫之劑補其陽氣使血各歸其經如大吐血病毋論其脈急用獨參湯救之若潮熱咳嗽而脈數者元氣虛而假熱之脈也皆由脾胃先損須用人參之類本草云人參治脾胃不足補中溫中爲瀉脾肺中火東垣先生云脾胃虛者心火亢甚而乘土後脾肺氣受邪須用黃芪最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理實治氣血脫歸脾十全大補最善若用寒涼止血胃氣反傷無不致禍 一老婦每作先飲食不進或胸膈不利或中脘作痛或大便作瀉或小便不利余以爲肝脾之證用逍遙散加山梔茯神遠志木香而愈後鬱結吐紫血每作先倦怠煩熱以前藥加炒黑黃連三分吳茱萸二分頓愈後因怒吐赤血甚多燥渴垂死此血脫也法當補氣乃用人參一兩茯苓當歸各三錢陳皮炮黑乾薑各二錢炙甘草木香各一錢一劑頓止又用加味歸脾湯調理而痊 一女子懷抱素鬱胸滿食少吐血面赤用六味丸及歸脾加山梔貝母芍藥而愈 一婦人爲哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水不行此悲傷肺思傷脾朝服補中益氣湯若病勞瘵加

桔梗貝母知母夕用歸脾湯送六味丸而愈

雞蘇散 治婦人吐血心煩昏悶

雞蘇葉壹兩 阿膠 刺薊
生地黃各壹兩 黃芪 羚羊角屑
茜根 甘草各半兩 麥門冬
黃芩 當歸 伏龍肝各半錢

右爲粗末每服四錢水一盞生薑三片竹茹半雞子大煎至六分去滓溫服

又方 治婦人虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉 黃芩各等分 當歸

赤芍藥(各半兩) 伏龍肝 阿膠(炒各半兩)
右爲粗末每服四錢水壹盞煎六分去滓溫服
治婦人熱毒上攻吐血不止
生藕汁 刺薊汁 生地黃汁(各三合)
生薑汁(半合) 白蜜(壹匙)
右和煎三兩沸以壹小盞調炒麪壹錢服無時
千金翼治吐血百方不瘥療十十瘥神驗不傳方(出此)
地黃汁(半升) 生大黃末(壹方寸匕)
右煎地黃汁三兩沸調大黃末令勻分爲三服

又方 伏龍肝研極細每服貳錢新汲水調下頻服取効
又方 白茅根(壹握長) 以水壹大盞煎七分去滓服
又方 桂心(末爲) 水調方寸匕日夜可二十服
又方 生地黃(壹斤) 阿膠(貳兩) 蒲黃(壹合) 以水五升煮取叁升分三服 予嘗治一人吐血診其脈弦氣口濡此因怒極而得之遂用蘇合香丸和雞蘇丸服即効養生必用方云凡吐血須煎乾薑甘草湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者服生地黃竹茹藕汁去生便遠

柔脾湯 治虛勞吐血衄血下白汗出方(出...)
甘草 白芍藥 黃耆(各壹兩)
熟地黃(叁兩)
右爲末每服四錢水酒各壹盞已上煎至七分去滓取清汁六分溫服食前 予嘗治一女人年十九歲月經不行以藥通之遂妄行血崩而諸藥不効察其人肥脈不大不小投以四生丸即安 又治一男子因飽低頭負重吐血諸藥無効亦投四生丸及青餅子即安更不發嘗觀初虞世治吐血不喜用竹茹生地黃藕汁然亦不可拘泥此說如陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢宜服涼藥以解之大黃犀角生地黃生艾藕汁等豈得無効若陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成氷宜服溫藥以煖之乾薑肉桂豈能無功學者更宜思之

四生丸 療吐血凡吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥
生荷葉 生艾葉 生柏葉 生地黃(各等分)
右爛研圓如雞子大每服壹丸水叁盞煎至壹盞去滓溫服無時候 陳日華云先公紹興初遊福

溝鹽石寺上僧留飲食將竟侍者見僧驚詫能來侍立見卓子不穩急蹲折穩之眾首即嘔血斗許發拗傷肺也明年再到寺問舊年嘔血者無恙否主僧云得四生丸服之愈自得此方屢施有驗 濟生

愚意山谷乃取其汁服之有效者入蘭父本宗下以倒補胃以治化虛否則虛火上炎金反受剋

療傷寒嘔血者以犀角地黃湯局方小三黃湯以白茅根煎湯飲之極妙

犀角地黃湯 治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑

芍藥一本錢 生地黃半斤 牡丹皮去心淨壹兩

犀角屑壹兩如無以升麻代

右㕮咀每服伍錢水煎服有熱如狂者加黃芩貳兩

膏餅子 治咯血

青黛 杏仁各壹兩

右處同研成膏熔黃蠟和作叁拾餅子每服壹餅子用乾柿半個夾定以濕紙裹煨令香同嚼粥飲下無時

乾薑甘草湯 若陰乘於陽心肺經寒而嘔血者宜服

甘草 乾薑各半兩

右㕮咀水煮頓服 局方理中湯亦妙

花蘂石散 予嘗見一婦人苦此疾百藥不效以童子小便和酒調下眞花蘂石散不數服而愈

烏金散 治吐血不已每服貳錢米飲下 方見生肌散後

濟生雞蘇散 治勞傷肺經唾中有血咽喉不利

雞蘇葉 黃芪炒 生地黃

阿膠炒 貝母 白茅根各壹錢

桔梗炒 麥門冬去心 蒲黃炒

甘草炙各伍分

右薑水煎服

生地黃散 治鬱熱衄血咯血吐血陰虛而不能愈者

枸杞子 柴胡 黃連炒

地骨皮 天門冬去心 白芍藥

甘草炒 黃芩炒 黃芪炒

生地黃 熟地黃自製各伍分

右水煎服 下血加地榆

三因茯苓補心湯 治面色黃悴五心煩熱咳嗽吐

血

半夏　前胡　紫蘇

茯苓　人參　枳殼麩炒

桔梗炒　甘草炒　乾薑各五分

當歸　川芎　陳皮

白芍藥各壹錢　熟地黃自製壹錢半

右薑棗水煎服

麥門冬飲子　治氣虛吐血或氣虛不能攝血

五味子拾粒　麥門冬去心　黃芪炒各壹錢

當歸身　人參　生地黃各錢半

右水煎服

十全大補湯　治胃氣虛弱吐血衄血便血不止以致外感惡寒發熱自汗盜汗食少體倦或寒熱作渴頭疼眩暈而似中風或氣血俱虛胸腹脇痛或骨節作痛經候不調或寒熱往來發熱晡熱或五心發熱口乾舌燥或痰嗽喘促胸膈虛痞或嘔吐泄瀉手足冷熱等證方見[illegible]門

積聚癥瘕

古方有五積六聚七癥八瘕之名五藏之氣積名曰積故積有五六府之氣聚名曰聚故聚有六經病未純言之詳矣若夫七癥八瘕則婦人居多七者火數屬心蓋血生於心八者木數屬肝蓋血歸於肝雖曰強分理似不混夫癥者堅也堅則難破瘕者假也假物成形古人將婦人病爲痼疾以蛟龍等爲生瘕然亦不必如此執泥婦人癥瘕並屬血病龍蛇魚鱉肉髮蝨瘕等事皆出偶然但飲食間誤中之留聚腹臟假血而成自有活性亦猶[illegible]中偶有[illegible]者腹中有一物其狀如魚即生瘕也與夫宿血停凝結爲痞塊雖內外所感之不同治法當以類相從所爲當審其意也如以散[illegible]治鱉瘕銅屑治龍瘕麴櫱治米瘕石灰治酒瘕如此等類學者可以理解也

大全良方分痃癖疝瘕八瘕腹中瘀血癥瘕食癥血癥凡七門痃者在腹內近臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀故名曰痃癖者僻在兩肋之間有時而痛故名曰癖疝者痛也瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃動也八瘕者黃瘕青瘕燥瘕血瘕脂瘕狐瘕蛇瘕鱉瘕積在腹內或腸胃

之間與臟氣結搏堅牢雖推之不移名曰癥言其病形可徵驗也氣聚為瘕言其氣痞塞不宜暢也傷食成塊堅而不移名曰食癥痰血成塊堅而不移名曰血癥若大腹中瘀血則積而不堅未至于成塊者也大抵以推之不動為癥推之動為瘕也至夫痃與癖則與痛俱痛即見不痛即隱在臍左右為痃在兩脅之間為癖在小腹而牽引腰脇為疝恐學者一時難了未免淆濫故總叙而條析之　張戴人過譙過一卒說出妻事戴人問其故答曰吾婦為室女時心下有冷積如覆杯按之如水聲以熱手熨之如冰娶來已十五年矣恐斷我嗣是故棄之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除孕可得卒從之戴人診其脈沉而遲尺脈洪大而有力非無子之候也可不踰年而孕其良人笑曰試之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白朮調中湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月而娠二子戴人嘗曰用吾此法無不子之婦此言不誣矣[illegible]　陽夏張主簿之妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五餘年後因性急悲感病益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不能坐臥鍼灸匝矣徒勞人耳乃邀戴人診之曰此肥氣也得之季夏戊巳日在左脇下如覆杯久不癒令人發痎瘧以瓜蒂散吐之魚腥黃涎約一二缶至夜繼用舟車丸通經散投之五更黃涎膿水相半五六行凡有積處皆覺痛後用白朮散當歸散和血流經之藥如斯湧泄凡三四次方癒[illegible]

薛新甫云婦人瘕痞癥瘕大抵因飲食起居七情失宜虧損臟腑氣血乖違陰絡受傷循行失度所致　羅謙甫云養正積自除必先調養使榮衛充實若不消散方可議下但除之不以漸則必有顛覆之害若不守禁忌縱情嗜慾其有不喪身者鮮矣　一婦人內熱作渴飲食少思腹內初如雞卵漸大四寸許經水三月一至肢體消瘦齒頰似瘡脈洪數而虛左關尤甚此肝脾鬱結之證外貼阿魏膏午前用補中益氣湯[illegible]午後用加味歸脾湯[illegible]兩月許肝火稍退脾土少健午前用補中益氣下六味丸[illegible]午後逍遙

散（綿裹）下歸脾丸又月餘日用蘆薈丸（本末二服）空心
以逍遙散下日晡以歸脾湯下善其護疾調理年餘
而愈　一婦人腹內一塊不時上攻或作痛有聲或
吞酸痞悶月經不調小便不利二年餘矣面色青黃
余以為肝脾氣滯以六君加芎歸柴胡炒連木香吳
茱各少許二劑却與歸脾湯送下蘆薈丸三月餘肝
脾和而諸證退又與調中益氣湯加茯苓牡丹皮中
氣健而經自調　一婦人性多鬱善怒勃於女工小
腹內結一塊或作痛或痞悶月經不調恪服伐肝之
劑內熱寒熱胸膈不利飲食不甘形體日瘦牙齦蝕

爛此脾土不能生肺金肺金不能生腎水腎水不能
生肝木當滋化源用補中益氣湯六味丸至仲春而
愈　一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之
類反兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如
帛所蔽余曰脾為諸陰之首目為血脈之宗此脾傷
五臟皆為失所不能歸於目也遂用補中益氣濟生
歸脾二湯專主脾胃年餘而愈　松江太守何恭人
性善怒腹結一塊年餘上腭蝕透血氣虛極時季冬
肝脉洪數按之弦緊或用伐肝木清胃火之藥余曰
真氣虛而邪氣實也恐伐肝木至春不能發生耳用

八珍湯以生氣血用地黃丸以滋腎水肝脉頓退因
大怒耳內出血肝脉仍大煩熱作渴此無根之火也
仍以前藥加肉桂二劑脉斂熱退復因大怒果卒於
季冬辛巳日乃金剋木故也

通治諸積　順氣丸　治三十六種風七十二般氣
去上熱下冷腰脚疼痛四肢困倦減食羸瘦顏色
赤黃惡瘡下疰口苦無味憎寒毛聳積聚氣塊男
子世事斷絕女子久無子息久患癱瘓發成勞疾
百節痠疼自嬰孩至百歲老人皆可服疎風順氣
補精駐顏

錦紋大黃（五兩一半生用一半蒸熟）　車前子（貳兩）
白檳榔（貳兩）　火麻子仁（貳兩微炒去殼另研入）
川牛膝（酒浸一夕）　郁李仁（泡去皮另研）　山藥
菟絲子（酒浸研焙各二兩）　山茱萸肉　防風
枳殼（麩炒）　獨活（各壹兩）
右為細末煉蜜丸如梧子大茶清粥飲下貳十丸
百無所忌空心臨臥服一月消食二月去腸內宿
滯三月無倦少睡四月精神強盛五月耳目聰明
六月腰脚輕健一年消百病如服藥臟腑微動以
羊肚肺羹補之

勝紅丸（易簡） 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積女人脾血積氣小兒食積

陳皮　青皮　京三稜

莪茂（醋煮各） 乾薑（炮） 良薑（炒各壹兩）

香附子（炒各） 一方加神麯麥芽

右為末醋糊丸如梧子大每服叁拾丸薑湯下虛者宜以補藥下之。

香稜丸（易簡） 治一切積聚破痰癖消癥塊

木香　丁香（各半兩） 三稜（酒浸壹夕）

枳殼（麸炒） 莪茂（細剉壹兩用巴豆叁拾粒去殼同炒待巴豆黃色去巴豆不用）

青皮（去白） 川楝子肉（炒）

茴香（炒各等分）

右為末醋煮麪糊丸如梧桐子大朱砂為衣每服二拾丸鹽湯或溫酒下無時

大消石丸　治七癥八瘕聚結杯塊及婦人帶下絕產腹中有癥瘕者當先下此藥和去癥瘕令人不困

消石（陸兩） 大黃（捌兩） 人參

甘草（各叁兩）

右為末以三年苦酒叁升置銅石器中先內大黃

微火熬微沸常攪不息至七分內餘藥復熬成膏至可丸即丸如梧桐子大每服叁拾丸米飲下三日一服婦人服之或下如雞肝或如米泔赤黑等物二三升後忌風冷

阿魏膏　治一切痞塊

羌活　獨活　玄參

官桂　赤芍藥　穿山甲

生地黃　兩頭尖　大黃

白芷　天麻（各伍錢） 槐柳桃枝（各叁錢）

紅花（肆錢） 木鱉子（拾枚去殼） 亂髮（壹團如雞子大）

右用香油二斤四兩煎黑去粗入髮煎髮化仍去粗徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各伍錢麝香叁錢調勻即成膏矣攤貼患處黃丹須用真正者方效凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥

八瘕　新漏曰八瘕者皆胞胎生產月水往來血脈精氣不調之所生也腎為陰主開閉左為胞門右為子戶主定月水生子之道胞門子戶主子精神氣所出入合於中黃門玉門四邊主持關元禁閉子精臍下

二寸名曰關元主藏兒瘕婦人之胞三焦之所從此然婦人經脉俞絡合調則月水以時來故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絕不通邪氣便得往來入合於臟若生血未盡而合陰陽即令婦人血脉攣急小腹重急支滿胸脇腰背相引四肢痠痛飲食不調結牢惡血不除月水不時或月前月後因生積聚如懷胎邪氣甚盛者令人恍惚多夢寒熱四肢不欲動陰中生氣腫內生風甚者小便不利苦痛如淋狀面目黃黑歲月久即不復生子也　齊氏曰經水氣住嗽之血上溢之若血不流則凝而為瘕也瘕者中癰硬而忽聚忽散多因六淫七情飲食起居動作而成當與痞癖諸瘕合治慎勿復多忌也

黃瘕者婦人月水始下若新傷墮血氣未止臥寤未定五臟六腑虛羸精神不足因向大風便利陰陽開闔關節四邊中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名為陰虛則生黃瘕之聚令人苦四肢寒熱身重淋露臥不欲食左脇下有氣結牢不可得抑若腰背相引痛月水不利令人不產小腹急下引陰中如刺不得小便或時寒熱下赤黃汁令人無子當刺[illegible]瘕下即瘉

皂莢散　療黃瘕方

皂莢一兩炙去皮子　蜀椒一兩汗　細辛一兩半

右搗散以三角囊大如指長二寸貯之內陰中欲便悶則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

青瘕者婦人新産未滿十日起行以浣洗太早陰陽虛玉門四邊皆解散子戶未安骨肉皆痛手臂不舉飲食未復內臟吸吸又當風臥不自隱蔽若居濕席令人[illegible]洒入腹煩悶沉淖惡血不除結熱不得散則生青瘕聚在左右脇下藏於背膂上與肩胛腰下攣急腹下有氣起喜唾不可多食四肢不欲動搖手足腫面目黃大小便難其後月水為之不通利或不復禁狀如崩中此自過所致令人少子療之當刺[illegible]以毒藥有法瘕當下即瘉

療青瘕導藥方

戎鹽一升　皂莢半兩去皮子炙　細辛一兩半

右搗散以三角囊大如指長二寸貯之內陰中但卧瘕當下青如葵汁養之如産法

燥瘕者婦人月水下惡血未盡其人虛憊而以夏月熱行疾走若舉重移輕汗出交流氣血未平而卒以

恚怒致腹中猥咽不泄經脉攣急內結不舒煩滿少
氣上達胸膈背膂少腹雍急月水與氣俱不通利
而反以飲清快心月水橫流溢入他臟不去有熱則
生燥瘕之聚大如半杯上下腹中苦痛還兩脇上
引心而煩害飲食欲嘔吐胃及腹中不得太息腰背
重喜淋溢汁足痠削久立而痛小便失時忽然自出
若失精月水閉塞大便澀難病如此者其人少子療
之以長鍼按而刺之法度行以毒藥瘕當下即愈

療燥瘕方聖惠

大黃如雞子 乾薑[illegible] 黃連[illegible]

雞膍胵中黃皮[illegible] 厚朴[illegible] 桂心壹尺

䗪蟲[illegible] 郁李仁[illegible]

右搗散早朝空腹以溫酒[illegible]和方寸錢頓服瘕當
下畢養之如產婦法三月勿合陰陽無子者當有

血瘕 婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過
[illegible]不盛溢入他臟若大饑寒吸吸不足呼吸未
調而自勞動血下未定左右走腸胃之間留絡不去
內自寒熱與月水合會為血瘕之聚令人腰痛不可
以俛仰橫骨下有積氣牢如石少腹裏急苦痛背膂
疼深達腰腹下攣陰裏若生風冷子門僻月水不時
乍來乍不來此病令人無子療之瘕當下即愈

療婦人血瘕痛方聖惠

乾薑 烏鰂魚骨[illegible] 桃仁[illegible]

右搗散酒服二方寸匕日二 一方無桃仁

又方 取古鐵秤鎚或大斧頭或鐵杵以炭火燒令
赤投好酒三升中飲之

療婦人血瘕攻刺腹脇時痛導藥方

大黃 當歸各半兩 山茱萸

皂莢[illegible] 細辛 戎鹽[illegible]錢半

右搗以香脂丸如指大每用一丸綿裹內陰中正

坐良久瘕當下養如乳婦法

桃仁煎 治婦人血瘕血積經候不通

桃仁 大黃[illegible]壹 虻蟲[illegible]

川朴硝[illegible]

右四味為末以醇醋[illegible]升半銀石器中慢火煎取
[illegible]桃仁等不住手攪[illegible]可
丸下朴硝攪勻[illegible]丸如梧桐子大[illegible]不用
吃晚食[illegible]用溫酒吞下五丸日午取下如赤
豆汁或如雞肝蝦蟇衣之狀未下再作如鮮血來
即止續以調補氣血藥補之 [illegible]

貴宦女患小便不通臍腹脹不可忍衆醫皆作淋
治以八正散之類愈甚予診之曰此血瘕也非瞑
眩藥不可去用此藥更初服至日午大痛不可忍
遂卧少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁一
二升痛止得愈　此藥治病的切然猛烈傷人氣
虛血弱者不可輕用也

三稜煎（各選）　治婦人血瘕血癥食積痰滯

三稜　莪茂（各貳兩）　青橘皮（去白）
半夏　麥芽（炒各壹兩）

右用好醋六升煮乾焙爲末醋糊丸如梧桐子大

每服三四十丸淡醋湯下痰積多薑湯下

脂瘕 者婦人月水新來若生未滿三十日以合陰陽
絡脈分胞門傷子戶失禁關節散五藏六腑津液流
行陰道瞤動百脈關樞四解外不見其形子精與血
氣相遇犯禁子精化不足成子則生脂瘕之聚令人
支滿裏急痛痺引少腹重腰背如刺狀四肢不舉飲食
不甘卧不安左右走腹中切痛時痛脇下或時少
氣頭眩身體解㑊苦寒惡風膀胱脹月水乍來乍去
不如常度大小便血不止如此者令人無子療之當
以長鍼行以毒藥瘕當下即愈

療脂瘕方（出聖惠）

皂莢（去皮子炙錢半）　礬石（燒錢貳）　五味子
蜀椒（去目）　細辛　乾薑（各半兩）

右搗散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰陽
不三行其瘕即愈

導散方（出聖惠）

皂莢（炙去皮子）　吳茱萸　當歸（各壹兩）
蜀椒（去汗）　乾薑　大黃
戎鹽（各貳兩）　細辛（熬）　礬石（燒）
五味子（各十銖）

右搗篩爲散以輕絹袋如指大長三寸成藥令滿
內陰中坐卧隨意勿行走小便時去之別換新者

狐瘕 者婦人月水當日數來而反悲哀憂恐若以遠
行逢暴風疾雨雷電驚恐衣被沉濕罷倦少氣心中
恍惚未定四肢懈惰振寒若寤寐氣絕精神遊亡邪
氣入於陰裏不去則生狐瘕之聚令人羸瘦月
水閉不通少腹瘀滯胸脇腰背痛陰中腫小便難胞
門子戶不受男精不成氣盛令人嗜食欲嘔喜唾多
所思如有身狀四肢不舉有此病者終身無子其瘕
有手足成形者殺人未成者可療以長鍼急持刺之

行以補藥有法瘕當下即瘉

療狐瘕方

右取新死鼠一枚，裹以新絮，塗以黃土，穿地坎，足沒鼠形，置其中，桑薪火灼其上，一日一夜出之，研為末，內桂心末貳錢半，酒服二方寸匕，瘕當下。甚者不過再服瘥。

蛇瘕者，婦人月水已下，新止，適閉未復，胞門子戶勞傷，陰陽未平，榮衛分行，若其中風暴病羸劣，飲食未調，若起行當風，及度泥塗，因衝寒太早，若坐濕地，名陰陽亂，腹中虛，若遠行道路，飲污井之水，食不潔之食，吞蛇鼠之精，留絡不去，因生蛇瘕之聚，上食心肝，長大，其形若漆，在臍上下，還疗左右脇，不得吐氣，兩股脛間苦疼，少腹多熱，小便赤黃，膀胱引陰中攣急，腰背亦痛，難以動作，喜發寒熱，月水或多或少，有此病者，不復生子，其瘕手足成形者殺人，未成者可治。

療蛇瘕方

大黃　黃芩　芒硝各半兩

甘草大如指一尺，炙　烏賊魚骨二枚　皂莢六枚，去皮子，酥炙

右細切，以水六升，煮之三沸，絞去滓，下硝，適寒溫服之，下日一劑，空腹服之，瘕即下。

鼈瘕者，婦人月水新至，其人劇作罷勞，汗出衣服潤濕，不以時去之，若當風睡，足踐濕地，恍惚覺悟，蹠立未安，顏色未平，復見所好，心為之開，魂魄感動，五內脫消，若入水浣洗沐浴，不以時出，而神不守，水精與邪氣俱入，至三焦之中，幕下門先閉，津液不行，留絡不去，因生鼈瘕之聚，大如小柈，令人少腹內切痛，惡氣左右走，上下腹中苦痛，若存若亡，持之躍手，下引陰裏，腰背亦痛，不可以息，月水不通，面目黃黑，脫聲少氣，有此病者，令人絕子，其瘕有手足成形者殺人，未成者可治。療有法度，以長鍼按療之，行以補藥，瘕當下即瘉。

療鼈瘕方

大黃　乾薑　側子

附子　人參　䗪蟲

桂心　細辛　土瓜根

白朮

右搗散，以酒服方寸匕，日三。

治鼈瘕及心腹宿癥，或卒得癥。

右以白雄雞屎熬，不問多少，小便和之，於器中火上

煞令燥末服方寸匕多服不限度以當熱飯飼猫

住。

癥瘕 婦人癥瘕由飲食失節脾胃虧損邪正相搏積於腹中牢固不動有可徵驗故名曰癥氣道壅塞故名曰瘕得冷則發冷入子臟則不孕入胞絡則月水不通。當兩審之若脾胃虛弱用六君子加芎歸方見若肝脾虛弱用補中益氣湯及歸脾湯若肝火鬱滯佐以蘆薈丸地黃丸外貼阿魏膏患者須慎七情六淫飲食起居治者不時審察病機而藥之庶幾有効

積聚癥瘕

穿山甲散 治婦人癥瘕及惡血氣攻心腹疼痛面無顔色四肢瘦弱。

女科二 六十四

穿山甲灰炒 鱉甲醋炙 赤芍藥

大黃炒 乾漆炒令煙盡 桂心各壹兩

川芎 芫花醋炒 當歸各半兩

麝香一錢細研

右爲細末入麝和勻每服壹錢熱酒調下無時

蓬莪茂丸 治婦人癥瘕腹脇妨痛令人體瘦不思飲食

莪茂一錢半 當歸焙 桂心

赤芍藥 檳榔 昆布[illegible]

琥珀研 枳殼 木香[illegible]

桃仁 鱉甲 大黃[illegible]

右爲末煉蜜丸如梧子大食前米飲下二十丸

丁香丸 治婦人癥瘕結塊不散心腹疼痛

雄雀糞炒黃 鱉甲[illegible] 硇砂

當歸[illegible] 芫花醋炒 巴豆[illegible]

右爲末研令勻醋煮麵糊丸如小豆大當歸酒下叁丸

積聚癥瘕

桃仁散 治婦人癥瘕心腹脹滿不能飲食體瘦無力

女科三 六十五

桃仁湯浸去皮尖 訶子皮

白朮 赤芍藥 當歸[illegible]

京三稜[illegible] 鱉甲[illegible] 陳皮[illegible]

右爲散每服叁錢水壹盞入生薑[illegible]錢叁分煎至六分去滓食前稍熱服

右方皆攻積之藥所多獲得用者慎之如薛氏

食癥 婦人臟腑虛弱月候來時食生冷之物脾胃既虛不能消化與臟氣相搏結聚成塊日漸生長盤牢不移故謂之食癥。當兩審若形氣虛弱須先調

補脾胃爲主而佐以消導若形氣充實當先疏導爲主而佐以補脾胃若氣壅血滯而不行者宜用烏藥散散而行之（烏藥 莪朮醋浸炒 桂心 當歸 桃仁 青皮 木香各等分爲末每服二錢熱酒調下）脾氣虛而血不行者宜用四君芎歸補而行之（方見□□）若脾氣鬱而不行者宜用歸脾湯（雜症健忘）解而行之若肝脾血燥而不行者宜用加味逍遙散（雜症發熱）清而行之大抵食積痞塊之證爲有形蓋邪氣勝則實真氣奪則虛當養正辟邪而積自除矣雖然堅者削之客者除之胃氣未虛或可少用若病久虛弱者不可輕試也

磠砂丸（今夫）治婦人食癥久不消令人瘦弱食少

磠砂　青礞石　穿山甲（炙）
三稜（炮）　乾漆（炒令煙盡）　硫黃（各半兩）
巴豆（三十粒去皮心出油）

右爲末用軟飯丸如小豆大每服五丸生薑橘皮湯下

礞石丸（今夫）治婦人食癥塊久不消攻刺心腹疼痛

青礞石（五錢）　巴豆（去皮心出油）　朱砂
穿山甲（□□）　木香（各二錢半）　磠砂（半兩）

右研令停以糯米粥和丸如綠豆大每服二丸空心溫酒下取下惡物爲度

右方犯磠砂巴豆非胃氣強壯而積氣堅頑勞不兩立者不可輕用也

小三稜煎丸　治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及一切積滯不消心腹堅脹痰飲嘔噦噎酸脇肋刺痛脾氣橫泄

三稜　莪朮（各四兩）　芫花（一兩）

右入瓷器中用米醋五升浸滿封器口以灰火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微焦同稜朮焙乾爲末醋糊丸如綠豆大每服拾五丸生薑湯下婦人血分男子脾氣橫泄腫滿如水桑白皮煎湯下

血癥　婦人寒溫失節臟腑氣虛風冷在內飲食不消與血氣相結漸生顆塊盤牢不移動者是也皆因血氣勞傷月水往來經絡痞塞惡血不除結聚所生久而不消則心腹兩脇苦痛害於飲食肌膚羸瘦〇此何以知是血癥曰血之外證脊骨間煩[illegible]癥瘕[illegible]多骨熱肢冷其結在下焦者必臍下結[illegible]血熱內燥其脈洪而數也桃仁當歸生地黃牛膝大黃牡丹皮茯苓逐之　愚謂前證多兼七情虧損五臟氣

血弗運而致益氣以嘘之血主濡之脾統血肝藏血故鬱結傷脾恚怒傷肝者多患之腹脇作痛正屬肝脾二經證也洪舊云血積宜除東垣云人以胃氣為本治法當主於助元氣而佐以攻伐之劑必審之誠用若則速效攻以峻劑反致有誤

加減四物湯　當歸丸

引用散

大黃煎　治婦人血瘕血瘕食積痰滯

川大黃　鱉甲　牛膝

乾漆

右為末用米醋一升煎為膏每服一錢食前熱酒調下

腹中瘀血

婦人月經否澁不通或產後餘穢未盡因而乘風取涼為風冷所乘血得冷則成瘀血也血瘀在內則時時發熱面黃瘀久不消則為積聚癥瘕矣若鬱結傷脾用加味歸脾湯若恚怒傷肝用加味逍遥散若產後惡露用失笑散若肝脾虧損用六君柴胡以補元氣為主若胃氣虛弱用補中益氣湯加茯苓半夏為主大凡腹中作痛畏手按者此內有瘀血若形體如常偶病氣元氣俱實者用桃仁承氣湯直下之若痛而按之不痛急飲食少思此脾胃受傷屬形病不足元氣不足也當用補中益氣湯和之若痛而按之形體倦怠飲食少思此形氣病氣俱不足用六君炮薑芎歸純補之若痛而大便不實飲食難化此脾腎虛寒用六君炮薑肉果溫補之若痛而作嘔少食此脾胃虛寒用六君炮薑木香若痛而嘔吐不食泄瀉用六君加薑桂若兼手足逆冷自汗更加附子此證多有因攻伐而致者

調經湯　治瘀血不消臍腹引腰背俱痛

川芎　當歸　芍藥

地黃　生薑　三稜

莪朮　白芷　延胡索

蒲黃　香附子　澤蘭葉

細辛　川白芍　厚朴

半夏　甘草　辣桂

桃仁

右剉散每服五錢薑棗煎食前服

川當歸散　理榮衛消瘀血出聲音治痰嗽

川當歸　牡丹皮　白芍藥

子芩　木通　華陰細辛
麥門冬　甘草炙各半　生地黃二兩
右㕮咀每服叁錢水壹盞薑叁片煎至七分去滓
溫服
大黃湯　治婦人血瘀不消及撲損血瘀
大黃　桃仁去皮尖麩炒　官桂去粗皮
郁李仁各半兩　生薑　地黃各壹兩
右麤搗篩每服叁錢水酒各半盞同煎至七分去
滓溫服
琥珀散　治婦人經絡否塞腹內瘀血痛不可忍

琥珀　乳香　沒藥
右三味各研取細末伍錢每服貳錢水酒各半盞
煎至七分入地黃自然汁貳合再煎數沸去滓入
溫調服不拘時候
地榆散　治敗血
何首烏　肉桂　地榆
芎白芷各等分
右為細末每服貳錢米泔壹盞半沙糖壹小塊煎
至八分去滓服空心食前
又治產後消瘀血　以生藕汁飲之　以琥珀刮屑

水服之　瘀血不散變成癥搗生藕蘭葉取汁一
升服之　除腹中宿血以乾柿多食之　破宿血
用磨石燒黑熱投酒中飲之　紫荊木濃煮服之
痃癖論　痃者在腹內近臍左右各有一條筋脉急痛
大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀名曰痃也
癖者為僻側在兩肋之間有時而痛故曰癖也二者
皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯不得宣流邪冷之
氣搏結不散得冷則發作疼痛
麝香丸　治婦人痃癖冷氣兼疰氣心腹痛不可忍
麝香半兩別研　阿魏貳錢半麵裹煨令麵熟

五靈脂　桃仁　三稜各柒錢半
芫花醋炒　檳榔各壹兩　莪朮
桂心　沒藥　木香
當歸各半兩
右為細末入麝香令勻粳米軟飯為丸如梧桐子
大每服拾丸無時淡醋湯下
治婦人痃癖及血氣等神効方
右以豬肝壹具可及十兩者用巴豆伍拾枚去
大皮札在肝內用釅醋叁碗慢火熬肝極爛入京
三稜末和就得所為丸如梧桐子大每服伍丸食

前熱酒下肝熱後去巴豆不用　夫痃癖癥瘕血氣塊硬發歇刺痛甚則欲死究而言之皆血之所為僕嘗治一婦人血氣刺痛極不可忍其血死一二日方省醫巫併治數年不愈僕以葱白散烏雞丸遂安又嘗治一婦人血氣作楚如一小盤樣走注刺痛要一人伏定方少止亦用此二藥而愈尋常小小血氣用此二藥亦有奇効故錄于後

葱白散　專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻衝疼痛大治婦人胎前後腹痛胎不安或血刺痛者兼能治血臟宿冷百節倦痛肌體怯弱勞傷帶癖久服盡除但婦人一切疾病最宜服此

川芎　當歸　枳殼
厚朴　桂心　乾薑
芍藥　舶上茴香　青皮
苦楝子　木香　熟地黃
麥牙　三稜　莪茂
茯苓　神麯　人參各等分

右為細末每服三錢水一盞連鬚葱白二寸拍破鹽半錢煎至七分內大黃訶子宜相度病狀如大便不利入大黃同煎不入鹽如大便自利入訶子煎　朱先生云此藥大治心氣脾疼用之見効僕嘗以此藥治浮腫立効陳方人病血氣作楚痛不可忍服諸藥無効召僕診之兩關脉沉弱為肝脉沉差緊此血氣漸成痃癖也只以此二藥治之愈　四明馬朝奉後院亦病此用二藥亦愈

烏雞煎丸　方見前治諸疾

四等丸　出必用　治婦人痃癖氣心腹疼痛飲食不消一

川大黃剉碎微炒　訶梨勒去核　檳榔
木香

右各等分為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每食前以生薑橘皮湯下拾五丸溫酒亦得

又方

鼈甲醋炙黃去裙襴　川大黃剉微炒　京三稜炮裂各等分

右為末醋煮麪糊丸如梧桐子大每食前以生薑湯下拾丸

木香硇砂丸　治婦人痃癖積聚血塊刺痛脾胃虛冷宿食不消久不瘥者

木香　硇砂　丁香
官桂　附子炮　乾漆炒煙盡
細墨　大黃剉碎為末　乳香研

廣茂 青皮 京三稜
沒藥(研) 豬牙皂角 乾薑(炮各等分)
巴豆霜(減半)
右除硇砂乳香沒藥外同爲末以好醋一盞化開
硇砂去滓銀器中慢火熬去下巴豆霜大黄熬成
膏將前藥末與膏子爲丸如麻子大每服三五拾
丸食後溫酒送下加至大便利爲度
當歸散(聖惠) 治婦人疝瘕氣攻心腹痛不能飲食
當歸(剉微炒) 檳榔(各三分) 木香
桂心 陳橘皮(湯浸去白) 京三稜

郁李仁(去皮微炒各壹兩) 桃仁(去皮尖麩炒黃) 吳茱萸(湯泡柒次焙乾)
右件爲麤散每服參錢水壹中盞煎至六分去滓
不計時候稍熱服
右方皆攻積之劑全無補性虛人禁用實者亦須
以四物湯藥兼服乃可
疝瘕 良按婦人疝瘕由飲食不節寒溫不調氣血勞傷
臟腑虛弱風冷入腹與血相結所生疝者痛也瘕者
假也結聚浮假而痛推移乃動也婦人之病有異於
丈夫者或因產後血虛受寒或因經水往來取冷過
度非獨因飲食失節多挾於血氣所成也其脈弦急
者生虛弱小者死尺脈澀而浮牢爲血實氣虛其發
腹痛逆氣上行此爲胞中有惡血久則結成血瘕也
愚按子和云遺溺閉癃陰痿脬痺精滑白淫皆男子
之疝也若血涸月事不行行後小腹有塊或時動移
前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之
疝而謂之瘕 一婦人小腹痞脹小便時下白帶小
水淋瀝此肝經濕熱下注用龍膽瀉肝湯而愈 一
婦人小腹脹痛小水不利或胸乳作痛或脇肋作脹
或氣逆心忡余以爲肝火而血傷脾用四物柴胡青

皮玄胡索木香而愈 一婦人小腹痞悶小便不利
內熱體倦懶食用八珍湯加柴胡山梔龍膽草治之
而安
乾漆散 治婦人疝瘕久不消令人黃瘦尪羸兩脇
妨悶心腹疼痛
乾漆(炒令煙盡) 木香 芫花(醋炒)
赤芍藥 桂心 當歸
川芎 琥珀(各半兩研) 大黃(炒剉壹兩)
牛膝(去苗柒錢半) 桃仁(去皮尖研) 麝香(壹錢半)
右爲細末每服不拘時溫酒調下壹錢

當歸散　治婦人癥瘕及血氣攻刺心腹疼痛不可忍

鼈甲 醋炙黃貳兩　當歸 炒剉微　桂心

檳榔　川大黃 剉微炒各壹兩　川芎

吳茱萸 湯泡七次焙乾炒　木香　青橘皮 去白各半兩

蓬莪茂　赤芍藥　桃仁 湯浸去皮尖麩炒微

已上各柒錢伍分

右為散每服叁錢水壹盞煎至陸分去滓稍熱服不計時候

硇砂丸　治婦人痃癖及積聚血在臟腑攻腹脇疼痛

川芒硝　硇砂 各壹兩　當歸

雄黃　桂心 各半兩　大黃 炮

三稜 各貳兩

右為細末米醋壹盞熬大黃末為膏次入餘藥末和丸如梧桐子大空心溫酒下拾丸漸漸加至貳拾丸以利下惡物為度

巴豆丸　治婦人痃瘕及血氣疼痛

巴豆 去皮心醋煮半錢　硇砂　大黃 炒各壹兩

五靈脂　桃仁 各柒錢半　木香 半兩各為末

煉蜜丸如菉豆大淡醋湯空心下伍丸熱酒亦可

黑神丸

神麯　懷香 各肆兩　木香

椒 炒香出汗　丁香 各半兩　檳榔 肆枚

漆 陸兩半生半用重湯煮半日令香

右除椒漆五物皆半生半炒為細末用前生熟漆和丸如彈子大用懷香末拾貳兩鋪陰地陰乾候外乾并懷香收器中極乾去懷香腎餘育腸膀胱痃癖及癥瘕五膈血崩產後諸血漏下赤白並壹丸分四服死胎壹丸皆綿裹酒下難產炒葵子四十九粒擣碎酒煎下壹丸諸疾不過三服痃氣十服膈氣癥瘕五服血瘕三丸當瘥　予族子婦病腹中有大塊如杯每發痛不可忍時子婦已貴京下醫者皆莫服藥莫愈予應之曰此血瘕也投黑神丸三丸杯氣盡消終身不作

蟠葱散　治婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇膀胱小腸疝氣及婦人血氣撮痛

延胡索　肉桂　乾薑 各貳兩

甘草 炒　蒼朮 米泔浸　縮砂

丁皮　檳榔 各肆兩　莪茂

三稜　茯苓　青皮各等分

右為末每服叁錢水壹盞連鬚葱白壹莖煎空心熱服

寶鑑蒺藜湯　治陰疝小腹作痛小便不利手足逆冷或腹脇悶痛

蒺藜去刺　附子炮　梔子去皮各半兩

右末每服叁錢水煎溫服食前

丹溪定痛散　治寒疝疼痛速効

枳殼拾伍枚　山梔子炒　棠毬子

吳茱萸炒過　荔枝核炮各等分

右為末用長流水調下壹貳錢空心服

肥兒丸方　治疳癖肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口乾作渴或肚腹食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等症

黃芩　胡黃連　黃連炒焦

木香　白蕪荑炒　青皮各等分

當歸　茯苓　陳皮各壹兩

甘草炒伍錢

右為末米糊丸梧子大每服柒捌拾丸米飲下

心腹脹滿

夫婦人心腹脹滿者由臟腑久冷氣血虛損而邪氣客之乘於心脾故也足太陰脾之經也脾虛則腹足少陰腎之經也其脈起於小指之下斜趨足心入腹中上股內後廉貫脊絡膀胱從腎上貫肝膈入肺中其支者從肺出絡於心臟邪氣客於二經與正氣相搏積聚在內氣併於脾脾虛有熱故令心腹脹滿而脹也診其脈[illegible]浮者脹滿也　[illegible]前證脾胃虛痞用六君子湯[illegible]　脾胃虛寒者用人參理中湯鬱結氣滯者用歸脾湯[illegible]　肝脾血虛用六君柴[illegible]脾氣鬱滯用平胃散[illegible]肝氣鬱滯用紫蘇飲宿食停滯用香砂六君湯肝血虛痞用四物湯加參朮[illegible]

一婦人胸膈不利飲食少思服寬中破氣或用疏利之藥反致中滿不食予以為脾土虛而肝木侮用補中益氣湯[illegible]加砂仁香附煨薑又以六君子加芎歸桔梗而愈

[illegible]治史[illegible]年[illegible]久病之後遇事拂意忽胸腹脹滿面目微腫兩脈[illegible]滯氣逆上乳[illegible]服[illegible]氣之劑不效予曰此脾肺虛寒也先用六君子湯一劑病勢頓減後用補中益氣加茯苓半夏乾薑二劑形體頓安後以七

情失調夜間腹脹乃用十全大補湯加木香治之而
痊

白术散　治婦人脾胃氣虛心腹脹滿不欲飲食四
肢無力

白术　草果仁　訶子肉各叁分
赤茯苓　檳榔　桂心各半兩
陳皮　厚朴　人參各壹兩
甘草[illegible]分

右為粗末每服四錢水壹鍾薑叁片棗壹枚煎至
七分去滓食前熱服

檳榔散　治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

檳榔　前胡　川芎
青皮[illegible]錢半　赤芍藥　桂心
大黃　桔梗　木香
枳殼各半兩　甘草炙錢半

右㕮咀每服四錢薑叁片煎至柒分去滓溫服

木香湯　治[illegible]

木香　桂心　白术
乾薑[illegible]　陳皮去白　草果仁
訶梨勒　人參各[illegible]　神麯[illegible]

甘草炙半兩

右為細末每服壹錢茶清點熱服

補遺治心腹脹滿予嘗獨用厚朴薑汁炒過每服伍
錢薑七片水煎溫服不拘時候間服沉香降氣湯
待效見資生經
[illegible]分心氣飲亦妙方見雜病氣　三脘散亦妙[illegible]

嘈雜

大夫婦人心胸嘈雜此脾胃鬱火滯痰血液淚汗而成用猪血炒食之乃以血導血使之歸源爾旋覆花湯尤善　薛前證若因食鬱用六君山查山梔若因胃熱用二陳薑炒芩連若因六鬱用越鞠丸[illegible]若因氣滯用四七湯[illegible]桔梗枳殼大抵此證屬病氣元氣俱不足須用六君爲主少佐以治痰之藥若以水治之必變吞酸中滿　一婦人飲食少思胸中嘈雜頭暈吐痰此中氣虛而有熱用六君子湯加炒黑山梔桔梗而愈後因勞碌頭暈發熱吐痰用補中益氣湯加半夏茯苓天麻而痊　一婦人中脘嘈雜口中辛辣或咳嗽吐痰發喘面色或白或赤此脾氣虛而肺中伏火也用六君子加山梔桔梗柴胡及炒黑片芩治之尋愈　一婦人嘈雜吞酸飲食少思大便不實此脾氣虛寒而下陷用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑漸愈又常服人參理中丸即安　一婦人飲食後嘈雜吞酸此食鬱爲痰用六君子湯送越鞠丸漸愈又用加味歸脾湯而痊後因怒兩脇脹痛中脘作酸用四君子湯送左金丸漸安仍用六君子湯送越鞠丸而痊

旋覆花湯　治婦人心胸嘈雜中脘痰飲冷氣心下汪洋口中清水自出脇肋急脹滿痛不欲飲食

旋覆花　人參　桔梗
白芍藥（各一錢）　橘皮（去白）　赤茯苓
半夏（各八分）　官桂（去粗皮）　細辛
甘草（各五分）

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

補遺　常以參蘇飲二分四物湯一分交和每四錢生薑七片煎服治一婦人心胸嘈雜而愈亦名茯

苓補心湯

小便淋瀝

婦人淋瀝由腎虛而膀胱熱也蓋膀胱與腎為表裏主於水行於脬者為小便也若腎虛則小便頻數膀胱熱則小便淋瀝甚則不通腹脹喘急當速治之

若前症若膀胱熱結用五淋散若脾肺虛熱用補中益氣湯方見經候加山藥五味麥門若脾經鬱熱用加味歸脾湯方見師尼寡婦若肺經鬱火用黃芩清肺飲若肝經濕熱用龍膽瀉肝湯方見陰腫血虛用加味逍遙散方見經候陰虛用六味丸方見虛勞加柴胡山梔大抵不渴而不利者熱在下焦血分也用滋腎丸渴而不利者熱在氣分也用清肺飲大脈數而無力者陰火盛而陽不能化也用六味丸滋腎丸為主尺脈浮而無力者陽氣虛而陰不能生也用加減八味丸方見虛勞滋腎丸為主

一婦人素有前患內熱體倦余以為肝火血少脾氣虛弱用八珍逍遙二散兼服月餘而小便利又用八珍湯而血氣復

一婦人患前症發熱煩躁服諸淋藥小腹重墜余以為肝經氣滯而血傷用山梔川芎煎服而愈

一婦人小便不利小腹并水道秘悶或時腹脅脹痛余以為肝火用加味逍遙散加龍膽草四劑稍愈乃去膽草佐以八珍散加炒黑山梔兼服而瘥

石韋散 治婦人小便卒然淋瀝

石韋 黃芩 瞿麥穗
榆白皮 木通 葵子各一錢半
甘草半錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木通散 治婦人五淋

木通 榆白皮 瞿麥穗
大麻仁 滑石各壹兩 葵子
貝齒 白茅根各貳兩 甘草半兩

右為粗末每服五錢水煎空心溫服

桃膠散 治婦人氣淋勞淋

桃膠 榆白皮各壹兩 車前子
冬瓜子 鯉魚齒 葵子
苦參 木通各半兩 枳殼貳錢半

右㕮咀每服四錢水壹盞煎至七分去滓溫服

不去散 治婦人諸淋

右海金沙草陰乾為末煎生甘草湯調服二錢

又方 真琥珀研末不以多少 研木香白湯調下此一方出聖濟總錄方

雞蘇散 治婦人血淋

雞蘇葉 木通各貳兩 生乾地黃

滑石各叁兩 刺蘜根壹兩

右爲粗末每服半兩水盞半笙竹葉叁七片煎至七分去滓食前温服

治婦人血淋及尿血澁痛方

生乾地黄 鬱金 蒲黄各貳兩

右爲細末每服貳錢車前子葉煎湯調下以利爲度

亦有血瘕似淋小便不通臍腹脹滿宜桃仁煎方見積聚門

後有用亂髪方治脬轉不得小便亦可治血淋尿血

火府丹 治心經熱小便澁及治五淋加甘草爲㕮咀煎名導赤 女科二 仝六

生地黄貳兩 木通 黄芩各壹兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸木通煎湯下兼治淋瀝臍下滿痛 許學士云壬戌年一卒渴病一日飲水一斗不食者三月心中煩悶時已十月予謂心經有伏熱與此藥數服越二日來謝云當日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂通變也

治婦人諸般淋

苦杖根俗呼爲杜牛膝多取洗淨剉碎取壹合用水伍盞煎至壹盞去滓用麝香乳香少許調下鄞縣武尉耿夢得其內人患沙石淋者十三年每㵎痛楚不可忍溺器中小便沙石剝剝有聲百方不効偶得此方服之一夕而愈目所親見也

局方五苓散 八正散 清心蓮子飲皆可用

滋腎丸 治熱在血分不渴而小便不利或腎虚足熱腿膝無力不能履地又下焦陰虚小便不利肚腹腫脹或皮膚脹裂眼睛突出此神劑也

知母 黄檗各貳兩酒炒 肉桂去皮貳錢 女科三 仝七

右各另爲末水丸如桐子大每服貳百丸空心百滚湯下

黄芩清肺飲 治肺熱小便不利宜用此藥清之

黄芩炒 山梔各壹錢

右水煎服不利加鹽豉貳拾粒

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或成砂石或如膏汁或熱怫便血

赤茯苓壹錢半 赤芍藥 山梔各壹錢

當歸 甘草各壹錢貳分

右入燈心水煎服

脬轉不得小便

夫婦人脬轉之病者由脬爲熱所迫或忍小便俱令水氣迫於脬屈辟不得充張外水應入不得入內溲應出不得出內外壅滯脹滿不通故爲脬轉其狀少腹急痛不得小便甚者至死不可治也 隨前證不問男女孕婦轉筋小便不利命在反掌非八味丸不能救餘緣前後論中治 一婦人小便淋瀝小腹脹悶胸滿喘急諸藥不應余視爲轉脬之證用八味丸料煎服小便即利而痊 一婦人因鬱怒小便滴瀝漸至小腹腫脹痰咳喘促余用八味丸料煎服小便即利而痊

大滑石散 下全 治婦人丈夫脬轉小便數日不通

滑石 壹兩　寒水石 貳兩　葵子 壹合

右爲末以水壹斗煮取伍升時時服壹升即利

又方

亂髮 燒灰存性　葵子　車前子 各等分

右爲細末每服貳錢茶湯調下

葵葉散 治婦人脬轉小便不通亦可治男子

燒乾葵葉 燒灰存性壹兩　滑石 研細半兩

右研停沸湯調貳錢服

石韋湯 治證同前

石韋 去毛　車前子 各等分

右爲麄末每服伍錢水貳盞煎至壹盞去滓服

治婦人忍小便不得依時而起致令脬轉經四五日困篤欲死

滑石 貳兩　亂髮灰 壹兩

右研停取桃白皮壹斤熟搗以水叁盞絞取汁無時溫半盞調壹錢服

又方 以滑石末葱湯調下貳錢服

千金翼方 治婦人不得小便

杏仁 去皮尖 炒去　右一味麩炒黃細末水調服立通

又方 以紫菀爲末井華水調取末指撮立通又云紫苑皆可用

若脬暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲死此由暴氣傷脬脬或從變脬氣無所伸轉閉而不流氣衝脬系不正診其脉右手澁小左手急大宜葱白湯

葱白湯方

橘皮 叁兩　葵子 壹兩　葱白 壹莖

右㕮咀以水伍升煮取貳升分三服 出指迷方

神遺紫金皮爲末葱湯調下貳錢葵子湯亦可
又方 胞轉小便不通炒鹽半斤囊之乘熱熨小腹
薛滋腎生肝飲
山藥 山茱萸肉各壹錢 熟地黃自製貳錢
澤瀉 茯苓 牡丹皮各柒分
五味子杵炒伍分 柴胡叁分 白朮
當歸 甘草各叁分
右水煎服
八味丸 治脬轉小便不通殊有神効但世所不用以致誤人多矣方見雜病虛勞

一方皂角爲末吹鼻內取嚔

小便數
大婦人小便數者由腎與膀胱俱主於水腎氣通於陰此二經俱虛而有熱乘之則小便澁虛則小便頻數也薛前證若肝經火動用逍遙散經調加龍膽草車前子膀胱火動六味丸雜病虛勞加麥門五味肝腎濕熱龍膽瀉肝湯見便鬱傷肝脾加味逍遙散加味歸脾湯肝脾肺氣虛補中益氣湯雜病虛勞加麥門五味肝經血虛加味逍遙散腎氣虛敗鹿茸散如不應用八味丸 一婦人患前證小便頻數日晡熱甚此肝脾血虛氣滯而兼濕熱也用加味逍遙散加車前子而愈 一婦人患前證發熱煩躁面目赤色脈洪大而虛余用此血虛發躁用當歸補血湯雜病數劑而痊 一婦人久患前證泥爲於火雜用寒凉止血之劑虛證悉具余曰此脾胃虧損而諸經病也當補中氣爲主遂以六君補中二湯兼服兩月餘尋愈

鹿茸散 治婦人久虛冷小便日夜二三十行
鹿茸 烏賊魚骨 桑寄生
龍骨各壹兩 白芍藥 當歸
附子炮各半兩 桑螵蛸半兩
右爲細末食前溫酒調下貳錢

桑螵蛸散　治婦人虛冷小便數

桑螵蛸(炙)　鹿茸　牡蠣粉(煅)

甘草(炙)　黃芪

右為細末食前薑湯調壹錢服

補遺縮泉丸　治脬氣不足小便頻數

天台烏藥　益智仁(各等分)

右為末酒煮山藥為糊丸如梧子大臨睡鹽酒吞下伍拾丸或只為末調酒服如不飲酒以米飲調下

又方以糯米糍壹片臨睡炙令軟熟啖之仍以溫酒下不飲酒只湯下多啖愈佳行坐良久待心空則睡取驗

遺尿失禁

天經云膀胱不利為癃不約為遺尿者乃心腎之氣傳送失度之所為也故有小便滴而遺者有失禁而出不自知者又婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時又有脬寒臟冷而遺尿不禁治之各有方【附】

內經曰胞移熱於膀胱則癃溺血膀胱不利為癃不約為遺溺注曰膀胱為津液之腑水注由之然足三焦脉實約下焦而不通則不得小便足三焦脉虛不約下焦則遺溺也靈樞經曰足三焦者太陽之別也並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛則遺溺

竊謂前證若肝腎虛熱挺孔痿痺用六味丸如不應用加減八味丸陽氣虛憊膀胱積冷用鹿茸丸如不應用八味丸若脾氣虛弱不能禁止用補中益氣湯加山藥山茱五味若氣虛寒前湯加桂附此證屬虛熱者多虛寒者少治宜審察　一婦人小便自遺或時不利日晡益甚此肝熱陰挺不能約制用六味丸料加白朮酒炒黑黃蘗柒分知母伍分數劑諸證悉愈若誤用分利之愈損真陰必致不起　一老婦患前證惡寒體倦四肢逆冷余以為陽氣虛寒用補中益氣加附子三劑不應遂以參附湯四劑稍應仍

以前藥而安附子計用四枚人參三斤許。一婦人病愈　小便出尿此陰陽失於傳送名大小腸交也先用五苓散二劑而愈又用補中益氣湯而安

[大]鹿茸丸　治婦人久積虚冷小便白濁滑數不禁

鹿茸炙　椒紅　桂心

附子炮　牡蠣煅　補骨脂炒

石斛　肉蓯蓉酒浸　雞肶胵炙

沉香各壹兩　桑螵蛸半兩炙

右爲細末酒煮麵糊丸梧桐子大空心溫酒下叄拾丸

又方　鹿角屑炒令黃爲細末空心溫酒調貳錢

又方　雄雞肶胵炙爲末空心酒調服貳錢

治婦人遺尿不知出時

白薇　白芍藥各等分

右爲末酒服方寸匕日三服空心

又方以桑螵蛸酒炒爲細末每服貳錢生薑湯調下

又方

白礬　牡蠣各等分

爲細末飲服方寸匕亦治丈夫遺尿

治婦人遺尿不禁　雄雞翎燒灰爲末酒服方寸匕

補遺秘元丸　治内虚白汗小便不禁

白龍骨叁兩　訶子拾箇去核　縮砂仁壹兩

爲末糯米粥丸梧子大每服伍拾丸空心盐油吞下

又治小便不禁用豬脬洗淨鐵銚上炙熟食之以酒嚥下

小便出血

夫婦人小便出血者由心主於血血之行身通遍經絡循環臟腑血性得寒則凝澀得熱則流散失其常經溢滲入於脬內故小便出血也、○婦人小便尿血或因膏粱炙煿或因醉飽入房或因飲食勞役或因六淫七情以致元氣虧損不能統攝歸源若因怒動肝火者用加味逍遙散調送髮灰肝經風熱者送子芩丸久而血虛者用八珍湯送髮灰若膏粱積熱者用清胃散加槐花甘草房勞所傷者用六君加柴胡升麻風熱所傷者用四君加防風枳殼凡久而虧

損元氣者用補中益氣為主鬱結傷脾者用濟生歸脾為主、一婦人尿血因怒氣寒熱或頭痛或脇脹此肝血虛而肝火盛用加味逍遙散而血脹止補中益氣加蔓荊子而頭痛痊後鬱怒腹痛尿血仍用前散加龍膽草并歸脾湯治之將愈又因飲食所傷復作心忡不寧徹夜不寐仍用前湯而痊、一婦人尿血面黃體倦飲食不甘晡熱作渴此脾胃氣虛不能攝血歸經用補中益氣以補胃氣用歸脾湯以解鬱結更用加味逍遙散以調養肝血而痊、一婦人小便出血服四物蒲黃之類更加發熱吐痰加芩連之

類又飲食少思虛證蜂起肝脈弦而數脾脈弦而緩此因肝經風熱為沉陰之劑脾傷不能統攝其血發生者臟而然也令用補中益氣湯六味地黃丸而痊

鹿茸散（金人）治婦人勞損虛羸尿血

鹿茸　當歸　熟地黃

葵子　蒲黃　續斷（各等分）

右為細末酒調貳錢日叁服

髮灰散　治小便尿血或先尿而後血或先血而後尿亦遠近之謂也又治飲食忍小便或走馬房勞皆致脬轉臍下急痛不通兼治肺疽心衄內崩吐血一兩口或舌上血出如針孔若鼻衄吹內立已

亂髮燒灰（本草云能消瘀血通關格利水道破癥瘕癰腫狐尿刺尸疰雜瘡療轉胞通大小便止咳嗽鼻衄）

右一味用米醋貳合湯少許調服貳錢井華水調亦得服藥訖即炒黑豆葉蹲其上則通

生乾地黃散　治婦人尿血不止

生乾地黃（貳兩）　柏葉　黃芩（各半兩）

阿膠（炒成珠）

右為粗末每服叁錢水壹盞薑叁片煎柒分去滓溫服

當歸散　治婦人小便出血或時尿血

當歸　羚羊角屑　赤芍藥各半兩

生地黃壹兩　刺薊葉叁分

右爲粗末每服叁錢水煎去滓服

又方

羚羊角屑　龍骨　當歸

蒲黃各壹兩　生地黃貳兩

右爲細末粥飲調下貳錢食前服

又方　以生地黃搗取汁每服壹小盞日三服

又方　以蒲黃末酒調貳錢服之水調亦可

又方　以鹿角膠壹兩炙以水壹大盞煎至半盞去

滓分爲三服食前服

治婦人小便出血竹茹壹大塊水煎服

又方　川牛膝去蘆濃煎服

又方　當歸四兩爲末米飲下貳錢

又方　備生如神散童子小便和酒調下

治婦人卒傷於熱尿血　陳總領云余項在章貢時年二十六忽小便後出鮮血數點不勝驚駭却全不疼如是一月如不飲酒則血少不能止偶有鄉兵告以市醫張康者常療此疾遂延之來供一器清汁一云是草藥添少蜜解以水兩服而愈既厚酬之遂詢其藥名乃鏡面草一名螺靨草其色青翠所在石階縫中有之

大便下血

夫婦人臟腑損傷風邪易入凡熱氣在內令人下血風氣在內亦大便血色或如豆汁腹中疼痛若糞後下血者其來遠糞前有血者其來近遠近者言病在上下也婦人血黑血色時寒時熱脈浮弱按之絕者為下血也　當前證或飲食起居或六淫七情失宜以致元氣虧損陽絡外傷若膏粱積熱加味清胃散怒氣傷肝小柴胡湯鬱結傷脾加味歸脾湯脾氣虛弱六君子湯思慮傷心妙香散大腸風熱四物側栢荊防枳殼大腸血熱四物丹皮柴胡中氣下陷

補中益氣茯苓半夏心脾不能攝血必補脾肺之源舉下陷之氣　一婦人下血不已面色痿黃四肢畏冷此中氣下陷用補中益氣湯送四神丸數服而愈

一[illegible]張淑人下血煩躁作渴大便重墜後去稍緩用三黃湯加大黃至四兩方應後用三黃湯又二十餘劑而愈此等元氣百中一二　韓地官之內脾胃素弱因飲食停滯服剋伐之劑自汗身冷氣短喘急腹痛便血或用諸補劑皆不應余用人參炮附子各五錢二劑稍應却用六君子每劑加炮附子三錢四劑漸安又用前湯每加附子一錢數劑乃瘥　一婦人因怒胸痞飲食少思服消導利氣之藥痰喘胸滿大便下血余用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑四劑諸證頓愈又用八珍加柴胡炒梔全愈

加減四物湯　治腸風下血

側栢葉炒　荊芥　槐花炒
甘草炒各伍分　枳殼麩炒　生地黃
當歸　川芎各壹錢

右[illegible]水煎服

腸風黑神散　治腸風下血腹疼後重或肛門脫出

敗棕燒　木饅頭燒　烏梅去核

粉草炙各壹錢

右水煎服

愚按前二證若病久中氣虛弱者必用培補脾胃為主

地榆湯　治陰結便血　醫壘出方

地榆肆兩　甘草炒叁兩半　縮砂仁肆拾柒枚

右每服叁錢水煎

防風如神散　治風熱氣滯糞後下血

防風　枳殼麩炒各等分

右每服叁錢水煎

妙香散　治心氣下血溫酒調下　見雜病心痛

大便不通

婦人大便不通者由五臟不調冷熱之氣結於腸胃則津液燥竭大腸壅澀故大便不通也仲景云婦人經水過多則亡津液亦大便難也大三脘散或四物加青皮或七宣丸麻仁丸選而用之（方見前論）或大腸津液乾涸或血虛火燥不可計其日期飲食數多必待腹滿脹自欲去而不能者乃用豬膽汁潤之若妄服苦寒辛散之劑元氣愈傷或通而不止或成中滿之證凡此氣血虛火燥用加味逍遙散氣血俱虛用八珍湯燥藥傷血用四物連翹甘草克伐傷氣用

腸結川芎當歸內熱作渴飲湯脉實用竹葉黃芪湯（□□）內熱作渴引冷脉澁用四物送潤腸丸肝膽熱甚而不能輸送用小柴胡湯（少陽）加山梔郁李仁脾胃氣虛而不能傳送用補中益氣加杏仁厚味積熱而秘結用清胃散加芍藥（□□）其有熱燥風燥陽結陰結皆不宜損中氣治者審之、一婦人痰喘內熱大便不通兩月不寐脉洪大重按微細此屬肝肺腎虧損朝用六味丸夕用逍遙散各三十餘劑計所進飲食百餘碗腹始痞悶正前所謂血虛火燥也以豬膽汁導而通之用十全大補湯調理而安

通神散、治大便實熱不通其證心腹脹滿不得近心胸煩悶而欲飲食者、

大黃（炒）　芒硝　檳榔
郁李仁（湯浸去皮微炒）　桃仁（去皮尖各二兩）　一方有木香五兩

右為末每服貳錢空心粥飲調下

大麻仁丸、治腸胃風結大便常秘而欲飲食者

大麻仁（另研）　大黃（炒各四兩）　檳榔
木香　枳殼（麩炒各壹兩）

右為末入麻仁研勻煉蜜丸桐子大每服貳拾丸溫水下

皂角丸、治大腸經有風大便秘結而不堅實者、

皂角（炙去子）　枳殼（麩炒各等分）

右為末煉蜜丸桐子大每服柒拾丸空心米飲下蘇麻粥順氣潤腸用紫蘇子麻子仁水研取汁煮粥食之、

潤腸丸、治伏火風熱大腸乾燥若因失血或因腎虛當滋腎水最忌此丸

麻子仁　桃仁（去皮尖另研各壹兩）　羌活
當歸尾　大黃（煨）　皂角仁
秦艽（各伍錢）

右另研爲末煉蜜丸每服伍拾丸空心白湯送下
如直腸乾澁用猪膽汁導之亦忌前藥

搜風順氣丸 治痔漏腸風風熱秘結元氣充實者

車前子 壹兩伍錢　大麻子 微炒　大黃 伍錢半生半熟
牛膝 酒浸　郁李仁 湯泡　兎絲子 酒浸杵餅焙爲末
枳殼 麩炒　山藥 各貳錢

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服叁拾丸空心白湯下

子和脾約丸

麻仁 壹兩貳錢半　枳殼 麩炒　厚朴 薑製
芍藥 各壹兩　大黃 蒸肆兩　杏仁 去皮尖炒研如膏

右爲末入杏仁膏煉蜜丸梧桐子大每服叁貳拾丸空心用滚湯送下

仰廬曰古今歷觀古人用通藥率用降氣等藥盖肺氣不下降則大腸不能傳送以杏仁枳殼訶子等味是也又老人虛人風人津液少大便秘經云澁者滑之故用胡麻杏仁麻子仁阿膠之類是也今人學不師古妄意斟酌每至大便秘燥即以駛藥蕩滌之既走津液氣血大便隨手愈更秘澁兼生他病亦皆在

劉山日有一嬰少自稱太醫曹鎮有寄居上世安少

府本京師人始病風淫末疾爲此生以駛藥累累利之後爲肺痿咯膿血卒至大便不通而死古人服藥尤所謹重不若今人之輕生故舉此以戒後人爾

按前證若胃強脾弱津液不得四布但輸膀胱小便數而大便難者用脾約丸若陰血枯槁內火燔灼脾肺失傳大便秘而小便數者用潤腸丸此丸若用之於熱甚氣實與西北之禀厚者無有不效若用於東南及虛熱而氣血不足者則脾愈弱而腸愈燥反致虛痿矣此東垣先生之治法也其搜風順氣丸中實及西北人用之多効東南人用之無不致害　一老婦大便欲去而難去又不堅實腹內或如故或作脹兩關尺脉浮大余以爲腸胃氣血虛弱每服十全大補湯加肉蓯蓉去後始快若間二三日不服腹內仍脹大便仍難　一老婦大便月餘不通痰喘內熱不得就枕脉洪大重按微細朝用六味丸夕用逍遥散各五十餘劑計進飲食百餘碗小腹始悶此火燥而消鑠也以猪膽汁潤之用十全大補而安後仍不通用八珍湯加蓯蓉常服而通

大便或秘或利

經云春傷於風夏必飧泄蓋木氣刑土也土不能滲泄則木氣勝故泄風氣行精液燥故秘卽不可轉以秘燥爲風也余家中宗親張全度母氏年七十日下利數十行百方治之不愈又苦腰脚拘攣全度以蒺藜仁治拘攣而利愈黃[illegible]母家康郡太苦秘結以全度藥投之而大便利故知秘與利皆出於風全度潞人名醫也有令德承父學而克其家清修不喜取眞有德君子今見於此 愚按前證若因足陰虛損發熱作渴胸膈不利飲食善消面帶陽色脉洪而虛肢體倦怠者用補中益氣湯六味地黃丸脾肺氣虛補中益氣湯脾經鬱結用歸脾湯氣血俱虛者八珍加肉蓯蓉腎經津液不足者六味地黃丸胃火銷鑠津液竹葉黃芪湯肝木侮脾土小柴胡加山梔郁李仁枳殼膏粱積熱清胃散加山梔郁李仁枳殼若燥在直腸用豬膽汁導之

治風人脚氣人大便或秘或利虛人尤宜

皂角子(三百枚破作兩片慢火炒燥甚卽入酥一棗大又炒至燥又入酥至焦黑爲度)

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸煎蒺藜酸棗仁湯下空腹服兩時久未利再進一服漸加至百丸不妨以通爲度

蒺藜湯方 用蒺藜不以多少炒至赤黑色白內以木杵舂去刺簸淨秤蒺藜一兩以酸棗仁一兩炒令香同杵爲麤末每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服下前丸子

大五柔丸 治五臟氣不調大便難通榮衛利九竅進飲食

大黃(一兩米[illegible]蒸焙) 枳殼(去瓤麩炒) 白芍藥

葶藶(炒[illegible]) 肉蓯蓉(切片酒浸各一兩) [illegible]

桃仁(一百枚[illegible]) 杏仁(一兩麩炒令黃別研)

牛脂(去筋膜熬成油與[illegible]杏仁等併)

右除桃仁杏仁外各爲末入牛脂桃仁杏仁同杵數千下丸如梧桐子大米飲下三丸日三服稍空時服未知稍增以知爲度

安康郡太苦風秘予爲處此方二仁丸

杏仁(去皮尖麩炒黃) 麻仁(別研各) 枳殼(去瓤麩炒研)

訶子([illegible])

右二物各等分爲細末同二仁杵煉蜜和杵丸如梧桐子大溫水下三十丸未知稍增 潞公在北門日盛夏間苦大便不調余隨行醫官李琬本

潮州申戶公不獨終始涵容之又教以齋中公病
時有此以言勸摺之又求速效即以蔴石脂蓮肉等
乾薑等藥餵公公服之不大便者累日其家以為苦
予乃自其城來見公未坐定語及此事公又不肯
服下積藥予告曰此燥證在大腸藥所不及當以
豬膽汁導之公為然時七月中若熱予撟汁為公作
蜜煎導是夕三用藥下結糞四五十枚黑如橡栗公
二三日間飲食已如故世有一種虛人不可服利
藥今載其法

蜜煎導法　好蜜四五兩銀石器中微火熬不住手以
箸攪候可丸見風硬即以蛤粉塗手捏作人指狀
長三寸許坐廁上內之以手掩定候大便通即放
手未快再作（已上四方出和劑局）

清氣通氣散　治婦人憂怒傷肺肺與大腸為傳送
故令秘澀不通或服燥藥過多大便秘亦可用

陳皮　蘇葉　枳殼
木通（去皮節）

右等分剉每服四錢水煎溫服

皂角丸　蘇麻粥亦佳（見前）

泄瀉

大泄瀉之證因腸胃虛冷而邪氣乘之經云春傷於
風夏必飧泄蓋風傷肝肝木旺而剋脾土屬外因也
若七情不平臟氣受傷屬內因也若飲食生冷傷脾
屬不外內因也大法寒者溫之熱者涼之滑者澀之
濕者燥之　薛前證若生冷所傷用六君木香砂仁
若熱所傷用二陳炒連山梔麵食所傷用六君神麴
米食所傷用六君麥糵飲食不時而傷用四君子湯
飲食過多而傷用六君子湯飲食停滯人參養胃湯
脾氣虛弱者六君升麻柴胡脾氣虛寒六君木香炮

薑肝木乘脾者六君柴胡芍藥肝火剋脾者六君芍
藥山梔中氣虛而下陷者補中益氣湯鬱結傷脾者
歸脾湯腎氣虛者五味子散脾氣虛者二神丸
脾腎虛者四神丸命門火衰者八味丸真陽虛敗者
[illegible]停滯下方為用　侍御沈東江之內停食
腹痛作瀉以六君加木香炮薑而愈後復作傳為腎
泄用四神丸而安　侍御徐南湖子室瀉屬腎經不
信余言專主滲泄以後不起　一婦人年踰五十不
食夜飲五更作瀉二十年矣後患痢午前用香連丸
午後用二神丸各二服而痢止又以二神丸數服而

食夜飯不用而形體如故。吳江史玄年[illegible]
疾殆將二紀，平居泄瀉，飲食少思，面黃中滿，[illegible]
甚，治血之藥無慮數百劑，未嘗少減。余以為脾腎[illegible]
損，用補中益氣湯送二神丸，復用十全大補湯送[illegible]
前丸，食進便實，病勢頓退。若泥中滿忌參朮，痰痞忌
熟地，便泄忌當歸，皆致誤事。

補遺　治濕風證，則胃風湯、不換金正氣散；寒證則理
中湯、附桂散、大已寒丸；暑則五苓散、香薷散；不和[illegible]
濕則藿香正氣散、戊己丸。此大槩而論，至於通治則有
諸方可檢，隨證治療。然男子婦人久瀉不止，無逾固
腸丸之効驗。

香朴丸　治腸胃虛冷，泄瀉注下無度，脾虛氣閉，不
進飲食

大厚朴伍兩　北懷香　白朮
陳皮各叁兩　訶子　赤石脂各壹兩半

右為細末，麵糊丸如梧桐子大，空心米飲下伍拾
丸。常服暖脾胃。

[illegible]食丸　治臟腑虛為風濕寒所搏，冷滑注下不禁，
老人虛人危篤累効。

附子　肉豆蔻面裹煨　白茯苓各壹兩
桂心　木香炮　白[illegible]
丁香拾貳錢

右為細末，米粉糊丸如梧桐子大，空心米飲下伍拾
丸

豆蔻分氣飲　治臟腑虛寒，泄瀉無度，瘦極，及婦人
產後洞泄危篤者

藿香葉　草豆蔻仁　青橘皮各肆兩
甘草　丁香各半兩　烏梅肆拾箇
肉豆蔻拾箇炮

右㕮咀，每服肆錢，水貳盞，糯米少許，煎柒分，去滓
溫服

肉豆蔻丸　治臟寒泄瀉不止，服諸藥無効者可治
肉豆蔻[illegible]不以多少，搗細，入陳米白飯搗令得
所，丸如菉豆大，空心煮粟米飲吞下百丸，本宗[illegible]
[illegible]人有効

[illegible]散　治久瀉不止，服諸藥無効，此藥屢効

人參　肉豆蔻　乾薑
厚朴　甘草　陳橘皮各壹兩
川芎　桂心　訶子
北懷香各半兩

右爲細末每服二錢水一盞薑參片棗一枚煎
至陸分服

木香散 治臟腑冷極及久冷傷脾口瘡下泄米穀不化飲食無味肌肉瘦悴心多嗔恚婦人產後虛冷下泄及一切水瀉冷痢

木香　破故紙炒各　良薑
縮砂仁　厚朴薑製各壹兩　赤芍藥
橘紅　桂心　白术各半兩
吳茱萸湯泡七次　胡椒各貳錢半　肉豆蔻肆枚
檳榔壹箇

右爲散每服三錢用不經水豬肝四兩許去筋膜批爲薄片重重摻藥置一鼎中入漿水一碗醋一茶腳許蓋覆煮肝熟入鹽一錢蔥白三莖細切生薑彈子許拍破同煮水欲盡空心爲一服冷食之初服微瀉不妨亦是逐下冷氣少時自止經年冷痢滑瀉只是一服渴即飲粥湯忌生冷油膩物如不能食冷物即添少漿暖服　嘉興謝醫得此方病其繁只用漿水煮豬肝丸如梧桐子大粥飲下五十丸亦效若暴瀉痢只是一服唯熱痢熱瀉不宜服　趙府博宜人病泄瀉不止用附子木香訶

子肉豆蔻[illegible]骨等藥及[illegible]丹服之皆無効召余診之肝腎脈虛弱此肝腎虛也府博云[illegible]在何經余曰[illegible]論泄痢止是脾胃病不過謂風冷濕毒之所侵入及飲食傷滯遂成泄痢[illegible]下肝腎氣虛亦能為泄[illegible]所[illegible]可不辨經曰泄痢前後不止[illegible]也又曰[illegible]泄皆屬於下下謂下焦肝腎之氣也門戶束要肝之氣也守司於下腎之氣也肝氣厥而上行故下焦不能禁固而泄痢腎為胃關門戶不要故倉廩不藏也若病泄痢其源或出於此而專以脾胃藥治之則膈閡不[illegible]用木香散數服[illegible]

香連丸 治[illegible]水瀉[illegible]不問赤白[illegible]効
黃連[illegible]　吳茱萸[illegible]
右[illegible]味用[illegible]木[illegible]和入[illegible]
[illegible]砂[illegible]黃連紫[illegible]丸[illegible]
入[illegible]各[illegible]兩[illegible]醋米飲為丸如梧桐子大每服[illegible]
治[illegible]久痢中氣下陷者用補中益氣[illegible]下中
[illegible]用四君子[illegible]中氣虛[illegible]
如用黃連[illegible]斤分上中下三等[illegible]以[illegible]參斤

先題下皮以皮存一處將前搗汁勿前令乾黃連一兩先用乾薑上研細鋪鍋底又[illegible]
[illegible]皮[illegible]炒焦再拌再炒如此九次方用前皮同
為細末滴水丸

芍藥[illegible]湯 治飧泄身熱脈弦腹痛及頭痛
芍藥 黃芩
右用水煎服

[illegible]湯 治寒熱所傷身重腰冷如坐水中或小便秘澀大便溏泄此證多因坐臥濕地或陰雨所襲而致
蒼朮 白朮 甘草
縮砂 茯苓 陳皮
丁香
右[illegible]服每服伍錢棗水煎

[illegible] 治濕熱泄瀉或飲食傷瀉
白朮 茯苓
右[illegible]食前服

白朮芍藥湯 治脾經受濕水泄注下體重腹滿形[illegible]不思飲食或完穀不化
白朮 芍藥 甘草

右水煎服

胃苓散 治夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止
五苓散 平胃散
右和合薑棗煎空心服

五香散 治飲食所傷泄瀉不止氣刺奔衝及婦人產前產後腹痛血氣等疾用溫酒下產後敗血衝心用敗蒲煎湯下安胎以糯米飲調下孕婦脾泄瀉痢煎陳米飲調下食前
烏藥 白芷 枳殼
白朮 良薑 甘草
莪朮
右等分為細末每服貳錢溫酒調下

二神丸 治脾腎虛弱侵晨五更作瀉或全不思食或食而不化大便不實神效
破故紙 肉豆蔻
右為末用大紅棗肆拾玖枚生薑肆兩切碎同棗用水煮熟去薑取棗肉和藥丸桐子大每服伍拾丸空心鹽湯下

五味子散 治腎經虛弱人便不實或夜間或五更

泄瀉

五味子(炒二兩) 吳茱萸(半兩)

右為末每服二錢空心米飲調下其效如神米糊為丸亦可

固腸丸

人參(去蘆) 蒼朮(米泔浸) 茯苓

木香(不見火) 訶子肉(煨) 烏梅肉

肉豆蔻(麵裹煨) 罌粟殼(去蒂)

右各等分為末麵糊丸如梧桐子大每服五十丸米飲下

協熱下利

大若下清水其色赤黃或米穀不化但欲飲冷時時悔逆小便不利得熱則極心胸煩躁或口苦大便臭此由內虛熱入於胃流滲下焦津液不分併於大腸謂之協熱下利先用五苓散利小便次以玉粉丹四味阿膠丸 治驗前證若胃氣虛弱用補中益氣湯肝木侮脾土用六君子湯鬱結傷脾土用歸脾湯命門火衰用八味地黃丸餘參各論主之 一婦人五月間患痢日夜無度小腹墜痛發熱惡寒余以為脾氣虛弱用六君子湯送香連丸二服漸愈仍以前湯送四神丸四服全愈至七月終忽惱[illegible][illegible]四肢不收[illegible][illegible]節痛口舌乾燥飲食無味大便不實小便頻數灑淅惡寒悽慘不樂此肺之脾胃虛而陽氣不伸也用升陽益胃湯而痊

玉粉丹

蛤粉 硫黃(等分)

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸米飲下

四味阿膠丸

黃連 赤茯苓(去皮各二兩) 芍藥(三兩)

阿膠（炒燥）

右先將三味爲末，却以好醋熬阿膠成稀膏，丸如梧桐子大，米飲下五十丸。

補遺 協熱而利，活人書黃芩湯、赤石脂丸、局方益元散皆可。

滯下（男女通治）

夫赤白痢疾，古人名之滯下是也。皆因外感六淫之氣，內傷生硬冷熱之食，其證不一。有赤、有白、有赤白相雜，有冷有熱，有虛有實。冒以胃氣爲本，未有不因外感寒暑燥濕風之氣而傷於脾胃，脾胃既虛，而又內傷飲食，飲食不能尅化，致令積滯而成滯下。古人云：無積不成痢者此也。經云：春傷於風，夏生飧泄。蓋風善傷肝，然春時肝木正旺而不受邪，反移氣尅於脾土，然脾既受尅，又不能忌慎口腹，恣食生冷粘硬之物，致令脾胃不能尅化，

因此積滯，又夏秋之間或再感暑濕風冷之氣，發動而成痢也。其證必先臍腹㽲痛，洞泄水瀉，裏急後重，或有或無，或赤或白，或赤白相雜，日夜無度。如有此證，不問冷熱虛濕，但當先服神术散，可以發散風冷寒濕之氣，又服五苓散分利水穀，兼用加巴感應丸溫脾胃，去積滯，或六神丸、木香丸不安者也。或[illegible]人[illegible]不成痢，亦不專以去積爲先。又有一歲之內，獨於夏秋之間人皆有積，而春冬無之，蓋風邪入胃，木來勝土，不爲暴下，則爲痢疾，其神术散要藥也。又有一方一鄉之內，上下傳染，疾狀相似，或只有

一家長幼皆然或上下隣里間相傳染或有病同而證異亦有證異而治同或用温劑而安或用凉藥而愈有如此等是為疫痢也治疫痢者雖當察五運六氣之相勝亦不可狗泥此說且如運氣相勝豈獨偏於一方一郡而偏於一家一巷者乎如有此證當先察其虛實冷熱首以敗毒散多加人參甘草陳米薑棗煎服及三黃熟艾湯黃連阿膠丸五苓散駐車丸可選而用之如下痢赤多或純下鮮血裏急後重大便不通身體壯熱手足心熱之煩躁渴腹脇脹痛小便赤澁六脉洪大或緊而數或沉而實此熱痢也

宜白頭翁湯及三黃熟艾湯五苓散可選而用之若熱痢下血太過宜用胃風湯加木香黑豆煎服若夏秋之間下痢或赤或白或赤白相雜臍腹疞痛裏急後重憎寒發熱心胸煩悶躁渴引飲嘔逆惡心小便不利及五心煩熱六脉虛弱此等脉證正因伏暑而得此疾宜服香薷散加黃連甘草當歸酒水濃煎沉冷頓服仍急服酒蒸黃連丸或小柴胡湯加人參煎服必愈（[illegible]）雜暑退而痢尚不止則以四物湯加枳艾煎服以調陰陽未有不安者也如水穀不分小便不利宜用五苓散淡竹葉煎湯調服如煩渴甚者亦宜服之若不明伏暑之證但以脉虛而妄投硫附薑桂丹石之藥而殺之深可歎息若下痢純白狀如魚腦臍腹冷痛日夜無度手足逆冷或有嘔逆全不入食欲食欲温而惡冷六脉微細此由臟腑虛冷之極宜木香散加服四味理中湯及鍾乳健脾丸甚者四肢逆冷六脉沉絕當一味峻補灸氣海丹田二穴更以助胃之藥此守而不攻之意也宜四順附子湯三建丹白丹加味參附湯薑附湯皆可選用如年尊虛弱之人或素來稟受怯弱亦宜以此法詳酌調理然大宜開胃

進食為先食可得入則脾胃運化糟粕便聚糟粕既成垢膩鮮血痰滯不患其不順矣如久痢不差腸滑不禁滑泄不止諸藥無効方可施之澁腸止痢之劑亦宜先以龍骨肉豆蔻訶子鍾乳胡粉之藥近人多用罌粟殼地榆之類然此物性太緊澁能損胃氣如少壯之人壯健者服之間奏奇効若是疫毒受暑受濕之證及年尊之人或稟受怯弱服此莫不受其大害若以固秘澁腸為先則風寒暑濕之邪非惟澁而不去而胃管閉而不通禁口不食日見羸瘦糟粕不入腸中所患無由可除矣若有此證宜以參苓白术

散四君子湯及以石蓮山藥之劑治之必愈治痢餘投補藥必須有溫通之意在焉如四君子湯理中湯十全湯加木香白豆蔻茯苓官桂厚朴之劑可以散風邪可以分水道可以開胃管可以治纏擾可以通秘澁此攻守之意兩全也大抵治痢之法虛者補之實者瀉之滑者澁之閉者通之有積者推之風則散之暑則滌之濕則燥之熱則涼之冷則溫之冷熱者調之以平為期不可以過此為大法　給酒林謙之說臨入劉從周治痢有功嘗論殊不凡且有驗云大凡痢疾不問赤白而為冷熱之證若手足和暖則為

陽只須服五苓散用粟米飲調下大服感應丸二十丸即愈若覺手足厥冷則為陰當服暖藥如已寒丸附子之類如此治痢無不効此方親曾用有効有人夏月患痢一日六七十行用五苓散兩服止　薛東垣云太陰經受濕水瀉變膿血脾傳於腎者謂之賊邪難愈先痢而後瀉者謂之微邪易痊若厥陰經下痢脉沉遲手足厥逆用麻黃小續命湯汗之若身冷自汗小便自利脉微嘔吐用漿水散溫之若脉疾身動下迫脅滿用白朮芍藥湯脉沉身靜飲食不入用薑附湯身體沉重四肢不舉用朮附湯竊謂前證若

飲食停滯用六君子湯以補脾胃消飲食若胃氣下流用補中益氣湯以補脾胃升元氣若風傷腸胃飧用神朮散以補脾胃解外邪若痰積中焦宜用六神丸以補脾胃化痰滯大凡脾胃虛弱宜補中氣調飲食　一老婦食後因怒患痢裏急後重肛門脫下此脾氣下陷用大劑六君加附子肉蔻煨木香各一錢吳茱五分骨脂五味各一錢五分二劑諸證悉退惟小腹脹悶此肝氣滯於脾也與調中益氣加附子木香五分四劑而愈後口內覺鹹此腎虛水泛與六味地黃丸二劑頓愈又以飲食失宜大便不實四肢逆

冷此脾腎復傷與六君加附子五分及八味丸而愈　朱太宜人仲夏患痢服消導後無度服清涼飲湯手按腹痛稍止脉鼓指而有力此真氣虛而邪氣實也急用人參五錢白朮茯苓各三錢陳皮炙草升麻附子各一錢服之即睡覺而索食脉證頓退再劑而安此取證不取脉也凡時同患者論服痢藥者俱致不起惜哉　陳曾有一婦人病痢疾閱四十日服諸藥不愈召予診之六脉沉弱大凡下痢之脉宜沉宜弱但以十全大補湯姜棗煎成加白蜜半匙再煎數沸服之愈　甲子夏秋間痢行經略姪孫淵痢甚重召小

方脉奉實命予診之六脉下細以證觀之云是血痢其實非也只是血水而已予記調中湯治狀云治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱結入四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或赤壯熱冒悶脉數宜服此遂令之久大黄服之而愈 又有一婦女泄瀉不止似痢非痢以血非血其色如瀏滴者予診之則六脉沉絶弱用熱藥及丹藥服之則發煩悶僕先用敗毒散數服加陳米煎次用胃風湯加粟米煎服愈又調中湯去大黄亦療此證

大白頭翁湯 治熱痢下血連月不瘥

白頭翁 二兩 黄連 黄蘗皮

秦皮 各參兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓無時溫服

神术散 治春傷於風夏生飧泄大治傷風頭痛項背拘急鼻流清涕

蒼朮 壹斤 藁本 川芎 各陸兩

羌活 肆兩 甘草 壹兩陸錢 細辛 陸錢

右為粗末每服參錢水一盞生薑三片葱白三寸煎至柒分要出汗加葱白煎熱服無時候

六神丸 治赤白痢疾

神麴 別為末留作糊 麥芽 茯苓

枳殼 木香 煨白痢倍之 黄連 赤痢倍之 各等分

為末用神麴末作糊為丸桐子大每服五拾丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢乾薑甘草湯下 東山尭殿講云是京城醫官見傳予詳此方有黄連可以解暑毒和臓府厚腸胃有木香能温脾胃逐邪氣止下利有枳殼能寛腸胃有茯苓能利水道有神麴麥芽可以消滯負痢門之要藥也

滑下

三黄熟艾湯 治傷寒四五日大下熱痢時作白通湯諸藥多不止宜服此湯除熱止痢亦有人作丸子熟水吞下肆伍拾丸治時行毒痢良驗

黄芩 黄連 黄蘗 各參分

熟艾 半雞子大

右㕮咀每服參錢水壹盞煎柒分去滓溫服無時

四順附子湯

生附子 去皮臍 白薑 炮 甘草

人參 各壹兩

右㕮咀每服肆錢水貳盞煎至柒分去滓空心服吐瀉腹痛加桂半兩小便不利者加茯苓半兩大

凡痢疾逆體寒手足逆冷冷汗自出六脉沉伏不
宜輕用附子多因伏暑而得此疾亦有冷汗自出
四肢逆冷六脉虛弱但背寒面垢或面如塗油齒
乾煩冤躁渴引飲此伏暑證也小柴胡湯五苓散
酒蒸黃連丸必能奏效學者宜精思耳

三建丹

陽起石半兩煅　鍾乳粉壹兩　大附子半兩炮取末入粟一半作糊一半

右用附子末糊丸如梧桐子大每服伍丸至拾丸空
心溫酒下如渴參湯下
滑下

加味參附湯

大附子貳兩去皮炮　大人參伍錢

右二味㕮咀每服肆錢水貳盞薑拾片丁香拾伍
粒米壹撮煎至柒分空心溫服

香茸丸　治下痢危困

麝香壹錢別研入　鹿茸壹兩火燎去毛酥炙爲末入麝香令勻

右以燈心煮棗肉爲丸如梧桐子大每服五拾丸
空心服　繆立夫云有臨安許斜入滴乳香半兩
丸有效紹興中患痢危殆而死凡平時所用
治痢如罌粟殼之類不可不□□□服此藥及沒石
子丸愈

調中湯

葛根　黃芩　芍藥
桔梗　藁本　赤茯苓
白朮　甘艸炙各等分

右㕮咀每服參錢水壹盞煎至柒分去滓溫服移
時再服

胃風湯　治風冷乘虛客於腸胃以致水穀不化泄
瀉注下或腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

人參　白茯苓　芎藭
肉桂　當歸　白芍藥炒
白朮各等分

右每服參錢入粟米數粒水煎空心食前熱服

水煮木香丸　治久痢裏急後重日夜無度并治如
罌粟殼去蒂炙　青皮去白　甘艸炒各貳兩
訶子煨去核　當歸　木香各半兩

右爲末煉蜜丸彈子大每服壹丸水煎化空心服

戊己丸　治胃經受熱泄痢不止或飲食不入腹痛
不止

黃連炒　吳茱萸炒去梗　白芍藥各伍兩

右為末麵糊丸桐子大每服叁拾丸食前米飲下

升陽除濕防風湯　如大便閉塞或裏急後重數至圊而不能便或有白膿或血下此皆鬱結而不通也以此湯舉其陽則陰氣自降矣愼勿利之

蒼朮泔浸肆錢　防風貳錢　白朮炒

白茯苓　白芍藥炒各壹錢

先將蒼朮用水壹鍾半煎至壹鍾內諸藥同煎至捌分食前熱服大抵食入胃其氣上升輸精心肺然後下降若脾胃有傷不能上升下流肝腎而成泄利法宜升補中氣不可缺下此東垣發前人所未論也

三黄丸　治熱痢腹痛或口舌生瘡咽喉齒痛及一切實火之證

黄芩　黄連　黄蘗各等分

右各另為末水糊丸桐子大每服柒拾丸白湯下

芍藥湯　治熱痢便血後重經曰溲而便膿血此氣行而血止也行血則便膿自愈調氣則後重自除

芍藥炒壹兩　當歸　黄連炒各半兩

檳榔　木香　甘草炙各貳錢

桂伍錢　黄芩炒叁錢

右每服半兩水煎如不減加大黄此證外有因中氣虛弱脾氣鬱結者治當審察

酒蒸黄連丸　芪附湯

小柴胡湯　參苓白朮散

黄連飲　香薷散

敗毒散　理中丸

黄連阿膠丸　駐車丸

眞人養臟湯　五苓散

感應丸[illegible]香丸[illegible]黄蘗丸[illegible]

以上諸方並見各證治類方泄痢各門不復重錄

痢後嘔噦

大凡滯下病之稍久或欲愈之時多有咳逆及嘔逆之證然咳逆者古人之所謂噦是也噦者胃寒所生此證最危其他病亦惡咳逆如見此證宜用橘皮乾薑湯半夏生薑湯丁香柹蒂湯若陽證咳逆者小柴胡湯橘皮竹茹湯　予嘗治一痢疾咳逆不止六脉沉弱諸醫用藥灼艾皆無効後投退陰散兩服愈又嘗治許主簿痢疾愈後咳逆不止服諸藥無効遂灸期門穴不三壯而愈[illegible]　如有嘔逆之證蓋[illegible]有胃熱而嘔亦有胃寒而生亦

有暑毒而生如胃熱而嘔宜服小柴胡湯橘皮竹茹湯宜服[illegible]湯官局桔梗湯竹葉石膏湯加生薑汁之嘔而發渴者猪苓湯　又嘗治一痢後嘔不止六脉虚弱此胃寒而嘔又似有毒凝於胃脘投局方香薷丸而愈

橘皮乾薑湯　治噦

橘皮　通草　乾薑

桂心　甘草各肆錢　人參貳錢

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓溫服

半夏生薑湯　治噦欲死

半夏壹兩湯洗　生薑貳兩切

右以水貳盞煎至捌分去滓分為二服

丁香柹蒂湯　治咳逆

丁香拾粒　柹蒂拾伍枚

右㕮咀用水壹盞半煎至捌分去滓熱服

橘皮竹茹湯　治噦逆

橘皮　甘草各貳兩　半夏壹兩湯洗

人參半兩　竹茹壹升

右㕮咀每服肆錢水貳盞生薑陸片棗壹枚煎至柒分去滓溫服

生薑橘皮湯　治乾嘔噦若手足厥冷者

橘皮肆兩　生薑半斤

右㕮咀每服半兩水壹盞煎至柒分去滓溫服

退陰散　本治陰毒傷寒手足逆冷脈沉細頭痛腰重連進三服小小傷冷每服壹字入正元散內同煎加鹽少許所赤傷寒咳逆煎一服細細熱呷即止

乾薑　川烏頭各等分

右為粗末炒令黃色候冷搗為末每服　錢水壹盞鹽一捻煎至半盞服

豬苓湯 治咳而嘔渇心煩不得眠

豬苓 赤茯苓 澤瀉

阿膠炒 滑石碎各半

右㕮咀每服叁錢水壹盞煎候膠消盡服

補脾介腸湯 治痢疾心煩手足溫頭痛如脾胃脉不弱此乃毒氣上衝心肺所嘔噦而不食宜倉廩湯即敗毒散是

每服肆錢入陳倉米百粒薑伍片棗壹枚煎温服若脉微弱或心腹虛脹手足厥逆初病則不宜因服罌粟烏梅苦澁過多以致閉食先嘔此乃脾胃

痢後嘔噦 女科三

虛弱用山藥一味剉小豆大一半生用一半銀瓦銚內炒熟同為末米飲調下

又治噤口痢以石蓮子去殼留心并肉為末每貳錢陳米飲調下此疾蓋毒上衝心肺借此以通心氣便思食

痔瘻

[大]婦人痔瘻因嗜怒風熱厚味膏粱所致其名有五肛邊如乳出膿者為牝痔腫脹出血者為牡痔痒痛者為脉痔腫核者為腸痔登廁出血者為血痔治宜審之 前證婦人多因胎產經行飲食起居六淫七情失調所致男子多因醉飽入房筋脉橫解精氣脫泄熱毒乘虛而患或入房強閉其精木乘火勢而侮金或炙煿厚味陰虛濕熱宜涼血潤躁疎風消後當益元氣補陰精不愈即成痔漏有串臀串陰穿腸者其腫頭腫塊者濕熱也作痛者風也便燥者火也潰

女科二

膿者熱勝血也大便作痛者潤燥除濕肛門墜痛者瀉火導濕小便澁滞者清肝導濕經云因而飽食筋脉橫解腸澼為痔治當補肝腎不足故用加味地黃及六味丸有效慎勿數毒藥及服寒涼之劑

鼈甲散 治痔瘡腫痛血淋瀉或腫痛堅硬下墜

鼈甲 露蜂房 蛇蛻

豬後懸蹄 蝟皮各 麝香少分

右為末每服壹錢空心生地黃煎湯調下更傳之

又方 熱痛用寒水石朴硝為末以津調搽

治法并方詳雜病痔門茲不重錄

脫肛

大腸脫肛者大腸之候也大腸虛寒其氣下陷則肛門翻出或因產努力其肛亦然也　[illegible]若大腸濕熱用升陽除濕湯若血熱用四物條芩槐花血虛用四物白朮茯苓兼痔痛用四物槐花黃連升麻中風虛者用補中益氣湯加芍藥白朮中氣虛寒加半夏炮薑五味茯苓腎虛用六味丸虛寒用八味丸夫肺與大腸爲表裏肛者大腸之門肺實熱則秘結肺虛寒則脫出腎主大便故肺腎虛者多有此症

一婦人脫肛用補中益氣加味歸脾各百餘劑

一產後因分娩復脫仍以前藥各二百餘劑始愈

升陽除濕湯　自下而上者引而竭之

升麻　柴胡　防風

神麴炒　澤瀉　豬苓各半兩

蒼朮一兩　陳皮　甘艸炙

大麥蘖炒各一錢

右每服五錢水煎空心服胃寒腸鳴加益智仁半夏各五錢薑棗同煎服

姚和衆以鐵粉傅之良　聖惠方亦治陰脫陰痔

經驗方以生鐵叁斤水壹斗煮至伍升取水洗口二

灸

孫真人用蝦蟆皮瓶中燒多烟熏功效玄微

一方用五倍子煎湯洗以赤石脂末摻上托入或脫長者以兩床相並中空尺許以磁瓶盛湯令病人仰臥浸瓶中逐日易之收盡爲度

前陰諸證

陰腫 論 夫婦人陰腫者，是虛損受風邪所為。胞絡虛而有風邪客之，風氣乘於陰，與血氣相搏，令氣不通，腠理壅閉不泄，越故令腫也。

治 前證若氣血虛弱，用補中益氣湯舉而補之；肝經濕熱，用龍膽瀉肝湯滲而清之。若陰腫陰癢陰冷陰挺，當與後論互相參看。

一婦人陰中腫悶，小便澀滯，兩股作腫，內熱晡熱，月經不調，時或寒熱，此因肝脾鬱怒，元氣下陷，濕熱壅滯。朝用歸脾湯加柴胡、升麻解鬱結、補脾氣、升元氣；夕用加味逍遙散清肝火、生肝血、除濕熱。各數劑，諸證悉愈。又用加味歸脾、丹皮，調補肝脾，而經水如期。

菖蒲散 治婦人月水澀滯，陰間腫痛。

菖蒲 當歸(各壹兩，炒) 秦艽(半兩)
吳茱萸(半兩)

右為粗末，每服參錢，水壹盞，葱白伍寸，煎至陸分，空心溫服。

洗腫湯 治婦人陰中腫痛不可忍。

艾葉(伍兩) 防風(參兩) 大戟(貳兩)

右剉細，以水壹斗，煮取五升，熱洗，日參次，切宜避風冷。

古今錄驗治婦人陰腫或瘡爛者，麻黃湯洗方。

麻黃 黃連 蛇床子(各貳兩)
北艾葉(壹兩) 烏梅(拾個)

右剉細，以水壹斗，煮取伍升，去滓，熱洗，避風冷。

又方治婦人陰腫堅痛，白礬散

白礬(參兩) 甘草(生，半分) 大黃(壹分)

右為細末，每用棗大，綿裹內陰中，日兩換。

膿後方 療陰中腫痛

枳殼(半斤，炒令熱)以故帛裹熨，冷即換之。

肘後秘錄 療陰腫 鐵精粉傅上。

補遺方治陰門腫，以甘草、枯礬研爛，白沸湯淋洗，熏之。

又方 小麥、朴硝、白礬、五倍子、葱白，煮水洗。

又方 陰腫大，以馬鞭草搗爛涂之。

陰癢 論 婦人陰癢者，是蟲蝕所為。三蟲在於腸胃之間，因臟虛，蟲動作蝕於陰內，其蟲作熱，微則為癢，重者乃痛也。

治 前證屬肝經所化，當用龍膽瀉肝湯、逍遙散以主其內，外以桃仁研膏，和雄黃末，或雞肝納陰中以制其蟲。一婦人胸膈不利，內熱作渴，飲食不甘，肢體倦怠，陰中悶癢，小便赤澀，此鬱怒

傷肝脾所致用歸脾湯加山梔而愈復因怒患處痒
小腹脹痛用小柴胡加山梔膽草歸芍藥痛止用逍遥
散加山梔而愈又因勞役患處復脹小便仍澀用補
中益氣加山梔茯苓丹皮而愈 一婦人陰內痛痒
不時出水食少體倦此肝脾氣虛濕熱下注用歸脾
加丹皮山梔芍藥生甘草主之而安 一婦人陰內痒
痛內熱倦怠飲食少思此肝脾鬱怒元氣虧損濕熱
所致用參朮歸芎陳皮柴胡炒梔車前升麻芍藥丹
皮茯苓而瘥若陰中有蟲痒痛亦屬肝木以桃仁雄
黃研納陰中以殺之仍用清肝解鬱之藥有以雞肝
納之者乃取蟲之法也 一方搗新桃葉綿裹納陰中
日三兩易

大黃散 治婦人陰痒

大黃微炒 黃芩 黃芪炙各壹兩
赤芍藥 玄參 丹參
山茱萸 蛇床子各半兩

右為細末食前温酒調貳錢服

廣濟方療婦人陰痒不止

蚺蛇膽 雄黃 硫黃
朱砂 硝石 蕪荑各半兩

藜蘆貳錢半

右為細末研停以臘月豬脂和如膏用故布作纏
子如指長壹寸半以藥塗上內陰中日一易之易
時宜用豬椒根三五兩水煮稍熱洗乾拭內之効

又方 小薊不拘多少水煮作湯熱洗日三用之

崔氏療陰痒不可忍方

杏仁燒作灰承熱綿裹內陰中日二易之

又方 蒜煮湯洗之 一方用枸杞根

又方 狼牙細切兩 蛇床子三兩以水六升煮十沸熱服

又方 取雞肝承熱內陰中如有蟲當盡下

又方 取牛肝截五寸繩頭內陰中半日蟲入肝出
之豬肝亦得

聖惠方療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏
血下白少氣思美食用鯉魚長一尺去頭肉取骨搗
末熬黃黑以豬脂和以絹袋盛如常法內陰中至痛
處即止蟲當自出

陰痛 千金療小戶嫁痛連日方

甘草 生薑各參分 白芍藥
桂心各貳分

右細剉以酒貳升煮取壹升去滓温服神良

又療小户嫁痛單行方

牛膝五兩 右一味切以酒三升煮取半去滓分三服

又療婦人嫁痛單行大黃湯

大黃三兩 右一味切以酒一升煮一沸頓服

又療婦人小户嫁痛海螵蛸散

烏賊魚骨二枚 右一味燒研細末酒服方寸匕日三

補遺治陰腫不下小户嫁痛

冬青葉 小麥 甘草

右等分水煎洗

崔氏方治婦人陰痛用青鹽炒熱以布裹熨之

陰瘡門 婦人陰瘡者由三蟲或九蟲動作侵蝕所為也諸蟲在人腸胃之間若臟腑調和血氣充實不能爲害若勞傷經絡腸胃虛損則動作侵蝕於陰陰者或癢或痛者生瘡診其少陰之脈滑而數者陰中生瘡也 薛己按婦人陰瘡乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下注其外證有陰中舒出如蛇如菌或如雞冠狀或生瘡濕痒或潰爛出水或腫悶墜痛其內證口乾晡熱經候不調或飲食無味體瘦發熱胸膈不利小便澀脹或赤白帶下小水淋澀其治法腫痛者四物湯加柴胡山梔丹皮膽草濕痒者歸脾湯加柴梔丹皮淋澀者龍膽瀉肝湯加白朮丹皮潰腐者逍遙散山梔川芎腫悶墜痛者補中益氣湯山梔丹皮佐以外治之法 一婦人腐潰膿水淋漓腫痛寒熱小便赤澀內熱作渴肢體倦怠胸脇不利飲食少思余以爲肝脾虧損用補中益氣内柴胡升麻各用一錢加茯苓一錢山梔二錢數劑少愈又與歸脾湯加山梔川芎茯苓三十餘劑諸證悉退惟內熱尚在再與逍遙散倍用山梔而愈

一婦人素性急陰內痛小便赤澀怒則益甚或發熱或寒熱此肝經濕熱所致用龍膽瀉肝湯加柴胡炒梔黃芩丹皮炒黑山梔炒黃連治之數劑漸安乃去黃連澤瀉又數劑而愈

補心湯 治陰中生瘡名曰䘌瘡或痛或痒如蟲行狀淋瀝膿水

白茯苓 人參 前胡

半夏湯泡七次 川芎各三分 枳殼麩炒去瓤

紫蘇 桔梗 甘草炙

橘皮 乾薑各半分 當歸壹兩參分

白芍藥 熟地黃各壹兩半

右剉散每服肆錢水壹盞半薑伍片棗壹枚同煎食前服

藿香養胃湯危氏　治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

藿香　白朮　白茯苓

神麯炒　烏藥去木　縮砂仁

薏苡仁　半夏麯　人參各半兩

蓽澄茄　甘草炙各叁錢半

右㕮咀散每服肆錢水一盞半薑伍片棗兩枚同煎不以時候

治陰瘡方千金

蕪荑　芎藭　黃芩

甘草　礬石　雄黃各一兩

附子　白芷　黃連各陸銖

右㕮咀取豬脂肆兩合煎傅之

治婦人陰瘡與男子妬精瘡大同小異方

黃丹　枯白礬　萹蓄

藁本各壹兩　硫黃半兩　白蛇皮壹條燒灰

荊芥　蛇床子各半兩研

右細末另以荊芥蛇床子煎湯溫洗軟帛滲乾清油調塗如瘡濕乾末摻之

治妬精瘡因月後便行房致成湛濁伏流陰道疳瘡遂生瘙痒無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却服後藥

赤石脂　龍骨　黑牽牛炒

兎絲子蒸　黃耆鹽水炙　沙苑蒺藜炒

右為末蜜丸梧桐子大每服貳拾丸熱[illegible]蒸酒澄上清者吞下

用後方　療女人陰中生瘡

杏仁　雄黃　礬石各等分

麝香少許

右四味研細傅之

又方　用硫黃研細傅之

古今錄驗療婦人陰中生瘡黃芩湯洗方

雄黃　當歸　黃芩

川芎　大黃　礬石各貳分

黃連壹分

右七味以水五升煮取四升洗瘡日三度

雄黃散

雄黃　川芎　辰砂

藜蘆　北細辛　當歸

川椒

右為末綿裹內陰中又傅外瘡上忌如常法

當歸湯　治婦人陰蝕瘡凡婦人少陰脉數而滑陰中必生瘡名曰䘌瘡或痛或痒如蟲行狀淋露膿汁陰蝕幾盡者此皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血流滯故經云諸痛痒瘡皆屬于心又云陽明主肌肉痛痒皆屬于心治之當補心養胃外以熏洗坐導藥治之乃可

當歸　芍藥　甘草

川芎各二兩　地榆三兩

右細切以水伍升煮取四升去滓熏洗日三夜二

一方用蛇床子不用川芎

又方　五倍子　甘草　滑石　黃丹各等分　右爲末先以甘草湯洗然後傅之

又方　黃茱萸根加貫衆末每貳錢煮熟猪肝拌藥內陰戶數日可安

陰瘡　治婦人陰中生瘡如小蟲叢有肉突出者皆名爲䘌

用烏頭采個燒存性用小瓦礦磁膽礬淬之乘熱熏候通手沃之良

洗方　治茄子疾

用枯皮白礬馬棒頭根枳樹皮剉碎煮水熏洗加入炒石灰少許妙

傅藥　治茄子疾

用枳樹爲末黃荊柴燒瀝調傅或濃鐵漿末調傅

又方　治茄子疾

用硫黃壹兩大鯉魚壹尾去頭皮入硫黃煎肚中故紙裹黃泥固濟火煨燒熟爲末米糊丸梧桐子大每服貳拾丸溫酒下如下痘生蟲所下如柿汁臭穢心中疼痛悶絶虛煩甚者不可治

治茄子疾心躁連綿黃水易治白水難愈

用生枳殼爲散煎湯熏洗却用絹帛包枳殼滓納入陰中即日漸消

陰挺下脫　婦人陰挺下脫或因胞絡傷損或因子臟虛冷或因分娩用力所致　補當升補元氣爲主若肝脾鬱結氣虛下陷用補中益氣湯若肝火濕熱小便澀滯用龍膽瀉肝湯　一婦人陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱晡熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結蓋肝火濕熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先以補中益氣加山梔茯苓車前子青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱外以生猪脂和藜蘆末涂之而收　一婦人陰中挺出五寸

而悶痛重墜水出淋瀝小便澀滯夕與龍膽瀉肝湯分利濕熱朝與補中益氣湯升補脾氣諸證漸愈再與歸脾湯加山梔茯苓川芎黃蘗間服調理而愈後因勞役或怒氣下部濕癢小水不利仍用前藥即愈

三茱丸　治陰中生一物所大牽引腰腹膨痛至甚不思飲食皆因多服熱藥及煎煿或犯非理房事兼意淫不遂名陰挺

食茱萸　吳茱萸（湯泡三次炒）　桔梗（水浸一伏時漉出炒）

白蒺藜　青皮（去白）　山茱萸肉（微炒）

舶上茴香（鹽炒）　五味子（炒揀）

海藻（洗焙）　大腹皮（酒洗曬乾）　川楝子（去核）

玄胡索（各壹兩）

右爲末酒糊爲丸如梧子大每服叁拾伍丸木通湯下虛加川烏炮去皮肉桂去粗皮各壹兩腹痛甚加桃仁去皮尖麩炒別研青皮去白枳實大檳各壹兩以上加木香叁錢半服之一方每服貳錢半燒鹽湯調仍用食鹽狗脊各伍錢白礬水楊根魚腥草黃連各壹兩爲散分作四服以有嘴瓦礶煎熟預以銀錫作一長小筒下透礶嘴筒上貫挺上先熏後洗立效更服白薇散凌霄花少許

煎

檢金丸　服前藥未効却用

玄胡索　舶上茴香　吳茱萸（炒）

川楝子（去核）　青皮香（各貳兩）

右爲末粳米飯糊丸如梧桐子大每服叁拾伍丸空心木通湯服又用楝花膌子半錢鐵孕粉壹錢水調搽上如陰挺生瘡以涼血飲每服叁錢加凌霄花少許煎空心服見効

黃芩散　治婦人陰挺脫出

黃芩　蝟皮（燒灰）　當歸（各半兩）

赤芍藥（壹兩）　牡蠣　竹皮（各貳兩）

狐莖（壹具炙用狐皮）

右治下篩飲服方寸匕日三禁舉重房勞冷食一方以酒服貳錢妙

治婦人陰挺出下脫方

杜心（壹兩一方作川椒）　吳茱萸（壹兩）　戎鹽（貳兩）

右藥並蒸令色變搗羅爲末以綿裹如指大內陰中日再易之甚妙

又方

川椒　川烏頭（並生用）　白芨（各半兩）

右搗羅為末綿裹一錢內陰中深三寸服中熱即止來日再用之一方無川椒

又方 蛇床子五兩 烏梅拾枚去核 以水伍升煮取叁升去滓稍熱洗之每日夜三五度用

又方 硫黃 烏賊骨各半兩 搗羅為末傅之

又方 鐵精細研以羊脂調布裹炙令熱熨之以瘥為度

又方 弊帚頭燒為灰酒服方寸匕食前服

治婦人陰下脫若肚方

用羊脂煎訖適冷暖取塗上以鐵精傅之多少令調以火炙布令煖熨肛上漸塗內之然後末磁石酒服方寸匕日三

熏洗法

用荊芥穗臭椿樹皮藿香葉煎湯熏洗即入

托藥

用蓖麻子葉有九角者好飛過白礬為末以紙片攤藥托入

掺藥

先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬為末乾掺立效

敷藥

用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒烟熏次用蛇床子研爛塗上吸入如入即洗去

陰冷 婦人陰冷因勞傷子臟風冷客之 附前證屬肝經內有濕熱外乘風冷所致若小便澁滯或小腹痞痛用龍膽瀉肝湯若內熱寒熱或經候不調用加味逍遙散若寒熱體倦飲食少思用加味四君子若鬱怒發熱少寐懶食用加味歸脾湯 一婦人陰中寒冷小便黃澁內熱寒熱口苦脇脹此因肝經濕熱用龍膽湯祛利濕熱用加味逍遙散調補氣血而安 一婦人所患同前更寒熱嘔吐兩股腫痛先用小柴胡加山梔一劑寒熱嘔吐頓止次用龍膽瀉肝湯一劑腫痛頓消 一婦人陰中寒冷小便澄清腹中亦冷飲食少思大便不實下元虛寒治以八味丸月餘飲食漸加大便漸實又月餘諸證悉愈

五加皮浸酒方 治婦人癖瘦陰冷

五加皮 熟乾地黃 丹參

杜仲去粗皮炙微黃 蛇床子 乾薑各叁兩

地骨皮貳兩 天門冬壹兩 鍾乳肆兩

右細剉以生絹袋盛以酒壹斗伍升漬二宿後每

服煖宫丸爲空心及晚食前服一方用枸杞子無
地骨皮

治婦人陰冷方出大全良方

遠志　乾薑生用　蓮花各半兩
蛇床子　五味子各壹兩

右搗篩爲末每用藥以兔屎塗陰門用綿裹壹錢
內陰中熱即爲効

又方　蛇床子叁分　吳茱萸　甜葶藶各半兩　没石子
壹枚搗羅爲末綿裹棗許大內陰中令腹內熱爲度

又方　蛇床子　吳茱萸各壹兩　搗羅爲末煉蜜和丸

婦人良方　女科

如酸棗大以綿裹內陰中下惡物爲度

濕中坐藥　用蛇床子爲末白粉少許和勻相得如
棗大綿裹內之自然溫矣爲効

不孕丸　治血弱不能榮養臟腑津液枯澁風寒客
於子臟以致陰冷
過損血虛果係肝脾損虛殊有神効

治血虛後方具本門

交接輒血出痛論　一婦人每交接出血作痛此肝火
動脾而不能攝血用補中益氣濟生歸脾二湯而愈
若出血過多而見他證但用前藥調補肝脾

千金療女人交接輒血出方

桂心　伏龍肝各貳分　爲末酒服方寸匕瘥止

又方

黃連陸分　牛膝　甘草各肆分

右三味細切以水四升煮取貳升洗日三四度瘥
補遺以絹裹緊裹一團然後以綿裹內陰中

交接他物所傷論治　一婦人交接出血作痛發熱口
渴欲嘔或用寒涼之藥前證益甚不時作嘔飲食少思
形體日瘦余曰證屬肝火而藥復傷脾所致也先用
六君加山梔柴胡脾胃健而諸證愈又用加味逍遙
散而形氣復　一婦人陰腫下墜悶痛出水胸腹不
利小便頻數內熱晡熱口苦耳鳴此肝脾火證用小
柴胡加車前膽艸苓术升麻二劑稍愈又用加味逍
遙加升麻數劑漸愈乃以加味歸脾加升麻柴胡并
補中益氣加山梔數劑頓愈仍用加味逍遙加味歸
脾二藥調理全愈　一婦人患前證熱痛或用寒涼
敗毒藥飲食不入時欲作嘔小腹重墜余謂此脾胃
復損元氣下陷先用補中益氣湯加炮薑二劑重墜
頓愈又加茯苓半夏二十餘劑而愈乃以歸脾湯少
加柴胡升麻并六味地黃丸而康

集驗方　療女人交接陽道違理及他物所傷犯血流漓不止方取釜底墨斷葫蘆塗藥內之

又療女童交接陽道違理血出不止方

燒髮并青布末為粉塗之

又方　割雞冠血塗之

神道以赤石脂末摻之五倍子末摻亦良

[illegible]當用補中益氣六味地黃以滋化源

房事

集驗方　療女人傷丈夫四體沉重噓吸頭痛方

生地黃八兩　芍藥五兩　香豉一升

葱白切一升　生薑四兩　甘草二兩

右六味以水七升煮取二升半分三服不得重作

忌房事

千金　療諸婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔悶桑白皮湯

桑白皮半兩　乾薑一兩　桂心五寸

大棗二十枚

右四味以酒一斗煮三四沸去滓分溫服衣適厚覆取汗出

補遺　廣濟療婦人與男子交接相傷因而四肢沉重頭痛昏暈[illegible]下伍拾丸

與鬼交通

夫人稟五行秀氣而生承五臟神氣而養陰陽調和臟腑強盛邪魅安得而干之若攝理失節血氣虛衰則鬼邪干其正隱蔽而不欲見人時獨言笑忽時悲泣是其候也脈息遲伏或如鳥啄或綿綿而來不知度數而面色不改亦其候也　愚按前證多由七情虧損心血神無所護而然宜用安神定志等藥則正氣復而神自安若脈來乍大乍小乍短乍長亦是鬼祟宜灸鬼哭穴以患人兩手拇指相並用線緊紮當合縫處半在肉半在甲上灸七壯若果是邪祟病者即乞求免灸云我自去矣

茯神散　治婦人風虛與鬼交通妄有所見言語雜亂

茯神一兩半　茯苓　人參　石菖蒲各一兩

赤小豆半兩

右㕮咀每服三大錢水一盞煎七分去滓食前溫服　一方加茯苓一兩

桃仁丸　治婦人與鬼魅交通

辰砂　檳榔　當歸

桃仁各一錢半　水銀[illegible]　麝香

阿魏（麪裹煨） 沉香（各半兩）

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心桃仁湯吞下拾丸

辟瘟丹 治證仝前

虎頭骨（半兩） 朱砂 雄黃

雌黃 鬼臼 皂莢

蕪荑仁 鬼箭 藜蘆（各壹兩）

右件生為末煉蜜丸如彈子大囊盛壹丸男左女右臂上及用壹丸當病人戶前燒之一切邪鬼不敢近 太乙神精丹（方見雜病卒中） 蘇合香丸（方見雜病卒中）皆可用也

妙香散 治心氣不足精神恍惚夜夢顛倒與鬼交通語言錯亂先宜服此補氣養血鎮心安神然後以前後方治之（方見雜病心痛）

殺鬼雄黃散 治婦人與鬼交通

雄黃 丹砂 雌黃（各壹兩細研）

羚羊角屑 蕪荑 虎頭骨

石菖蒲 鬼臼 鬼箭

白頭翁 石長生 蒼朮

馬懸蹄 猪糞（各半兩）

右為細末以羊脂密蠟和搗為丸如彈子大每用壹丸當患人前燒之

別離散 治婦人風虛與鬼交通悲思喜怒心神不定

楊柳樹上寄生 白朮（各壹兩）

桂心 茵芋 天雄（炮去皮臍）

薊根 菖蒲（九節） 細辛

附子（炮去皮臍） 乾薑（炮各半兩）

右為細末每服壹錢食前溫酒調下

朱砂散 治婦人風虛與鬼交通悲笑無時言語錯亂心神恍惚睡臥不安

朱砂（細研水飛過） 鐵粉（各壹兩） 雄黃

龍骨（各半兩） 蛇蛻（壹尺） 虎睛（壹對炙）

牛黃 麝香（各壹錢）

右同研極細每服壹錢以桃仁湯調下不計時候

治女人與邪物交通獨言笑悲思恍惚者

用雄黃末壹兩以松脂貳兩鎔和虎爪攪令如彈丸夜內火籠中燒之令女人跨坐其上以被自蒙唯出頭目不過再作不過三劑自斷也

又方以安息香和雄黃合為丸燒熏丹穴永斷

又方

雄黃　人參　防風各壹兩

右㕮咀為末合

右搗篩清旦以井華水服方寸匕三服差

治婦人夢與鬼交

鹿角為末三指撮和清酒服即出鬼精並治漏下不斷　婦人為妖所魅迷惑不肯言狀以水服鹿角方寸匕即言實也

桃梟一名桃奴是過年樹上不落乾者味苦微温主殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五毒不祥正月採之

女科證治準繩卷之四

金壇王肯堂輯　門人新安閔邦治校

胎前門

求子

胡氏孝曰男女交姤其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶為後天滓質之物而一點先天眞一之靈氣萌于情欲之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟眞篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主於精語女則主於血著論立方男以補腎為要女以調經為先而又參之以補氣行氣之說察其脈絡究其虧盈審而治之夫然後一舉可孕天下之男無不父女無不母矣

【論脈】陳來章曰人身氣血各有虛實寒熱之異惟察脈可知舍脈而獨言藥者妄也脈有十二經應十二時一日一周與天同運循環無端其至也既不宜太過而數數則熱矣又不宜不及而遲遲則寒矣不宜太有力而實實非正氣能自實也正氣虛而火邪來乘以實之也治法先當散鬱以伐其邪邪去而後正可補也不宜太無力而虛虛乃正氣正血虛也治法惟當補其氣血耳亦有男婦上熱下寒表實裏虛而

求得子者法當臨睡時服涼膈之藥以清其上飯後食未入口時服補藥以温其下暫進升散之藥以達其表又服厚味之藥以實其裏又有久人氣多血少寒熱不調月水違期或後或先白帶漸下而無子者皆當診脉而以活法治之務欲使其夫婦之脉皆和平有久不熱不寒交合有期不妄用精必能生子不殤夭歿欲得子者必須對脉立方因病用藥、傳男子脉浮弱而澁為無子精氣清冷、脉訣婦人少陰遲沉[illegible]少者得之此為無子年大者得之絕產、脉微弱而澁年少得此為無子中年得此為絕產、肥人脉細胞有寒故令少子其色黃者胸上有寒、少陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血絕產惡寒、

調經 凡胎前之道始於求子求子之法莫先調經每見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成孕矣經曰夫不調之由其或前或後及行後作痛者虛也其少而淡者血虛也多者氣虛也其將行作痛及凝塊不散者滯也紫黑色者滯而挾熱也治法血虛者四物湯氣虛者四物加參芪滯者香附縮砂木香檳榔桃仁玄胡滯久而沉痾者吐之下之脉證熱者四物加芩連脉證寒者四物加桂附及紫石英之類是也前至積去滯行虛回然後血氣和平能孕子也夫婦治經不調者只一味香附末醋為丸服之亦可發而中也、秘旨云香附生痾

女子不孕

婦人經水不調即非受孕光景縱使受之亦不全美宜服六味地黃丸

熟地黃肆兩　山茱萸肉　山藥各貳兩

牡丹皮　白茯苓各壹兩伍錢　澤瀉

香附米童便浸透[illegible]各壹兩　蘄艾葉去筋醋煮伍錢

右為末醋糊丸如梧子大每服柒拾丸白沸湯送下隨後以四物作湯使或另作煎劑服

經水過期者乃血虛也宜四物湯加參芪陳皮白朮服之若肥白人是痰多宜二陳加南星蒼朮滑石芎歸香附之類　經水不及期者血熱也四物加芩連肥人亦兼痰治色紫黑者同血熱論　經將行而作疼者氣滯也用歸身尾香附木香及桃仁紅花黃連以行之或加四物湯木香玄胡索木香熱加黃芩柴胡　經行後作疼者血氣虛也八物湯

肥人多痰宜丹

一肥婦人肥盛者多不能孕育以身中有脂膜閉塞子宮以致經事不行瘦弱婦人不能孕育以子宮無血精氣不聚故也肥人無子宜先服調理藥

當歸酒洗壹兩　茯苓貳兩　川芎柒錢半

白芍藥　白术　半夏湯洗

香附米　陳皮　甘草各壹兩

作十貼每貼薑叁片水煎吞後丸子

白术貳兩　半夏麴　川芎

香附米各壹兩　神麯炒　茯苓各半兩

橘紅肆錢　甘草貳錢以上並為末

粥丸每服捌拾丸如熱多者加黃連枳實各壹兩服

前藥訖却服後螽斯丸

附子　茯苓各陸錢　厚朴

杜仲　桂心　秦艽

白薇　半夏　乾薑

牛膝　沙參各貳錢　人參肆錢

細辛伍錢

右為末煉蜜和丸小豆大每服五丸空心酒下加至拾丸不妨覺有娠三月後不可更服忌食牛馬肉則難產當出月

按此方即秦桂丸也用淡忌服之者宜忌於瘦人無血者若肥人濕多者又無前調理藥所服丸數十粒其丸只服五分無妨也上三方得之於冊溪之子朱慈祥者累試有効

抑氣散　治婦人氣盛於血所以無子尋常頭眩膈滿體疼怔忡皆可服

香附子炒淨肆兩　陳皮去白貳兩　[illegible]

甘草炙壹兩

右為細末每服貳叁錢不拘時白湯調下

瘦人無血宜　精血虛宜

大五補丸

天門冬　麥門冬去心　菖蒲

茯苓　人參　益智

枸杞子　地骨皮　遠志肉

熟地黃各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下叁拾丸服本方數服後以七宣丸泄之

增損三才丸

天門冬酒浸去心　熟地黃酒蒸　人參去蘆

遠志去骨　五味子　茯苓酒洗

鹿角酥炙　一法加白馬莖酥炙　一法加麥門

冬令人有力、一法加續斷以續筋骨。一法

加沉香緩下焦虛冷

右爲細末煉蜜和杵千下丸如桐子大每服伍拾

丸空心好酒下年光從補加混元衣全個入藥（混元衣者是也不可水洗佳用酒浸洗去污焙乾爲末）

紫石門冬丸（下求子 又名紫石）

紫石英　鍾乳石（各細研水飛過以上二味各七錢）

天門冬（去心已上各叁兩）　當歸　芎藭

紫葳　卷柏　肉桂

乾地黃　牡蒙　禹餘糧（醋淬）

石斛　辛夷（已上各貳兩）　人參

桑寄生　續斷　細辛

厚朴（薑製）　乾薑　食茱萸

蕪荑　白薇　薯蕷

烏鰂骨　甘艸（炙已上各壹兩半）　柘子仁（壹兩）

右件搗羅爲末煉蜜丸如梧桐子大溫酒服拾丸三

日漸增至叁拾丸以腹中熱爲度不禁房室夫行

不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有

娠　此方舊用烏頭牡丹牛膝墮胎藥此三物俱

墮胎求子藥中用之蓋胎未着之時若服之已着

已著而未覺服之未已反爲害也今悉去之而增鍾

乳紫石英白薇茲無疑矣

白薇丸　治婦人無子或斷緒上熱下冷百病皆主

之

白薇　熟乾地黃　川椒（去目及閉口微炒出汗）

白龍骨（已上各壹兩）　麥門冬（去心壹兩半）　藁本

卷柏　白芷　覆盆子

桃仁（湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃）　人參

桂心　菖蒲　白茯苓

遠志（去心已上各三分）　車前子　當歸（剉微炒）

芎藭　蛇床子　細辛

乾薑（炮已上各半兩）

右件藥搗羅爲末煉蜜爲丸梧子大每服叁拾丸

空心日午以溫酒下叁拾丸予之故友江君雅曾

仲容俱無嗣因以此方增之踰年而皆有子後有

史倩甫黃翰公者亦然故述之

趙氏從蓉兎絲子丸

肉從蓉（酒浸壹兩錢）　覆盆子　蛇床子

川芎　當歸　兎絲子（酒浸壹兩）

白芍藥（壹兩）　牡蠣（鹽泥固濟煅）　烏賊魚骨（錢）

五味子　防風各□　條芩各□炒
艾葉八錢
此方不寒不熱助陰生子前藥俱焙乾爲末煉蜜
丸如桐子每服癸拾丸淡鹽湯下早晚皆可服
加味香附丸男服聚精丸女服此
香附壹斤
澤蘭　海螵蛸　當歸
川芎　白芍藥　懷熟地
各爲末用浮小麥粉酒醋水打糊爲丸如菉豆大
每日早晚服兩次忌食萊菔及牛肉生冷

調經丸
香附　川杜仲
大川芎　白芍藥　當歸去尾
懷生地　廣陳皮　小茴香
延胡索　肉蓯蓉　青皮
台烏藥炒　枯黄芩酒炒
以上各名
右十四味足秤兩正好料醋和麵打糊爲丸如梧
桐子大每服百丸空心好酒送下　一方無陳皮

地黄有人參黄芪各貳兩
正元丹　調經種子
香附　阿膠　枳殼　懷生地
熟地　當歸身　川芎
白芍藥　加白茯苓琥珀治帶
末之醋糊丸如桐子大空心鹽湯吞伍陸拾丸
子和戴人過濮都管中飲會有一李說出妻事戴人
問其故答曰吾婦爲室女時心下有冷積如覆盆按
之如水聲以熱手熨之如水聲來已十五年矣恐斷
吾嗣是以去之戴人曰公勿黜也如用吾藥病可除
孕可得卒從之戴人診其脉寸脉沉而遲尺脉洪大
有力非無子之候也可不逾年而孕其良人歎曰試
之先以三聖散吐涎一斗心下平軟次服白术調中
湯五苓散後以四物湯和之不再月氣血合度數月
而娠一子戴人常曰用吾此法無不子之婦此言不
誣　一婦人年三十四歲夢與鬼神交驚怕異常及
見神堂陰司舟楫橋梁如此一十五年竟無妊娠巫
祈覡禱無所不至鑽肌灸肉孔穴萬千黄瘦發熱引
飲中滿足腫委命于天一日苦請戴人戴人曰陽火

盛于上陰水盛于下見鬼神者陰之靈神堂者陰之所居(?)橋梁水之用兩手寸脈皆沉而伏知胸中有實痰也凡三湧三泄三汗不旬日而無夢一月而有娠

蕩血積冷

大盪胞湯 治婦人立身以來全不產育及斷絶久不產三十年者宜服

朴硝 牡丹皮 當歸 各三兩(?)

大黃 [illegible] 桃仁 [illegible] 細辛 一兩

厚朴 [illegible] 桔梗 赤芍藥 一兩(?)

人參 茯苓 桂心 各(?)

甘草 牛膝去苗 陳橘皮 已上各[illegible]兩

附子炮去皮 虻蟲去翅足[illegible] 水蛭炒枯各[illegible]

右件以清酒伍升水陸合煮取參升分四服日三夜一每服相去三辰少時更服如常覆被少時取汗汗不出冬月著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁[illegible]為婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著坐導藥

坐導藥 治全不產及斷緒服前湯惡物不盡用此方

皂角去皮子 吳茱萸 當歸各一兩

細辛去苗 五味子 乾薑各一兩

黃芩(?)化 白礬枯 戎鹽

蜀椒[illegible]

右為末以絹袋大如指長三寸餘盛藥令滿納婦人陰中坐臥任意勿行走小便時去之更安一日一度易新者必下清黃冷汁汁盡止若未見病出可十日安之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則發疼痛須候病出盡方已不可中輟每日早晚用貫眾煎湯盪之

治無子

附秦桂丸論 無子之因多起於婦人醫者不求其因起於何處遍閱古方惟秦桂丸其辭確其意專用溫熱藥近乎人情欣然受之欣然服之甘受燔灼之禍猶惜然不悔何者陽精之施陰血能攝之精成其子血成其胞胎孕乃成今婦人之無子者率由血少不足以攝精也血之少也固非一端然欲得子者必須調補陰血使無虧欠乃可推其有餘以成胎孕何

乃輕用熱劑煎熬臟腑，血氣沸騰，禍不旋踵矣。或曰：春氣溫和則萬物發生，冬氣寒凜則萬物消損，非於桂丸之溫熱，何以得子臟溫煖而成胎耶？予曰：詩曰婦人和平則樂有子，和則血氣均平，則陰陽不爭。今得此藥，經血必轉紫黑，漸成衰少，或先或後，始則飲食驟進，久則口苦而乾，陰陽不平，血氣不和，疾病蜂起，焉能成胎？縱然成胎，生子亦多病而不壽，以秦桂丸能損天真之陰也，戒之慎之。[illegible]

又婦人無子胞門[illegible]　又法氣門[illegible]

又法子宮[illegible]　中極

又法關元[illegible]

甲：絕子，灸臍中，令人有子。女子手腳拘攣，腹滿疝，月水不下，乳餘疾，絕子，陰癢，陰交主之。腹滿疝積聚，乳餘疾，絕子，陰癢，刺石門[illegible]。女子絕子，衃血在內不下，關元主之[illegible]。婦人子門不端，少腹苦寒，陰癢及痛，經閉不通，中極主之。婦人無子，涌泉主之。大疝絕子，築賓主之。絕子，商丘主之（穴在內踝前宛宛中）。婦人絕產，若未曾產，陰廉主之[illegible]

袁了凡先生云：聚精之道，一曰寡慾，二曰節勞，三曰息怒，四曰戒酒，五曰慎味。今之談養生者，多言採陰補陽，久戰不泄，此為大謬。腎為精之府，凡男女交接，必擾其腎，腎動則精血隨之而流，外雖不泄，精已離宮，未能堅忍者，亦必有真精數點隨陽之痿而溢出，此其驗也。如火之有烟焰，豈有復反于薪者哉？是故貴寡慾。精成于血，不獨房室之交損吾之精，凡日用損血之事，皆當深戒。如目勞于視，則血以視耗；耳勞于聽，則血以聽耗；心勞于思，則血以思耗。吾隨事而節之，則血得其養而與日俱積矣，是故貴節勞。主閉藏者腎也，司疏泄者肝也，二藏皆有相火，而其系上屬于心。心，君火也，怒則傷肝而相火動，動則疏泄者用事，而閉藏不得其職，雖不交合，亦暗流而潛耗矣，是故當息怒。人身之血各歸其舍則常凝，酒能動血，人飲酒則面赤，手足俱紅，是擾其血而奔馳之也。血氣既衰之人，數月無房事，精始厚而可用，然使一夜大醉，精隨薄矣，是故宜戒酒。內經云：精不足者，補之以味。然醲郁之味不能生精，惟恬淡之味乃能補精耳。蓋萬物皆有真味，調和勝而真味衰矣，不論

腥素淡煮之得法自有一段冲和恬淡之氣益人腸胃洪範論味而曰稼穡作甘世間之物惟五穀得味之正但能淡食穀味最能養精又凡煮粥飯而中有厚汁滾作一團者此米之精液所聚也食之最能生精試之有效 煉精有訣全在腎家下手內腎一竅名玄關外腎一竅名牝戶真精未洩乾體未破則外腎陽氣至子時而興人身之氣與天地之氣兩相脗合精洩體破而吾身陽生之候漸晚有丑而生者次則寅而生者又次則卯而生者有終不生者始與天地不相應矣煉之之訣須半夜子時即披衣起坐兩手搓極熱以一手將外腎兜住以一手掩臍而凝神于內腎久久習之而精旺矣

桂茸丸 專治九醜之疾言莖弱而不振振而不豐豐而不循循而不實實而不堅堅而不久久而無精精而無子謂之九醜之疾此藥補十二經絡起陰發陽能令陽氣入胸安魂定魄開三焦積聚消五穀進食強陰益子精安五臟除心中伏熱強筋骨輕身明目去冷除風無所不治此藥平補多服常服最妙七十歲老人尚能育子非常之方及治五勞七傷無子嗣者

鹿角膠 [illegible]
杜仲 去皮[illegible]
乾山藥　白茯苓 [illegible]
熟地黃 [illegible]　兎絲子 [illegible]　山茱萸肉 [illegible]
北五味子　川牛膝 [illegible]　益智仁 [illegible]
遠志 去心[illegible]　小懷香 [illegible]　川楝子 [illegible]
川巴戟 [illegible]
破故紙　胡盧巴 [illegible]
柏子仁 去殼另研如泥[illegible]
沉香 [illegible]　全蝎 [illegible]　川山甲 酥炙

右件各製度爲極細末以新嫩肉蓯蓉肆兩酒洗淨去鱗甲皮切開心如有黃白膜亦去之取淨貳兩好酒煮成膏同煉蜜和前藥末搗千餘下丸如桐子大每服伍拾丸淡秋石湯溫酒任下以乾物壓之漸加至百丸服七日四肢光澤脣臉赤色手足溫和面目滋潤又能消食理脾輕身和氣語言清亮是其効也

千金種子丹 此方服之令人多子并治虛損夢遺白濁脫卸 男子服

沙苑蒺藜 [illegible]

遠志

山茱萸

覆盆子

雞頭實

龍骨

右用伏蜜壹斤煉以紙粘去浮沫數次無沫滴水中成珠者何候止用肆兩將前五味重羅過先以茯苓骨和作一塊再入煉蜜石臼內搗千餘下丸如豌豆大每服叁拾丸空心鹽湯送下忌慾事二十日此藥延年益壽令人多子不可盡述

聚精丸

黃魚鰾膠

沙苑蒺藜

右爲末煉蜜丸如梧子大每服捌拾丸空心溫酒白湯任下忌食魚及牛肉

五子衍宗丸　男服此藥添精補髓疏利腎氣不問下焦虛實寒熱服之自能平秘舊稱古今第一種子方有人世服此藥子孫蕃衍遂成村落之說嘉靖丁亥於廣信鄭中丞宅得之張神仙四世孫子及數人用之殊驗

甘州枸杞子　兔絲子

遼五味子 壹兩　覆盆子　車前子

右五品俱擇道地精新者焙曬乾共爲細末煉蜜丸如桐子大每服空心玖拾丸上牀時伍拾丸白沸湯或鹽湯送下冬月用溫酒送下修合日春取丙丁巳午夏取戊己辰戌丑未秋取壬癸亥子冬取甲乙寅卯忌師尼鰥寡之人及雞犬六畜見之

壬子丸　四明沈嘉則無子已上外服之連舉子

槐角子　覆盆子　枸杞子 去梗者及蒂

桑椹子　冬青子　兔絲子

柏子仁　沒石子　蛇床子

北五味子

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服伍陸拾丸淡鹽湯下乾點心壓之

趙氏加味六子丸

兔絲子　川牛膝 去蘆酒蒸　麥門冬

山茱萸 取肉　原蠶蛾　五味子

蛇床子　車前子　大甘草 炙壹兩

沙苑蒺藜　覆盆子　破故紙

肉蓯蓉酒浸焙乾

腎雖屬水不宜太冷精寒則難成孕如天地寒凉則草木必無萌芽也此方極意斟酌不寒不熱得其中和修合服之如一陽初動萬物化生二三月後必孕成矣前藥俱忌鐵器乾剉碎爲末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸或肆拾丸淸鹽湯送下早晚皆服

灸法 治男子無子者用熟艾宜置用鹽填臍滿却於臍上以蒜大小做艾丸灸之如痛即換鹽再灸至艾盡為度如一日灸不盡二日三日灸之當效

知時 凡先生云天地生物必有絪縕之時萬物化生必有樂育之時如猫犬至微將受娠也其雌必狂呼而奔跳以絪縕樂育之氣觸之而不能自止耳此天然之節候生化之眞機也世人種子有云三十時辰兩日半二十八九君須算此特言其大槩耳非的論也其經一月止有一日一日止有一時凡婦人一月經行一度必有一日絪縕之候於一時辰間氣蒸而熱昏而悶有欲交接不可忍之狀此的候也於此時逆而取之則成丹順而施之則成胎矣其曰三日月出庚又曰溫溫鉛鼎光透簾幃皆言其景象也當其欲情濃動之時子宮內有如蓮花蕊者不拘經淨幾日自然挺出於陰中如蓮蕊初開內人洗下體以手探之自知也但含羞不肯言耳男子預密告之令其自言則一舉即中矣

成胎 丹溪云成胎以精血之後先分男女者褚澄之論也愚竊惑焉後閱東垣之有曰經水斷後一二日血海始淨精勝其血感者成男四五日後血脉已旺精不勝血感者成女此論亦為未瑩何以言之易曰乾道成男坤道成女夫乾坤陰陽之性情也左右陰陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而合精之泄陽之施也血能攝之陰之化也精成其骨此萬物之資始於乾元也血成其胞萬物之資生於坤元也陰陽交媾胎孕乃凝胎之所居名曰子宮一系在下上有兩岐一達於左一達於右精勝其血及當日陽時感者則陽為之主受氣於左子宮而男形成精不勝血及系日陰時感者則陰為之主受氣於右子宮而女形成或曰分男分女吾知之矣其有雙胎者將何如曰精氣有餘岐而分之血因分而攝之故也若夫男女同孕者剛日陽時柔日陰時感則陰陽混雜不屬左不屬右受氣於兩岐之間者也亦有

三胎四胎五胎六胎者猶是而已或曰其有男不可
為父女不可為母與男女之兼形者又若何而分之
耶予曰男不可為父得陽道之虧者也女不可為
母得陰道之塞者也兼形者由陰為駁氣所乘而為
狀不一以女兼男形者有二一則遇男為妻遇女為
夫二則可妻而不可夫又有下為女體上具男之全
形此又駁之甚者也或曰駁氣所乘獨見於陰而所
成之形又若是之不同耶予曰陰體虛駁氣易於乘
也駁氣所乘陰陽相混無所為主不可屬左不可屬
右受氣于兩岐之間隨所得駁氣之輕重而成形故

女科四

所兼之形有不可得而同也　[illegible]云丹溪此論
極為精微發前人之未發足知男女之分已定於萬
物資始乾元之際陰陽交媾之時昧者不悟是理妄
有轉女為男之法惑矣夫萬物皆資始於乾元獨男
女之分不資始于乾元乎　[illegible]先生巢氏論婦人
妊娠一月名胎胚足厥陰脈養之二月名始膏足少
陽脈養之三月名始胎手心脈養之四月始受水精
以行血脈手少陽脈養之五月始受火精以成其氣
足太陰脈養之六月始受金精以成其筋足陽明脈養
之七月始受木精以成其骨手太陰脈養之八月始

受土精以成膚革手陽明脈養之九月始受石精以
成毛髮足少陰脈養之十月藏府關節人神俱備此
其大略也若求其細則受胎在腹七日一變展轉相
成各有生相大集經備矣今婦人墮胎在三月五月
七月者多在二四六月者少臟陰而腑陽三月屬心
五月屬脾七月屬肺皆在五臟之脈陰常易虧故多
墮耳如曾三月墮胎則心脈受傷須先調心不然
至三月復墮如曾五月墮胎則脾脈受傷後至五月
復墮宜先治脾惟有一月之內墮胎則人皆不知有
胎但知不受妊不知其受而墮也一月屬肝怒則墮

女科四　三二

多洗下體則竅開亦墮一次既墮則肝脈受傷他次
亦墮今之無子者大半是一月墮胎非盡不受妊也
故凡初交之後最宜將息勿復交接以擾其子宮勿
令怒勿令勞勿令舉重勿令洗浴而又多服養肝平
氣之藥胎可固矣　程鳴熊云褚氏言男女交合
陰血先至陽精後衝而男形成陽精先入陰血後參
而女形成信斯言也人有精先洩而生男精後泄而
生女者獨何歟東垣曰經水斷後一二日血海始淨
感者成男四五日血脈已旺感者成女至于六七日
後則經交感亦不成胎信斯言也人有經始斷交合

小女經久斷交合生男者亦有四五日以前交合無
孕八九日以後交合有孕者獨何歟前二本說淵
薄略者有立圖而實陽能入益陰行道不能受孕即
東垣之故見也又謂後陽不能射陰精不能入陽
信斯言也世有尪羸之夫怯弱之婦屢屢交而雖欲
止之而不能止者亦有血氣方剛精力過人稍乃艱
于有覆而莫之救者獨何歟宋東垣論治專以婦人
經水爲主然富貴之家侍妾已多其中寧無月水當
期者乎有已經前夫頻頻生育而娶此以圖其易者
顧亦不能得胎更遣與他人轉盼生男矣豈不能受

[illegible] 三三

孕于此而能受孕于彼乎愚以爲父母之生子如天
地之生物易曰坤道其順乎承天而時行夫知地之
生物不過順承乎天則知母之生子亦不過順承乎
父而已知母之順承乎父則種子者果以婦人爲上
乎以男子爲上乎然所謂上於男子者不拘老少不
拘強弱不拘康寧病患不拘精易洩難洩只以交感
之時百脉齊到爲善耳交感而百脉齊到雖老雖弱
雖病患雖易洩亦可以成胎交感而百脉參差雖少
雖強雖康寧雖難洩亦難以成胎矣婦人所構之血
固由于百脉合聚較之男子之精不能無輕重之分

也孔子贊乾元資始天贊坤元資生日至得無意
乎若男女之辨又不以精血先後爲拘不以經盡幾
日爲拘不以夜半前後交感爲拘不以父強母弱母
強父弱爲拘只以精血各由百脉之齊到者別勝負
耳是故精之百脉齊至有以勝乎血則成男矣血之
百脉齊至有以勝乎精則成女矣至有既孕而小產
者有生而不育者有育而不壽者[illegible]者
則亦由血[illegible]分爲脩短耳世人不[illegible]其相因之
[illegible]乃定于稟受之初乃以小[illegible]以不[illegible]
專付之兒以爲天數之數不亦謬乎

[illegible] 三六

候胎

【診】婦人懷軀七月而不可知時將血而轉筋者此為軀也。[illegible]而轉筋者非軀也。[illegible]又云婦人足少陰脈動甚者任子也[illegible]陰搏陽別謂之有子[illegible]

脈如妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也脈滑疾重以手按之散者胎已三月也脈重手按之不散但疾不滑者五月也[illegible]

尺脈左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實狀[illegible]

婦人妊娠四月欲知男女法左疾為男右疾為女俱疾為生二子[illegible]

遣妊娠人面南行還復呼之左迴首者是男右迴首者是女[illegible]從後急呼之左迴首者是男右迴首者是女也[illegible]按[illegible]以男受胎在左子宮女受胎在右子宮斯[illegible]其是說也蓋男胎在左則左重故回首時慎護重處而就左也女胎在右則右重故回首時慎護重處而就右也推之於脈其義亦然胎在左則血氣護胎而盛於左故脈亦從之而左疾為男左大為男也胎在右則血氣護胎而盛於右故脈亦從之而右疾為女右大為女也亦猶經云陰搏陽別謂之有子[illegible]而盛於下故陰之尺脈鼓搏有力而與陽之寸脈殊別也又如癰癤發上則血氣從上而寸脈盛發下則血氣從下而尺脈盛發左則血氣從左而左脈盛發右則血氣從右而右脈盛也所溪以左大順男右大順女為醫人之左右手[illegible]智者之一失也

診婦人有妊歌[illegible]

肝為血兮肺為氣血為榮兮氣為衛陰陽配耦不參差兩臟通和皆類例血衰氣王定無孕血王氣衰應有體[illegible]寸微關滑尺帶數流利往來并雀啄小兒之脈已見形數月懷耽猶未覺[illegible]左疾為男右為女流利相通速來去兩手關脈大相應已形亦在前通語[illegible]縱兩個兒[illegible]左手帶[illegible]也右手帶橫一雙女[illegible]

二五

一雙女於右手見之左手脈逆生三男（逆者子乘母也是水乘金火乘木[illegible]）

右手則懷三男也右手脈順還三女（順者[illegible]）

尺部皆相應一男一女分形證（[illegible]一男一女大小[illegible]之脈也）

或即母亡存子命（此二句[illegible]子母存亡之[illegible]）往來三部通流利滑數相參皆替替陽實陰虛脈得明通滿胸膛皆逆氣（[illegible]）

（關尺三部通行流利皆有力而數皆是陽實陰虛之脈主姙婦[illegible]不順也）左手太陽浮大男（左手[illegible]為太陽其脈浮大則是懷男之脈也）右手太陰沉細女（右手[illegible]為太陰其脈沉細是懷女之脈也）諸陽為男諸陰女指下分明長記取（諸陽脈皆為男[illegible]）

當[illegible]三部沉正等無絕尺內不止真胎婦（[illegible]）夫乘妻兮縱氣霧（[illegible]）妻乘夫兮橫氣助（[illegible]）子乘母兮逆氣參（[illegible]）母乘子兮順氣護（[illegible]）小兒日足胎成聚身熱脈亂無所苦（[illegible]）汗出不食吐逆時精神結備其中住（[illegible]）

[illegible]但疾不散五月母（[illegible]）滑利安沉細而微歸異路（[illegible]）

驗胎 神方驗胎散

婦人三兩個月月經不行疑是兩身却疑血滯心煩寒熱恍惚此藥可驗取之內也外已有身為無邪脈以本周脈法推之十得八九矣

真雀腦芎（一兩）　當歸（全用重一兩若只用米錢）

右為細末分作兩服濃煎好艾湯一盞調下或好酒調服亦得可待二兩箇時辰間覺腹臍微動仍頻即有胎也動罷即愈安穩無虞如不是胎即不動所滯惡物自行母亦安也如服藥不覺效再煎紅花湯調下必有神效

又方 治婦人經脈住三箇月驗胎法真川芎為細末濃煎艾湯下一匕投腹內漸動是有胎也

探胎散　婦人胎氣有無疑惑之間以此探之有胎

則吐無則不吐

皂角去皮　甘草炙各五錢　黄連一錢

右為細末作一服温酒調服

博陵之郡之中者日鄰翁十人陳光運妻病欲以為勞役之際日病解藥是為妊娠且頻利小子已而果然又一婦人妊一暗黑不能言鄰曰兒胎大經絡兒生經行則言矣不可毒以藥一極壯健鄰診其脈曰母氣已死所以生者反恃兒氣耳如則子生母死

一婦人渴惟飲五味汁名醫耶陽診其脈曰此血

欲凝非疾也已而果孕古方有血欲凝而渴飲五味之證不可不知也　滑壽診虞部員外郎張成之妻孕五歲南陵尉富昌齡妻孕二歲團練使劉彝孫妾孕十有四月皆未育壽視之曰疾也凡醫妄以為有孕爾於是與破血攻毒大劑飲之虞部妻墮肉塊百餘有衍目狀昌齡妻夢二帝子一色漆黑仍怖悸疾走而去孫妾墮大蛇猶蜿蜒未死三婦皆無恙

陳斗巖治南洲妻經閉五月下白或赤午後發熱咳嗽喘吐醫為勞瘵陳視曰兩尺脈皆實此必有孕外受風邪搏激故耳飲清和之劑而安半年生一子

胎產大法

潔古治胎產之病從厥陰經論之無犯胃氣及上二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動于脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣如發渴則白虎氣弱則黃耆血刺痛而和以當歸腹中疼而加之芍藥大抵產病天行從增損柴胡雜證從增損四物宜詳察脈證而用之

大抵外則和於榮衛內則調於傷寒壞證治之　李仲南胎前病惟當安胎順氣若外感四氣

內傷七情以成他病治法與男子無異當於各證類中求之但胎前治他證者動胎之劑切須審詳爾

丹胎前當清熱養血　產前安胎白朮黃芩妙藥也

胎前將臨月以三補丸加炒香附炒白芍藥丸服　又抑熱以三補丸用生地黃膏丸

有孕八九箇月必順氣枳殼緊除湯　前至八九月

因火動胎逆上作喘急者可用條芩香附之類為末調下條芩於水中沉取重者用之　因胎熱黃芩半錢當歸身尾人參白朮陳皮各壹錢甘草參分黃芩川芎各半錢黃連炒粉各少許桑上羊兒

膝銀金花七葉完者糯米拾肆粒煎服血虛不安者用阿膠痛者用砂仁行血氣故也

嘗脈志云政和中蔡魯公之孫婦有孕及期而病國醫皆以為陽證傷寒懼胎墮不敢投以涼劑魯公密至訊之曰兒處胎十月將生矣何藥之能敗即以常法與藥且使倍服之半日而兒生病亦失去明日其婦大泄而喉閉不入食衆醫復指其疵且曰二疾如冰炭又產蓐甫近雖司命無如之何矣張曰無用憂也將使即日愈乃取藥數十粒使吞之咽喉即通下泄亦止及滿月魯公酌酒為壽曰君術通神吾不敢知

敢問一藥而愈二疾何也張曰此于經無所載特以意處之向者所用藥乃附子理中丸裹以紫雪爾方喉閉不通非至寒藥不為用既以下咽則消釋無餘其得至腹中者附子力也故一服而兩疾愈公大加嘆異

汪機治一婦常患橫生逆產七八胎矣子皆不育汪診脈皆細澁頗弦曰此氣血兩虛無熱也或曰氣血有餘方成妊娠氣血既虧安能胎耶汪曰觀其形長瘦而脈細濡屬于氣血兩虛色青脈弦屬于肝火時熾而兩尺浮滑似血虛為輕而氣虛為重也宜以補

於托除躁炙倍加香附參芪蜜丸服之常令接續踰年臨產果順而育一子

保生丸 補養胎臟益血安和子臟治妊娠將理失宜或因勞役胎動不安腰腹痛重胞阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成胎或受妊不能固養痿燥不長過年不產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨產節適乖宜驚動太早產時未至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑吐出冷沫新產惡血上衝運悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹疼痛寒

熱往來或因產勞損虛羸未復面黃體瘦心怔盜汗飲食不進漸成蓐勞人月常服壯氣養胎正順產理潤胎易產產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實腑臟治風虛除痼冷

大麻仁 貝母 黃芩 一

大豆黃卷 粳米 甘草 炙微赤

乾薑 炮 肉桂 去粗皮 石斛 去根

石膏 細研 秦椒 微炒 當歸 去蘆炒

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸並用溫酒或棗湯化下嚼亦得空心食前服

交感地黃煎丸　治婦人產前產後眼見黑花或即發狂如見鬼狀胞衣不下失音不語心腹脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口內生瘡咽中腫痛心虛忪悸夜不得眠產後中風角弓反張面赤牙關緊急崩中下血如豚肝狀臍腹㽲痛血多血少結為癥瘕恍惚昏迷四肢腫滿產前胎不安產後血刺痛皆治之

生地黃（淨洗研以布絞汁留滓以生薑汁炒地黃滓以地黃汁炒生薑滓各至乾為末）

生薑（各二斤淨洗爛研以布絞汁）　當歸（去蘆）

延胡索（拌糯米炒赤去米）　琥珀（別研各一兩）　蒲黃（炒香四兩）

右為末蜜丸彈子大當歸湯化壹丸食前服

琥珀丸　治婦人胎前產後百病及療二十六種血冷七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺手足痠疼乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯不安死胎不出并胎衣不下並宜服之

琥珀（別研）　辰砂（別研各一兩）　阿膠（碎炒）

五味子（一兩半）　石斛（去根）　附子（炮去皮臍）

肉桂（去粗皮）　沉香（不見火）　川芎（各半兩）

牛膝（去蘆酒浸）　當歸（去蘆炒）　肉蓯蓉（酒浸炒）

人參　續斷　沒藥（別研）

熟地黃　木香（各一兩）

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸空心煖酒化下午後食前再服能生新血去惡血　若腹脇疼痛繞臍如刀刺及惱逆上氣築心痰痃不思飲食用薑汁少許和酒化服　諸痢及赤白帶下血冷崩中下血漏胎下血用生薑與艾剉炒令赤色入酒同煎數沸去滓調服　泄瀉不止陳米飲化服　淋瀝諸淋煎通草燈心湯服　血暈不知人煎當歸酒調服　上熱下冷煎人參湯服　遍身虛腫水氣煎赤小豆湯服　產內一切傷寒及

中風角弓反張如板硬煎麻黃湯服以衣被蓋出汗　月經不通或閉絕五色頻併而下斷續不止飲食無味肌膚瘦劣面赤唇焦乍寒乍熱四肢煩疼五心燥熱黑點遍身血斑赤腫走注及血風勞傷無力用童子小便入當汁少許調服常服以童便為妙若惡心和以半酒　如懷胎婦於臨月一日一服令產下不覺疼痛或服至五服十服日飲食是藥力也其功不能具述

龍鬚湯　治胎前產後身疼（體痛）論云身疼者肌體不實而受風邪客於經絡邪氣與正氣相搏交擊

於骨肉之間故身疼而不動則趁痛散主之若姙娠而患身體疼者必因勞役過多致使然也不爾經絡受風寒命痛丸防風湯主之產者若因勞役身疼而不能動搏者良由產後百節開張血脉流走氣弱則骨肉之間血多凝滯是故百節經脉緊急腰背不能轉側手足不能動搖身熱若納參頭如釘釘醫者不識妄為傷寒發汗變生他證宜服

黃芪 三兩蜜炙　當歸 去蘆酒浸　牛膝 酒洗去蘆[illegible]

[illegible]　白朮　防風 去蘆

獨活 去蘆　甘草 各錢半

右㕮咀每服半兩水伍盞生薑拾片葱白一寸全搥同煎至叁盞去滓不拘時服

佛手散 治產前產後腹痛體熱頭疼及纔產未進別物即先服此藥逐敗血生新血能除諸疾

川芎 貳兩　當歸 叁兩

右為細末每服貳錢水一盞酒貳分同煎柒分溫服 一方為麁末每服肆錢水柒分酒叁分同煎全柒分熱服未產前先安排此藥將臨服藥煎之產了速進之三日內日三服三日外一服 一方名芎歸湯只此二味等分以咀水煎專治失血傷

胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙去血不止一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉能治之若產後眩暈宜加芍藥服之 一名芎歸散治產後腹疼不可忍者加桂心等分酒與童子小便合煎服之立效 一名芎歸湯治妊娠子死或未死胎動不安每服用酒水合煎連進數服胎若已死服之便下若未死其胎即安此經累効萬不失一 一名琥珀散臨月服之只縮胎易產兼治產後諸疾 一名羊肉湯治產損瘀之腹中疼痛往來寒熱吸吸少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服用精羊肉壹兩生薑拾片水貳盞煎至陸分溫服 一名君臣散治婦人室女心腹疼痛經脉不調用水煎服 若姙婦胎氣不安產後諸疾加酒煎服 一名擒當散治婦人血氣上喘下腫二味等分為細末每服貳錢水一盞煎葵湯調下又治產後損身血衝心及腹脹氣絕者神驗 難生倒橫子死腹中先用黑大豆壹合炒熱水壹盞入童子小便壹盞藥末四錢同煎至壹盞以上分為二服未效再作 產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑豆加生薑自

然汁半合煎服　治臟毒下血每服二錢半入炒槐花
末半錢水一盞煎至七分無時服三五服下血塊
即愈　如產後頭疼加荊芥煎如吐血亦宜服之
若產難多用百草霜香白芷等分為末名烏金
散每服二錢童子小便好醋各半合沸湯浸服止
一服見效甚者再服已分娩矣　一法以五積散
加醋煎服亦能催生　崩中漏下久血過多久不
能止用芎歸湯發之不止者宜以香附子炒去皮
毛為細末每服二錢入甘草末一錢清米飲調服名
順元湯　有白帶者於順元湯內加芍藥半兩或

謂之潤經氣則不然許學士謂滋血養氣婦人仙
藥雖癥人亦宜服之　兼治男女吐衄使利及諸
證失血用此藥係以米飲丸百草霜為衣每服百餘
丸或以其他燒灰藥皆能作效不可遽以燥澀之
劑止之必致癰漏腐敗必生他證大抵血不能行
氣使之然若氣得其平則血循故道必無妄行之
患矣香附子善能導氣用之勿疑也
收選用　治婦人胎前產後諸疾危證
右用小葉獅背艾麻葉似艾葉開紫花如紅蓼花
一名花豬草又名益母草又名火杴又名貞蔚又

名貞稱端五日採取陰乾用葉及花子以磁器研
為細末煉蜜和丸如彈子大隨後治證服其根
燒存性為末酒調服功與黑神散不相上下　如
胎前臍腹作痛或作聲者溫米飲下　胎前產後
臍腹刺痛胎動不安下血不止术煎秦艽糯米湯
下或當歸湯亦可　如產時先用一丸以童子小
便化下安魂定魄自然氣血調順諸病不生又能
破血止痛養脈息調經絡溫酒下　產後胎衣不
下血在胞中及橫生不順死胎經日不下者脹滿
腹中心悶心痛炒薑湯下　產後中風牙關緊急

一半身不遂失音不語童子小便無灰酒各半下
產後咳嗽胸膈不利惡心口吐酸水面目浮腫兩
脇痛舉動失力者溫酒下　產後兩太陽痛呵欠
心忪氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑
麻百節疼痛溫米飲湯下　產後眼前黑暗血暈
血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事薄荷自
然汁如無生者濃煎薄荷湯下及童子小便酒各
一半亦可　產後面垢顏赤五心煩熱或結成血塊
臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童子小便酒各半
下薄荷自然汁亦可　產後大小便不通結

滯臍腹刺痛惡物上衝心胸卒悶者童子小便酒
各半下　產後大小便不通煩躁口苦者薄荷自
然汁下如無生者濃煎薄荷湯下　產後瀉血者
水調漿湯下　產後口帶下者薊膠艾湯下　月
水不調溫酒下　血崩漏下溫酒下　婦人久無
子息溫酒下服之令有孕或冷氣亦能治孕　一
子死腹中者因產母臟腑熱極蒸其胎是以子死
也若子死在腹中宮或陰戶冷痛小便沫
出腹中四肢逆冷爪甲青者是也或臨產之時此
藥安魂定魄血氣自然調順諸疾不生破血補虛

止痛養血氣調經絡酒煎童子小便各半分化下
二難產者胎以食母之血十月滿足則餘血結成
塊俗呼為兒枕欲產之時血塊先動敗血裹其子
是以難產或產後惡物不盡臍腹刺痛惡物上衝
心胸悶用童便酒各半分化下　三垢而類赤
胎衣不下從產了臟腑虛瘀五心煩躁血流入衣
中則難出淡其熱有冷汗出但去其敗血其衣自
出如帶斷了服此藥下或橫生不順心悶欲死者
童便酒各半分化下薄荷自然汁調湯亦可　四
產後三日起則不得眠時兩目黑暗生花蓋產後血氣

未定運走五臟入肝則目昏俗為麻風醫家以風
治之或血熱口乾煩渴心悶亂如見鬼神狂言妄
語不省人事童便酒各半分薄荷自然汁亦可
五產後口乾心悶及煩渴者血氣未定卻食麪
積滯在內以致熱躁煩渴者俗為胸膈壅盛或兩
太陽疼痛呵欠怔忡氣短身體羸瘦不思飲食血
風身熱手足頑麻百節疼痛此名溫米飲童便各
半分化下　六產後四肢浮腫及寒熱者蓋因敗
血流入五臟滲入四肢停留日久化為膿狀氣喘
或小便澀或咳嗽胸脇不利惡心口吐酸水兩脇

疼痛累動乏力溫酒化下　七產後寒熱往來蓋
因敗血入心則熱入脾則寒狀如瘧臍腹作痛或
作聲溫米飲化下桂枝湯亦可　八產後中風牙
關緊急半身不遂失音不語童便酒各半分化下
九產後痢水經月滿或誤食物下與血相攻擊
前所積受濕以此敗血相攻桑湯下　十產後大
便秘結口苦煩渴非時不語乃敗血衝心蔽其心
孔童便酒各半分化下薄荷汁亦可　十一產後
遍身疼痛百節開張血來流入陽中停留不散
臍腹疼痛米飲化下　十二產後崩中漏下不止

蓋是傷酸物，狀如雞肝，吞背候悶，煎糯米秦艽湯
化下，當歸枳殼湯亦可。十二產後未經月滿，血
氣不通，喜怒□□，未還或食熱麪雞，結成塊，喘嗽，
四肢無力，令血汗出不止，月水不調，爲骨蒸勞，
便服此藥，當以酒各半分化下。十四產後吐逆
不止，當因敗血停於脾胃，脾冷□□，噦惡腹脹，俗
爲反胃，溫酒化下。十五產後霍亂吐瀉，並盛
因心腹疼痛，因□□□□，使酒各半分化下。
十六產後赤白帶下，煎秦艽湯下。十七產後氣
急咳中痛，有者當因敗血衝心，入咳中，萬無一痊

胎前產後　八　四十

矣。十八產後中風，名言因未經七月，勞重則百
日之中作勞，心中中風，初病之狀，眼澀口噤，筋急角
弓反張，牙關緊急，若此者皆自傷犯也。十九產
後面色黑及遍身皆黑，糯者乃敗血入皮膚，萬無
一痊矣。

內灸散　治婦人產前產後一切血疾，血崩虛憊，腹
脇疼痛，氣逆嘔吐，冷血冷氣凝積，塊硬刺痛，泄下
青白，或下五色，腹中虛鳴，氣滿堅脹，瀝血腰疼，口
吐清水，頻產血衰，顏色青黃，勞傷劣弱，月經不調，
下血墮胎，血迷血暈，血瘕時發，疼痛，頭目眩□，
血上心悶絕，昏迷，惡露不乾，體虛多汗，手足逆冷，
並宜服之

藿香葉　肉桂去皮　熟乾地黃洗焙
丁香皮各一兩　甘草炙赤　山藥
當歸去蘆洗　白朮　白芷各八兩
蒼朮米泔浸　乾薑炮　川芎
黃芪去蘆各　木香不見火　陳皮去白
白芍藥　茴香炒

右爲散，每服三錢，水一大盞，入生薑五片，艾一團，
同煎至七分，空心食前熱服，爲末溫酒調下亦得。
如產後下血過多，加蒲黃煎服；惡露不快，加當歸、

胎前　胎產大全　八　女科四　四十一

紅花煎；水瀉，加肉豆蔻末煎服；嘔吐，加藿香、生
薑煎；上熱下冷，加荊芥煎；但是腹中虛冷，血氣不
和，並宜服。產後每日一服，則百病不生。丈夫虛冷
氣刺，心腹疼痛，尤宜服之。

食忌　一受胎之後，切宜忌不可食之物，非惟有感動
胎氣之戒，然於物理亦有厭忌者。設或不能禁忌，非
特延月難產，亦能令兒破形母損，可不戒哉。
食雞肉糯米合食，令子生寸白蟲。食羊肝，令子
多厄。食鯉魚膾及雞子，令兒成疳多瘡。食犬

肉令子無聲音　食兎肉令子缺唇　食鱉令子
項短及損胎　食鴨子共桑椹同食令子倒生心
寒　食螃蟹令子橫生　食雀肉合豆醬食之令
子面生黯黑子　食豆醬合藿香食之墮胎　食
水漿絕產　食雀肉令子不恥多淫　食山羊肉
令子多病　食生薑令子多指生瘡　食蝦蟆鱔
鱉令子喑啞　食騾驢馬肉延月難產
如此之類無不驗者則知聖人胎教之法矣
【藥忌】蚖斑水蛭地膽蟲烏頭附子配天雄躑躅野葛
螻蛄類烏喙側子及虻蟲牛黃水銀并巴豆大戟蛇

蛻及蜈蚣牛膝藜蘆并薏苡金石錫粉及雌雄牙硝
芒硝牡丹桂蜥蜴飛生及䗪蟲代赭蚱蟬胡粉麝芫
花薇銜草三棱槐子牽牛并皂角桃仁蠐螬和茅根
欓根硇砂與乾漆亭長波流菵草中瞿麥蘭茹蟹爪
甲蝟皮赤箭赤頭紅馬刀石蠶衣魚等半夏南星通
草同乾薑蒜雞及雞子驢肉兎肉不須供切須婦人
產前忌此歌宜記在心胸
【起居忌】便產須知云勿亂服藥勿過飲酒勿妄針灸
勿向非常地便勿舉重登高涉險心有大驚犯之產
難子疾病勿多睡臥時時行步體虛腎氣不足生子

解顱腦破不合宜溫補脾胃不和榮衛虛怯
瘦自家及鄰家修造動土犯其胎氣令子破形
刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色必青黯
者相拘攣有此等驗如影響切宜避之

逐月養胎法

北齊名醫徐之才云妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥毋食腥辛是謂才正　妊娠一月足厥陰脉養不可針灸其經[illegible]足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澀不爲力事寢必安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽新合爲胎寒多爲痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服

烏雌雞湯

烏雌雞一隻治如食法　茯苓　阿膠各貳兩

[illegible]

吳茱萸壹升　麥門冬伍合去心　人參

芍藥　白朮各參兩　甘草

生薑各壹兩

右㕮咀以水壹斗貳升煮雞取汁陸升去雞下藥煎取參升內酒參升并膠烊盡取參升放溫每服壹升日三

補胎湯　若曾傷一月胎者當預服此

細辛壹兩　防風貳兩　乾地黃

白朮各參兩　生薑肆兩　吳茱萸

大麥各伍合　烏梅壹升

右八味㕮咀以水柒升煮取貳升半分三服先食服寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加瓜蔞根貳兩若有所思去大麥加柏子人參合一方有人參壹兩

妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百節皆痛是爲胎始結　妊娠二月足少陽脉養不可針灸其經[illegible]足少陽內屬於膽膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也

妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所

[illegible]

下乍寒乍熱宜服

艾葉湯

艾葉　丹參　當歸

麻黃各貳兩　人參　阿膠各參兩

甘草壹兩　生薑陸兩　大棗拾貳枚

右九味㕮咀以酒參升水壹斗煮減半去滓內膠煎取參升分三服一方用烏雌雞壹隻宿肥者治如食法割頭取血內參升酒中相和雞以水壹斗貳升先煮取汁去雞內藥煎取參升內血酒并膠煎取參升分溫三服

黄連湯　若曾傷二月胎者當預服此

黄連　人參各壹兩　吴茱萸伍合

生薑叁兩　生地黄伍兩　一方用阿膠

右五味㕮咀以酢漿柒升煮取叁升分四服日三夜一十日一修合若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳一方用當歸半兩

妊娠二月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而内感者也　妊娠二月手心主脉養不可針灸其經[illegible]手心主內屬於心無悲哀思慮驚動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黄卒驚恐憂愁瞋怒喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛或腰背卒有所下宜服

雄雞湯

雄雞一隻治如食法　黄芩　白朮

生薑各壹兩　麥門冬伍合　芍藥

大棗拾貳枚擘　甘草　人參

茯苓　阿膠各貳兩

右十味㕮咀以水一斗五升煮雞減半出雞内藥煮取半內清酒三升并膠煎取三升分三服一日令盡當溫臥一方用當歸芎藭各貳兩不用黄芩生薑

茯神湯　曾傷三月胎者當預服此方

茯神　丹參　龍骨各壹兩

阿膠　當歸　甘草

人參各貳兩　大棗貳拾壹枚　赤小豆貳拾壹粒

右九味㕮咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服七日後服一劑腰痛者加桑寄生貳兩[illegible]

[illegible]一婦人但有孕至三箇月左右必墮其脉左手大而無力重取則濇知其血少也以其妙年只補中氣使血自榮時初覺[illegible]以濃煎白朮湯下黄芩末二錢與數十貼得保全而生因思之墮于內熱而虛者於理為多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月上屬相火所以易墮不然何以黄芩熟艾阿膠為安胎妙藥也　婦人經候三月驗胎法川芎生末濃煎艾湯空心下壹匙腹中微動者是有胎

妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡　妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經[illegible]手少

陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心下慍慍欲嘔胸膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胸心煩不得安卒有所下宜服

菊花湯

菊花（如雞子大壹枚） 麥門冬（壹升） 大棗（拾貳枚）
人參（壹兩半） 甘草 當歸（各貳兩）
麻黃 阿膠（各叁兩） 半夏（肆兩）
生薑（伍兩）

右十味㕮咀以水捌升煮減半內清酒叁升并阿膠煎取叁升分叁服溫臥當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雌雞壹隻煮汁煎藥

調中湯 若曾傷四月胎者當預服此

白芍藥 生薑（各肆兩） 厚朴
生李根白皮 枳實 白朮
柴胡（各叁兩） 續斷 芎藭
甘草（各壹兩） 當歸（壹兩半） 烏梅（壹升）

右十二味㕮咀以水壹斗煮取叁升分肆服日三夜一八日後復服一劑

妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五臟

妊娠五月足太陰脉養不可針灸其經

足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大饑無甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦

妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下宜服

阿膠湯

阿膠（肆兩） 人參（壹兩） 生薑（陸兩）
當歸 芍藥 甘草
黃芩（各貳兩） 旋覆花（貳合） 吳茱萸（柒合）
麥門冬（壹升）

右十味㕮咀以水玖升煮藥減半內清酒叁升并膠微火煎取叁升半分四服日三夜一先食服便愈不差再服 一方用烏雌雞一隻割取咽血內酒中以水煮雞以汁煎藥減半內酒并膠煎取叁升半分肆服

安中湯　曾傷五月胎者當預服此
黃芩壹兩　當歸　芎藭
乾地黃　人參各貳兩　甘草
芍藥各叁兩　生薑陸兩　麥門冬壹升
五味子　大麻人各伍合　大棗叁拾伍枚
右十二味㕮咀以水柒升清酒伍升煮取叁升半
分四服日三夜一七日復服一劑
安胎當歸湯　若妊娠五月舉動驚愕胎不安小腹
痛引腰胳小便下血
當歸　阿膠炒　川芎

人參各壹兩　大棗拾貳枚　艾葉壹把
右以酒水各叁升煮至叁升內膠令烊分三服一
方有甘草無參棗
妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處
出遊於野數觀走犬及視走馬食宜鷙鳥猛獸之肉
是謂變腠理紉筋以養其力以堅背膂　妊娠六月
足陽明脉養不可針灸其經[illegible]足
陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調
五味食甘美無太飽
妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體
腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服
麥門冬湯
麥門冬壹升　人參　甘草
黃芩各貳兩　乾地黃　阿膠
生薑陸兩　大棗
右八味以水柒升煮減半內清酒貳升并膠煎取
叁升分叁服中間進糜粥　一方用烏雌雞壹隻煮
汁煎藥
柴胡湯　若曾傷六月胎者當預服此方

柴胡　茯苓　白朮
芍藥　甘草　麥門冬
芎藭　生薑　乾地黃
大棗
右㕮咀以水[illegible]升煮取叁升分四服日三夜一中
間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑
一方有黃芩貳兩
旋復花湯　治療妊娠六七月胎不安常處
旋復花　厚朴製　白朮
枳殼　黃芩炒　茯苓
半夏炒　一方無芍藥

右以水壹斗煮取貳升半分五服先食服日三夜二忌羊肉餳醋桃李雀肉

妊娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳以密腠理是謂養骨而堅齒　妊娠七月手太陰脈養不可針灸其經（如少商魚際列缺尺澤天府俠白穴是也）手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脈若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強葱白湯主之

葱白（長三四寸拾肆莖）　半夏　麥門冬（各壹升）
旋覆花（貳合）　黃芩（壹兩）　人參（壹兩半）
甘草　當歸　黃耆（各參兩）
阿膠（肆兩）　生薑（捌兩）

右十一味㕮咀以水貳升煮減半內清酒參升及膠煎取肆升每服壹升日三夜一溫臥當汗出若不出者加麻黃貳兩煮服如前法若秋後勿強責汗一方以黃雌雞壹隻割咽取血內酒中煮雞取汁以煎藥

杏人湯　若曾傷七月胎者當預服此

杏人　甘草（各壹兩）　紫菀（壹兩）
鍾乳　乾薑（各參兩）　麥門冬
吳茱萸（壹升）　粳米（伍合）　五味子（參合）

右九味㕮咀以水捌升煮取參升半分四服日三夜一中間進食七日服一劑一方用白雞壹隻煮汁煎藥

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色　妊娠八月手陽明脈養不可針灸其經（如商陽二間三間合谷[illegible]曲池[illegible]等穴是也）手陽明內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忽大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目䀮䀮芍藥湯主之

芍藥　生薑（各肆兩）　厚朴（貳兩）
甘草　當歸　白朮
人參（各參兩）　薤白（切壹升）

右八味㕮咀以水伍升清酒肆升合煮取參升分

叁服日再夜一一方用烏雌雞一隻治如食法以水煮取汁以煎藥

葵子湯　若曾傷八月胎者當預服此

葵子貳升　甘草　厚朴各貳兩

白朮　柴胡各叁兩　芍藥肆兩

生薑陸兩　大棗貳拾枚

右八味㕮咀以水玖升煮取叁升分三服日三夜一

十日一劑一方用烏雌雞一隻治如食法煮汁煎藥

丹溪縮胎丸　八九箇月用之

黃芩夏一兩春秋七錢半冬半兩　白朮貳兩

陳皮叁兩忌火　茯苓壹兩半錢

右為末粥丸桐子大

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備

飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經如湧泉然谷

足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒

脉續縷皆成無處濕冷無著炙衣

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛

不可轉側短氣宜服

半夏湯

半夏　麥門冬　吳茱萸

當歸　阿膠各貳兩　乾薑壹兩

大棗拾貳枚

右七味㕮咀以水玖升煮取叁升去滓內白蜜捌

合微火上溫服四服痢即止一方用烏雌雞一隻

煮汁煎藥

豬腎湯　若曾傷九月胎者當預服此

豬腎壹具　茯苓　桑寄生

乾薑　乾地黃　芎藭各叁兩

白朮肆兩　附子中者壹枚　大豆叁合

麥門冬壹升

右㕮咀以水壹斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取叁

升半分四服日三夜一十日更一劑

丹溪滑胎丸　九箇月用之

黃芩　枳殼炒　白朮

滑石

右為末粥丸如桐子大每服叁拾丸空心熱湯下

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故

使關節人神皆備但俟時而生

妊娠一月始胚二月始膏三月始胞四月形體成五

月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月

數未入胃十月諸神備日滿即産矣宜服保[illegible]藥入
月即服
滑胎枳殼散　瘦胎易生湖陽公主每産累日不下
南山道士進此方
　商州枳殼（貳兩）　粉草（壹兩）
右為細末百沸湯點貳錢服空心日三服凡懷孕
七八个月已上服之令兒易生初生胎小微黑百
日已後漸漸變白此雖孫真人滑胎易産方然抑
陽降氣為衆方之冠此方分兩出必用方以此為
正　一方枳殼陸兩甘草壹兩（[illegible]）
一方有糯米半升淘洗控
乾同炒為末米飲或白湯調下壹貳錢　溫隱居
加當歸木香各等分
張氏方　治妊娠胎肥壅隘動止艱辛臨月服之縮
胎易産兼治腸中諸疾下氣寬膈
　枳殼（伍兩）　甘草（壹兩半）　香附子（[illegible]）
為末薑煎湯點亦可如丈夫婦人冷氣攻刺脇肋
疼痛者用葱白三寸同煎服　婦人脚手虛氣成
塊作痛熱酒調服　大小便不通白秤木煎湯調
服　選奇方香附子枳殼（各貳兩）甘草（半兩）

內補丸　治妊婦衝任脉虛補血安胎
　熟地黃（貳兩）　當歸（微炒壹兩）
右為細末煉蜜和丸如梧子大溫酒下叁肆拾丸
許學士云大率婦人妊娠唯在抑陽助陰素問云
陰搏陽別謂之有子蓋關前為陽關後為陰尺中
之脉按之搏手不絕者妊身也婦人平居陽氣微
盛無害及其妊子則方閉經隧以養胎若陽氣盛
搏之則經脉妄行胎乃不固素問所謂陰虛陽搏
謂之崩也抑陽助陰之方甚多然胎前藥唯惡群
隊若陰陽交錯別生他病唯是枳殼散所以抑陽
四物湯所以助陰故爾然枳殼散差寒若單服之
恐有胎寒腹痛之疾以內補丸佐之則陽不致強
陰不致弱陰陽調停有益胎嗣此前人未嘗論及
也
易産滑胎方　其藥性滑利小便
以車前子（為末）酒調服方寸匕不能飲者水調
詩云采采芣苡能令婦人樂有子矣　陸機注云
治婦人産難故也
神寢丸　瘦胎滑利易産臨入月服之極有神效
知蘄州施少卿方蘄州徐太丞傳

通明乳香 別研半兩　　枳殼 去穰麩炒
右為細末煉蜜丸如梧子大空心用溫酒吞下三四十
丸懷孕九月已後方可服　崔氏方名小丸乳
香只貳錢半酒糊丸
榆白皮散　治妊娠滑胎易生
榆白皮　　甘草 各貳兩　　葵子 壹兩
右為粗末每服貳錢水壹盞煎至柒分去滓溫服
一方無榆皮名葵子散
十月九个月將產消息
豬肚 壹具　如法用葱五味煮熟食食如不盡
更食以盡為度不得與別人食無効
保氣飲　安胎寬氣進食瘦胎易產或居處失宜
偶然頓仆胎動胎痛漏胎下血兼服佛手散 見胎產大
神寢丸 枳殼散　此三方入月內大宜常服
香附子　　山藥 貳兩　　縮砂仁
粉草　　益智仁　　紫蘇葉 各
木香
右為細末以白湯點服貳錢
無憂散　治妊婦身居富貴口厭肥甘憂喜不常食
物不節既飽便卧致令胞胎肥厚根帶堅牢行動

艱難因致臨產難生入月可服無憂散則易生矣
當歸　　川芎　　白芍藥
枳殼　　乳香 各參錢　　木香
甘草　　血餘
右為末每服貳錢水煎日進兩服
丹溪云世之難產者往往見於鬱悶安佚之人富貴
奉養之家若貧賤辛苦者未有也古方止有瘦胎
飲一論而其方為湖陽公主作也　　何
者見其有用此方者　　難產後
進胎孕則觸而大　　勤於針指
措思何日忽自悟　此與湖陽公主相反彼奉養
之人其氣必實耗其氣使不和故易產今形肥知其
氣虛久坐知其不運必氣愈弱兒在胞胎因母氣不
能自運耳當補其母之氣則兒健易產矣今其有孕
至五六個月來告遂于大全方紫蘇飲加補氣藥與
數十貼因得男而甚快後遂以此方隨母形色性禀
參時令加減與之無不應者因名其方曰達生散
縮胎飲
大腹皮 參錢　　人參　　陳皮
紫蘇莖葉 各伍分　　白芍　　白术

達生丸 …… 黄楊樹腦

或加枳殼　縮砂　青葱　黄楊樹腦

右作一貼吞下。緣妊婦臨月得此藥服，易生産後

無病。按丹溪云：難産多是胎肥，氣血滯病也。蓋此

方補中行滯。春加川芎　氣虛倍參朮　氣實

倍香附陳皮　血虛加當歸地黄　形實倍紫蘇

性急加黄連　熱急加黄芩　濕痰加滑石半

夏　食積加山楂　食後易饑加黄楊腦　腹痛

加木香官桂黄芩　冬不用芩

寧神丸　用益母草研末爲丸，治婦人

臨月，日三次服。用縮砂飲送下，能催生易産；

産後服能生新血去舊血，只以白湯送下；虛者煎

白朮人參陳皮湯送下

惡阻（痰逆不食）

惡阻，謂嘔吐惡心，頭眩，惡食擇食是也。（丹溪）凡婦人虛羸，血氣不足，腎氣又弱，或當風飲冷太過，心下有痰水者，欲有胎而喜病阻。所謂欲有胎者，其人月水尚來，顏色肌膚如常，但苦沉重憒悶，不欲食飲，又不知其患所在，脈理順時平和，則是欲有娠也。如此經二月日後，便覺不通，則結胎也。阻病者，患心中憒憒，頭重眼眩，四肢沉重懈惰，不欲執作，惡聞食氣，欲噉鹹酸果實，多臥少起，世謂惡食。其至三四月日已上，皆大劇吐逆，不能自勝舉也。此由經血既閉，水漬於臟，臟氣不宣通，故心煩憒悶，氣逆而嘔吐也。血脈不通，經絡否澀，則四肢沉重，挾風則頭目眩也。覺如此候者，便宜服半夏茯苓湯數劑，後將茯苓丸，痰水消除，便欲食也。既得食力，體強氣壯，力足養胎，母便健矣。

（丹溪）孕婦禀受怯弱，便有阻病，其狀顏色如故，脈息和順，但覺肢體沉重，頭目昏眩，擇食，惡聞食氣，好食鹹酸，甚者或作寒熱，心中憒悶，嘔吐痰水，恍忽不能支持，巢氏謂之惡阻。但證有輕重耳，輕者不服藥亦不妨，重者須以藥療之。千金方以半夏茯苓湯、茯苓丸專治阻病，然此二藥比來少有服者，以半

夏有動胎之性蓋胎初結慮其易散此不可不謹也

一張仲景傷寒論有用黃龍湯者小柴胡湯中去半夏是也此蓋爲妊娠而設爲主丹溪則有白术散爲安則人參丁香散湯液則有人參橘皮湯所以則有醒脾飲皆不用半夏用之多効　李茂遠云右脉弱而嘔服諸藥不止者當服理血歸原藥則愈經云無陰則嘔是也　薛立齋云若中脘停痰用二陳湯加枳殼若飲食停滯用六君子加枳殼若脾胃虛弱用異功散若胃氣不足用人參橘皮湯兼氣鬱加枳殼胸膈痞悶再加蘇梗脇痛再加柴胡若飲食少思用

六君子加紫蘇枳殼頭暈體倦用六君子湯若脾胃虛弱嘔吐不食用半夏茯苓湯蓋半夏乃健脾氣化痰滯之主藥也脾胃虛弱而嘔吐或痰涎壅滯飲食少思胎不安必用茯苓半夏湯倍加白朮然半夏白朮茯苓陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃予嘗用之驗矣　痰逆不食證因食停滯用半夏茯苓湯加枳殼頭疼惱悶更加柴胡因痰壅滯用半夏茯苓湯加白朮因風寒外傷用參蘇飲飲食腹脹用香砂六君子湯寒熱嘔吐人參養胃湯　一妊娠嘔吐惡食體倦嗜臥此胃氣虛而惡阻也用人參橘皮湯一劑漸愈又用六君加紫蘇二劑而安　一妊娠吞酸惡心時欲作嘔此因脾胃虛而飲食停滯用六君加枳殼香附治之而愈　一妊婦停食腹滿嘔吐吞酸作瀉不食余以爲飲食停滯兼肝木傷脾土用六君子湯以健脾胃加蒼朮厚朴以消飲食吴茱萸炒黃連以清肝火諸證悉愈又以六君加砂仁調胃而脾土乃安

一妊婦嘔吐脇脹或寒熱往來面色青黃此木旺而尅脾土用六君子加柴胡桔梗枳殼而安　一妊婦嘔吐酸水胸滿不食此脾土虛而肝木所侮用六君子加芍藥而愈　一妊婦胸腹膨脹吐痰不食此

脾胃虛而飲食爲痰用半夏茯苓湯漸愈又用六君子加枳殼蘇梗桔梗而飲食如常後因恚怒脇脹不食吐痰惡心用半夏茯苓湯加柴胡山梔而愈　汪石山治一婦形質瘦小面色近紫產後年餘經水不通首夏忽病嘔吐手指麻木不能伸屈聲音啞小咳不出聲醫皆視爲風疾　汪診脉皆細微近滑曰此妊娠惡阻病也衆謂經不行安有妊理汪曰天下之事有常有變此乃事之變也脉雖細微似近下滑又尺按不絕乃妊娠也遂以四君子加二陳治之而嘔吐俱減尚畏粥湯惟食乾糕香燥之物而有生

一給事游讓夫人病新愈月餘經事不行嘔噦
吸痛飲食頻進嘔以為有瘀之病發心中女子不月
法在不治經瘀診之尺脈雖小按之滑而不絕此妊
而惡阻非內傷也不須加砂仁數服而安後產一女
金匱云婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱
名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫
治逆者卻一月加吐下者則絕之　本草曰絕之
者謂絕止醫治候其自安也予常治一二婦惡阻病吐
愈治愈逆因思仲景絕之之旨遂停藥月餘自安真
人哉聖賢之言也

六十四

治妊娠　大凡妊娠惡食者以所思食任意食之必愈

仲景云妊娠嘔吐不止乾薑人參半夏丸主之

乾薑人參半夏丸

乾薑　人參各壹兩　半夏湯洗貳兩

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲服拾
丸日三服

半夏茯苓湯　治妊娠惡阻嘔吐心煩頭目眩運惡
聞食氣好食酸鹹多臥少起百節煩疼羸瘦有痰
胎孕不牢

半夏湯洗七次　赤茯苓　熟地黃各

橘紅　旋覆花
人參　芍藥　川芎
桔梗　甘草各

右㕮咀每服伍錢水煎空心服　服茯苓
丸　若有客熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知
母柴錢半　若腹冷下痢去地黃加桂心半兩
若胃中虛熱大便秘小便赤澀加大黃半錢半
去地黃加黃芩貳錢伍分

茯苓丸　治妊娠阻病心中煩悶吐痰眩暈先服半
夏茯苓湯兩劑後服此藥

胎前門　大　六十五

赤茯苓　人參　桂心
乾薑　半夏湯泡七次炒黃　橘皮各壹兩
白朮　葛根　甘草
枳殼各貳兩

右為細末煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸米飲下
日三服　一方加麥門冬　肘後加五味子

療妊娠心胸支滿痰逆不思飲食

赤茯苓　前胡　白朮
紫蘇葉各壹　半夏　麥門冬
人參　大腹皮各

右爲粗末每服四錢水壹盞蘆根五寸煎至柒分去
滓温服 一方無橘皮人參有大腹子檳榔
療姙娠心胸氣滿嘔吐不下飲水心神虛煩四肢少
力
枇杷葉 半夏 麥門冬
人參 甘草 訶子肉
當歸 赤茯苓 枳殼
陳皮
右㕮咀每服四錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至柒
分去滓温服 一方無訶子及棗
療姙娠婦人姙娠惡阻嘔吐不下食
青竹茹 橘皮 生薑
茯苓 半夏
右細切以水陸升煮取貳升半去滓分三服不差
頻作忌羊肉餳鮓等物
旋覆半夏湯 治姙娠惡阻吐逆酸水惡聞食氣多
卧少起
旋覆花 川芎 細辛
人參 甘草 當歸
半夏 赤茯苓 乾生薑

陳皮
右作一服水貳鍾薑五片煎至一鍾不拘時服
旋覆花湯 治姙娠六七個月子不安
旋覆花 厚朴 白朮
枳殼 黃芩 茯苓
半夏 芍藥 生薑
右作一服水貳鍾煎至壹鍾食前服
右諸方並用半夏蓋取其辛以散結氣瀉逆氣故
嘔惡自止非專爲痰設也
夏動胎而不用錢氏方乃用之予治姙娠
用半夏未嘗動胎也經云有故無殞是也
白朮散 治惡阻吐清水甚者十餘日水漿不入
白朮 人參 丁香
甘草
右爲細末每服貳錢水壹盞薑伍片煎至柒分溫
服
人參丁香散 治姙娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及
心腹刺痛
人參 丁香 藿香葉
右爲散每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓溫服無時

又方

人參　丁香　柿蒂各貳錢

甘草　良薑各半兩

右為細末每服貳錢熱湯點下無時

醒脾飲子　治妊娠阻病嘔逆不食甚者中滿口中無味或作寒熱

草豆蔲以濕紙裹灰火中煨令紙乾取出去皮　厚朴製各半兩

乾薑炮　甘草炙各一分

右為細末每服貳大錢水壹大盞棗貳枚生薑叁片煎至捌分去滓呷服病輕者只一兩服便能食

[illegible]

舊有橘紅貳兩治寒熱瘧痢不食後人去橘皮以乾生薑代乾薑治老人氣虛大便秘少津液引飲有奇効產科醫官齊一明依舊用乾薑去橘皮亦名醒脾飲子治阻病極神驗

右潘方與前茯苓丸並用丁香乾薑惟中寒脉遲者宜之

人參橘皮湯　治阻病嘔吐痰水

人參　橘皮　白术

麥門冬去心各壹兩　甘草炙叁錢　厚朴製

白茯苓各叁錢

為粗末每服肆錢加淡竹茹彈子大[illegible]

治妊娠嘔吐不食甚吐痰水

生蘆根柒分　橘紅肆分　生薑陸分

檳榔貳分　枇杷葉叁分

右切水貳盞煎柒分空心熱服

治妊娠惡食心中煩憒熱悶嘔吐

青竹茹　麥門冬各叁兩　前胡貳兩

橘皮壹兩　蘆根壹握　[illegible]

右切細以水壹大升煮半升去滓分兩服食前

右潘方內用門冬竹茹蘆根皆氣涼而性和有熱無寒者通用之下劑也

又方　治妊娠惡食

人參壹兩　厚朴　生薑

枳殼　甘草各壹兩

水陸升煮取貳升分三服

理血歸原散　治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無効者用此藥理血歸原則愈

人參　甘草　川芎

當歸　芍藥　丁香各半兩

白茯苓　白术　陳皮各壹兩

桔梗(去蘆)　枳殼(麩炒 去瓤 各半兩)　半夏(湯洗 炒黃 各七錢)

右㕮咀每服叁錢生薑伍片棗壹枚水同煎

安胎飲　治懷胎三月四月至九个月日惡阻吐痰水心中憒悶頭重目眩惡聞食氣或胎動不安腰腹疼痛或時下血及妊娠一切疾病並皆治之

甘草　茯苓　當歸

熟地黃　川芎　白朮

黃芪　白芍藥　半夏(湯泡 炒)

阿膠(蛤粉炒)　地榆(各等分)

右㕮咀每服叁錢生薑肆片水煎溫服無時候

一方無半夏地榆有人參桑寄生　一方無黃芪朮半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓

小地黃丸　治妊娠惡心嘔吐清水腹疼不食

人參(去蘆)　乾薑(炮 各等分)

右為細末以生地黃汁和為丸如梧子大每服五拾丸食前米飲送下

右方並理血之劑李茂翁所謂左脈弱而嘔服諸藥不止者服理血歸原藥則愈即此類是也

保生湯　治婦人經候不行身無病而似病脈滑大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎服(孟嵩惡阻方)

人參　甘草(各貳錢)　白朮

香附子　烏藥　橘紅(各壹錢)

右㕮咀每服叁大錢水壹盞半生薑伍片煎至柒分去滓溫服無時或作末子調服

白朮散　治妊娠胎氣不和飲食少進

白朮(炒)　紫蘇(各壹兩)　人參(貳錢)

青皮(去白)　訶子肉　川芎(各捌分)

甘草(炙 壹錢)

右作一服水壹鍾薑叁片煎至柒分食遠不拘時服

二香散　治妊娠胎動不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水起坐覺重

香附子(炒)　藿香葉　甘草(各叁錢)

右為細末每服貳錢不拘時沸湯調下

胸遂子曾治妊婦惡阻嘔吐不食頭重不敢行步以枳殼濃煎湯飲數盞而愈甚者加生薑汁

又方　縮砂仁為末每服貳錢米飲湯調下或米飲調

右方並理氣之劑若脉來有力者宜之乃為行氣不順者

指南三方名宜

一婦人年三十吐痰不止飲食每日寅卯時作作時覺少腹有氣衝上然後嘔滿而吐面赤微躁頭眩作止起則四肢疼微渴此肝火挾衝脈之火衝上也口苦一日輕脉和右寸洪大前藥不效將二陳湯加偶用沉香磨水化抱龍丸一服膈覺氣不上衝二三服吐止眩減食進而安　又龐氏婦嘈雜吐食脉纏心下滿塞氣攻背兩脇背痛要人不住手以熱物摩熨得吐稍疎脉洪大龐此方

黃連二錢　黃芩各一錢半炒　白朮七上二

半夏各一錢　甘草炙　縮砂各伍分

陳皮一　當歸　山梔

枳殼　香附　人參

蒼朮各一錢　茯苓半錢　生薑三片

服二帖後嘈雜吐止心滿塞退但於夜間背脇痛用摩熨遂內抱龍丸化服其疾如失

明一婦人年逾三十懷孕兩月病嘔吐頭眩自覺不可禁持以人參白朮川芎陳皮茯苓等藥服五七日愈覺沉重診其脉之兩手弦左為甚而且弱予曰此是惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所宜致以時用茯苓湯下抑青丸二十四粒五貼自覺稍安診其脉略有數狀仍口乾苦稍食粥則口酸予意其為胎熱氣未可行參朮以川芎陳皮山梔茯苓生甘草煎湯下抑青丸十五粒十餘貼餘證皆平但食及常時之半食後覺口酸不食覺易飢予謂肝熱未平則以白湯下抑青丸二十粒二十日而安予又脉之見其兩手脉蹋和平而左手弱甚此胎必墮此時肝氣既平參朮可用矣遂用始初參朮等藥補之預防墮胎以後之虛服之一月胎自墮卻得平穩無事抑青丸一味黃連為丸是也

胎動不安

[大全]妊娠胎動不安者由衝任經虛受胎不實也亦有飲酒房室過度損動不安者有忤觸偶而胎動者有喜怒氣宇不舒傷於心肝觸動血脈者有信醫宜服煖補及爲藥所害者有因母病而胎動者但治母病其胎自安有胎不堅而動及母疾但當安胎其母自愈當以母形色察之若面赤舌青兒死母活面青舌赤口中沫出母死子活若唇口青兩邊沫出者子母俱死、若因從胎氣鬱滯者用紫蘇飲脾氣虛弱者六君子湯加蘇梗鬱結傷脾者歸脾湯加柴梔鬱怒傷肝脾者四七湯加芎歸怒動肝火者加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加朴硝腐化之、

永固孕湯

地黃　川芎　黃芩各五分

歸身尾　人參　白芍藥

陳皮各壹錢　白朮壹錢　甘草叁錢

黃柏分半　桑上羊食藤圓者　糯米拾肆粒

右㕮咀水煎服

[金匱]婦人妊娠宜常服當歸散主之

當歸散方

當歸　黃芩　芍藥

芎藭各肆兩　白朮半斤

右五味杵爲散酒飲服方寸匕日再服妊娠常服即易產胎無苦疾產後百病悉主之

妊娠養胎白朮散主之

白朮散方

白朮　芎藭各壹分　蜀椒三分去汗

牡蠣

右四味杵爲散酒服錢匕日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭心煩吐痛不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以醋漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥汁飲之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置

集驗方療妊娠一二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所見方

艾葉　阿膠　當歸

川芎各三兩　甘草壹兩

右細切以水捌升煮取叁升去滓內膠令烊分三服日三　千金文仲備急同

四物湯加熟艾阿膠茯苓治一切胎動不安

安胎當歸湯 治妊娠五月舉動驚愕胎動不安下在小腹痛引腰胳小便疼下血 [illegible]

阿膠散 治妊娠或因頓仆胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心

熟地黄貳兩 白芍藥 艾葉

當歸 甘草 阿膠

黄芪各壹兩 一方有川芎

右㕮咀每服半兩薑參片棗壹枚水同煎

又方 治妊娠胎動不安心神虛煩腹內痛

阿膠 [illegible] 人參 川芎 [illegible]

白茯苓 麥門冬去心 柴胡 [illegible]

甘草炙 當歸 黄芩各半兩

右件為末每服肆錢以水壹中盞生薑半分棗叁枚同煎陸分去滓熱服

立效散 治婦人胎動不安如重物所墜冷如冰

川芎 當歸各等分

右為麄末秤叁錢水煎食前溫服

產寶治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶

當歸 桑寄生各壹兩 川芎 [illegible]

豉 阿膠 蔥 [illegible]

右以水貳升煮取捌合下膠烊消分貳服空心服

一方無豉用銀器煎其驗無寄生或有續斷參錢半銀多少先煎後入藥

養生必用治胎動方 救急療胎動去血腰腹痛

阿膠 川芎 當歸

青竹茹各貳兩

右以水拾盞內銀壹斤煮至伍盞去銀入上件藥三味煮至貳盞半去滓入膠再煎膠烊分溫三服空心自早至暮盡未效再作

寄生湯 治胎氣常不安及五個月已後胎不安

桑寄生 艾葉 阿膠各半兩

糯米粉半兩

右以新汲水叁升先下寄生艾葉貳味煮至貳升去滓次入阿膠糯米再煮約壹升止分三服空心食前日午服之忌酒醋三五日妊婦胎氣至五月已後常不安者服之必効須見妊婦好飲酒食鹹酸五辛胎必動不可不知

黄芪湯 治胎動不安腹痛下黄汁

糯米壹合 黄芪 川芎各壹兩

右細剉水貳大盞煎至壹盞叁分溫服

順氣飲子 産前服之安胎
紫蘇葉 木香炮一 人參
草豆蔻 茯苓各壹兩 甘草半兩
大腹子壹兩如氣弱者不用
右㕮咀每服叁錢水壹盞苧根叁寸糯米少許煎至柒分去滓溫服
安胎寄生湯 療血流下方
桑寄生 白术各壹兩貳錢半 茯苓壹兩
甘草壹兩半
右剉以水伍升煮取貳升半分三服若人壯者可加芍藥貳兩足水貳升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑壹兩即安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等

苧根湯 治胎動不安
苧根 阿膠炒 艾葉
右等分㕮咀每服伍錢水貳盞糯米百粒煎至壹盞去滓溫服
小當歸湯 療妊娠重下痛引腰背安胎
當歸 阿膠炙 乾地黃
黃連 芍藥各壹兩 雞子壹枚
秫米壹升
右柒味以水柒升攪雞子令相得煮米令如餅日沸去滓內諸藥煮取叁升分四服忌蕪荑經心錄同
黃芪湯 治婦人胎動不安
黃芪 白术各半兩 當歸貳錢
右作一服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服
鉤藤湯 治妊娠八九月胎動不安心腹疼痛面目青冷汗出氣欲絕此由勞動用力傷胎宮宜急治之
鉤藤鉤 當歸 茯神
人參各壹兩 苦梗壹兩半 桑寄生半兩
右為粗末每服伍大錢水貳盞煎至壹盞去滓溫服無時候忌豬肉菘菜若煩熱加石膏貳兩半臨產月加桂心壹兩

刪療婦人懷妊胎動不安蔥豉安胎方
香豉壹升熬 蔥白壹升 阿膠貳兩炙
右以水叁升煮二物取壹升去滓入膠再煎令烊服一日一夜可服三四劑經心錄同
療妊娠胎動不安護胎法

鯉魚壹斤 粳米壹升 葱壹握
豉 薑
右件隨食之每月一度
安胎白朮散
白朮壹兩 白芷半兩
右為細末每服貳錢煎紫蘇湯調下或胎熱心煩悶入砂糖少許煎
銀苧酒 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方
苧根貳兩剉 銀伍兩 清酒壹盞
右以水貳大盞煎至壹大盞去滓分溫二服
治胎動不安
用好銀煮取水着葱白作羹食之佳
又方 川芎壹兩 葱白壹升 右以水柒升煮取貳升半分溫三服
療妊娠後不轉動方
阿膠炙壹兩 桑寄生半兩
右為末以酒壹升煮至沸下生雞卵壹枚酒中分溫頓服空心食前
肘後治胎動不安取苧根如足大指者壹尺㕮咀以水伍升煮取貳升去滓服

縮砂散 治胎動不安隨在須臾者神效 方見毒物傷胎
又方 川芎貳兩 葱白伍兩 水參碗煮取貳碗半分三服
治妊娠因失所動困絕方 取竹瀝飲壹升立愈
鯉魚臛方 治妊娠胎動不安心腹刺痛
鯉魚壹斤修事細切 阿膠壹兩杵碎炒黃燥 糯米貳合
右件以水貳升入魚膠米煮令熟入葱白生薑橘皮鹽少許更煮伍柒沸食前喫如有所傷且喫五七日效
治妊娠胎動煩悶不安甚方
取生地黃杵絞汁每服壹小盞煎令沸入雞子白壹枚攪令勻頓服
治妊娠胎動晝夜叫呼口噤唇搴及下重痛不息方
艾葉伍兩 右以好酒伍升同煮取肆升去滓更煎取壹升服口閉者格口灌之藥下即瘥

胎上逼心　附子懸

薛　胎上逼心之證，若氣逆胎上，用紫蘇飲；飲食不甘，兼以四君子；若內熱晡熱，兼以逍遙散；若胃火所致，用四君、黃芩、枳殼、柴胡、梔子；若脾鬱所致，用歸脾湯加柴胡、梔子、枳殼。

一妊婦每因恚怒，其胎上逼，左關脈弦洪，乃肝火內動，用小柴胡加茯苓、枳殼、山梔而愈。但體倦不食，用六君子調養脾土，加柴胡、枳殼調和肝氣乃瘥。

一妊婦胎上逼，胸滿嗳氣，飲食少思，此脾氣鬱滯，用紫蘇飲頓安，又用四君子加枳殼、柴胡、山梔而瘥。

程文彬治孕婦七個月，胸膈飽悶，氣喘，忽吐出一物如小腸，寸許，舉家驚疑其胎爛。程至，診得右口脈洪滑，知其氣盛血少，胎氣湊上，中焦尚有濕熱，凝生痰，知所吐之物乃痰結聚，病名子懸。以紫蘇飲加芩、連、貝母，十劑獲痊。

本事方紫蘇飲　治妊娠胎氣不和，懷胎近上，脹滿疼痛，謂之子懸。兼治臨產驚恐，氣結連日不下。

紫蘇莖葉一兩　大腹皮　人參
川芎　陳皮　白芍藥各半兩
當歸三錢　甘草一錢

右細剉，分作三服，每服用水一盞半，生薑四片，蔥白七寸，煎至七分，去滓，空心服。

曾有一婦，累日產不下，服遍催生藥不驗。予曰：此必坐草太早，心懷一點懼氣，結而不行，然非不順也。素問云：恐則氣下。蓋恐則精神怯，怯則上焦閉，閉則氣還，還則下焦脹，氣乃不行矣。得此藥一服便產。及婦人六七月子懸者，予用此，數數有驗，不十服，胎便近下。

陳良甫治一婦，有孕七個月，遠歸，忽然胎上衝心而痛，坐臥不安，兩醫治之無效，遂說胎已死矣。用蓖麻子研爛，加麝香調，貼臍中以下之，命在垂亡。召陳診視，兩尺脈絕，他脈平和。陳問二醫作何證治之？答曰：死胎也。陳曰：何以知之？曰：兩尺脈沉絕，以此知之。陳曰：此說出何經？二醫無答。陳曰：此子懸也。若是胎死，卻有辨處：面赤舌青，子死母活；面青舌赤吐沫，母死子活；唇口俱青，母子俱死。今面不赤，舌不青，其子未死，是胎上逼心，宜以紫蘇飲子治之。至十服，而胎近下矣。

當歸湯　治妊娠胎動，盪心悶絕，煩躁口乾，橫生倒產，上衝下築，迷悶，唇口青黑，手足厥冷，須臾不救，此方保安散。一方無[illegible]有川芎[illegible]

當歸　阿膠炒　甘草各壹兩
人參各壹兩半　連根葱白壹握
右細剉，水貳升，煎四味至升半，去滓，下葱，再煎減參合，溫服。一劑分為二三服。
大聖散　治妊娠忪悸，睡夢多驚，心腹脹滿，連臍急痛，胎上逼。見驚悸
治胎上逼心煩悶方。又治妊娠六七月以後胎動困篤。用葱白二七莖，濃煮汁飲之。若胎未死即安，已死即出。未效再服。婁全善云：此方神妙，脈浮滑者宜之。本草云：葱白通陽氣安胎。
秘錄治胎動上逼心痛，取艾葉如雞子大，以頭醋四升，煎取二升，分溫服。　又治胎上逼心熱痛下血，神麴半斤搗碎，和熟水絞取汁三鍾，無時溫服，止。
治妊娠遍身痛，或衝心欲死，不能飲食。
白朮伍兩　黃芩貳兩　芍藥肆兩
右水陸升，煮取貳升半，分作三服。緣胎有水致痛，兼易產。
文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方　取弩弦急帶之，立愈。
膠艾湯見血崩　保生丸大法

妊娠經來　漏胎下血
脈經　婦人經月下，但為微少。師脈之，反言有軀，其後審然。其脈何類？何以別之？師曰：寸口脈陰陽俱平，榮衛調和，按之滑，浮之則輕，陽明少陰各如經法，身反灑淅，不欲食飲，頭痛心亂，嘔噦欲吐，呼則微數，吸則不驚，陽多氣溢，陰滑氣盛，滑則多實，六經養成。所以月見，陰見陽精，汁凝胞散，散者損墮。設復陽盛，雙妊二胎。今陽不足，故令激經也。激脈一作行，今又多欲知孕也。　大抵妊娠經來不多，而飲食精神如故，六脈和緩滑大無病者，血盛有餘也，兒大能飲，自不來矣。
又名　夫妊娠漏胎者，謂妊娠數月而經水時下也。此由衝任脈虛，不能約制手太陽少陰之經血故也。衝任之脈為經絡之海，起於胞內。手太陽小腸脈也，手少陰心脈也，是二經為表裏，上為乳汁，下為月水。有娠之人經水所以斷者，壅之養胎，蓄之以為乳汁也。衝任氣虛則胞內泄，不能制其經血，故月水時下，亦名胞漏。血盡則人斃矣。又有因勞役喜怒哀樂不節，飲食生冷，觸冒風寒，遂致胎動。若母有宿疾，子臟為風冷所乘，氣血失度，使胎不安，故令下血也。　曾有以娠婦月信不絕而胎不損問產科熊宗古，答曰：婦

人血盛氣衰其人必肥既娠之後月信常來而胎不動若據晚進觀之便以爲漏胎若作漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮今推宋氏之言誠有旨也巢氏云婦人經閉不利別無所苦者是謂有子以其經血蓄之以養胎擁之爲乳汁也有子之後蓄以養胎矣豈可復能散動耶所以然者有妊而月信每至是亦未必因血盛也若謂婦人營經有風則經血喜動以其風勝則可也既榮經爲風所勝則所來者非養胎之血以此辨之若作漏胎治之必服保養補胎之藥且胎不損強以藥滋之乃所謂實實

虛虛也其胎終墮宜矣若醫者知榮經有風之理專以一藥治風經信可止或不服藥胎亦無恙然而有胎本不固而因房室不節先漏而後墮者須作漏胎治之此又不可不審也　丹胎漏因氣虛因血虛因血熱　薛新甫按若因風熱用防風黃芩丸若因血熱用加味逍遙散若因血虛用二黃散若因血去太多用八珍湯未應補中益氣湯若因肝火用柴胡山梔散若因脾火用加味歸脾湯若因事下血作痛用八珍湯加阿膠熟艾若因脾胃虛弱用補中益氣湯加五味子若因脾胃虛陷用前湯倍用升麻柴胡若晡熱內熱宜逍遙散　一妊娠每怒下血若因怒氣用小柴胡湯若因風熱用一味防風丸若因血熱用一味子芩丸若因脾氣虛弱用六君子湯若因中氣下陷用補中益氣湯若氣血盛而下血者乃因兒小飲少也不必服藥　一妊婦下血服涼血之藥下血益甚食少體倦此脾氣虛而不能攝血余用補中益氣湯而愈後因怒而寒熱其血仍下此肝火旺而血沸騰用加味逍遙散血止用補中益氣湯而安　一妊婦下血發熱作渴食少體倦屬脾氣虛而肝火所侮用四君子加柴胡山梔血止因怒復作用六君加柴胡山

梔升麻而安　一妊娠六月每怒下血甚至寒熱頭痛脅脹腹疼作嘔少食余謂寒熱頭痛乃肝火上衝脅脹腹痛乃肝氣不行作嘔少食乃肝侮脾胃小便下血乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黑山梔茯苓白朮而愈　一妊娠六月體倦食少勞役下血用六君加當歸熟地黃柴胡升麻而愈　汪憲副治王祠部安人孕三月腰腹遊痛漏下不止氣湧脹悶速汪診視六脈浮數不勻脈按沉細此必怒動肝火挾相火衝任內熱故脈不滑本至斷經猶可保也以條芩白朮枳殼香附茯苓阿膠砂仁當歸陳皮煎調鹿角

服酒浮細末一錢更進抑青丸一服痛已數劑平復

仲景云婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻芎歸膠艾湯主之 方見血部

大全方治妊娠三四月腹痛時時下血

續斷 貳兩　艾葉　當歸
乾地黃 各叁兩　竹茹　阿膠
雞蘇 各壹兩

水壹升煎取陸合空心再服

廣濟安胎胎病漏血腹痛

當歸　川芎　阿膠 炙
人參 各壹兩　大棗 貳拾箇

右切以水叁升酒肆升煮取貳升半分三服五日一劑頻服三四劑無妨

濟生如聖湯　治胎動腹痛或為漏胎

鯉魚皮　當歸 酒浸　熟地黃 酒蒸
白芍藥　阿膠 蛤粉炒　川芎
續斷 酒浸　甘草 炙各等分　一方有乾薑竹茹

右㕮咀每服肆錢水壹盞苧根少許薑伍片煎溫服濟生有續斷無乾薑竹茹

桑寄生散　治胎漏經血妄行淋瀝不已

桑寄生　當歸 酒浸去蘆　川芎
川續斷 酒浸　阿膠 蛤粉炒　香附子 炒去毛
茯神 去木　白朮 各壹錢　人參
甘草 炙各半錢

右作一服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘時服

鄭氏人參散　治漏胎敗血湊心日漸胎乾子母危困

人參　黃芪 炙　阿膠 炒各二錢
竹茹　木香　炙甘草

附子 炮各半錢　川芎　陳皮
苧根 各貳錢半　生薑 叁錢炮黑

右㕮咀每肆錢糯米三七粒水煎熱服忌生冷雞鴨魚麵

梅師治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安死即下卽催生佛手散方見胎產大法 即川芎當歸散也

妊娠無故卒下血不止取阿膠叁兩炙擣末酒壹升半煎令消一服愈

羅氏立聖散　治妊娠下血不止

雞肝叁箇用酒壹升煮熟共食之大效

二黃散　治胎漏
生地黃　熟地黃各等分剉　水叄盞煎半乾去滓服
治胎漏下血　阿膠麩炒搗末生地黃一斤搗取汁以清
酒叄升絞汁分叄服
治胎漏下血不止胎乾即死宜急治之
生地黃汁壹升　陳酒伍合
右同煎叄伍沸溫叄服以止爲度
地黃湯　治經血妄行及鼻衄不止
生地黃酒洗半兩　薄荷取汁叁錢　甘草壹錢
右二味爲末新汲水合地黃汁調食後服

續易簡治漏血
用野苧根貳兩剉炒　金銀各壹兩　爲一劑酒水平
煎耗半溫服若閃撲胎動欲墮縮砂仁皮炒令熱透
爲末每服貳錢酒或鹽湯下

保命枳殼湯　治婦人胎漏下血及因事下血
枳殼　黃芩各半兩　白朮壹兩
右爲麤末每服柒錢水壹盞煎柒分食前服
子芩丸　治肝經有熱妄行下血細條黃芩炒爲末
每服壹錢以秤錘燒赤焠酒熱調服若脾胃虛不
宜用

防風丸　治肝經有風以致血得風而流散不歸經
用防風爲末每服壹錢白湯調服
防風黃芩丸　治肝經有風熱致血崩便血尿血用
條芩炒焦防風等分爲末酒糊丸梧子大每服叄
伍拾丸食遠或食前米飲或溫酒送下

仲景云婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不
止胎動在臍上者爲癥痼害　妊娠六月動者前三
月經水利時胎下血者後斷三月不血也所以血不
止者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓丸主之
桂枝茯苓丸方

桂枝　茯苓　牡丹去心
桃仁去皮尖熬　芍藥各等分
右五味末之煉蜜和丸如兎屎大每日食前服壹
丸不知加至叄丸
治胎下血不止取桃樹上乾不落桃子燒灰和水服
[illegible]
榆白皮散　治妊娠胎漏去血恐其難產常宜服之
榆白皮　葵根　瞿麥各貳錢
大麻仁去殼　木通各壹錢　牛膝去蘆酒浸焙壹錢半
右作一服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

胎漏黃汁下或如豆汁

脉前證肝脾濕熱用升陽除濕湯[illegible]肝脾風熱用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯肝脾氣虛用錢氏白朮散若脾氣下陷用補中益氣湯肝經風熱用防風黃芩丸風入腸胃用胃風湯　一妊婦因怒胸膈不利飲食少思服消導順氣之劑脾胃愈弱飲食愈少大便不實且無度久而便黃水或帶白視其面色黃中隱白余曰黃色脾虛也白色肺虛也朝以補中益氣湯升補胃氣夕以六君子培補脾氣而愈

大全方治妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

粳米伍合　黃芪陸兩

右以水柒升煎取貳升分爲四服

銀苧酒 治妊娠胎動不安

又方用生艾汁貳琖阿膠白蜜各貳兩煎至柒分溫服

如無生艾煎乾艾濃汁亦可　一方加竹茹　一方用酒不用蜜

脉經云婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也 胎漏徐徐下水今暴下而多故知墮胎也

跌撲傷胎毒藥傷胎

大妊娠驚胎者乃懷妊將滿胎神已具墜仆傷胎[illegible]至下血不醒若欲驗其子母安否當察[illegible]治之

歸愚按前證若因怒跌仆或手足抽搐用釣藤湯若內氣滞用紫蘇飲[illegible]若因脾胃氣虛用六君子加蘇梗若鬱結傷脾用歸脾湯若鬱怒傷肝脾用四七湯[illegible]加芎歸若去血過多用佛手散如不應膠艾湯氣血虛八珍湯加膠艾

催生神妙佛手散　治婦人妊娠五七月因事築磕着胎或子死腹中惡露下疼痛不已口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若胎損立便逐下[illegible]驗胎動方云治血上衝心腹滿悶者如湯沃雪又治產前產後體熱敗血腹痛

又名芎歸湯

當歸陸兩　川芎肆兩[illegible]

右爲粗末每服叁錢水壹大盞煎令泣泣欲乾投酒壹大盞止煎壹沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服不過三五服便生　一方云此藥治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多昏暈欲倒者以水煎服或先以滿血服內疼痛加芍

杜拔牛臨手劾[illegible]

妊娠忽因倒地或登高作勞促損腹中疼痛胎動

及子死腹中不出三服立下

川芎壹兩

右為細末以熱酒調服方寸匕日三四服

按川芎上窠散恐有服之未亡者若診其脉舉之

有按之無者忌服

治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶

生地黃　益母草各壹兩　當歸

黃芪各半兩

[illegible]

右㕮咀每服四錢水[illegible]分去滓

集驗治妊娠二三月上至七八月頓仆失跌胎動不

安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短

氣下血不止方

乾地黃　當歸　艾葉各貳兩

阿膠　川芎各參兩

右以水柒升煮取貳升半分作三服腹痛甚加杜

仲五加皮各參兩　一方無地黃有甘草　一方無

地黃却用生藕自然汁小薊地黃汁半合馬通半

合煎成藥去滓入此再煎三沸溫服　一方有人

參白茯苓水煎

治婦人因閃挫傷胎肚疼血崩

歸尾　陳皮　白朮

人參　茯苓　白芍藥

川芎各參錢　甘草炙伍分

右㕮咀分兩貼水盞半煎取壹盞下縮砂末壹錢

伍分炒黑五靈脂壹錢

竹茹酒　治妊娠誤有失墜損血胎損疼痛

青竹茹貳合　好酒壹升

[illegible]

右煮三五沸分作三服即安

泰光湯　療妊娠或因僵仆胎動不安臍腹疞痛方見

[illegible]

治妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍兼治崩血

又兼治子冒又名子癇

縮砂不以多少和皮炒令黑色　一方用仁熨斗內略

炒為細末熱酒調下貳錢不飲酒者以米飲調下

皆可覺腹中熱則胎已安矣此方神効予常用之

有驗

神造安治散　治卒然腰痛下血不已

熟地黃　艾葉　白芍藥
川芎　黃芪　阿膠炒
當歸　甘草　地榆各等分
右㕮咀每服肆錢重伍片棗壹枚煎至溫服
若因毒藥用甘草黑豆淡竹葉若因頓仆用阿膠
散本應煎送知母丸若因頓仆下血腹痛用佛手散
未應用八珍送知母丸血出過多用八珍湯斤許益
母草四兩水煎徐徐與服若胎死以朴硝或平胃散
下之

撥徑方　治用毒藥攻胎藥毒衝心外證牙關緊急

口不能言兩手強直握拳頭低自汗身微熱外證與中風相似但其脉浮而軟十死一生醫多不識若作中風治之必死無疑用白扁豆貳兩生去皮爲末新汲水調下即効

阿膠散　治妊娠不問月數深淺或因頓仆或因毒藥胎動不安腰痛腹滿或有所下或胎上搶心短氣之方

妊娠誤服諸藥毒致胎動不安治之方

甘草　黑豆　淡竹葉各等分　濃煎汁飲之

奪命丸　治婦人小產下血至多子死腹中其人憎寒手指唇口爪甲青白面色黃黑胎上搶心悶絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下若胎腐爛腹中危甚者立可取出此方的係異人傳授至妙[illegible]

牡丹皮　茯苓　桂枝　[illegible]

心痛

大妊娠心痛乃風邪痰飲交結若傷心正經爲眞心痛朝發夕死夕發旦死若傷心支絡則乍安乍作若傷於子臟則胎動而血下　論前證若飲食所傷用平胃散加枳殼山梔若因鬱結氣滯者用[illegible]治之　一妊婦心痛煩熱作渴用白朮散即愈後因停食其痛仍作胸腹脹滿按之則痛此因飲食停滯用人參養胃湯按之不痛乃脾胃受傷以六君子補之而愈　一妊婦心腹作痛胸脅作脹吞酸不食此肝脾氣滯用二陳山楂山梔青皮木香而愈又因怒仍痛胎動不食面色青黃肝脈弦緊脾脈弦長此肝木乘土用六君子湯加升麻柴胡木香而愈

火龍散　治妊娠心氣疼

川楝子　茴香炒各　艾葉末鹽炒壹錢

右作一服水一鍾煎至七分不拘時服

產寶治妊娠卒心痛氣欲絕方

川芎　當歸　茯苓

厚朴製各壹分

右水六升煎取二升分二服

白朮湯　治妊娠卒心痛欲死不可忍者出古今錄驗

白朮[illegible]　芍藥肆兩　黃芩參兩

右㕮咀以水陸升煮取貳升半分參服半日令盡微下水令易生忌桃李雀肉等

千金療妊娠心痛

青竹茹壹升　羊脂捌兩　白蜜參兩

右三味合煎每服棗核大參枚食前頓服日三服

又方　青竹茹壹升酒貳升煮取壹升半去滓分溫二頓服

又方　破雞子壹枚酒調服之

又方　大麻子參升研水捌升煮取伍升分五服

又方　橘皮參兩　豆豉伍兩　爲細末煉蜜爲丸如梧子大溫水下貳拾丸無時[illegible]

補遺沉香降氣湯　茯苓補心湯　四七湯　紫蘇飲皆可用

古今錄驗療[illegible]心痛欲死心腹延引

心腹痛

〔丹溪〕夫妊娠心腹痛者，或由宿有冷疼，或新觸風寒，皆由臟虛而致發動也。邪正相擊而并於氣，隨氣上下，上衝於心則心痛，下攻於腹則腹痛，故令心腹痛也。妊娠而痛者，邪正二氣交攻於內，若不時差者，其痛衝擊胞絡，必致動胎，甚則傷墮也。又云妊娠心腹疼痛多是風寒濕冷痰飲與藏氣相擊，故令腹痛攻傷不已，則致胎動也。〔薛〕前證若風寒痰飲，用金沸草散（方見咳嗽）；胎氣鬱結，加香附、川芎；若飲食停滯，用六君加紫蘇、枳殼；若怒動肝火，前藥更加柴胡、山梔；若鬱結傷脾，用歸脾湯（方見健忘）加枳殼、山梔。一妊婦心腹作痛，吐痰惡心，胎氣上攻，飲食少思，此脾虛氣滯而為痰，用六君子加柴胡、枳殼，諸證漸退，飲食漸進，又用四君子加枳殼、山梔、桔梗而安。後因怒，兩脇氣脹，中脘作痛，惡寒嘔吐，用六君加柴胡、升麻、木香一劑而愈。

當歸芍藥散　治妊娠腹中絞痛，心下急痛，及療產後血暈，內虛氣乏，崩中久痢，常服通暢血脉，不生癰瘍，消痰養胃，明目益津

白芍藥（半斤）　當歸　茯苓

白术（各四兩）　澤瀉

川芎（各半斤，一方芎藭三兩）

右為細末，每服二錢，食前溫酒調服。〔元和紀用經〕名為六氣經緯丸，能祛風補勞，養真陽，退邪熱，緩中，安和神志，潤澤容色，散寒邪、溫瘴、時氣。案期先生賜李少君久餌之藥，後仲景增減為婦人懷妊腹痛之本方，用芍藥四兩，澤瀉、茯苓、川芎各二兩，當歸、白术各二兩，亦可以蜜丸服。[illegible]

阿膠散　治妊娠胎動，腹中㽲痛，不思飲食

甘草（炙，一錢半）　白茯苓　白术

川芎　阿膠（各炒，一錢半）　當歸（炒）

陳皮（各一錢）

右㕮咀，每服三錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎至柒分服

療妊娠患腹痛，并胎動不安

葱白（切，一升）　人參　厚朴

阿膠　川芎（各二兩）　當歸（炙，一兩）

右㕮咀，以水柒升，煎取三升，分三服。一方有甘草，無厚朴、川芎

療妊娠先患冷氣，忽中心腹痛如刀刺　芎歸湯

川芎　人參　茯苓

吳茱萸　桔梗　當歸各叁兩
厚朴製　芍藥各貳兩
右㕮咀以水玖升煎取叁升分三服氣下即安
草豆蔻散　治妊娠心腹常痛嘔吐食減少四肢不和
全不入食
草果仁　陳橘皮　乾地黃
白朮各壹兩　川芎錢半　當歸炒
桂心　乾薑　木香各半兩
右爲細末每服肆錢水壹盞棗貳枚煎陸分熱服
古今錄驗療妊娠腹內冷痛忽胎動

薤白壹升　當歸切肆兩
右以水伍升煮取貳升作三服亦將小便服將去
一炊頃大
千金療妊娠腹中痛方　生地黃貳斤取汁酒壹升
合煎減半頓服愈
治妊娠胎動欲落腹中痛不可忍
上等銀壹斤　茅根去黑皮貳斤　以水玖升煮銀取
伍升入清酒壹升同煎茅根取叁升分三服立安
治妊娠一月忽心腹絞痛
大雞卵燒作灰末童子小便調下

治妊娠心腹痛不可忍方
鹽壹斤燒令赤以兩指取一撮酒調服
香莪散　治妊娠五个月已後常胸腹間氣刺滿痛
或腸鳴以至嘔逆減食此由喜怒憂慮過度飲食
失節之所致也　蔡元度寵人有子夫人怒欲逐
之遂病醫官王師復處此方三服而愈
廣中莪茂炒壹兩　丁香半兩　粉草炙錢半
右爲細末空心鹽湯點服壹大錢覺胸中如物按
下之狀愈

補遺　手拈散　四七湯加歸芍　四磨湯　小烏沉
湯安胎飲除地黃　已上諸方皆可選用

腹痛

仲景曰婦人懷胎腹中諸疾痛當歸芍藥散主之（見前心腹痛）

潔古地黃當歸湯 治婦人有孕胎痛

當歸（壹兩） 熟地黃（貳兩）

右為末作一服水叁升煎至壹升半去滓頓服

仲景 婦人腹中痛小建中湯主之（方見虛勞）

（心腹痛）芎歸湯 治妊娠先患冷氣忽心腹痛如刀刺（方見前）

丹發院在因近觸冒惡氣傷胎肚痛手不可近發熱口中不思食須安胎散滯氣

青皮（炒 錢） 黃芩 芍藥（各貳錢）

歸尾（壹錢半） 川芎（壹錢） 木香（伍分）

甘草（炙少許）

分二貼水壹盞先煮苧根兩大片至貳盞去苧根入前藥同煎至壹盞熱服

治妊娠腹痛用生地黃叁斤搗取汁酒壹升合煎減半頓服愈

脈訣曰婦人有胎腹痛其人不安若胎病不動欲知生死令人摸之如覆杯者則男如肘頸參差起者女也冷在何面冷者為死溫者為生

小腹痛

大全 妊娠小腹痛者由胞絡虛風寒相搏痛甚亦令胎動也

薛己按 前證若風寒所搏用紫蘇飲加生薑氣血虛用八珍湯脾氣虛用六君子湯中氣虛用補中益氣湯若腹脹痛用安胎飲加升麻白术不應兼補中益氣湯

一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍膽瀉肝湯一劑諸證頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸 川芎（各捌分） 阿膠（炙）

人參 艾葉（各肆分） 大棗（貳拾個）

茯苓（拾分）

右細切以水肆升煮取貳升溫分三服

補遺 治妊婦小腹痛胎動不安

川芎為細末酒調下

又方 川芎 當歸（各等分） 水煎溫服

腰腹及背痛

大抵腰足因勞傷損動其經或觸風冷乘之則腰痛冷氣乘虛入腹則腹痛故令腰腹相引而痛其痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞姙娠而腰痛甚者則胎墮也 薛前證若外邪所傷用獨活寄生湯[illegible]勞傷元氣用八珍杜仲砂仁膠艾脾腎不足以前藥加白朮補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳殼肝火所動用小柴胡湯[illegible]加白朮枳殼山梔肝脾鬱結用歸脾湯[illegible]加柴胡枳殼 一妊婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致用拔萃羌活湯[illegible]

一劑而愈又用獨活寄生湯及八珍湯以祛邪固本而痊 兩山治一婦懷妊八月當𦙶腰痛不能轉側大便燥結服用人參等補劑痛益加用硝黃通利之藥燥結雖行而痛如故汪診之脉稍洪近駛曰血熱血滯也宜用四物加木香乳沒黃檗火麻仁煎服四五貼痛稍減燥結潤復加發熱而亦或惡寒仍用前方去乳香沒藥加柴胡黃芩服二貼而寒熱除又背心覺寒腰痛復作汪曰血已利矣可於前方加人參一錢服之而安 汪南治一婦姙娠三个月因鬥撲傷胎腰痛小腹疼下血內有熱用當歸白朮

黃芩上施通用芎防風砂仁下艾葉下香附下用水煎服止小腹不痛其砂仁又用補子黃芩何以治風化者黃芩之所治

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍也求杜仲

破故紙[illegible]為末先嚼胡桃肉半个空心溫酒下三錢

五加皮散 治妊娠腰痛不可忍或連胯痛[illegible]

杜仲　五加皮　阿膠

防風　金毛狗脊　川芎

白芍藥　細辛　萆薢各叁兩

杏仁[illegible]　一方有白茯苓無白芍

右㕮咀以水九升煮取二升去滓下膠作三服

五加皮丸 治墮胎前腰痛[illegible]

續斷　杜仲[illegible]　芎藭

獨活　五加皮　狗脊

萆薢　芍藥　訶子肉各壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧子大空心酒下肆拾丸日三

姙娠兩月胎以致腰痛背痛

杜仲　五加皮　當歸

芍藥　川芎　單桂各等分
右細剉以水柒升煮取叁升半分溫三服
陰不足　丹仁六娘有胎腰痛
白朮肆錢　陳皮叁錢　黃蘗炒貳錢半
人參　條芩　川芎
地黃　當歸尾各半兩　甘草五錢
右分四貼水酒煎服
療妊娠氣攤攻腰痛不可忍兼治腹痛
當歸八兩　阿膠　甘草各二兩
葱白壹斤

右細剉以水柒升煮取叁升去滓分溫三服
大地黃丸　治產前後腰腹疼一切血疼兼治血氣
虛四肢不寒骨髓熱疼
熟地黃貳兩　烏梅肉　當歸各壹兩
右爲細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸空心白湯
嚼下
又方　治妊娠腰痛如折
大黑豆貳合　炒令香熟以酒壹大盞煮取柒分去
豆空心頓服
千金　本草　治妊娠胎動搶心或下血取葱白不拘多少濃煮
汁

鹿角　取所淬酒飲之
方鹿角爲末酒服亦可
卒腰痛不安或腰痛胎轉搶心下血不止用葛汁
酒壹升服之
妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不
止艾葉壹把如雞子大以酒肆升煮取貳升分爲
貳服良
小品苧根湯　療損動胎腰腹痛去血胎動向下方

生乾地黃　苧根各貳兩　當歸
芍藥　阿膠　甘草各壹兩
右細切以水陸升煮取貳升去滓內膠煎烊分溫
三服忌海藻蕪荑

心腹脹滿

大全夫妊娠心腹脹滿者由腹內素有寒氣致令停飲妊娠重因觸冷飲發動與氣相平故令心腹脹滿也 胎前證若外感風寒內傷飲食用藿香正氣散若食傷脾胃用六君子湯若陽氣壅滯用紫蘇飲 一妊婦飲食停滯心腹脹滿或用人參養胃湯加青皮山查枳殼其脹益甚其胎上攻惡心不食右關脉浮大按之則弦此脾土不足肝木所侮用六君子加柴胡升麻而愈後小腹痞悶用補中益氣湯升舉脾氣而瘥 一妊婦腹脹小便不利吐逆諸

胎前心腹脹滿　女科四　百十二

醫雜進溫胃寬氣等藥服之反吐轉加脹滿湊心驗之胎死已久服下死胎藥不能通因得鯉魚湯其論曰妊婦通身腫滿或心胸急脹名曰胎水遂去妊婦胸前看之胸肚不分急以鯉魚湯三五服大小便皆下惡水腫消脹去方得分娩死胎此證盖因懷妊腹大不自知覺人人皆謂妊娠孕如此終不知胎水之患也

倉公下氣湯　治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食四肢無力

羌活　赤芍藥　甘草

檳榔　青皮　大腹皮

枳殼　赤茯苓　半夏

桑白皮　桂心各半兩　紫蘇莖葉壹兩

㕮咀每服肆錢水壹盞薑伍片棗貳枚煎至柒分去滓服無時　局方分心氣飲大同小異加燈心減

訶梨勒散　療妊娠心腹脹滿氣衝胸膈煩悶四肢少力不思飲食

訶梨勒　赤茯苓　前胡各壹兩

陳皮　大腹皮　桑白皮各柒錢半

枳殼　川芎　白朮各半兩

胎前心腹脹滿　女科四　百十三

右爲粗末每服肆錢水壹盞半薑叁片棗子壹枚煎至柒分去滓溫服無時

安胎和氣飲　治胎冷腹脹痛引兩脇小便頻數大便虛滑

訶子麵裹煨去核　白朮各貳錢　陳皮去白

高良薑炒　木香不見火　白芍藥

陳米炒　甘草炙各壹錢

右作一服水貳盞生薑五片煎至壹鍾不拘時服忌食生冷之物

治妊娠心下滿氣急切痛

赤茯苓各半分　桑白皮伍分　前胡貳分
郁李仁　檳榔各叁分
右為細末以水壹升煮取一半去滓夜臥服
紫蘇飲　治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶見胎上逼心
枳殼湯　治婦人妊胎腹脹
枳殼叁兩　黃芩壹兩
右為粗末每服五錢水一盞半煎溫服　如胎前腹滿
身體沉重加白朮壹兩
仲景云婦人懷妊六七月脉弦發熱其胎愈脹腹痛惡
寒者少腹如扇所以然者子藏開故也當以附子湯
溫其藏

附子湯方
附子壹枚炮去皮臍切片　白朮肆兩　茯苓
芍藥各叁兩　人參貳兩
右五味以水捌升煮取叁升去滓溫服壹升日三
服
婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水
氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞
宮及關元小便微利則愈

胎水腫滿

產寶論曰夫妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不
尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便
秘澀陳無擇云凡婦人宿有風寒冷濕妊娠喜腳腫
俗呼為皺腳亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水
論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安
穩若中風寒邪氣及有所觸犯則隨邪而生病也凡
妊娠經血壅閉以養胎若忽然虛腫乃胎中挾水水
血相搏脾胃惡濕主身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛
水氣流溢故令身腫滿也然其由有自或因泄瀉下

痢臟腑虛滑耗損脾胃或因寒熱瘧疾煩渴引飲太
過濕漬脾胃皆能使頭面或手足浮腫也然水漬於
胞兒未成形則胎多損壞及其臨月脚微腫者乃胞
藏水少血多水出於外故現微腫則易生也宿有寒
氣因寒冷所觸故能令腹脹腫滿也　產乳集論妊
娠自三月成胎之後兩足自腳面漸腫腿膝以來行
步艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於腳指間
有黃水出者謂之子氣直至分娩方消此由婦人素
有風氣或衝任經有血風未可妄投湯藥亦恐大段
甚者慮將產之際費力有不測之憂故不可不治於

未產之前也古方論中少有此者按名醫錄宋少主元徽中與徐文伯微行學鍼法文伯見一婦人足腫不能行少主脉之此女形也文伯診之曰此男胎也在左則胎黑色少主怒欲破之文伯惻然曰臣請鍼之胎遂墮男形而色黑此妊娠足腫之說見於古者今巢氏病源中但有子腫之論而全生產寶亦略言之劉禹錫續傳信方以為妊婦有水氣而成胎陳無擇亦言之皆非也唯淮南陳景初名醫也獨有方論治此病方名初謂之香附散李伯時易名曰天仙藤散也　愚按前證若胸滿腹脹小便不通

遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛弱佐以四君子若面目虛浮肢體如水氣用全生白朮散如未應用六君子湯脾虛濕熱下部作腫用補中益氣加茯苓若飲食失宜嘔吐泄瀉用六君子湯若腿足發腫喘悶不安或指縫出水用天仙藤散脾胃虛弱兼用四君子湯如未應用補中益氣湯若脾肺氣滯用加味歸脾湯佐以加味逍遙散　一妊婦每胎至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此是脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈凡治妊娠毋泥月數但見某經證即用本藥為主　一妊婦

年三十八妊娠水腫以鯉魚湯加五苓散人參濕加蒼朮壹錢厚朴陳皮五分雞蘇子炒車前子滑石各壹錢作一貼若喘急加葶藶杏仁小便不利加木通燈草甚者車前子澤瀉相救其濕毒自消防己治腰已下濕熱腫如內傷胃弱者不可用也

天仙藤散

天仙藤洗略炒　香附子炒　陳皮

甘草　烏藥不必天台者但得軟白香而辛者良

右等分淨秤為細末每服叁錢水壹大盞薑叁片木瓜叁片紫蘇叁葉同煎至柒分放溫澄清空心

食前服日三服小便利氣脈通體輕腫漸消更不須多服 [illegible]

產寶療妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓肆兩　杏仁　檳榔各叁兩

旋覆花　郁李仁各壹兩

右為粗末以水陸升煮取貳升去滓分溫三服小便通即瘥

崔氏療妊娠體腫有水氣心腹急滿

茯苓　白朮各肆兩　旋覆花貳兩

杏仁　黄芩各参分

右細切以水柒升煮取貳升半分溫三服忌桃李

雀肉酢物

療妊娠遍身洪腫葶藶子散

葶藶子壹兩　白朮伍兩　茯苓

桑白皮　郁李仁各貳兩

右爲粗末水陸升煮取貳升分三服小便利即差

又方

澤瀉　葶藶各參兩　茯苓

枳殼　白朮各陸兩

右細切以水陸升煮取貳升分溫兩服小便利即

差

澤瀉散　治妊娠氣壅身體腹脇浮腫喘急大便不

通小便赤澀宜服

澤瀉　木通　桑白皮

赤茯苓　枳殼　檳榔各壹兩

右件□服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾分食前服

防己湯　治妊娠脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小

便不利

□□壹錢半　桑白皮　赤茯苓

紫蘇葉各壹錢　木香伍分

作　服煎服法同前

千金鯉魚湯　治妊娠腹大胎間有水氣

白朮伍兩　茯苓肆兩　當歸

芍藥各參兩

右細剉片以鯉魚壹尾修事如食法煮取汁去魚

不用每服肆錢入魚汁壹盞半生薑柒片橘皮少

許煎至柒分去滓空心服未效再

腎著湯　治妊娠腰腳腫

茯苓　白朮各肆兩　乾薑

甘草各貳兩　杏仁參兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分食前服

指迷五皮散　治胎水並常脾虛喘滿亦治

大腹皮　桑白皮　生薑皮

茯苓皮　橘皮各等分

右㕮咀每服半兩水貳盞煎至壹盞去滓不拘時煎

分捌分去滓空心溫服未效再服脾虛浮腫

治妊娠兩腳浮腫名曰脆腳因脾衰不能化

氣水溢故用生料平胃散每服肆錢水壹盞分小紫蘇

蘇葉煎湯下

全生白朮散 治妊娠面目虛浮如水腫狀

白朮 壹兩 生薑皮 大腹皮
茯苓皮 陳皮 各半兩

右為細末每服貳錢米飲調下不拘時

千金 治妊娠後腳上至腹腫小便不利微渴豬苓伍兩為末以熟水服方寸匕日三服

丹溪 腫多濕用山梔一撮米飲吞下

腹內鐘鳴

丸 治孕婦腹內鐘鳴用鼠窟前後土為細末研麝香酒調下二錢其危立愈

補遺 治孕婦腹中兒哭用川黃連濃煎汁令母常呷之

按準繩云小兒在腹中哭其治法亦用空房中鼠穴土或黃連煎濃汁飲之即止想即是證又云臍帶上疙瘩兒含口中因妊婦登高舉臂脫出兒口以此作聲令妊婦曲腰就地如拾物狀仍入兒口即止然後題(?)…須合用…

積聚

素問黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死 素問

丹溪 血塊如盤有孕難服峻劑此方主之

香附子 醋煮 肆兩 桃仁 去皮尖 壹兩 海粉 醋煮 貳兩
白朮 壹兩

右為末麵糊丸服

○子癰

治孕癰立效

烏藥 為細末

右用伍錢水壹盞煎至柒分溫服

補遺 治孕中有癰 薏苡仁煮汁飲之

準繩按孕癰即是腹內患癰如前法不應宜用牡丹皮散 或薏苡仁湯 方見外科

傷食

大經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味若妊子飲食不節生冷毒物恣性食啖致傷脾胃故妊娠傷食最難得藥唯此二方最穩捷（木香丸 白朮散）按東垣先生云脾胃之氣壯則過時而不饑多食而不傷蓋胃主司納脾主消化五臟之本也然食倍而傷者乃脾氣虛而不化也若投以峻劑則脾胃復傷而胎亦損矣當審其所因而調治之若飲食停滯或肚腹作痛用平胃散嘔吐惡心加枳殼砂仁吞酸噯腐加黃連叁分吳茱萸貳分腹

滿泄瀉用六君子湯停滯肉食倍加山楂停滯麵食倍加麥芽停滯糯食用白酒麴末一味米食停滯倍加穀芽魚腥所傷倍加陳皮傷辛熱之物加黃連傷生冷之物加砂仁木香如不應更加肉豆蔻補骨脂再不應用四神丸若脾氣下陷用補中益氣湯凡噯覺藥氣且戒藥餌節飲食經云損其脾者調其飲食適其寒溫大凡脾胃虛弱飲食難化以白朮陳皮為末等分麴糊丸常服最善枳朮丸但可暫用枳實峻厲能耗真氣治者慎之 一妊娠因停食服枳朮丸胸腹不利飲食益少更服消導寬中之劑其胎下墜余謂此脾氣虛而不能承載也用補中益氣湯倍參朮茯苓湯中氣漸健其胎漸安又用八珍湯加柴胡升麻調理而痊

木香丸 治婦人有孕傷食

木香（壹錢） 三稜 人參

白茯苓（各叁錢）

右為細末麵糊丸如綠豆大熟水吞下肆拾丸

白朮散 治妊娠氣不調和飲食易傷

白朮（炒） 乾紫蘇（各壹兩） 人參

白芷（炒各叁錢半） 川芎 訶子皮

青皮（各半兩） 甘草（貳錢）

右為末每服貳錢水壹盞薑叁片煎至柒分溫服

前方小七香丸（傷食）保氣散（上二方）治傷食良効

鄭氏勝金散 治妊婦因食傷胎傳於脾胃氣虛冷逆小腹脹痛或響重大便秘

吳茱萸（泡） 淨陳皮 川芎

乾薑（炮） 生薑（各半錢） 炙甘草

厚朴（薑製各六錢）

右為細末每服叁錢陳米飲下入鹽煎尤妙濟生加砂

仁

中惡

大夫妊娠忽然心腹刺痛悶絶欲死者謂之中惡邪惡之氣中胎傷於人也所以然者血氣自養而爲精神之主若血氣不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠之病亦致損胎也［謹］按前證當調補正氣爲善用金銀藤一味煎湯飲之

當歸散　治妊娠中惡心腹疞痛

當歸　丁香　川芎各叁兩

青橘皮貳兩　吳茱萸半兩湯洗七次炒黑

右爲細末無時溫酒調壹錢

又方　生乾地黃壹兩　枳殼　木香各叁錢

右爲細末每服壹錢酒調下

又方　苦梗壹兩細剉炒　生薑半兩　水煎服之

補遺　治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血或衄血者用熟艾如雞子大　煮汁頓服

又方　用鹽一盞水一盞調和服以冷水噀之吐出即安

又方　竈心土爲末每服二錢井水調服白湯調亦可

又法　取汗衣用男子貼體久染汗者作燒灰存性白湯調服

中風

大論曰夫四時八方之氣爲風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名爲虛邪賊害萬物人體虛則中之若風邪客於皮膚入於經絡即頑痺不仁若入於筋脈挾寒則攣急喎僻挾濕則縱緩若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛風邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而爲諸病妊娠中風若不早治則令墮胎也［謹］按病機要云風本爲熱熱勝則風動宜以靜勝其躁是亦養血也治法須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者多著四肢則脈浮惡寒拘急不仁中臟者多著九竅則唇緩失音耳聾鼻塞目瞀便秘中腑者宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治在經當以大藥養之此中風之要法妊娠患之亦當以此施治而佐以安胎之藥

防風散　治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言四肢急強

防風　葛根　桑寄生各壹兩

羚羊角屑　細辛　當歸

甘菊花　漢防己去皮　秦艽去蘆
桂心　茯神去木　甘草炙各一兩
右為㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至一
大盞去滓入竹瀝半合攪勻溫服無時
生犀角散　治妊娠卒中風不語四肢強直心神惛
憒
生犀角屑　麻黃去節各一兩　防風去蘆
赤箭　羌活　當歸
人參各去蘆　葛根　赤芍藥各半兩
甘草炙　秦艽各半兩　石膏一兩半

右為㕮咀每服四錢煎服法如前
防己散　治妊娠中風口眼喎斜手足頑痹
防己去皮　羌活　防風各去蘆
麻黃去節　黃松木節　羚羊角屑各一兩
桂心　荊芥穗　薏苡仁
桑寄生　甘草炙各半兩
右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎至一
大盞去滓溫服不拘時候
獨活散　治妊娠因洗頭中風身體強硬牙關緊急
失音不語並宜治之

獨活去蘆　赤箭　麻黃去節
阿膠各炒　烏犀角屑　羌活去蘆
防風去蘆　天麻　白附子炮
漢防己去皮　桂心　芎藭
白殭蠶各微炒　龍腦細研各一分
右為細末入研藥令勻每服貳錢薄荷湯調下不
拘時
白殭蠶散　治妊娠中風口噤心膈痰涎壅滯言語
不得四肢強直
白殭蠶炒　天麻　獨活去蘆各一兩
麻黃去節一兩半　烏犀角屑半兩　白附子炮
半夏湯洗七次薑汁製　天南星炮　藿香各半兩
龍腦一錢細研

右為細末入研藥令勻每服一錢生薑薄荷湯調
下不拘時日三服
赤箭丸　治妊娠中風手足不隨筋脈緩急言語謇
澀皮膚不仁
赤箭　萆薢酒浸　麻黃去節
獨活去蘆　鼠黏子　熟乾地黃
羚羊角屑　阿膠炒　防風去蘆

芎藭 當歸(炒去蘆) 薏苡仁
五加皮 秦艽(去蘆) 漢防已(去皮)
栢子仁 酸棗仁(炒) 丹參(去蘆各叁錢半)
右爲細末煉蜜和搗三五百下丸如梧子大每服叁拾丸荳淋酒送下食前

白术酒 治妊娠中風口噤語言不得
白术(壹兩半) 獨活(壹兩) 黑豆(壹合炒)
右細剉以酒叁升煎取壹升半去滓温分四服口噤者拗口灌之得汗即愈

治妊娠因感外風如中風狀不省人事
熟艾(叁兩) 陳米醋炒令極熱以絹帛裹熨臍下良久即省

風痓

夫妊娠體虚受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相搏發則口噤背强名之曰痓又云痓其候冒悶不識人須臾自醒良久復作謂之風痓一名子癇亦名子冒甚則反張、前證若心肝風熱用鈎藤湯肝脾血虚加味逍遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯健氣逆痰滯紫蘇飲肝火風熱鈎藤散脾鬱痰滯二陳湯加竹瀝若無外邪相雜當參照子煩門

羚羊角散 治妊娠冒悶角弓反張名曰子癇風痓
羚羊角(鎊) 獨活 酸棗仁(炒)
五加皮 薏苡仁(炒) 防風
當歸(酒浸) 川芎 茯苓(去木)
杏仁(去皮尖各五分) 木香 甘草(炙各貳分)
右薑水煎服

小品療妊娠忽悶眼不識人須臾醒復發亦有不醒者名爲痓病亦名子癇亦名子冒宜葛根湯 若竹瀝可迷辦者當先作湯汗次竹瀝湯也其間遠不可即辦者當先辦湯此二藥食得其一種便服療諸痓絶死也非但偏療妊娠產婦絶死亦有效小兒或癇病食療發痓療之亦驗

葛根湯方 治妊娠臨月因發風痙忽悶憒不識人吐逆眩倒小醒復發名曰子癇

葛根　貝母去心　牡丹皮

木防己　防風　當歸

川芎　白茯苓　桂心熬

澤瀉　甘草各二兩　獨活

石膏碎　人參各三兩

右細切以水九升煮取三升分三服貝母令人易產若未臨月者以升麻代之忌海藻菘菜酢物

按此方犯桂瀉牡丹不如羚羊角散之妥

羌活酒 治妊娠中風痙口噤四肢強直角弓反張

羌活一兩半去蘆　防風一兩去蘆　黑豆一合去皮炒

右二味為㕮咀好酒五升浸一宿每服用黑豆一合炒令熟投入藥酒一大盞候沸即住火去滓分兩服灌之

予治一婦人懷妊六月發癇手足揚直面紫黑色合眼流涎昏憒不醒人事半時而醒醫與震靈丹五十粒其疾時作時止無減遂直至臨產方得產一女產中亦皆安次年其夫疑用前藥求治之診其脈浮數重取滑按至骨則沉帶數時正二月因未見其癇發正狀未敢與藥意其舊年癇發時乃五月欲待其時度此疾必作當審諦施治至五月半其疾果作皆是午巳兩時遂教以自製防風通聖散用生甘草加桃仁多紅花少或服或吐至四五劑疾漸跡而輕後發為疥而愈

瘈瘲

瘈者筋脉急而縮也瘲者筋脉緩而伸也一縮一伸手足相引搐搦不已大抵與嬰孩發搐相似謂之瘈瘲也此證多屬風蓋風主搖動駱龍吉云心主脉肝主筋心屬火肝屬木火主熱木主風風火相熾則爲瘈瘲也治法若因風熱用鈎藤湯加柴胡山梔黃芩白术以平肝木降心火養氣血若風痰上涌加竹瀝南星半夏若風邪急搐加全蠍僵蠶若虛損氣血用八珍湯加鈎藤山梔爲主若無力抽搐戴眼反折汗出如油者肝絶也皆不治 一妊婦四肢不能伸服

祛風燥血之劑遺尿痰甚四肢抽搐余謂肝火血燥用八珍湯加炒黑黃芩爲主佐以鈎藤湯而安後因怒前證復作小便下血寒熱少寐飲食少思用鈎藤散加山梔柴胡而血止用加味逍遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥鈎藤鈎飲食進而漸安

鈎藤湯 見胎動

鈎藤散 眩暈

眩暈

消風散 治妊娠肝臟熱風上攻太陽穴痛嘔逆頭旋目暈或腮項腫核

石膏 煆　防風 去蘆　川羌活 去蘆

甘菊花 去梗　川芎　羚羊角 鎊

當歸 去蘆　大豆黃卷 炒　荊芥穗

白芷 各壹錢　炙甘艸 半錢

右作一服水貳鍾好芽茶半錢煎至壹鍾食遠服

犀角散 治妊娠婦人諸風熱困倦時發昏眩

犀角　揀參　山梔仁

川羌活　黃連　青黛

川芎　吳白芷　茯苓

甘艸 各壹錢

右作一服水貳鍾生薑叁片竹葉[illegible]煎至壹鍾食遠服

本[illegible]遂病悸以[illegible]中[illegible]焉無可
為治未常以為膽傷只得服補膽湯而不[illegible]

大聖散 治妊娠怔悸睡裏多驚腹脅膨脹坐臥不寧

白茯苓去皮 麥門冬去心 黃芪蜜炙去蘆
當歸洗去蘆 川芎各壹錢半 木香不見火
人參 甘草炙各壹錢

右作一服水二鍾生薑伍片煎至壹鍾服無時

○治孕婦不語非病也間有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不識與人臨月則與寒涼之藥產後能語則以為醫之功豈其功也哉 黃帝問曰人有重身九月而瘖此為何也岐伯對曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之柰何岐伯曰無治也當十月復 都氏治驗見前候胎條

子煩 口乾附

大全 妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子煩也產寶云夫妊娠而子煩者是肺臟虛而熱乘於心則令心煩也停痰積飲在心胸之間或衝於心亦令煩也若熱而煩者但熱而已若有痰飲而煩者嘔吐涎沫惡聞食氣煩躁不安也大凡妊娠之人既停痰積飲又寒熱相搏氣鬱不舒或煩躁或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂子煩也 薛 前證若因內熱用竹葉湯氣滯用紫蘇飲痰滯用二陳白朮黃芩枳殼氣滯用分氣飲加川芎脾胃虛弱用六君紫蘇山梔 一妊婦煩熱吐痰惡食惡心頭暈此脾虛風痰為患用半夏白朮天麻湯方見眩暈以補元氣祛風邪漸愈惟頭暈未瘥乃用補中益氣湯加蔓荊子以升補陽氣而愈

竹葉湯 治妊娠心驚膽怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓肆錢 防風 麥門冬去心
黃芩各叁錢

右作一服水貳鍾竹葉五片煎至壹鍾無時服

竹瀝湯 出外臺秘要與前竹葉湯同內有竹瀝壹合

無竹葉　又方有知母無黃芩

竹茹湯　療妊娠煩躁或胎不安

川淡青竹刮茹壹兩　以水壹大升煮取肆合徐徐

服盡爲度

知母飲　治妊娠心脾壅熱咽膈渴苦煩悶多驚

知母　麥門冬去心　赤茯苓各壹兩半

黃芩　黃芪各貳兩　甘草壹兩

右作一服水貳鍾人桑白皮半錢煎至壹鍾再入

竹瀝些少同煎二三沸服無時

麥門冬湯　治妊娠心驚膽怯煩悶名曰子煩

胎前　女科四　百五

麥門冬　白茯苓　防風各叁錢

人參壹錢半

右作一服水貳鍾生薑伍片淡竹葉拾葉煎至壹鍾

食遠溫不拘時服

麥門冬散　治妊娠心煩憒悶虛躁吐逆惡聞食氣

頭眩四肢沉重百節疼痛多卧少起

麥門冬去心　子芩　赤茯苓各壹兩

茯神　赤芍藥　陳皮

人參　苦梗　桑寄生

甘草　旋復花各半兩　生地黃柒錢半

右爲粗末每服肆錢水壹盞半薑五錢煎至柒分不

拘時溫服

又方

麥門冬　苧根各叁兩　黃芩

茯神各壹兩　甘草炙　犀角屑各半兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞生地黃壹分淡竹葉伍

片煎至陸分去滓溫服効

柴胡散　治妊娠心煩頭目昏重心胸煩悶不思飲

食

柴胡壹兩半　赤茯苓　麥門冬各壹兩

胎前　女科四　百五

枇杷葉去毛　人參　橘紅

甘草各半兩

㕮咀每服肆錢水壹盞薑叁片煎至柒分服

人參散　治妊娠熱氣乘於心脾津液枯少煩躁壅

熱乾渴

人參　麥門冬　赤茯苓

地骨皮　家乾葛　黃芩

犀角屑各柒錢半　甘草半兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞煎至陸分去滓溫服

治妊娠心煩熱不止

葱白　豉

右以水大盞煎至一盞半去滓溫分三服

一母丸　治妊娠因服藥後胎氣不安有似虛煩不得臥巢氏謂之子煩也（出産寶）

知母（一兩炒）

右爲細末以棗肉爲丸如彈子大每服一丸煎人參湯送下　醫者不識此證作虛煩治之損動胎氣宜矣

【[illegible]】夫足太陰脾之經也其氣通於口手少陰心之經其氣通於舌若妊娠之人臟腑氣虛榮衛不理陰陽隔絕熱乘於心脾津液枯少故令心煩而口乾也　若前證若胃經實火用竹葉石膏湯若胃經虛熱用人參黃芪散若胃經氣虛用補中益氣湯若肝經虛熱用紫蘇飲若肝經火動用加味逍遙散若脾氣鬱結用加味歸脾湯若腎經火動加味地黃丸

一妊婦煩熱吐痰咽悶作渴用知母散加山梔以清肺經而愈後因怒咳嗽小便自遺用補中益氣加麥門山梔以補肺氣滋腎水而痊

升麻散　治妊娠壅熱心神煩躁口乾渴逆

川升麻　瓜蔞根　黃芩　人參

麥門冬　柴胡　梔子仁[illegible]

茯神（各一錢）　知母　甘草（炙五分）

右作一服水一鍾煎至六分食遠溫服

知母散　治妊娠煩躁悶亂口乾及胎藏熱

知母　麥門冬　甘草（炙）　黃芪

子芩　赤茯苓（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝一合更煎一二沸溫服

葛根散　治婦人妊娠數月胸膈煩躁唇口乾渴身熱少食

家葛根[illegible]　黃芩　人參

葳蕤　黃芪　麥門冬　甘草（炙各等分）

右每服四錢水一盞竹茹如彈子大煎七分溫服無時

人參黃芪散　治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參　黃芪　家葛根　麥門冬

赤茯苓　秦艽（各半兩）　知母（炙）　甘草（炙[illegible]）

每服四錢薑水竹葉煎服

補遺人參白朮散　當歸六一湯皆良

治子煩口乾不得臥用黃連（末每服[illegible]）錢粥飲調下

吐血衄血咳唾血

夫妊娠吐血者皆由臟腑有傷凡憂思驚怒皆傷臟腑氣逆於上血隨而溢心悶胸滿久而不已心悶甚者死妊娠病此多墮胎也 [illegible]若肝經怒火[illegible]用小柴胡山梔生地黃用前藥合四物後用加味逍遙散 肝經風熱防風子丸 心經有熱朱砂安神丸 心氣不足補心湯 思慮傷心妙香散 胃經有火犀角地黃湯 [illegible]脾經[illegible]散 鬱結傷脾加味歸脾湯 肺經有火黃芩清肺飲 因氣鬱滯紫蘇飲 氣不攝血用補中益氣湯 腎經虛火加味六味丸

[illegible]

治男子婦人血妄流溢吐血衄血嘔血咯血

熟乾地黃 小薊并根用 人參

蒲黃微炒 當歸去蘆 芎藭

烏梅肉各等分

右件藥搗羅爲散每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時

治吐血不止

[illegible]紙[illegible]用生布[illegible]爲末濃米飲調下

治吐衄以白[illegible]

[illegible]妊[illegible]寒熱[illegible]咳嗽[illegible]不食[illegible]或[illegible]

[illegible]乳[illegible]或[illegible]如[illegible]以[illegible]

或痰涎[illegible]夜[illegible]也[illegible]

[illegible]

如寒熱[illegible]痰[illegible]取 [illegible] 大[illegible]

[illegible]

也[illegible]後[illegible]

治[illegible]服[illegible]取[illegible]一[illegible]

其[illegible]

欬嗽

大全 夫肺內主氣外司皮毛皮毛不密寒邪乘之則欬嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其欬不已則傳於腑妊娠病久不已則傷胎也

薛前證若秋間風邪傷肺用金沸草散（方見）夏間火邪尅金用人參平肺散（方見喘）冬間寒邪傷肺用人參敗毒散（方見）春間風邪傷肺用參蘇飲（方見）若脾肺氣虛用六君子湯加桔梗若血虛用四物桑白皮杏仁桔梗腎火上炎用六味丸（方見）加五味子煎服脾胃氣虛風寒所傷用補中益氣（方見）加桑皮杏仁桔梗

蓋肺屬辛金生於己土嗽久不愈者多因脾土虛而不能生肺氣而腠理不密以致外邪復感或因肺氣虛不能生水以致陰火上炎所致治法當壯土金生腎水為善 一妊娠氣喘痰甚諸藥不效素有帶下始於目下浸兩月餘其面亦然此氣虛而有痰飲也用六味丸料數劑而愈 一妊婦嗽則便自出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中益氣湯以培土金六味丸加五味以生腎氣而愈 一妊婦咳嗽其痰上涌日五六碗作腎藥不應予以為此水泛為痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數劑而安

一妊婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯加山梔枳殼白朮茯苓治之而愈但欲作嘔此肝侮脾也用六君子加升麻柴胡而痊

欵冬花散 治妊娠心膈痰毒壅滯肺氣不順咳嗽頭疼

欵冬花　麻黃　貝母（炒）
前胡　桑白皮　紫菀（各二兩）
旋覆花　白朮　甘草（各一兩）
石膏（二兩）

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分去滓

溫服

桔梗散 治妊娠肺壅咳嗽喘急

桔梗　紫蘇　人參
桑白皮　貝母　甘草（各半兩）
天門冬（去心）　赤茯苓（各一兩）
麻黃（去節）

右每服四錢水一盞生薑三片煎至七分去滓不拘時服

馬兜鈴散 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴　桔梗　人參
甘草　貝母（各半兩）　陳皮（去白）

大腹子　桑白皮　紫蘇（各…）
五味子（各貳錢）
右㕮咀每服肆錢薑叁片水煎

麻黃散　治妊娠外傷風冷痰逆咳嗽不食
麻黃　陳皮　前胡
半夏　人參　白朮
枳殼　貝母　甘草（各…）
㕮咀每服肆錢薑叁片棗壹枚水煎服

百合散　治妊娠風壅咳嗽痰多喘滿
百合　紫菀茸（洗）　白芍藥
赤茯苓　桔梗（炒）　前胡（各…）
貝母　甘草（五分）
作一服水貳鍾薑伍片煎至壹鍾不拘時服

紫菀湯　治妊娠咳嗽不止胎不安
紫菀（…兩）　桔梗　甘草
杏仁　桑白皮（各…）　天門冬（壹兩）
右㕮咀每服叁錢竹茹壹團水煎入蜜半匙
再煎二沸溫服

[illegible]散治妊娠咳嗽不止穩重有效

喘
昔滄洲治經歷者散作人病喘不得臥衆作肺氣受風邪治之呂診之氣口盛于人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離經因告之曰病…得之產後動血以致胎死不下奔迫而上衝非風寒作也乃用催生湯加芎歸煮二三升服之夜半果下一死胎喘即止哈散翁聞曰病若誠有懷以室人見致故棄去之衆所不知也衆嘆而去

不安散　治妊娠上氣喘急大便不通嘔吐不食腹脇脹痛
川芎　木香（各壹錢半）　陳皮
熟地黃　乾薑（炮）　生薑
厚朴　甘草（各…）
右作一服水貳鍾入姜鹽少許煎至壹鍾不拘時服

桔梗湯
馬兜鈴散（咳嗽…）

瘧

夫妊娠病瘧，乃夏傷於暑，客於皮膚，至秋而發，陽盛則熱，陰盛則寒，陰陽相離，寒熱俱作。其發晏者，由風邪客於風府，循膂而下，衛氣一日一夜常大會於風府，故發日晏。其早者，衛氣之行風府，日下一節，二十一日下至尾骶，二十二日入脊內，上注於伏衝之脈，其行九日，出缺盆，其氣既上，故發更早。其間日發者，由邪氣內搏五臟，橫連募原，其道遠，其氣深，其行遲，不能日作也。妊娠而發，多傷於胎。　愚按：前症若因脾胃虛弱，飲食停滯，或外邪所感，或鬱怒傷脾，或暑邪所

伏，當審係飲食停滯，用六君子加桔梗、蒼朮、藿香；外邪多而飲食少，用藿香正氣散(雜症中風)；外邪少而飲食多，用人參養胃湯(雜症瘧疾)；勞傷元氣，用補中益氣湯(雜症勞傷)；鬱怒所傷，用小柴胡湯(傷寒方)兼歸脾湯(心脾)；若木侮土，久而不愈，用六君子為主，佐以安胎藥，仍參三陰三陽經而治之。一婦人因怒，寒熱頭痛，發熱，期久而不已，胸腹不利，飲食少思，吞酸吐痰，用六君子加柴胡、山梔，二十餘劑而愈。但晡熱少食，又用四君子加柴胡、升麻為主，佐以逍遙散而瘥。一妊婦瘧久不已，發熱，胸腹膨脹，食少欲嘔，便血少寐，此屬肝脾鬱怒，用歸脾湯加柴胡、山梔漸愈；又用六君子湯加柴胡、山梔、升麻而愈。一妊婦患瘧已愈，但寒熱少食，頭痛晡熱，內熱，此脾虛血弱也，用補中益氣湯加蔓荊子，頭痛頓止；又用六君子湯加芎、歸，飲食頓進；再用逍遙散加參朮而寒熱愈。

驅邪散　治妊娠停食感冷，發為瘧疾。

白朮　草菓仁　高良薑(各)

縮砂仁　藿香葉　橘紅

白茯苓(各壹錢)　甘草(炙，伍分)

右作一服，水貳鍾，生薑伍片，紅棗壹枚，煎壹鍾，不拘時服。

七寶散　治男婦一切瘧疾，或先寒後熱，或先熱後寒，或寒多熱少，或熱多寒少，或一日一發，或一日兩三發，或連日發，或間日發，或三四日一發，不問鬼瘧、食瘧，不伏水土，山嵐瘴氣，似瘧者，並皆治之。

常山　厚朴(薑製)　青皮

陳皮(去白)　甘草　檳榔

草菓(各等分)

㕮咀，每服半兩，於未發隔夜用水酒各壹盞煎至壹大盞，去滓，露一宿，再用酒水煎滓，一大盞，去滓，另

瘧，宿要日當發之早，溫溫而東北服頭藥少頃所服藥汗大有神効。予嘗治一妊婦六七个月患瘧先寒後熱，六脉浮緊，醫用柴胡桂枝無効。予曰此非常山不愈，衆醫難之。越數日疾甚，乃從予治以七寶散一服瘧止。衆問婦人重身瘧之柰何。岐伯曰有故無殞亦無殞也。何謂也。岐伯曰大積大聚其可犯也，衰其大半而止。誠審藥物之性，明治瘧之方，何疑攻治哉。

柴胡散　治妊娠瘧疾

柴胡貳錢　生大黃貳錢　生黃芩壹錢半

甘草壹錢

右㕮咀作壹服，水煎，臨發日五更溫服，必取利為愈。如胎上逼心，可服枳殼散。忌油麪辛熱等物。

又方

用大黃貳兩　柴胡壹兩　黃芩壹兩　芍藥壹兩　為細末，滴水糊為丸如梧桐子大，每服百丸，臨發日五更冷湯吞下，腑兩時再服伍拾丸，以利為度。若妊娠瘧疾發熱口乾渴飲無度者，亦用生地黃壹兩　苦參　麥門冬　人參　知母各壹兩　石膏貳兩　甘草壹兩半　黃芩壹兩　右㕮咀每服伍錢，入烏梅半箇，煎服。

又方

用常山壹兩　石膏壹兩　甘草炙　黃芩各半兩　烏梅拾箇

細切，以水酒各壹椀浸一宿，平日煎至壹椀，去滓，分二服，臨發時服。

右方犯常山大黃吐下之劑，若六脉浮緊有力中有痰積熱者用之，所謂有故無殞也。其他瘧治方法已備雜證瘧門，茲不贅。若熱甚恐致動胎者，亦如傷寒熱病治法，以白藥子伏龍肝等塗臍上下可也。

霍亂

人兵飲食過度觸冒風冷陰陽不和淸濁相干謂之霍亂其間或先吐或腹痛吐利是因於熱也若頭痛體疼發熱是挾風邪也若風折皮膚則氣不宣通而風熱上衝爲頭痛若風入腸胃則泄利嘔吐甚則手足逆冷此陽氣暴竭謂之四逆妊娠患之多致傷胎也 薛按前證若因內傷飲食外感風寒用藿香正氣散若因飲食停滯用平胃散果脾胃頗傷陽氣虛寒手足逆冷者須用溫補之劑治當詳審毋使動胎也 一妊婦霍亂已止但不進飲食口內味酸泛行消導寬中余曰此胃氣傷而虛熱也當用四君子湯彼不信乃服人參養胃湯嘔吐酸水其胎不安是藥復傷也仍與四君子湯俾煎熟令患者先嗅藥氣不作嘔則呷少許恐復嘔則胎爲所動也如是旬餘愈

人參白术散

白术 茯苓 人參 甘草

木香 藿香各半 乾葛各一兩

爲末沸湯調服一錢甚者加生薑汁頻頻飲之

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 厚朴薑製 橘紅各一兩 當歸炒

乾薑 甘草各炒

作一服水二鍾薑五片紅棗二枚煎八分食前服無時

白术散 治妊娠霍亂腹痛吐利不止

白术炒 益智仁 枳殼麩炒 橘紅各二錢半

草豆蔻煨去皮 良薑炒各半兩

右爲散每服三錢水煎入鹽半分去滓溫服無時

木瓜煎 治妊娠霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕

吳茱萸湯泡七次 生薑各二錢半 木瓜一兩半

一方有茴香炒 甘草各一錢 茱萸二錢半 加紫蘇煎

右細剉水二盞煎一盞二分去滓分二服熱服無時

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多致煩躁宜沉井水中候冷頻頻服

草果仁 烏梅肉 甘草

右㕮咀每半兩水二碗薑十片煎八分沉冷服

妊娠霍亂腹痛四肢冷逆汗出脈虛弱者理中湯治之

右四方內用乾薑豆蔻茱萸俱大溫之劑若發熱煩渴脈數陽證者服之即死宜用後方

竹茹湯 益元散 桂苓甘露飲 參蘇子湯

泄瀉

傷米食所傷用六君加穀蘗麵食所傷用六君加麥蘗肉食所傷用六君加山查神麯寒熱作悶乃用木傷脾土用六君加柴胡升麻嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加薑桂不應用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢體倦怠用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉果若作嘔不食腹痛惡寒乃脾土虛寒用六君加木香薑桂若瀉在五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神丸日間服白朮散如不應或愈而復作或

飲食少思急用八味丸補命門火以生脾土爲善。

邊人常側室妊娠泄瀉自用枳朮黃連之類腹悶吐痰發熱惡寒飲食到口即欲作嘔強匙許即吞酸不快欲用祛痰理氣余曰此因脾胃傷而痰滯中脘若治痰氣復傷脾胃矣遂以參朮炮薑爲末丸如黍粒不時含嚥三五丸漸加至三日後日進米飲半湯少愈、

進士王繳徽之內懷妊泄瀉惡食作嘔余曰脾氣傷也其夫憂之強進米飲余謂飲亦能傷胃且不必強候脾胃醒宿滯自化飲食自進不信別用人參養胃湯飲之吐水酸苦又欲投降火寒藥余曰若然則胃氣益傷也經云損其脾胃者調其飲食適其寒溫後不藥果愈、

加味理中湯

人參　白朮　白芍藥

白茯苓　乾薑　黃連

藿香葉　木香　訶子肉

肉果　甘草各五錢

水貳鍾生薑參片大棗貳枚煎壹鍾飢時服

除方並詳第一卷泄瀉及雜病泄瀉門

滯下

當治痢之法當參詳[illegible]下黃水乃脾土[illegible]其色
下陷也當升補中氣若黃而兼青乃肝木[illegible]
下肝補脾若黃而兼白乃子令母虛須補脾胃若黃
而兼黑是水反侮土矣必温補脾胃若黃而兼赤乃
心母益子但補中益氣若腸胃虛弱風邪客之用胃
風湯或胎氣不安急補脾胃而自安矣凡安胎之藥
當臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類　地官胡成
甫之內妊娠久痢自用消導理氣之劑腹內重墜胎
氣不安又用阿膠艾葉之類不應余曰腹重墜下元

氣虛也胎動不安內熱盛也遂用補中益氣湯而安
又用六君子湯全愈　憲僉何君治湯總兵夫人妊娠
痢疾不止翁診其脈虛而澀關若滑此由胎氣不
和相火炎上而有熱似痢實非也乃用黃芩白朮以
安胎四物芍地黃以調血數劑而安
當歸芍藥湯　治妊娠下痢腹痛[illegible]
不治婦人胎前產後赤白痢
生薑[illegible]　鴨子[illegible]
右[illegible]投鴨子入[illegible]煎[illegible]分入[illegible]黃
[illegible]心熱服立效

治妊娠下痢赤白絞刺疼痛
雞子[illegible]　黃丹[illegible]
[illegible]
右每服二錢米飲調下一服愈者是男　二服愈者
是女
又治妊娠系弱頻併下痢腹痛羸瘦面色痿黃不進
飲食
厚朴[illegible]　白朮　熟地黃　川芎
白芍藥　當歸　乾薑　人參[illegible]
訶子[illegible]　甘草[illegible]
右㕮咀每服[illegible]水煎
又方　治妊娠下痢腹痛小便澀
當歸　黃芪[illegible]　糯米[illegible]
右細切和勻水煎分四服
[illegible]人寧散　治妊娠下痢赤白灰色泄瀉疼痛垂死
者
黑豆[illegible]　粟殼[illegible]　甘草[illegible]
右為粗末都作一服[illegible]同煎食前服
挾熱　治妊娠挾熱下痢亦治男子常痢
黃連　黃蘗[illegible]　山梔仁[illegible]

右㕮咀每服伍錢水貳盞煎一時久煑十餘沸[illegible]服　若嘔加陳皮（壹兩去白）生薑（伍片）

黃連湯　治妊娠下痢赤白膿血不止

黃連（壹兩）　厚朴（薑製）　阿膠（炒）
當歸　乾薑（各壹兩半）　艾葉
黃檗（各壹兩）

右為細末空心米飲調下方寸匕日三服

療妊娠白膿痢腹中冷

乾薑（壹兩）　赤石脂（壹兩）　粳米（壹合炒黃）

右用水柒升煎取貳升溫分叁服

厚朴散　治妊娠下痢黃水不絕

厚朴（薑汁炒）　黃連（各兩）　肉豆蔻（貳枚連皮用）

右為麄末水煮頓服

草菓飲　治妊娠臟腑虛脾胃少弱臟腑虛滑腹臍疼痛日夜無度

厚朴（薑製）　肉豆蔻（煨）

右㕮咀每服叁錢薑叁片水同煎

大小便不通

夫妊娠大小便不通由臟腑之氣[illegible]所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不利大小腸俱熱則大小便俱不通更推其因而藥之　[illegible]若大腸血燥用四物湯加條芩桃仁大腸氣滯用紫蘇飲加杏仁條芩腸胃有熱用[illegible]加黃芩[illegible]用[illegible]小腸有熱用[illegible]用加味逍遙散[illegible]

[illegible]妊娠大小便不利或用降火理氣[illegible]脈[illegible]其面色青黃不[illegible]此鬱怒所致也用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散而安　[illegible]妊娠痢疾愈後二便不通其家世醫[illegible]用[illegible]而未效余診其脈浮大而[illegible]氣而虛也朝用八珍湯加桃仁杏仁夕用加味逍遙散加車前子而安

小品療妊娠子淋大小便並不利氣急已服豬苓散不瘥宜服甘遂散下之

甘遂散方　用太山赤皮甘遂[illegible]　右一味為末以白蜜貳合和服如豆大一粒[illegible]心下煩得[illegible]下者[illegible]小[illegible]後還服[illegible]服不得下[illegible]服滿加令中[illegible]以[illegible]為度[illegible]

猪苓散 療妊娠小便澀痛兼治胎水
猪苓為末白湯調方寸匕加至貳匕日三夜一不瘥宜轉下之服前藥

葵子湯 治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利安胎除熱
葵子 滑石
右以水伍升煮取壹升去滓盡服須臾當下便愈

又方 葵子 川朴硝 每服叁錢水煎溫服

治妊娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩熱

檳榔 赤茯苓 大腹皮
木通 郁李仁去皮尖 北五味各壹兩
桑寄生 甘草 苦梗
右為粗末每服叁錢水壹盞煎至柒分溫服

治妊娠大小便不通熱閉心胸腹脇脹悶妨害飲食
大黃 木通 檳榔
枳殼 大腹子 訶子
右為末每服宜盞葱白二寸同煎至陸分調下貳錢

當歸散 治胎前諸疾或因怒中氣衝不快或衝脾脉腹急脹腰腹時疼不思飲食四肢浮腫氣急時喘大便忽難小便忽澀產門忽腫
當歸 赤茯苓 枳殼
白芍藥 川芎各貳兩 川白芷
木香 粉草
右㕮咀每服叁大錢水壹盞半生薑叁片煎至捌分去滓無時溫服 如禁受氣弱及有人枳殼減半如氣實及北人於內加分兩服之或連日大便秘澀加蜜同煎

初虞世治妊娠大便秘澀方

枳殼 防風 炙甘草
右為細末沸湯點服貳錢空心日三

又治虛羸大便秘方
枳殼 阿膠
右為細末煉蜜和劑杵貳叁千下丸如梧子大別研滑石末為衣溫湯下貳拾丸半日來未通再服叁拾丸止於伍拾丸

又方
車前子 大黃
右為細末每服叁錢空心煎葱湯調下

大腹皮湯　治妊婦大小便不通

枳殼　大腹皮　赤茯苓各壹兩

甘草貳錢

右爲末葱白湯調下貳錢

褚氏方八正散　治妊婦心經蘊熱臟腑秘結大腸不通小便赤澁癃閉

右陳良甫氏所錄諸方今並存之內甘遂朴硝非至實至危不得已而爲之不可輕用其它亦宜審訂而用之仍味薛氏之說而參之以雜病諸方法庶無誤也

小便不通

【大】妊娠小便不通爲小腸有熱傳於胞而不通耳若兼心腎氣滯則致喘急（陳無擇云妊娠胎滿逼胞多致小便不利若心腎氣虛清濁相干則爲諸淋若胞系了戾小便不通名曰轉胞若胎滿尿出名曰遺尿

丹溪曰轉胞病胎婦禀受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大率有之古方皆用滑利疏導藥鮮有應效因思胞爲胎所墜展在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起懸在中央胞系得疏水道自行然胎之墜下必有其由一日吳宅寵人患此脈之兩手似濇重取則弦左手稍和予曰此得之憂患濇爲血少氣多弦爲有飲血少則胞弱而不能自舉氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就下故喜墜遂以四物湯加參朮半夏陳皮生甘草生薑空心飲隨以指探喉中吐出藥汁俟少頃氣定又與一貼次日亦然如是八貼而安此法果爲的確恐偶中耳後有數人歷歷有效未知果何如耶（仲景云婦人本肌盛頭舉身滿今反羸瘦頭舉中空減胞系了戾亦致胞轉其義未詳必有能知之者

一婦人四十一歲妊孕九個月轉胞小便不出三日矣下急脚腫不堪存活來告急予往

視之見其形瘦脉之右滿而左稍和此飽食而氣傷胎系弱不能自舉而下墜壓著膀胱偏在一邊爲其所閉所以水竅不能出也轉胞之病大率如此予遂製一方補血養氣血氣既正胎系自舉則不下墜方有安之理遂作人參當歸身尾白芍藥白朮帶白陳皮炙甘草半夏生薑煎濃湯與四貼任其叫喊不安早又與四貼藥杳作一貼煎令頓飲之探喉令吐出此藥湯小便立通皆黑水後就此方加大腹皮枳殼青葱葉縮砂仁二十貼與之以防産前後之虚果得就蓐平安産後亦健　一婦人妊娠七八箇月患小便不通百醫不能利轉加急脹診其脉細弱予意其血氣虚弱不能承載其胎故胎重墜下壓住膀胱下口因此溺不得出若服補藥升扶胎起則自下藥力未至愈加急滿遂令一老婦用香油塗手自産門入托起其胎溺出如注脹急頓解一面却以人參黄芪升麻大劑煮服或少有急滿仍用手托放取溺如此三日後胎漸起小便如故　論曰[illegible]亦有[illegible][illegible]不氣虚不能下輸膀胱者亦有氣[illegible]不利者亦有金爲火爍脾土濕熱甚而不[illegible]審施治　同徒李杏爾仲子宅孕五月小便不利諸藥不效余曰非八味丸不能救不信翌日分劑之藥肚腹脹以致不起　儒者王文達[illegible]此亦溺濇服幾至於殆用八味丸一服小便滴瀝再以前丸之料加車前子一劑即利肚腹頓寬而安

仲問曰婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便則愈宜腎氣丸主之

治妊娠小便不通及胞轉桑螵蛸搗末米飲服方寸匕日三

仲妊娠有水氣重身小便不利洒淅惡寒起即頭眩葵子茯苓散主之

葵子　茯苓各叁兩

右二味杵爲散飲服方寸匕日三服小便利則愈

妊娠小便難飲食如故歸母苦參丸主之

當歸　貝母　苦參各四兩

右爲末煉蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸

又治妊娠卒不得小便杏仁一味去皮尖搗丸如綠豆大燈心湯吞七丸立利

□婦人三十餘歲懷胎四個月大小便閉因與
□用冬葵子等藥已通但氣未順此由性急而怒氣
亂宜順其氣滋其血乃安

陳皮　青皮　芍藥炒
人參　歸身尾　川芎
地黃　白朮炒　茯苓
木通　甘草炙

利便散　治妊娠小便不通
右用蔓荊子為末每服二錢食前濃煎葱白湯調
下

一妊娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊
婦胞繫於腎腎間虛熱而成斯證甚者心煩悶亂名
曰子淋也　前證若頸項筋攣語澀痰甚用羚羊
角散方見　若小便澀少淋瀝用安榮散若肝經濕熱
用龍膽瀉肝湯方見　若肝經虛熱用加味逍遙散腿
足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若服燥
劑而小便頻數或不利用生地黃茯苓牛膝黃蘗知
母芎歸甘草若頻數而色黃用四物加黃蘗知母五
味麥門玄參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥
麥門若陰挺痿痹而頻數用地黃丸若熱結膀胱而
不利用五淋散方見　若脾肺燥不能化生宜黃芩清肺
飲方見　若膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸方見　若膀胱陽
虛陰無所化用腎氣丸　一婦人每怒發熱脇脹小
便淋澀如遇經行旬餘未已受胎三月因怒前證復
作朝用加味逍遙散夕用安胎飲各二劑而安五月
又怒復下血如經行四日未止仍用前藥而愈　一
妊娠飲食後因惱怒寒熱嘔吐頭痛惡寒胸腹脹痛
大便不實其面青色小便頻數時或有血服安胎止
血之劑益甚余曰寒熱嘔吐而腹脹此肝木尅脾土

而心氣傷也大便不實而而由此飲食傷脾無肝侮土也小便頻數而有血此肝熱傳胞而莖挺痿也用六君子加枳殼紫蘇山梔一劑脾胃頓醒又用加味逍遙散加紫蘇枳殼二劑小便頓清後節飲食調理而安

地膚大黃湯（外臺）　療妊娠子淋宜下

川大黃　地膚草（各叁兩）　知母

黃芩　豬苓　赤芍藥

通草　川升麻　枳實

甘草（各貳兩）

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎柒分去滓溫服

療妊娠患淋小便澀不利小腹水道熱痛

冬葵子（壹兩）　芍藥（貳兩）　黃芩

赤茯苓　車前子（各叁兩）

右㕮咀以水柒升煎取貳升溫分[illegible]服

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心煩悶亂不思飲食

瞿麥穗　赤茯苓　桑白皮

木通　葵子（各壹兩）　黃芩

芍藥　枳殼　車前子（各半兩）

右為粗末每服肆錢水壹盞煎至陸分溫服

安榮散　治妊娠小便澀少遂成淋瀝

麥門冬（去心）　通草　滑石

人參　細辛（各壹兩）　當歸（去蘆各半兩）

燈草　甘草（各…）

右為細末每服貳錢不拘時麥門冬湯調服

大腹皮散　治妊娠大小便赤澀

大腹皮　枳殼（麩炒各壹兩）　甘草（炙各壹錢）

赤茯苓（去皮叁錢）

右為細末每服貳錢不拘時濃煎葱白湯調下

經心錄療妊娠患子淋小便數出少或熱疼痛及子煩

地膚子（叁兩）

右細切水肆升煮取貳升半去滓分三服日三服

補遺治胎前諸般淋澀小便不通

瞿麥　赤芍藥（各等分）

右每服伍錢水煎溫服甚效

豬苓散　療妊娠子淋小便澀痛

[illegible]熱宜用加味逍遙散[illegible]宜用
補中益氣湯加益智若肝腎陰虛宜用六味丸一
[illegible]小便[illegible]熱脈洪數按之[illegible]痛
[illegible]以後肝火血虛用加味逍遙散六味地
黃丸[illegible]心[illegible]寒熱或發熱或小便頻數[illegible]用八
味逍遙散[illegible]服以清肝火養肝血而愈
[illegible]散服　療妊娠胎滿不知小便出用[illegible]
桑螵蛸散　治妊娠小便不禁
桑螵蛸[illegible]
[illegible]
右為細末每服貳錢空心米飲調下
又方　益智仁為末米飲下亦好

溺血
一妊娠婦勞傷經絡有熱在內熱乘於血血得熱則流
滲滲入脬故令溺血也　[illegible]若因怒動火宜用小
柴胡湯加山梔因勞動火者宜用補中益氣湯若因
厚味積熱宜用清胃散[illegible]加犀角地黃若因
肝經血熱宜用加味逍遙散若因脾氣下陷宜用補
中益氣湯若因脾虛血熱宜用加味逍遙散　一妊
婦因怒溺血內熱作渴寒熱往來胸乳間作脹飲食
少思肝脈弦弱此肝經血虛而熱也用加味逍遙散
六味地黃丸兼服漸愈又用八珍湯加柴胡丹皮山
梔而痊
千金療妊娠卒下血及子淋方
葵子[illegible]升[illegible]
右以水五升煮取貳升分溫三服
又方　生艾葉[illegible]
右以酒伍升煮取貳升分三服
又方　生地黃切[illegible]升
右以酒四升煮取貳升分溫三服亦療落身後血
續斷湯　治妊娠下血及溺血
當歸　生地黃各壹[illegible]　續斷半兩

赤芍藥 壹錢半

右爲末空心葱白煎湯調下貳錢

療妊娠尿血方

阿膠　熟地黄 各等分

右爲細末空心粥飲調下貳錢

續斷湯　治妊娠小便尿血

生地黄 壹兩　蜜 [illegible]　白茅根 [illegible]

右入水濃煎服

又方　[illegible]加阿膠 [illegible] 同爲粗末每服肆錢用水煎

眼目

一妊娠將產月忽然兩目失明不見燈火頭痛眩暈項腮腫滿不能轉頭諸治不瘥反加危困偶得消風散服之病減七八獲安分娩其眼吊起人物不辨乃以四物湯加荊芥防風更服眼科天門冬飲子二方間服目漸稍明大忌酒麵煎炙雞羊鵝鴨豆腐辛辣熱物并房勞此證因懷妊多居火閣衣著太煖伏熱在內或酒麵炙煿太過以致胎熱也

天門冬飲子　治妊娠肝經風熱上攻眼目帶吊失明

天門冬 去心　知母　茺蔚子

五味子　防風 去蘆　茯苓 去皮

川羌活 去蘆　人參 各等分

右作一服水貳鍾生薑三片煎至壹鍾食後服

臟躁悲傷

[illegible]一姙娠四五個月[illegible]遇
[illegible]
無[illegible]與[illegible]大棗湯[illegible]而愈[illegible]來
攻心[illegible]邪者治當[illegible]祭　一姙娠無故自悲
用大棗湯二劑而愈後復患又用前湯佐以四君子
加山梔而安　一姙婦悲哀煩躁其夫詢之云我無
故但自欲悲耳用淡竹茹湯爲主佐以八珍湯而安
仲景云婦人臟躁悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘
麥大棗湯主之

甘麥大棗湯方

甘草 叁兩　小麥 壹升　大棗 拾枚

右以水陸升煮取叁升溫分三服亦補脾氣
許學士云鄉里有一婦人數欠無故悲泣不止或謂
之有祟[illegible]備至終不應予忽憶金匱有一證
云婦人臟躁悲傷欲哭象如神靈數欠伸者宜甘麥
大棗湯予急令[illegible]而愈古人識病制方種種
妙絕如此

淡竹茹湯　治姙婦心虛驚悸臟躁悲傷不止又治
虛煩甚效

麥門冬 去心　小麥 [illegible]合
人參　白茯苓 各壹兩　甘草 [illegible]
右㕮咀每服肆錢薑五片棗壹枚淡竹茹壹團如
指大同煎溫服

又方　治姙婦臟躁自悲自哭自笑
右以紅棗燒存性米飲調下

妊病可下胎斷胎

【大全】妊娠羸瘦或挾疾病臟腑虛損氣血枯竭既不能養胎致胎動而不堅固終不能安者則可下之免害妊婦也。【陳】前證宜用腰腹背痛門方論十之其胎果不能安者方可議下慎之慎之。 瀉臚張淑人痢疾後胎動心神不安肢體殊倦用八珍散二十餘劑漸愈因勞加煩熱頭痛以大劑補中益氣湯加蔓荊治之熱痛頓止仍用前散又五十餘劑而安其後生産甚易 今大中丞許少薇公向令余境時夫人胎屢墮治不止時迫於上計公欲因其勢遂下之

以茲余余弟令服佛手散以爲可安即安不可安即下。質其門然而已既數服公愛疑不決女科醫皆檢方以進乃用牛膝一兩酒煎服謂牛膝固補下部藥耳用之何害公遂信而服之而胎果下余時有從母之戚未及知此知而馳至則閨盈庭皆推脊氣益因胞衣未下許醫又進香桂散矣血遂暴下如大河決不可復止亟煎獨參湯未成而卒公哀傷甫定而過余謝且論余曰牛膝補藥而能墮胎何也余對曰牛則宜而熟則補故破血之與填精如箭鋒相拄豈獨牛膝哉鹿角亦墮胎破血而煎爲白膠則安胎止血因其熟而信其生此之謂粗工公歎恨無已余故特著之以爲世戒

【大全】治妊娠母因疾病胎不能安可下之取七月七日法麴（[illegible]）四兩水二大盞煎取一盞三分絹濾去滓分溫三服立下。 又方大麯伍升清酒壹斗煮二沸去査分五服隔宿勿食但再服其子如糜母無疾苦（[illegible]）。 又方麥蘖壹升爲末和水煮貳升服之即下（[illegible]）。 又方附子二枚爲末以淳苦酒和塗右足去之大良 又方取雞子一枚以三指撮鹽放雞子中服之立出

按陳良甫所列有牛膝湯桂心散之類今皆不之取而獨取此數方其見卓矣。

【濟陰】用斷子法 用白麪麯壹升無灰酒伍升打作糊煮貳升半用絹帛濾去査作叁服侯前月經將來日晚下吃一服次日五更吃一服天明吃一服月經即行終身絕子

【又】斷產除方故蠶紙方圓壹尺燒爲末酒飲調服終身不復懷孕。 又方用油煎水銀一日方息空心服棗核大許凡水斷不損人

四物湯每服伍錢加芸薹子一撮於經行後空心溫

蒙前六合用蠶故紙尺許燒灰爲末產後酒服之血虛者終不復孕大抵斷產之劑多用峻厲往往有不起者是則產之害未若斷產之害也予聞閣老張維峰太常李恆齋俱因服斷產之劑而形體俱伏遇勞必病有由然矣

按吳堅志載東京女子白牡丹以售墮胎藥坐得惡報今雖列如上方以備萬一之用用者尚其慎之

胎自墮

時陰陽化胎孕乃成血氣虛損不足榮養其胎自墮或勞怒傷情內火便動亦能墮胎推其本原□於熱火能消物造化自然病源乃謂風冷傷於子臟而墮此未得病情者也予見寶氏婦但有孕至三月左右必墮診其脉左手大而無力重取則澀知其血少也以其妙年只補中氣使血自榮時正夏初教以濃煎白朮湯下黃芩末一錢服三四十貼遂得保全其生因而思之墮因內熱而虛者於理爲多曰熱曰虛當分輕重蓋孕至三月正屬相火所以易墮不然何以黃芩熟艾阿膠等爲安胎妙藥耶好生之工幸無輕視　一婦年三十餘或經住或成形未具其胎必墮察其性急多怒色黑氣實此相火太盛不能生氣化胎反食氣傷精故也因令住經第二月用黃芩白朮當歸甘草服至三月盡止藥後生一子　一婦經住三月後尺脉或澀或微弱其婦却無病知是子宮真氣不全故陽不施陰不化精血雖凝終不成形至產血塊或產血胞　一婦腹漸大如懷子至十月求易產藥察其神色甚困難與之藥不數日生一蟲半桶實由婦人之元氣太虛精血雖凝不能成形爲

殘傷精積之久濕化爲熱濕熱作燥燥則少火作氣衰周十月之氣發動而產終非佳兆其婦不及月已熱熱小蟲停之溝渠污濁積久不流則諸蟲生于其間矣

汪石山治一婦長瘦色黃白性躁急年三十餘常患墮胎已七八見矣診其脈皆柔軟無力兩尺雖浮而弱不任尋按曰此因胎墮太多氣血耗甚胎無滋養故頻墮譬之水涸而禾枯土削而木倒也況三月五月正屬少陽火動之時加以性躁而急發之故墮多在三五七月也宜大補陰湯去桂加黃柏黃芩煎服仍用研末蜜丸服之庶可保生服半年胎固而生二子

錢仲陽治一孕婦病醫言胎且墮錢曰娠若五臟傳養率六旬乃更候其月偏補之何必墮已而母子皆全

陳日華治一婦有胎四月墮下逾旬腹悶發熱氣喘脈洪盛面赤口鼻舌青黑陳診之曰脈洪盛者胎未墮也面赤心火盛而血乾也舌青口鼻黑肝氣絕而胎死矣內外皆曰胎墮久矣復診色脈如前以蛇蛻煎湯下平胃散加芒硝歸尾一倍服之須臾腹鳴如雷腰腹陣痛復一死胎墮下病亦愈

薛立齋治一婦年近四十禀氣素弱自去其胎五日內顛仆腹脹如鼓至心痛上吐不能食用補氣不効診六脈微弱但其形瘦脹此乃自傷胞絡而作脹然急則治其標若泥用淡滲之藥不及事矣用雞食脈氣加製香附枳殼桔梗煎服四分去其一分單仍不通再急又服琥珀丸三錢至申時大通脹減但倦怠四肢無力口不知味發熱再用參芪歸朮溫補腸皮入劑而安

汪惡齋治汪鋼妻三十五歲厭產誤服打胎藥下血如崩何作腹痛薛即行攻時鼻閉諸藥不効診得六脈數而微弦乃厥陽之火泛逆設四物換生地黃加阿膠炒黑山梔蒲黃一劑愈

薛氏云大抵治法須審其月屬某經育養而藥之

濟生芎藭補中湯 治懷孕血氣虛弱不能衛養以致數月而墮名曰半產

芎藭	五味子	阿膠
乾薑 炮	黃芪 去蘆 蜜炙	當歸
白芍藥	白朮	杜仲 去粗皮
人參	木香	甘草 炙 各五分

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

阿膠湯 治妊娠數墮胎小腹疞痛不可忍

阿膠	熟乾地黃	艾葉
芎藭	當歸	杜仲

白朮各壹兩

右㕮咀每服肆錢水一盞半棗叁枚擘破同煎至捌分去滓食前溫服

杜仲丸　治妊娠三兩箇月胎動不安防其欲墮[illegible]預服之

杜仲薑汁製炒去絲　續斷酒浸各壹兩

為末煮棗肉杵丸梧子大每服柒拾丸米飲下

四製香附丸　治婦人數墮胎由氣不升降所以胎氣不固只宜服此

香附[illegible]

為細末醋煮糊和丸梧子大每服柒拾丸空心溫酒下肥人只依本方瘦人加澤蘭葉赤茯苓各貳兩

一方用香附子[illegible]艾葉[illegible]當歸[illegible]

刪繁方　治妊娠懷胎數落而不結實或冷或熱百病之源[illegible]

甘草　黃芪　人參

川芎　白朮　地黃

吳茱萸[illegible]

右為末空心溫酒調下貳錢忌菘菜桃李雀肉酢物

愚按用淡而俱是順熱而無寒者人如依此一方

以俟施之于千百而一者也

附附丸　治數墮胎[illegible]

千金療妊娠三箇月胎欲墮方　灸膝下[illegible]

妊子不成時時墮胎後漏下五色者須灸[illegible]

[illegible]大妊娠日月未足胎氣未全而產者謂之半產[illegible]由妊婦衝任氣虛不能滋養於胎胎氣不固或顛仆[illegible]或氣血損動或因熱病溫瘧之類皆令半產[illegible]此名為半產婦人則半產漏下是也　又云半產俗呼小產或三四月或五六

月皆為半產以男女成形故也或因憂恐悲哀暴怒或因勞力打撲損動或觸冒暑熱[illegible]桑[illegible]生他疾宜[illegible]散和經湯之類使產須細云小產不可輕視將養十倍於正產可也又云半產即肌肉腐爛補其虛損生其肌肉益其氣血去其故邪養其臟氣將養過於正產十倍無不平復[illegible]

小產重於大產盖大產如栗熟自脫小產如生採破其皮殼斷其根蒂也但人輕忽致死者多治法宜補形氣生新血去瘀血若未足月痛而欲產者宜補中[illegible]湯加知母止之若產而血不止人參[illegible]湯補之

若汗而心腹痛當歸川芎湯主之脈氣弱而小產者
八珍湯倍之若出血過多而發熱煩躁湯汗不止急
用獨參湯發熱煩躁肉瞤筋惕八珍湯大補湯如不應
洪而虛當歸補血湯身熱面赤脈沉而微四君薑附
東垣云晝發熱而夜安靜是陽氣自旺於陽分也晝
安靜而夜發熱是陽氣下陷於陰中也如晝夜俱發
熱者是重陽無陰也當峻補其陰王太僕云如大寒
而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發
晝止時節而動是無火也如大熱而甚寒之不寒是
無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也若

八　女科四

陽氣自旺者補中益氣湯陽氣陷於陰者四物二連
湯重陽無陰者四物湯無火者八味丸無水者六味
丸　一妊婦五月服剪紅丸墮胎腹中脹痛服破血
藥益甚手按之愈痛余曰此峻藥重傷脾胃受患用
八珍倍參芪半夏乳香[illegible]一劑痛止數劑全愈　史仲
[illegible]墮胎後咳服清肺解表喘急不寐
[illegible]不能化生脾金藥重損之須補中益
氣[illegible]茯苓半夏五味杏仁[illegible]兩劑漸愈再往視又與不
[illegible]陳皮及參杏人參湯而全愈　陳氏婦張素怯
[illegible]及月不因抑鬱所作飲遂致食[illegible]因後因跌從半空

頓數欲聤作二日感氣忽患心腹脹作疼手不可
按嘔吐不止六脈微細之極某翁自以脈證虛寒病
形則實唉臆諸痛不可補氣乃用青皮香附吳萸等
藥而愈繼復患瘧且墮胎又自投理氣行血之藥病
去元氣轉脫再投參芪補劑不應六脈如絲欲絕
恐非附子不能起因叔請余診之云此由理氣損真
之誤也速投參芪歸朮附子薑桂二劑間用八味丸
五日眠食漸甘六脈全復余謂之云向使心腹疼時
即服此藥病亦不作矣　一妊婦墮胎昏憒不省自
汗發搐時吐痰自用養血化痰之劑昏憒不省痰涎

八　女科四　百七

湧出彼以為中風欲用袪風化痰余曰此屬脾氣虛
寒所致遂用十全大補加炮薑二十餘劑尋愈

生地黃湯　治妊娠胎氣損動氣血不調或撲閃
墜以致胎墮墮後惡滯不盡腹中疞痛

生乾地黃焙　大黃炒　芍藥
白茯苓去皮　當歸[illegible]　細辛去苗
甘草炙　黃芩去[illegible]　桂去粗皮各半兩

右㕮咀每服伍錢匕水壹盞半入生薑大棗拍碎
同煎至壹盞去滓不拘時溫服

人參湯　治半產後血下過多心驚體顫頭目運轉

或寒或熱臍腹虛脹疼痛

人參　麥門冬去心　生乾地黃焙

當歸洗焙　芍藥　黃芪

白茯苓去皮　甘草炙各等分

㕮咀每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓食前溫服

治墮胎後復損經脉而下血不止甚則煩悶至死皆

以調補胃氣爲主。前證若肝經血熱用四物參

朮山梔肝經風熱用防風黃芩炒肝經怒火用加味

逍遥散脾經氣虛用四君歸地脾經鬱滯用加味歸

脾湯氣滯不和用紫蘇飲脾氣下陷用補中益氣湯

人參黃芪湯　治小產氣虛血下不止

人參　黃芪炒　當歸

白朮炒　白芍藥炒　艾葉各壹錢

阿膠炒貳錢　右作一劑水煎服

治妊娠損動下血不止腹痛宜服此

阿膠　艾葉　水壹大盞煎六分去滓空心服

治妊娠損動下血不止方

甘草炙　阿膠炒　雞子壹個　右以水貳大盞煮甘草

壹盞叄分去滓下雞子膠候膠烊攪勻分二服

龍骨散　療因損娠下惡血不止

龍骨　當歸　地黃

艾葉炒　地榆　阿膠

芍藥　乾薑炮各壹　蒲黃

牛角腮　右食前用米飲調下貳錢

千金療落胎下血不止方

右以生地黃汁壹小盞調代赭石末壹錢日三服

治妊娠下血不止疼痛方亦治小便不禁

家雞翎燒灰細研以溫酒調下貳錢如人行五

里再服以効爲度

千金療妊娠胎墮下血不止方

以丹參拾貳兩細切酒五升煮取參升分三服

補遺催生如神散妙

又方　香附子爲末米飲調下

當歸酒　治妊娠墮胎後血不出

當歸炙　芍藥

㕮咀每服叄錢匕無灰酒壹盞入生地黃汁壹合

銀器內慢火煎至柒分去滓溫服以惡血下爲度

烏金散　治妊娠墮胎後惡血不下兼治諸疾血病

好墨　麒麟竭

沒藥　麝香

右爲細末每服溫酒調下壹錢匕如[illegible]
便加酒調下貳錢匕
治妊娠墮胎後血不出少腹滿痛
用冷羊角燒灰細研如麵每服叁錢不拘時以豆
淋酒調下
治妊娠墮胎下血不盡苦煩滿欲極時發寒[illegible]狂悶
鹿角屑（[illegible]） 右用水壹大盞煎豉[illegible]合取
汁除滓分三服調鹿角屑貳錢服日三須臾血下
紅藍花散 治墮胎後血不出奔心悶絕不識人
紅藍花（[illegible]） 男子髮（[illegible]） 京墨（[illegible]）
血竭（[illegible]） 蒲黃（各[illegible]分）
右爲細末以童便小半盞調貳錢服之立效
白蜜湯 治墮胎後惡血不出
白蜜（[illegible]） 生地黃（[illegible]汁） 酒（半盞）
右汁與酒共入銅器中煎五七沸入蜜攪勻分兩
服服二劑有病可愈
豬膏飲 治墮胎血不出上搶心疼痛煩憒
豬膏（[illegible]合） 白蜜（[illegible]合） 生地黃（[illegible]）
右先將豬膏地黃相和煎令赤色去地黃內蜜攪
勻分溫二服相次再服

當歸湯 治妊娠墮胎胞衣不出
當歸（切炒） 牛膝（[illegible]） 木通（[illegible]）
滑石（研各[illegible]兩） 冬葵子（[illegible]） 瞿麥（[illegible]）
右㕮咀每服叁錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服
未下再服以下爲度
地黃湯
蒲黃（炒） 生薑（切炒各[illegible]） 生地黃（[illegible]）
右以無灰酒叁盞於銀器內同煎至貳盞去滓分
三服未下再作服
澤蘭湯 治胞衣不[illegible]
澤蘭葉（切研） 滑石末（各半兩） 生麻油（少許）
右以水叁盞先煎澤蘭至壹盞半去滓入滑石末
并油更煎叁沸頓服之未下更服
蒲黃酒（[illegible]）
蒲黃（[illegible]合） 槐子（[illegible]枚）
右以酒叁盞煎至貳盞去滓分溫二服未下更作
服 又治妊娠不足月欲產腹痛候未定丸酒下
治墮胎胞衣不出腹中疼痛牽引腰脊（[illegible]）
用蠶蛻紙壹升炒熱綿裹搨心下胞自出也
又方 好墨細研末溫酒調下貳錢頻服効

治妊娠胎死腹中衣不出及產後卒有別病欲至狼狽方　刺羖羊血飲一小盞極効

又方　以水噀其面神驗加醋少許

又方　洗兒水半盞令產婦服其衣即出勿令產婦知

又方　治胞衣不下腹滿則殺人

用水壹盞煮猪脂壹兩煎十數沸和脂服之當下

又方　以雞子壹枚取清吞之

又方　用鐵斧燒令通赤投酒中沸定則出飲之

腹痛

當歸川芎湯　治小產後瘀血心腹痛或發熱惡寒

當歸　川芎　熟地黃（自製）

白芍藥（炒）　玄胡索（炒）　紅花

香附　青皮（炒）　澤蘭

牡丹皮　桃仁（各等分）

右水煎入童便酒各小半盞服

若以手按腹愈痛此瘀血爲患宜此藥或失笑散消之若按之不痛此是血虛宜四物參苓白朮若痛而作嘔此是胃虛宜六君子若痛而作瀉此是脾虛宜六君子送二神丸

芎歸湯　治墮胎心腹疼痛

芎藭　芍藥　白朮

阿膠（炒令燥）　甘艸（炙各壹兩）

右㕮咀每服叄錢水壹盞入艾葉糯米什許同煎至陸分食前服　一方無白朮有人參

當歸散　治產後氣血虛弱惡露內停增寒發熱

當歸　白芍藥（炒）　川芎

黃芩（炒各壹兩）　白朮（伍錢）

右爲細末温童便調下貳錢

聖愈湯　治血虛心煩睡臥不寧或五心煩熱

熟地黃（酒拌蒸半日）　生地黃（酒拌）　川芎

人參（各壹錢）　當歸（酒拌）　黃芪（炒各伍錢）

右水煎服

當歸補血湯　治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脉洪大而虛重按全無此脉虛血虛也若誤服白虎湯必死

當歸（叄錢）　黃芪（壹兩）　右水煎服

四物二連湯　治血虛發熱或口舌生瘡或晝安夜熱

當歸　川芎　熟地黃　芍藥

胡黃連　宣黃連（各等分）　右作一劑水煎服

東垣云婦人分娩及半產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心與包

絡者有火相火也得血則安亡血則[illegible]令
人昏目久勝其肺瞑目不省人事也[illegible]
鎮撫也血已虧損往往用滑石甘草石膏之類[illegible]
甘大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧[illegible]
陽使二者俱傷反為不足虛勞之病昏迷不省上
焦心肺之熱也此無形之熱用寒涼之藥驅令下行
豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今
反下之幸而不死暴虧氣血必夭天下又不知內經
有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰
宜汗不宜下又不知傷寒鬱冒得汗則愈是禁用寒

涼藥也分娩之後非木氣不病是恭長其血亡血補血
又何疑焉補其血則神昌常時經下降亡今當補而
升舉之心得血而養神不昏矣血若暴下是秋冬之
令大旺今舉而升之助其陽則目張神不昏矣今立
一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足也

全生活血湯

紅花 蔓荊子 細辛各伍分 生地黃夏月加之 熟地
黃[illegible] 藁本 川芎各[illegible] 防風[illegible] 羌
活 獨活 甘草[illegible] 柴胡 當歸身[illegible] 葛根各
[illegible] 白芍 升麻各[illegible]
[illegible]食前稍熱服

胎不長

夫妊娠不長者因有宿疾或因失調以致臟腑衰
損氣血虛弱而胎不長也當治其疾疾去益其氣血則
胎自長矣 [illegible]胎前益更當察其經絡[illegible]治
之

一妊婦胎六月體倦懶食面黃晡熱而胎不長
因勞役憂此脾氣不足也用八珍湯倍加參朮茯苓
三十餘劑脾胃漸健胎安而長矣　一妊婦因怒寒
熱往來內熱晡熱脇痛嘔吐胎至八月而不長此因
肝脾鬱怒所致用六君加柴胡山梔枳殼紫蘇桔梗
病愈而胎亦長矣

安胎白朮散 治妊娠宿有冷胎痿不長或失於將
理傷胎多墮此藥補榮衛養胎氣

白朮 川芎各[illegible] 吳茱萸湯泡[illegible]
甘草炙壹兩半

為細末每服貳錢食前溫酒調下忌生冷果實

白朮散 [illegible]不安[illegible]

黃芪散 治妊娠胎不長安胎和氣思食利四肢

黃芪 白朮 陳皮
麥門冬 白茯苓 前胡
人參各[illegible] 川芎 甘草各半兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞薑指大片棗子枚煎至半
分去滓溫服
人參丸 主妊娠胎不長宜服養胎
人參　白茯苓　當歸
柴胡　刺薊　厚朴
桑寄生各壹兩　枳殼麩炒錢半　甘草半兩
右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服貳拾丸食前
溫水吞下
集驗治婦人懷胎不長方
鯉魚長一尺者去鱗腸以水漬沒內鹽及棗煮熟取汁稍
稍飲之當胎所腹上當汗出如牛鼻狀雖有所見
胎雖不安者十餘日輒一作此令胎長大甚平安
附枳實檳榔丸 安養胎氣調和經候散瘕癖塊有
似爭孕婦可以久服血氣通和
枳實麩炒　檳榔　黃連
黃蘗　黃芩　當歸
木香　阿膠炙炒各半兩
右爲細末水和丸如小豆大每服叁拾丸不拘時
用溫米飲送下

日月未足欲産過期不産
大凡婦人懷胎有七月八月而産者有至九月十月
而産者有經一年二年乃至四年而後産者各依後
法治 蓋先期欲産者凉血安胎 過期不産者補
血行滯 一本 一姙婦八箇月胎欲墮似産困久少安
日晡益甚此氣血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半
夏隨愈更以八珍湯調理而安
集驗知母丸 治日月未足而痛如欲産者兼治産
難及子煩
知母多少不以爲細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚼下
日三服 一方丸如梧子大粥飲下貳拾丸
槐子丸 治妊娠月數未足而似欲産腹痛者
槐子　蒲黃各等分
右爲細末蜜丸如梧子大溫酒下貳拾丸以痛止
爲度
又方 取蒲黃如棗核大篩過以井花水調服
又方 梁上塵竈突煤同爲末空心溫酒服方寸匕
又治日月未足欲産擣菖蒲根汁宜貳升灌喉中
又治過期不産方 四物湯加香附桃仁枳殼縮砂
紫蘇水煎服即生

鬼胎

夫人臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之若榮衛虛損則精神衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷娠故曰鬼胎也

愚按前證因七情脾肺虧損氣血虛弱行失常道衝任乖違而致之者乃元氣不足病氣有餘也若見經候不調就行調補庶免此證治法以補元氣爲主而佐以雄黃丸之類行散之若脾經鬱結氣逆者用加味歸脾湯調補之若脾虛血不足者用六君芎歸培養之肝火血耗者用加味逍遙散滋抑之肝脾鬱怒者用加味歸脾逍遙二藥兼服腎肝虛弱者用六味地黃丸

附治驗 一婦人經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎證之藥不應余診視之曰面青脈濇寒熱往來肝經血病也面黃腹大少食體倦脾經血病也此鬱怒傷脾肝之證非胎也不信仍用治胎散之類不驗余用加味歸脾逍遙二藥各二十餘劑諸證稍愈彼欲速效別服通經丸一服下血昏憒自汗惡寒手足俱冷嘔吐不食余用人參炮薑二劑漸愈又用十全大補五十餘劑而安

雄黃丸 治姙娠是鬼胎致腹中黑血散下腹痛

雄黃（細研） 鬼臼（去毛） 莽草 丹砂（細研） 巴豆（去皮心油） 獺肝（炙令黃） 蜥蜴（炙黃） 蜈蚣（炙黃）

右爲細末蜜丸如梧子大空心溫酒下二丸日二服後當利如不利加至三丸初下清水次下蟲如馬尾狀無數病極者下蛇蟲或如蝦蟆卵雞子或如白膏或如豆汁其病即除

治婦人鬼胎及血氣不可忍方

斑蝥（去翅足） 延胡索（炒各等分）

右爲細末每服[illegible]溫酒調服半錢胎下爲度

治婦人虛羸有鬼胎癥塊經候不通以芫花根（三兩剉）炒令黃色爲細末桃仁煎湯調下一錢當下惡物

補遺 治婦人鬼胎如抱一甕

吳茱萸 川芎 秦艽 柴胡 殭蠶 巴戟 巴豆（不去油） 芫花（醋煮）各一兩

右爲末蜜丸梧子大每服柒丸蜜酒下即出惡物而愈

右方俱非藥不可輕用如以古方存之耳

臨產坐草法

脈訣欲產之婦脈離經沉細而滑也同名夜半覺痛

應分誕來日日午定知生

身重體熱寒又頻舌下之脈黑復青反舌上冷子當

死腹中須遣母歸冥面赤舌青細尋看母活子死定

應難舌口俱青沫又出母子俱死總教拆面青舌赤

沫出頻母死子活定知真不信若能看應驗尋之賢

哲不虛陳

楊子建十產論

一曰正產若婦人懷胎十月滿足忽腰腹作陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛穀道挺迸繼之漿破血出兒子遂生名曰正產

二曰傷產者蓋一人之生陰注陽定各有時日不可改移今有未產一月已前忽然臍腹疼痛有如欲產仍却無事是名試月非正產也但一切產母未有正產之候即不可令人抱腰產母亦不可妄亂用力蓋欲產之婦臍腹疼痛兒身未順收生之婦却教產母虛亂用力兒身纔方轉動却被產母用力一逼使兒錯路忽橫忽倒不能正生皆緣產母用力未當之所致也凡產母用力須待兒子順身臨逼門戶方始用力一送令兒下生此乃是產母之用力當也若未有正產之候而用力傷早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗而助長無益而有害矣此名傷產

凡有傷產一法最爲切要慎勿輕忽也凡十月未足臨產腹痛或作或止或痛不甚者名曰弄痛非正產之候或腹雖痛甚而腰不甚痛者非正產之候胎高未陷下者非正產之候穀道未挺迸者非正產之候水漿未破血未出者非正產之候漿血雖出而腹不痛者非正產之候凡未有正產之候且令

扶行熟忍如行不得或凭物坐之或安附之或服安胎藥一二服得安即止慎勿妄服催生藥何惜惟彼令產母憂恐而挫其志後要產母寬心存養調停亦令坐婆先說諭之如覺心中煩悶可取白蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先困其母直待子逼門八腰重痛極眼中如火穀道挺迸此是正產候乃可用力并服催生藥也子男婦於未產一月已前腸腹但痛全似將產其痛至甚但過已腳稍止如此者將十餘日一月無所出因謂此候遂與安胎藥亦參求數服間與肉味養之由是平復不痛又一十餘日始產男是時若妄動亂用力并服催生等藥立見危亡矣

三曰催產者言婦人欲產漿破血下臍腹作陣疼痛極甚腰重穀道挺迸已見兒正產之候但兒却未生即可服藥以催之或有經及數日產母困苦已分明見得是正產之候但兒子難生亦可服藥以助產母之正氣令兒速得下生此名催產

四曰凍產者冬月天冷產母經血得冷則凝以致兒子不能生下此害最深若冬月產者下部不可脫去綿衣并不可坐臥寒處當滿房著火常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常有煖氣得熱則血流散使兒易生此名凍產

滑胎婦羸冬分娩艱難傷冷恐產已死用溫紙撚燒斷臍帶溫其氣以暖之俄頃忽作啼聲兒後無傷食行瀉之證可見前法之功不誣

五曰熱產者盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不可人多熱氣逼襲產母使產母血沸而有發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事此名熱產若夏月風涼陰雨亦不[illegible]

六曰橫產者兒先露手或先露臂此由產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰臥後令看生之人先推其手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須是產母仰臥然後推兒直上徐徐正之候其身正煎催生藥一盞吃了方可用力令兒下生此名橫產

七曰倒產者產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入去不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順云

蛇蛻散 治妊婦欲産時不肯伸舒行動多曲腰眠臥忍痛兒在腹中不能得轉故脚先出謂之逆生須臾不救母子俱亡。

用烏蛇蛻壹條 全者 蟬蛻拾肆枚 血餘壹握 即胎髮 右並燒灰存性研分二服 温酒調連進之 仰臥少頃 或用小綉針於兒脚心刺三五刺 用鹽少許塗刺處 即時順生母子俱活 又法以鹽塗兒足底 又可爪甲搔之并以鹽摩母腹上 又以手中指取鍋底煤交畫兒足下 即順生 又方取其父名書兒足下 即順生 若孕婦横生未可出者 以車前子爲末 酒服

貳錢匕 又方兔絲子爲末 酒調服貳錢匕 米飲調亦得 又以百草霜香白芷 不見火 各等分 用童便與好醋各壹合 調成膏 沸湯投服 甚者二服 即生

若婦人横逆難産子死腹中 先用黒豆壹大合炒熟水與童便合煎服 神效 又方用葵子半斤 酒肆升 煮取壹升服之 又以當歸爲末酒服方寸匕 紫蘇湯調服亦可

八曰偏産者 兒身未正 産母用力一逼 致令兒頭偏拄左腿 或偏拄右腿 故頭雖露 偏拄一畔 不能生下當令産母仰臥 次令看生之人輕輕推兒近上 以手正其頭 令兒頭端正 然後令産母用力一送 即便生下 若是小兒頭後骨偏拄穀道 只露其額 當令看生之人 以綿衣炙煖裹手 於穀道外方 輕輕推兒頭令正 便令産母用力送兒生 此名偏産

九曰礙産者 兒身已順 而露正頂 不能生下 蓋因兒身回轉 肚帶攀其肩 以此露正頂而不能生 當令産母仰臥 令看生之人輕推兒近上 徐徐引手 以中指按兒肩下 除其肚帶 仍須候兒身正順 方令産母用力一送 便兒生下 此名礙産

右横産倒産偏産礙産四法 若看生之人非精良

妙手 不可依用此法 恐恣其愚以傷人命也 按御纂者今世術得術隨其倒足向而無從其子母雙全 看生者必須推足向上之法亦妙 又礙産者往往肚帶有纏在兒項上 而兒頭已出在産門外 看生之人以手撥其肚帶 從兒頭頂過而下之者 又有肚帶纏在頂上一匝 而兒與胞衣自然同下者 皆無妨不必以此礙産法入産門撥下也

十曰坐産者 兒將欲生 其母疲倦 久坐椅褥 抵其生路 急於高處繫一手巾 令産母以手攀之 輕輕屈足坐身 令兒生下 非坐在物上也 此名坐産

十一曰盤腸產者臨產母腸先出然後兒生通都進
恭人每產則大腸先出然後產子產後其腸不收甚
以為苦醫不能療偶在建昌得坐婆一法而收之其
法以醋半盞新汲水柒分調停噀產母面每噀一縮
三噀收盡此良法也
按而今有方以蓖麻子仁四十九粒研塗產母頭
頂腸收上急洗去其腸若乾以磨刀水少許溫潤
之內用磁石煎湯飲之即收上磁石須陰陽家用
有驗者若以水噀母面恐驚則氣散
用產後腸不收香油五斤煎熱盛盆中候溫坐油盆

中約一食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上妙
若乾更為末搐鼻中則腸上矣　又方以大紙撚蘸
香油點燈吹滅以烟熏產母鼻中腸即上矣
又方　腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之腸即
上
論欲產之時覺腹內轉動即當正身仰臥待兒轉身
向下時作痛試捏產母手中指中節或本節跳動方
與臨盆即產矣若初覺不仰臥以待轉胞或未產而
水頻下此胞衣已破血水先乾必有逆生難產之患
若胞衣破而不得分娩者保生無憂散以固其血自

然生息如血已耗損用八珍湯料一斤益母草半斤
水數碗煎熟不時飲之亦有得生者凡孕婦只腹痛
未產也若連腰痛甚者將產也蓋腎候於腰胞繫於
腎故也凡孕婦宜常請存仁心知事穩婆當以恩結
其心先與說知倘有生息不順只說未產或遇雙胎
只說胎衣未下恐驚則氣散產難生且余家親驗之
大抵婦人多患於胎閉或伏當責之家治法亂於胎
前有產後病者血不可曲直若胸骨不實氣血不充
宜預調理不然臨產必有患難　如因難產或大寒
時急以大紙撚蘸徐徐燒其臍帶嬰兒已死令煖

氣入腹多得復生切勿用刀斷之

催生法

因大凡生產自有時候未見時候切不可強服催生滑胎等藥或勢不得已則服之又云切不可坐草太早及令坐婆亂動手[illegible] 大法滑以流通澀滯 苦以降逐閉塞 香以開竅逐血 氣滑者行氣 胞漿先破疲困者固血 則凝者催生只用滑劑最好又効捷[illegible]

滑劑 催生如聖散 黃蜀葵子[illegible] 研以酒濾去滓溫服神妙或漏血胎乾難產痛極者并進三服良久腹中氣寬胎滑即產須見正產候方可服之或以黃葵子炒七十粒細研酒調濟為

[illegible]

若遇臨危產難時 免得全家俱哭泣

又方以香油白蜜小便和勻各半盞調益母草末服

一方止用油蜜小便能下難產

又方 治橫倒生者

明阿膠[illegible] 滑石末[illegible] 葵子 貳兩

右水[illegible]盞半煎[illegible]盞去滓分二服

治難產五六日不得分娩者疲困虛乏死胎水[illegible]兩銀火炒好酒[illegible]并半盞滾入膠候烊再入新汲[illegible]子一枚攪[illegible]令產婦坐椅上仰腹大口作一次服覺小便重即生緩些產早發動故也

苦劑 催生柞木飲子 治產難或橫或倒死胎爛脹腹中此方屢用神効

大柞木枝一大握長一尺洗淨寸剉 甘草大者五寸[illegible]剉

右用新汲水三升半同入新磁瓶內以紙三重封緊文武火煎至一升半令香候產婦腹重痛欲坐草時溫飲一小盞[illegible]便覺心下開豁如覺渴再飲一盞至三四盞覺下重便生此方最驗

[illegible]劑治難產時胎在腹中如已見兒胎衣不出或胎死者蜀葵子貝母各四兩為末米飲下壹匙好人行四五里許不下再服

[illegible]

按苦能下氣柞木蜀葵貝母則又不專於苦要之亦有利竅行血之功茲特因某氏所編而列之耳

香劑 乳珠丹

用通明乳香研細以猪心血為丸梧子大朱砂為衣日乾每服一粒催生冷酒化下良久未下再服一粒若大段難產以蓮葉心蒂[illegible]水煎湯[illegible]化下[illegible]如逆放溫化下[illegible]良久未下再服[illegible]胎下胞不下者服此便下[illegible]先服神應黑散再服此藥[illegible]

午時極妙或七月七日三月三日及彼日□時□
可
又方 通明乳香如皂角子大 為末腰痛時用冷水一
小盞入醋少許同煎令產婦兩手捉兩石燕子坐婆
調藥飲水須臾坐草便生無痛楚神良
開骨膏 □□□日
乳香研細滴水丸如芡實大每服一丸無灰酒吞
下
又方 乳香 朱砂等分 為細末麝香酒調下
竹生丹 治產婦生理不順產育艱難或橫或逆

難產門 女科門 二百四

十二月兔腦髓去皮膜研如泥 母丁香一錢研末
乳香一錢另研 麝香一字另研
右三味拌勻以兔腦髓和丸雞頭實大陰乾油紙
裹每服一丸溫湯下即產兒握藥出
如意散 臨產腰疼方可服之
人參為末 乳香各壹錢 朱砂一錢
右同研細臨產急用雞子清一個調藥末再用生薑
自然汁調開冷服如橫倒等即將端順下及無恙
勝金散 郭稽中論產難者因兒轉身將兒枕血塊
破碎與胞中敗血壅滯兒身不能便利是以難產
急服勝金散消散其血使兒自易生陳無擇云多
因兒未轉順坐草太早或努力太過以致包衣破
而血水乾產路澀而兒難下宜先服催生如神散
以固其血設或逆生橫產當用前法□□之
麝香一錢研 鹽豉一兩以舊青布裹了燒令赤研細
右取秤錘燒赤焠酒中以酒調服一錢
催生湯 治妊娠欲產痛陣尚疏難產經二兩
日不生胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澀纔
覺痛密破水後便可服
蒼朮米泔浸切炒 小厚朴殼去穰麩炒 白桔梗

難產門 女科門 二百五

陳皮去白 白芍藥 川白芷
大川芎 大當歸去蘆酒洗 交趾桂去粗皮不見火
半夏湯洗 粉草 麻黃去節
軍薑去皮 厚朴去粗皮薑汁炒 南木香不見火
杏仁去皮尖 白茯苓各半錢
右為末每服三錢順流水溫暖調下若覺熱悶白
蜜湯下或以散入真米醋少許煎服方內用芍藥
肉桂能開通子宮其餘藥皆助氣□□以緩□□通
麻黃內通陽氣陽氣盛則血行□□□□外却
寒邪去積聚皆得其宜然川芎□□降者不宜

輕者何以[illegible]所[illegible]調下御米湯

[illegible]用[illegible]

[illegible]令得所[illegible]

[illegible] 枳殼 甘草 滑石 右

[illegible]

行血 [illegible]益母草取汁半大合煎減半頓

單方治[illegible]以乾者[illegible]大杯水半合煎服

用益母膏大作丸 [illegible]為末

煉蜜丸[illegible]服人臨産[illegible]九能除[illegible]後百病

佛手散 方[illegible]

如聖散 專治孕婦難産

紫蘇葉 當歸 各等分

右㕮咀每服叁伍錢用長流水煎服如無流水以

水[illegible]煎服即下 又方取本夫褌帶五寸燒

存性酒調服下 又方取槐樹東枝令産婦把之

易産 又方用[illegible]調[illegible]丸散服之即産

黑神散 治[illegible]難産

當歸[illegible] 川芎[illegible] 木香[illegible]

白芍藥 枳殼[illegible] [illegible]

乳香[illegible] 血餘[illegible]

右作一服水貳鍾煎至[illegible]入乳香血餘和勻不

[illegible]狗[illegible]散

固血 治胞漿先破惡水來多胎乾不得下[illegible]

與四物湯[illegible]養血氣[illegible]

劑[illegible]須[illegible]洗[illegible]令氣上下通暢更用[illegible]

金[illegible]服[illegible]乳[illegible]或[illegible]如聖散

催生如聖散 治逆産橫生瘦胎

百草霜 香白芷 不見火 各等分

右二味等分研勻每服貳大錢於臨産時以童便

并少米醋打為膏沸湯調下集驗用酒童便各半

盞同煎纔沸即熱服不過再服即産[illegible]

[illegible]

婦人臨産累日氣虛不能生[illegible]出盡胞乾終不

産者用赤小豆壹升水[illegible]煮令熟[illegible]以阿

膠叁兩入豆汁溶化每服半盞[illegible]未産再服即出

破血 半夏湯 治胎乾而不能産

半夏麴[illegible] 大黃 伍錢 肉桂[illegible]

桃仁[illegible]

右為粗末先服四物湯一二服次服半夏湯[illegible]

片水煎 又方當歸為末酒調方寸匕服之

通聖散　臨產腹疼方服
延胡索　没藥　白茯苓
白芷　蒲黃　當歸
桂心各等分
右為末臨產陣痛時燒鐵秤錘令通赤淬酒
調下參錢服一兩盃立產
勝金散　治難產逐敗血即自生若橫逆則轉正子
死腹中則胎軟膨寬即產祖宗秘傳千金不授
王不留行　酸漿艸　茨菰子
白蒺藜去刺　五靈脂各等分

右為散每服參錢取利方水壹盞半入白花劉寄
奴子壹撮同煎溫服大効
外取 如聖膏　治產難并治胞衣不下兼治死胎
蓖麻子去殼細研成膏塗脚心胞即下速洗去
不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入
催生丹（小注）
催生如意不傳遇仙丹
蓖麻子　硃砂　雄黃
蛇蛻　一方加麻子參粒
右為末漿水飯和丸如彈子大臨產時先用椒湯

淋渫臍下次安藥丸於臍中用蠟紙數重覆上
閤帛束之頭生下急取去藥一丸可用三次
三麻四豆脫衣裳研碎將來入麝香　有婦人遇產
難貼在臍中兩分張
立聖丹　治產難危急者
寒水石　右同研細入麝香同研如
深桃花色每用參分井花水調如薄糊以紙花剪
如杏葉大攤上貼臍心候乾再易不過三上便產
橫逆惡候死胎不下並治神驗

雜方 崔氏云今產婦兩手各握石燕壹枚須臾子下
救產難經曰不生雲母粉半兩溫酒調服入口即產
萬不失一
治橫逆產理不順用伏龍
肝細研每服壹錢酒調服其土從兒頭上戴出妙
世如神散　治催生累効靈妙之理人所難通用貫
殊効　臨產時令人路上尋破草鞋安獲取耳燒
灰溫酒調下參錢匕得左足者男右足者女覆者
死側者有驚裘是神奇用此立催生丸丸效
勝金丹　治難產神妙破死胞難產救逆炎研細
搗生搗汁壹盞下之若產母虛弱久泰有參淡者

此臨合動氣，中於衝心，內娩適救云產。

針灸 東垣：婦人將產，預先胎破，惡水去盡，產門乾燥無血，[illegible]可養枯竭。獨陰 [illegible] 承陰 [illegible] 合谷 [illegible]

下催生難產及死胎。太衝 [illegible] 合谷 [illegible] 三陰交 [illegible]

足小指節 [illegible] 產子上衝逼心 [illegible] 合谷 [illegible]

三陰交 [illegible]

張仲景 橫產難產 右腳小指尖頭 [illegible] 三陰交 [illegible]

集又法 獨陰 [illegible] 合谷 [illegible]

[illegible] 難產 三陰交

醫案 滑伯仁治賈川王美人懷子而不乳，召伯仁往，診以臭穢藥一握，以酒飲之，旋乳。又後診其脈，而脈躁疾者有餘，乃即飲以消石一劑，出血，血如豆比五六枚。 滑伯仁治一婦難產七日而不乳，且食甚少，伯仁視之，以涼治一盞，投佩蘭煎湯調咲之，旋乳。或問其所以，曰：此婦食甚少，未有無穀氣而生者，夫楓葉，木之先落後生，後落，故以作湯飲也。 羅安常治一婦產七日而子不下，百治不效，龐視之，令其家人以湯溫其腰腹，自為上下拊摩，孕者覺腸胃微痛，呻吟間生一男，其家驚喜而不知所以然。龐曰：兒已出胞，但一手誤執母腸，不能脫，非符藥所能為，吾隔腹捫兒手所在，針其虎口，痛即縮手，所以遽生，無他術也。取兒視之，右手虎口針痕存焉。 一婦累日產不下，服催生藥不效，龐曰：此必坐草太早，心下懷懼，氣結而不行，非不順也。素問云：恐則氣下，蓋恐則精神怯，怯則上焦閉，閉則氣逆，逆則下焦脹，氣乃不行矣。以紫蘇飲一服便產。及治婦人六七月子懸者。 吳茭山治一婦產難三日不下，服破血行經之藥俱罔效，吳因製一方，以車前子為君，冬葵子為臣，白芷、枳殼為佐使，巳服午產，眾醫異之，吳曰：本草謂催生以此為君，毛詩采芣苡以防產難是也。 劉復真遇府判女產不利，已斂，劉取紅花濃煎，扶女於凳上，以綿帛蘸湯盦之，連以澆帛上，以器盛水，又暖又淋，久而甦醒，遂生男子。蓋遇嚴冬，血冷凝滯不行，溫即產見，亦神矣哉。 一醫行各店，值店婦產數日不下，下體已冷，無藥甚窘，以椒橙茱萸等煎湯，可下手，則和臍腹入門處，皆淋洗之，氣溫血行，遂產。

交骨不開 產交骨不開，產門不閉，皆由元氣素弱，胎前失於調攝，以致血氣不能運達而然也。交骨不開

陰氣虛也用加味芎歸湯補中益氣湯產門不閉氣血虛也用十全大補湯 地官李□□妻三十五歲女為□□姙娠虑其產難崇加味芎歸湯四貼備用至期果產門不閉止服一貼頓然分娩 上舍費懷德之室產門不閉兩日未生服前藥一劑即時而產上舍傅此方用之者無有不驗 一婦人分娩最易至四十妊娠下血甚多產門不開與前湯一劑又以無憂散斤許煎熟時時飲之以助其血而產

加味芎歸湯 治交骨不開不能生產

川芎 當歸各□兩 自死龜板□□□

婦人頭髮□□□□□□□□

右為散每服伍錢水煎服約人行五里即生如胎死亦下灼過龜板亦可

下死胎法

產難子死腹中者多因驚動太早或觸犯禁忌令產難胞漿已破無血養胎枯涸而死故也須驗產母舌若青黑其胎死矣當下之 大法寒者熱以行之熱者涼以行之 燥者滑以潤之 危急者毒藥下之

鳥金散 治難產熱病胎死腹中或因頓仆或從高墜下或房室驚搐或臨產驚動太早觸犯禁忌或產時未到經血先下惡露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產婦面赤舌青是其候也面青舌赤母死子活唇舌俱青口中沫出子母俱斃又有雙胎或一死一活其候難知臨時觀變可也

熟地黃□□ 蒲黃 大當歸

交趾桂 芍藥 軍薑□皮

粉草各壹兩 小黑豆□□ 百草霜□□

右為末每服二錢米醋半合許沸湯六七分浸起溫服疑貳之際且進佛手散酒水合煎一二服探之若未死子母俱安若胎已死立便逐下的知其胎死進此藥後更進香桂散須臾如手推下□用催生更加好滑石末半兩□□□十粒□□□□

紫七八皮麩炒一二十順流水煎湯調下若氣衰不能
利小便枳殼行氣遂血惡自內逼胎又以米飲行
即產矣
【奪命】下死胎方　桂枝二錢　麝香當門子一個　同研爲末
服須臾如手推下　香散各半　此藥比之用水銀等
不損血氣　救生　一方單用桂末二錢痛時童便
調下名救苦散
一穩婆之女嫁若負重妊娠腹中胎死冷而墜口中甚穢
穢余意其胎必死令視其舌果青遂與朴硝半兩許
服之隨下穢水而愈　一婦胎死服朴硝而下穢水
肢體倦怠氣息奄奄用四君爲主佐以四物薑桂調
補而愈
【熟雞】治妊娠三五个月胎死在腹內不出
大腹子　赤芍藥　榆白皮各三兩
當歸一兩　滑石末半錢　瞿麥
葵子一分　茯苓　粉草
子芩各半兩
右爲粗末每服四錢水一盞煎至七分去滓不拘
時溫服
鄧知縣傳療死胎不出朴硝半兩研細以溫童便調
服屢效
治死胎不下指甲青舌青脹悶口中作屎臭先以平
胃散一貼作兩服每服酒水各一盞煎至一盞卻
投朴硝末半兩再煎三五沸溫服其胎化血水下
【又方】治子死腹中不出用水銀二兩水煮四五沸去之
然後取酒調服立出
【外療】子死腹中真珠二兩爲末酒調服盡立出
【滑劑】治小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口
噤不開格口灌之藥下即活　療妊娠胎死腹中
或母疾欲下胎榆白皮煮汁服二升
又治子死腹中或半生不下或半著脊在草不產
血氣上衝母心面無顏色氣欲絕
豬脂一斤　白蜜一升　淳酒二升
右三味合煎取二升分溫二服不能飲隨所能服
之
【奪命】一字神散　治子死胎不下胞破不生此方屢
效救人無數
鬼臼不拘多少黃色者去毛研為細末
右每服二錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服
立效如神

治生產不順胎死腹中胞衣不下臨產危急

妙

蛇退（一條全者燒存性研）　麝香（少許）

右為末童便酒各半盞調一服即生効

楊氏療有孕月數未足子死腹中母欲悶絕以大豆三升醋煮濃汁叁升頓服立効

本事治妊娠熱病胎死腹中鹿角屑一兩水一盞葱白五莖豉半合同煎至六分去滓温分二服

又方　取死胎　烏雞一隻去尾細切以水三升煮取二升去雞通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

女科證治準繩卷之四

女科證治準繩卷之五

金壇王肯堂輯　門人新安閔承啓校

產後門

產後將調法

大全凡生產畢飲熱童便一盞不得便臥且宜閉目而坐須臾上床宜仰臥不宜側臥宜豎膝未可伸足高倚牀頭厚鋪裀褥遮圍四壁使無孔隙免致賊風及以醋塗鼻或用醋炭及燒漆器更以手從心擀至臍下使惡露不滯如此三日以防血暈血逆不問腹痛不痛有病無病以童便和酒半盞溫服五七服妙酒雖行血亦不可多恐引血入四肢且能昏暈宜頻食白粥少許一月之後宜食羊肉猪蹄少許仍慎言語七情寒暑梳頭洗足以百日為度若氣血素弱者不計日月否則患手足腰腿痠痛等證名曰蓐勞最難治療初產時不可問是男女恐因言語而泄氣或以愛憎而動氣皆能致病不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刷齒恐致血逆須血氣平復方可治事犯時微若秋毫成病重如山嶽可不戒哉（[illegible]）陳無擇云[illegible]產婦服[illegible]腹痛以[illegible]　產婦將息如法臟腑調和庶無諸疾苦須先服黑神散四物

湯四順理中丸七寶散若壯熱頭痛此乳脈將行用
玉露散頭目不清是血暈用清魂散粥食不美是胃
氣虛用四順理中丸 丹溪曰初産之婦好血已虧
汚血或留彼黑神散非要藥乎答曰至哉坤元萬物
資生理之常也初産之婦好血未必虧汚血未必積
臟府未必寒何以藥爲飲食起居勤加調護何病之
有誠有汚血體怯而寒與之數貼亦自簡便或有他
病當求病起何因病在何經氣病治氣血病治血何
用海制此方例令服俗亦有性急者形瘦者本有怒
火者夏月坐蓐者時有火令薑桂皆爲禁藥至于將

產後書 卷五

護之法尤爲悖理肉汁發陰經之火易成內傷之病
也先哲具有訓戒胡爲以羊雞濃汁作糜而又常服
當歸丸當歸建中湯四順理中丸雖是補劑並是偏
熱臟府無寒何處消受若夫兒之初生母腹頓寬便
啖雞子且吃糖鹽不思雞子難化糖鹽發熱展轉生
證不知所因率爾用藥宜不誤人予每見産婦之無
疾者必教之以却去黑神散與夫雞子糖鹽諸品肉
食且與白粥將理間以此少養魚若令淡食之半月
後方與少肉若雞子亦須豁開淡煮大能養胃却疾
彼富貴之家驕恣之婦卒有白帶頭風氣痛膈滿痰

逆口乾經事不調髮禿體倦皆是陽盛陰虛之所致
生血氣本自和平曰哉曰虛又烏知非此等藥誤之
以兆之耶

千金云凡産後滿百日乃可會合不爾至死虛羸百
疾滋長慎之 凡婦人患風氣臍下虛冷莫不由此
早行房故也 産後七日內惡血未盡不可服湯候
臍下塊散乃進羊肉湯有痛甚切者不在此例 兩
三日消息可服澤蘭丸比至滿月丸藥盡爲佳不爾
虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭
丸補之服法必七日外不得早服也 凡婦人因

產後 通用方

暑月産乳取涼太多得風冷腹中積聚百疾競起迄
至於死百方療不能差桃仁煎主之出蓐後服之婦
人總令無病每至秋冬須服一兩劑以至年內常將
服之佳

丹溪云産後以大補氣血爲主雖有雜證以末治之
産後一切病不可發表 産後不可用芍藥以酸
寒伐生發之氣故也

通用方

加味四君子湯 新産之後雖無疾故宜將息調理
脾胃大進飲食則臟腑易平復氣血自然和調百

疾不生也
人參　茯苓　白术
甘草　陳皮　藿香
縮砂仁　黃芪各等分
右㕮咀每服肆錢薑叄片棗壹枚煎溫服
四順理中丸　治新產血氣俱傷脾胃不調百日內
宜常服
人參去蘆　乾薑炮　白术各壹兩
甘草炙
右煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心米飲送下

地黃丸　治產後腹痛眼見黑花或發狂如見鬼狀
或胎衣不下失音不語心胸脹滿水穀不化口乾
煩渴寒熱往來口內生瘡咽喉腫毒心中忪悸夜
不得睡產後中風角弓反張面赤牙關緊急或崩
中如豚肝臍腹㽲痛煩躁恍惚四肢腫滿及受胎
不穩唇口指甲青黑
生地黃研取汁留滓　生薑各貳斤研取汁留滓　蒲黃
當歸各壹兩
右於銀石器內取生地黃汁炒生薑滓以薑汁炒
地黃滓各令乾四味同焙研爲細末醋煮麪糊爲

丸如彈子大每服壹丸食前當歸酒化下　一方
只用地黃生薑依交加法制爲末每服叄錢酒下
當歸散見前胎前門半產條
四味湯　治產後一切諸疾纔方分娩一服尤妙
當歸心膈煩加半錢　玄胡索氣悶喘加半錢　血竭惡露不快加半錢
沒藥心腹撮痛加半錢
右等分爲細末每服貳錢食前以童子小便壹鍾
煎至陸分溫服
玉露散　治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏
眩大便澀滯此藥涼膈壓熱下乳

人參　白茯苓　甘草各半兩
川芎　苦梗炒　白芷各壹兩
當歸貳錢五　芍藥柒錢半
右爲細末每服貳錢水壹盞煎至柒分溫服如
煩熱甚大便秘者加大黃貳錢半
地黃煎　治產後諸疾
生地黃汁　生薑汁各壹升　藕汁半升
大麻仁去殼
右和勻以銀器內慢火熬成膏溫酒調服半匙更
以北术煎膏入半匙尤佳　產寶方無麻仁用白

[illegible]治產後虛憊盜汗嘔吐

地黃酒　治產後百病未產一月先釀產訖可服 [illegible]

地黃汁　好麴 [illegible]

右先以地黃汁漬麴令發準家法釀之至熟封七日取清者服常服令酒氣相接勿令絕忌蒜生冷鮓滑雞豬肉一切毒物凡婦人皆可服但夏三月不可釀春秋宜作以地黃汁并滓內米中炊合用之若作一石十石準此一升爲則先服當歸湯後服此妙

桃仁煎　療產後百病諸氣

桃仁一千二百枚去皮尖雙仁熬令黃色 [illegible]

右搗令極細以上等好酒一斗五升同研三四遍如作麥粥法以極細爲佳入小長頸瓷瓶中密塞以麪封之納湯中煮一伏時不停火亦勿令火猛使瓶口常出在湯上勿令沒之候熟取出溫酒服一合日再服

產後諸疾

松烟細墨 [illegible] 右研令極細用絹羅過纔產了服貳錢以童便調下

黑神散　治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胸痞滿或臍腹堅脹撮痛及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之　又名烏金散治產後十八證一曰因熱病胎死腹中二曰產難三曰胞衣不下四曰[illegible]五曰[illegible]六曰乍寒乍熱七曰虛腫八曰乍見鬼神九曰月水不通十曰[illegible]痛泄瀉[illegible]十一曰遍身疼[illegible]十二曰血崩十三曰血氣不通咳嗽十四曰[illegible]不[illegible]十五曰腹脹滿嘔逆不定[illegible]十六曰口鼻黑氣及鼻衄[illegible]十七曰喉中氣喘急[illegible]不十八曰中風

熟乾地黃　蒲黃炒　當歸
乾薑炮　桂心　芍藥
甘草各肆兩　黑豆炒去皮 [illegible]

右爲細末每服貳錢[illegible]各半盞同煎服

琥珀散　治產後一切危急之疾

琥珀　朱砂　麝香
香墨[illegible]　僵蠶　當歸各[illegible]
鯽魚鱗[illegible]　桂心　百草霜
白附子　梁上塵[illegible]各[illegible]兩

細末之炒[illegible]熱酒調服貳錢効

千金增損澤蘭丸　療産後百病理血氣補虛勞方

澤蘭　甘草　當歸

川芎各七錢半　附子炮　乾薑

白朮　白芷　桂心

北細辛各五錢　北防風　人參

牛膝七錢半　柏子仁　熟地黄

石斛各壹兩半　厚朴　藁本

蕪荑各伍錢　麥門冬去心

右其為細末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下貳拾丸

黑神丸　治産後一切血疾産難胎衣不下危急惡疾垂死者但灌藥得下無不全活

當歸　五靈脂　川芎

良薑　熟地黄各壹兩

右細剉以沙合盛赤石脂泥縫紙筋鹽泥固濟炭火十斤煅令通赤去火候冷開看成黑糟色取出細研却入後藥

百草霜五兩　硫黄　乳香各壹錢半

花蘂石　琥珀各壹錢

右五味並細研與前五味再研如法修製和勻以米醋煮麵糊丸如彈子大每服壹丸炎火燒令通赤投於生薑自然汁與童子小便入醋漉出焙乾研細只用此酒調下

診　婦人生産之後寸口脈洪疾不調者死沉微附骨不絶者生　婦人新生乳子脈沉小滑者生實大堅弦急者死

胞衣不下

夫產兒出胞衣不落者世謂之息胞由產初時用力出產兒出而體已疲倦不復能用力產胞經停之間而外冷乘之則血道澀故胞衣不出急以方藥救治不妨害於兒所奈者胞繫連臍帶不出即不得以時斷臍浴洗冷氣傷兒則成病也舊法胞衣不出恐損兒者依法截臍而已產處須順四時方面并避五行禁忌若有觸犯多令產婦難產 郭稽中論曰胎衣不下者何答曰母生子訖流血入衣中衣為血所脹故不得下治之稍緩脹滿腹以次上衝

產後 胞衣不下 女科五

心胸疼痛喘急者但服奪命丹以逐去衣中之血血散脹消胎衣自下牛膝湯亦効 [論]有因惡露入衣脹而不能出有因元氣虧損而不能送出其惡露流衣中者腹中脹痛用奪命丹或失笑散以消瘀血緩則不救其元氣不能送者腹中不脹痛用保生無憂散以補固元氣或用蓖麻子肉一兩細研成膏塗母右脚心衣下即洗去緩則腸亦出如腸不上仍用此膏塗腦頂則腸自入益母丸亦効 家人婦胎衣不出胸腹脹痛手不敢近此瘀血爲患用熱酒下失笑散一劑惡露胎衣並下 一產婦胎衣不出腹不脹

痛手按之痛稍緩此是氣虛而不能送出用無憂散而下[illegible] 婦頭髮入口作嘔胎衣自出其不出者必死授與前法而效 一產婦[illegible]衣不下[illegible] 良[illegible] 酒化下益母丹[illegible]

奪命丹

附子[illegible] 牡丹皮[illegible] 乾漆[illegible]

右為細末以釅醋[illegible]大黃末[illegible]同熬成膏和

產後 胞衣不下 女科五

藥丸如梧子大溫酒吞五七丸[illegible]

[illegible]治產後氣欲絕緩服[illegible]

[illegible]

花蕊石[illegible] 硫黃[illegible]

右二味相拌令勻先用紙和膠泥固瓦罐子一個內可容藥候泥乾入藥在內密泥封口[illegible]

焙令透熱安在四方磚上（……）用炭一秤麄
壘周匝自巳午時從下生火令漸漸上徹有隆下
火放夾火上直至經宿方消火冷又放經宿冷定
取出細研以絹羅至細然合内盛依法用之（……）
（……）
一親戚婦人產後胞衣不下血脹迷悶不省人事
告之曰死矣予曰此血脹也可用花蘂石散研之
因以一錢童便調灌下即甦其胎衣與惡水旋即
下而無恙

芎藭散　治胎衣不下

芎藭　當歸（各等分）　榆白皮（……）

爲細末每服二錢食前用生地黄汁同溫酒調下

必効方牛膝湯　治胎衣不出臍腹堅脹急痛即殺
人服此藥胞即爛下死胎

牛膝　瞿麥（各一兩）　當歸（……）
通草（……）　滑石（……）　葵子（五兩）

右細切以水九升煮取三升分三服若衣不下腹
滿即殺人宜服此藥衣即爛出也

牛膝散　治妊娠五六月墮胎胞衣不出

牛膝　川芎　朴硝

蒲黄（……）　當歸（……）

右爲粗末每服三錢……煎至六分去滓……
千金備急丹　治……胞衣不下……
嘔以鍋煤大……
當光如……子大……
即下愈

保命治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血
暴下及胎乾不能生産半夏湯主之（……）

下胎丸

半夏　白斂（各等分）

右細末丸如梧子大食後半夏湯下二十丸漸加
至五十九如不効者……此藥……
又不効用大聖散……人參荊芥
散

治胞衣不出若腹服則殺人……
蝟皮……煎……分爲二服……亦可

必効方　治胎衣不下服蒲黄如棗大（……）

又方　生地黄汁……苦酒……煖服之

又方　牛膝（……兩）　葵子（……合）　杵碎以水一盞半煎至一盞

大浮分二服
廣濟治胎衣不出方
以竈突中土三指撮以水服之
又方 伏龍肝 用好醋調令仰令納臍中續
又方 煎生甘草湯三合服
又方 醋湯飲之亦出
又方 雞子一枚以醋和吞之立出
千金方 治胎衣不出腹脹則殺人
吞雞子黃三箇仍解髮刺喉中令嘔即出若因極
以水煮螻蛄壹枚二十沸灌入口汁下即出

救急方 赤小豆 東流順水吞下
發胞衣不下方
右酒童便各半盞相和煎至
柒分大溫服
又方 紅花 酒煮濃汁服
又方 以鹿角鎊屑研細三分煮蔥白湯調下
凡欲產時必先腕常所著衣以籠竈胞衣不自下仍易
產
廣濟方 取夫單衣蓋井上立出
又方 取產母鞋底火炙熟熨小腹上下二七次

又方 取路傍破草鞋前截連燒灰童便和
下
又方 皂角刺燒爲末每服三錢溫酒調下
寶慶方 若婦人有病莫甚於生產產科之難臨產莫
重於催生既產莫甚於胞衣不下惟有花蘂石散一
藥最爲緊要如黑神散牛膝散諸方之類雖皆有驗
然鄉居或遠於藥局倉卒之間無法可施今有一妙
法若產訖胞衣不下停待稍久非特產母疲倦又且
血流入胞中爲血所脹上衝心胸喘急疼痛必致危
篤若有此證宜急斷臍帶以少物繫墜

使其子血脈不潮入胞中則胞
衣自當萎縮而下縱淹延數日亦不害人只要產母
心懷安泰終自下矣累試有驗不可輕信坐婆妄用
手法多有因此而亡者慎之慎之
【針灸】胞衣不下 中極
標幽賦 又決 照海 內關
甲 女子字難若胞不出崑崙主之

血暈（氣逆附）

金匱問曰新產婦人有三病一者病痓二者病鬱冒三者大便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令病痓亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難 按產婦鬱冒即今世所謂血暈也 大全產後血暈者由敗血流入肝經眼見黑花頭目旋暈不能起坐甚致昏悶不省人事謂之血暈細酒調黑神散最佳慎勿作暗風中風治之凡暈由敗血乘虛逆上湊心故昏迷不省氣閉欲絕是也然其由有三有用心使力過多而暈者有下血多而暈者有下血少而暈者其暈雖同治之則異當詳審之下血多而暈者但昏悶煩亂而已當以補血清心藥下血少而暈者乃惡露不下上搶於心心下滿急神昏口噤絕不知人當以破血行血藥古法有產婦纔分娩先預燒秤錘或黃石子硬炭燒令通赤置器中急於床前以醋沃之得醋氣可除血暈產後一月時作為妙崔氏云凡婦者皆是虛熱血氣奔迸腹中空所致欲分娩者第一須先取釅醋以塗口鼻仍置醋於傍使聞其氣兼細細飲之此為上法如覺暈即以醋噴面醒來即飲醋仍少與解之（一云仍少與水解之）一法燒乾漆令煙濃熏產母面即醒（[illegible]） 郭稽中論曰產後血暈者何答曰產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神故眼前生花極甚者令人悶絕不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但服清魂散即省 薛按產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神昏口噤或痰涎壅盛者急用失笑散主之若血下多而暈或神昏煩亂者大劑芎歸湯補之或[illegible]散或童子小便有痰加二陳湯若因勞心力而致者宜補中益氣湯加香附若因氣血虛極不省人事用清魂散（[illegible]）以芎歸湯及大補氣血之劑凡產可用醋[illegible]或用[illegible]夏末冷水和凡大鼻中亦無前患[illegible]會產宜因氣血俱虛痰火泛上宜以二陳（[illegible]）或朱砂安神丸以麥門冬湯下亦可大凡產後口眼喎斜等證當大補氣血為主而兼以治痰（[illegible]）不能回者用大補湯至五七個月當服達生散八九個月再加大腹皮黃楊腦如臨產時更宜服保生無憂散庶無前患 一家人婦產後小腹作痛忽牙關緊急灌以失笑散良久而甦又用四物加炮薑白术陳皮而愈

一產婦兩手麻木服愈風丹天麻丸遍身皆麻神

思慮怠惰勞作湯白汗盜汗此氣血俱虛也用十全
大補加炮薑數劑諸證悉退却去炮薑又數劑而愈
但內熱此血虛也用逍遙散而痊 一婦八月胎下
墜或動面黃體倦飲食少思此脾氣虛也用補中益
氣湯倍白朮加蘇梗三十餘劑而安產後又患胸滿
咳嗽用四物加茯苓半夏桔梗而愈 一產婦因產
飲酒恣慾甚多患血暈口出酒氣[illegible]血得熱而妄
行虛而作暈也以佛手散加乾薑[illegible]一劑而痊 酒
性慓悍入月及產後不宜飲恐致前證產室人衆喧
嘑氣熱亦致此證 大科五 丹溪治一婦面白形長心鬱半
[illegible] 一八
後半產後發寒熱忽發痙十左壯而甦後以參朮
[illegible]服兩月而安此陽症也 不化陰藏治新胃徐
氏婦病產後暴死但胸膈微熱陳診之曰此血悶也
用紅花數十斤以大鍋煮之候湯沸以木桶盛之將
病者寢其上熏之湯氣微復加之有頃婦人指動半
日遂甦此與許胤宗治柳太后之意同

清魂散

澤蘭葉 人參各[illegible] 川芎[illegible]
荊芥[illegible] 一方有甘草貳錢

右為末用溫酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽

眼開氣定即醒

保命荊芥散 治產後風虛血暈精神昏眩

荊芥[illegible] 桃仁[illegible]

右細末熟水下三錢[illegible] 甘草各[illegible]
衍義治產後血暈用荊芥[illegible]不省便調下[illegible]
極妙 產後血暈[illegible]口前[illegible]
上疾急不知人取雞子[illegible]取清以童[illegible]
貳錢調服遂仍依方調治[illegible]則不[illegible]
為敏捷

右荊芥倒氣虛人不可服

大科五 十九

來甦散 治臨產用力太過氣血暈悶不省人事

木香[illegible] 神麴炒 陳皮去白
白芍藥[illegible] 阿膠[illegible] 麥蘖炒
黃芪[illegible] 生薑[illegible] 糯米壹撮
苧根[illegible] 甘草[illegible]

右作一服水貳鍾煎至一鍾斡開口灌下連進為
愈

芎歸湯 治產後去血過多血暈不省

川芎 當歸[illegible]

右作一服水貳鍾煎至一鍾食前服腹中刺痛加

白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬乾葛加白芍
藥水停心下加茯苓生薑虛煩不得眠加人參竹
葉
芎歸加芍藥湯治產後去血過多
保命集治產後血暈危困
生地黃汁 當歸 赤芍藥
右水煎葵 溫服如覺有熱人當歸入童子小
便半盞服之
廣濟治產後血暈心悶不識人神言鬼語氣息欲絕
芍藥 甘草各一兩 丹參
生地黃汁 生薑汁 白蜜
右水貳升先煎前藥取捌合下二汁及蜜和勻分
兩服
梅師治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷
氣欲絕新羊血一盞飲之三兩服
產後忽冒悶汗出不識人者破雞子三枚
吞之便醒若未醒可與童便一升甚驗 若產後去
血多者又增此疾與雞子不醒者可急作竹瀝汁一
服伍合須臾不定再與五合頻與三五服瘥
又方 松烟墨貳錢燒通紅窨滅為末溫酒或醋湯

下血少者寶血竭

調服半七
又婦人產後血暈此乃虛火載血漸漸衝上昏厥用
鹿角燒灰出火毒研極細用好酒童便調灌下一呷
即醒此物行血甚効
獨行散 治產後血暈昏迷不省衝心悶絕
五靈脂
右為細末每服貳錢溫酒調下口噤者拗開口灌
之入喉即愈 一方加荊芥為末童便調服如血崩
不止加當歸酒童便煎
治下胎或產後血上衝心已死用彩金燒存性為末
貳錢釅醋一合調灌之立活
產後血暈心悶氣絕紅花壹兩搗為末分作二服酒貳
鍾煎取一鍾併服如口噤斡開灌之効 一方用
紅花叁兩新者無灰酒童便各半升煮取壹盞服
肘後治血暈 蘇木 水五升煮取貳升分再服
產無蘇木取緋衣煮汁飲之亦得
聖惠治產後血運不知人及狂語麒麟竭壹兩細研為末非
時以溫酒調下貳錢匕
奪命散 治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失
志及產後百病

沒藥　血竭各等分

右研細為末，纔產下，便用童便細酒各半盞煎一兩沸，調下貳錢，良久再服，其惡血自循下行，更不衝上，免生百疾。專治婦人方，只用白湯調。

洪蘊使子治一婦人產後語言顛倒譫語不已，如有所憑，服諸藥無効，召與診之，六脉和平，陳以此藥兩服愈。

紅花散　治產後血昏血崩及月事不勻遠年乾血氣

乾荷葉　牡丹皮　川當歸

紅花　蒲黃紙炒各等分

右細末，每半兩酒煎，和查溫服。如胎衣不下，榆白皮湯調半兩。

右㕮咀作劑

牡丹散　治產後血暈悶絕，口噤則拿開口灌之

牡丹皮　大黃煨各壹兩　芒硝

冬瓜子半合　桃仁三七個去皮尖

右剉，每服伍錢，水壹鍾煎至半鍾，去滓入硝，又煎分二服。

產寶治產後心煩手脚煩熱，氣力欲盡，血暈連心頭硬及寒熱不禁，接骨木破之如筭子，一握以水二升煎取半升，分溫二服。或小便數，惡血不止，服之即瘥。此木煎三遍，其力一般，此是起死之方。

右一劑血暈腦不出者宜用

花蕊石散　治產後氣欲絕，惡血奔心，一服見效，胎死者但以童便調[illegible]錢服之，取下[illegible]

黑神散　治產後血暈，用細酒調服[illegible]

右方寒多者用之

治產後血暈心悶亂恍惚如見鬼

生益母草汁[illegible]　生地黃汁貳合

童便壹合　雞子清壹枚

右以前三味煎三四沸，後入雞子清攪停，作一服。

治產後血暈狂語不識人狂亂

童便壹合　生地黃汁壹合　赤馬通七枚

紅雪一分

右以上二味，以赤馬通絞取汁，下紅雪，溫為兩服。

右方熱多者用之

仲景云：產婦鬱冒，其脉微弱，不能食，大便反堅，但頭汗出。所以然者，血虛而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出。以血虛下厥，孤陽上出，故頭汗出。所以產婦喜

汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之病解能食七八日更發熱者此為胃實大承氣湯主之　今按鬱冒即血暈也觀此則產後血暈自汗下和解三法當分表裏虛實精而別之

張氏方治產後血暈令不省人事極危殆者

右切韭菜入有嘴磁瓶內煎熱醋沃之便密塞瓶口以瓶嘴向產婦鼻孔令醋氣透入須先扶病人起坐惡血衝心故有此證韭能去心之滯血加以醋氣運達之用無不效　又方半夏洗不以多少

為末丸如大豆內鼻中即與亦療五絕

治胎後血上衝心生薑五片切以水捌升煮取叁升分三服

崔氏療產乳暈絕方以洗兒水飲叁合良　或惡血服少許良

醋噀面

鍼灸　治產後血暈不省人事　三里　支溝　三陰交

標幽又法　陰交　陽別

但又法　神門　內關不應取灸穴　關元灸

醫鑑　產後手足厥逆用主之　一婦人產後日食茶粥二十餘碗至一月後遍身冰冷數塊人以指按其冷處即冷從指下上應至心如是者二年諸治不效以八物湯去地黃加橘紅入薑汁竹瀝一酒鍾十服乃溫

血不下

夫產惡露不下者，由產後[illegible]氣血虛損，或胞絡挾於宿冷，或產後當風取涼，風冷乘虛搏於[illegible]血，則凝滯不宣，積蓄在內，故令惡露不下也。薛曰：前症若惡露不下，用失笑散[illegible]若氣滯[illegible]若瘀[illegible]一方[illegible]服[illegible]久而發[illegible]以手護其腹，奈何此瘀[illegible]故用[illegible]以人參理中湯加肉桂一劑[illegible]

牡丹散 療產後一四日惡露不下

芍藥拾分　知母捌分　生薑[illegible]

當歸　蒲黃各肆分　紅花壹分

荷葉中心蒂[illegible]　生地黃汁[illegible]

右細切，以水貳升煎至柒合，去滓服。

荷葉散 療產後惡露不下，腹中疼痛，心神煩悶。

乾荷葉[illegible]　鬼箭羽　桃仁

劉寄奴　蒲黃各[illegible]

右為粗末，每服參錢，以童便壹大盞，薑[illegible]片，生地黃壹分捶碎，同煎至陸分，去滓，無時熱服。

又方 療產後惡露不多下方

川牛膝　大黃各[illegible]　牡丹皮

當歸各[illegible]　芍藥　蒲黃

桂心[illegible]

右為末，以生地黃汁[illegible]服[illegible]愈

沒藥丸 治產後惡露[illegible]斷絕，臍作寒熱，臍腹白[illegible]如[illegible]由冷熱不調，或思慮動作，氣[illegible]而[illegible]結。

當歸[illegible]　桂心　芍藥[illegible]

桃仁去皮尖　沒藥[illegible]　虻蟲[illegible]

水蛭[illegible]各[illegible]枚

右為末，醋糊丸如豌豆大，醋湯下參丸。

千金備急丹[illegible]

又方 治婦人惡血不下

當歸炒　芫花炒

右為細末，每服參錢，酒下。又方用好墨醋焠末，以童便酒下，妙。

[illegible]治產後血不下，[illegible]服[illegible]以[illegible]煮取[illegible]升，頓服。

又方 治產後血不下，[illegible]搗絞汁，每服[illegible]小盞，入酒[illegible]合，攪勻溫服。

又方 治產後血不去 麻子伍升 酒壹升 浸一宿 明旦去滓溫服壹升 不瘥再服壹升 不吐不下 不得與男子通 一月將養如初產

黑龍丹 [illegible]

生料五積散 治產後惡露不快 腹中疼痛 或腰疼 有血塊及發熱 並加醋少許煎 通口服 亦能療血崩

婦人 卷五 八

產

血不止

大抵產後惡露不絕者 由產後傷於經血 虛損不足 或分解之時 惡血不盡 在於腹中 而臟腑挾於宿冷 致氣血不調 故令惡露淋瀝不絕也 [illegible] 若肝氣熱而不能生血 用六味地黃丸 若肝氣虛不能藏血 用逍遙散 若脾氣虛而不能攝血 用六君子湯 胃氣下陷而不能統血 用補中益氣湯 若脾經鬱熱而血不歸源 用加味歸脾湯 若肝經怒火而血妄行 用加味四物湯 若氣血俱虛 用十全大補湯 若肝經風邪而血沸騰 用一味防風丸

產後 [illegible] 太平 [illegible] 一產婦惡露淋漓 體倦面黃 食少惡寒 日夜不寐 驚悸汗出 此脾經虛熱 用加味歸脾湯而瘥 後因怒 [illegible] 少食 用六君加柴胡治之而瘥

芎歸加芍藥湯 治產後血崩眩暈 不知人事

用芎藭 當歸 芍藥 各等分

右㕮咀 每服肆錢 以水一鍾半 煎至柒分 去滓無時熱服

又方 治產後血崩如豆汁 紫黑過多者 四物湯加蒲黃 生地黃汁 阿膠 薊根 艾葉 煎服

療產後七八日惡露不止

㕮咀艸　當歸各陸分　芍藥
續斷各捌分　川芎　竹茹各肆分
生地黃　拾分
右細剉以水柒升煮取貳升分三服空心頓服
四七　婦人產後所冒寒多血瘀下身體脈沉
當歸　白朮　陳皮
川芎　乾薑　黃芪
芍藥各三錢　炙甘草各一錢
右分二貼水煎服
四八　婦人因憂慮墮胎後兩月餘血不止腹痛
氣滯惡物行不盡
陳皮各分　白朮貳錢　芍藥三錢
木通　川芎伍分　甘草各五分
竹茹下五之尾陸拾枚兩
四九　[illegible]湯　療產後亡血過多心腹微痛然後血下久
而不止亦治赤白帶下年深諸藥不能療者良驗
貫眾
右用好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為細末用米
飲調下貳錢空心食前服
五十　治產後惡血不盡或經月或半歲者升麻參兩

清酒五升煮取貳升分溫再服
牡蠣散　治產後惡露不絕心悶短氣四肢乏
弱頭目昏重
牡蠣　川芎　熟地黃
白茯苓　龍骨　續斷
當歸　人參
五味子　地榆　甘草
右為末每服貳錢水壹中盞入生薑三片棗貳枚煎
至陸分去滓食前服
產後猶有餘血水氣者宜服豆淋酒　黑豆伍升
熬令煙盡於磁器內以酒壹斗淬之名豆淋酒治
污血又能發表也
治產後惡血不盡崩血不可禁腹中絞痛氣息急治
蒼朮
亂髮　阿膠
乾薑　代赭石
馬蹄殼　生地黃
牛角鰓
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服參肆拾丸
米飲下日二服
返魂丹

文仲葛氏治惡露不絕方　以鋸截桑木取屑五指撮酒服之

又方　炙桑白皮煮水飲之

總錄治胎落下血不止以桑木中蠹蟲燒末酒服方寸匕日二服

療產後泄血不止無禁度及治腹痛胸膈悶以蒲黃爲末酒服方寸匕日三四服（胡氏云蒲黃治惡露不止）

療產後血不止虛竭迸死亦治血氣蒲黃貳兩用水貳升煎八合頓服

心痛

大全產後心痛爲陰血所損隨火上衝心絡名曰心胞絡痛宜大岩蜜湯治之若寒傷心經名曰真心痛朝發夕死夕發朝死無藥可救（[illegible]）寒用大岩蜜湯溫之瘀血上衝用失笑散行之血既散而痛仍作用八珍湯補之大凡心腹作痛以手按之卻不痛此血虛也須用補養之劑　一產婦患前證昏憒口禁冷汗不止手足厥逆用六君子加附子壹錢以迴其陽二劑頓甦又以十全大補湯養其血氣而安　一產婦患前證手不敢近腹用失笑散一服下瘀血而愈次日復痛亦用前藥而安　一產婦患前證服大補等藥其血雖下復患頭痛發熱惡寒次日昏憒自以兩手堅護其腹不得診脈視其面色青白余謂脾氣虛寒而痛也用六君子湯加薑桂而痛止又用八珍湯加炮薑調理而安

七氣手拈散　治產後心氣攻痛

玄胡索　小茴香　白芍藥

乾漆（炒）　枳殼（各二錢）　黃連

石菖蒲　香附子　蘇葉（各壹錢半）

沒藥　乳香（各壹錢）　甘草（伍分）

右剉散分作二服每服用水一盞半入薑五片煎至一盞分空心服

大岩蜜湯

生乾地黃　當歸　獨活

吳茱萸　芍藥　乾薑

甘草　桂心　小草各一兩

細辛半兩

右爲散每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱服

詳曰產後心痛雖非產蓐常疾或有之痛未必便是血痛設是岩蜜湯豈可用乎熟地黃泥血安能去痛也此本出千金用生地黃[illegible]一升合滓五兩乾薑三兩細辛治[illegible]本一兩加減半兩制[illegible]病淺者自有品數不可妄意加減然以岩蜜湯治血痛不若失笑散更捷

失笑散　治心腹痛欲死百藥不效服此頓愈

五靈脂　蒲黃各等分

右爲末先用釅醋調二錢熬成膏入水一盞煎至七分食前熱服良驗

經心錄蜀椒湯　療產後心痛此大寒所爲

蜀椒二合　芍藥三兩　半夏

當歸　桂心　人參

甘草　茯苓各二兩　[illegible]汁五合

蜜一升

右切以水九升煮椒令沸[illegible]升半去滓下薑汁及蜜更煎取三升服五合至六合

大地散亦治產後心痛[illegible]

治產後血不盡心腹痛荷葉炒令香爲末水煎下方寸匕

理血湯治產後惡血衝心痛氣悶欲絶用桂心三兩擣羅爲散狗膽汁和丸如櫻桃大不拘時候熱酒磨下一丸

玄胡索散　手拈散治心腹痛

腹痛

一産後小腹作痛俗名兒枕既用失笑散行散之若惡露既去而仍痛用四神散調補之若不應用八珍湯若痛而惡心或欲作嘔用六君子湯若痛而泄瀉用六君子湯送四神丸若泄瀉痛而或後重用補中益氣湯送四神丸若胸膈飽脹或惡食吞酸或腹痛手不可按此是飲食所致當用二陳加山查白朮以消導若食既消而仍痛或按之不痛或更加頭痛煩熱作渴惡寒欲嘔等證此是中氣被傷宜補脾胃爲主若發熱腹痛按之痛甚不惡食不吞酸此是瘀血

停滯用失笑散以消之若止是發熱頭痛或兼腹痛按之却不痛此是血虛用四物加炮薑參朮以補之病機要云産後之病從厥陰經論之無犯胃氣及上中二焦爲之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動於脾利小便則内亡津液胃中枯燥制藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣如發渴用白虎氣弱用黃耆血刺痛則用當歸腹中痛則加芍藥宜詳察脈證而用之丹溪先生云産後當大補氣血爲先雖有雜證從末治之一切病多是血虛皆不可發表　一産

婦腹痛發熱氣口脈大余以爲飲食停滯不信乃破血補虛反寒熱頭痛嘔吐涎沫又用降火化痰理氣四肢逆冷泄瀉下墜始信問余曰何也余曰此脾胃虛之變症也法當溫補遂用六君加炮薑二錢肉桂木香各一錢四劑諸證悉退再用補中益氣之劑元氣悉復　一婦人産後腹痛後重去痢無度形體倦怠飲食不甘懷抱久鬱患痢月餘自汗如雨晝夜不寐神思消爍余曰氣血虛而有鬱也用當歸補血湯内貫以炮薑炒黑一劑汗少止再用歸脾湯八珍散兼服元氣漸復而愈　一産婦小腹作

痛服行氣破血之藥不效其脈洪數此瘀血内潰爲膿也以瓜蔞仁湯一劑痛止更以太乙膏下膿而愈産後多有此病縱非癰用之更效　一産婦小腹痛小便不利用薏苡仁湯一劑痛止更以四物加紅花桃仁下瘀血而愈大抵此證皆因榮衛不調或瘀血停滯所致若脈洪數已有膿脈但數微有膿脈遲緊乃瘀血下之即愈若腹脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大便出宜用蠟礬丸太乙膏及托裏藥　一産婦小腹作痛有塊脈芤而濇以四物加玄胡紅花桃仁牛膝木香治之而愈　一婦産後小腹患痛服

服八七湯下瘀血而瘥瘀血停滯宜急治之緩則
腐化為膿最難治療若流注關節則患骨疽失治多
為敗證。婦人寒月中產後腹大痛[illegible]甚者方
不治。人教以羊肉生地黃[illegible]兩不
煎服之三五次愈
兒枕者由母胎中宿有血塊因產時其血破敗與
兒俱下則無恙也若產婦臟腑風冷使血凝滯在於
小腹不能流通則令結聚疼痛名之曰兒枕也
延胡索散　治產後兒枕腹痛
延胡索　當歸各壹兩　真琥珀
蒲黃　赤芍藥　桂心
紅藍花
右為細末以童便合酒溫溫調叁錢食前服
療新產後七八日腹痛兩脇痛
當歸　劉寄奴　苦梗各
延胡索　桂心　陳皮
茯苓　芍藥各捌分
右㕮咀以水貳升煮取捌合調延胡索末空心服
療產後惡冷氣因產後發腹痛
川芎　桂心　當歸

吳茱萸　茯苓　芍藥
甘草各　桃仁
右㕮咀以水柒升煮取貳升去滓分叁服
丹　產後三日血塊痛發熱
五靈脂各　牡丹皮　芍藥
滑石
右研細分[illegible]
治產後發熱腹中痛[illegible]神散
白术　芍藥　滑石
黃芩　牡丹皮　人參
川芎　當歸尾　陳皮
荊芥　乾薑各　甘草
治血瘕痛無定處
童便　生地黃汁　生藕汁各壹升
生薑汁
右先煎三味約三分減一次下薑汁慢火煎如稀
餳每服取一盞溫酒[illegible]
黑神散　療產後血塊痛經脉行後腹疼并經脉不
調　熟地黃　陳生薑
右二味同和炒乾為末每服貳錢用烏梅調下當

服酒調經脉不通為瘀利米酒調下
一方用山查濃煎汁入沙糖少許再煎熱服
治兒枕痛乃血瘕也用真蒲黃研細調酒服二錢如
躁渴者新汲水調下 又方隔年蟹殼燒灰酒調下
治產後兒枕大痛黑神散
烏金石 寒水石
右各收之痛時各抄等錢半米飲調下痛止勿服
未止再服
海藏云四物加玄胡索沒藥白芷湯治產後敗血作
痛
四物苦楝湯 一方治臍下痛不可忍四物湯
加玄胡索二錢半服之
紫金丸治產後臍下痛即失笑散醋為丸是也 立
效散治兒枕痛不可忍用五靈脂慢火炒乾為末溫
酒下二錢立瘥

產後七八日無大便太陽證少腹堅痛此
惡露不盡不大便煩躁發熱切脉微實再倍發熱日
晡時煩躁者不食食則譫語至夜即愈宜大承氣湯
主之熱在裏結在膀胱也 大全產後惡血雖常通
行或因外感五邪內傷七氣致令斬然而止餘血壅
滯所下不盡故令腹痛當審其因而治之 一產婦
小腹痛其牙關緊急此瘀血內停以失笑散下之
而甦又用四物加炮薑白朮陳皮而愈
水來比常度過多不止遂用涼藥止之腹作痛
乃氣血凝滯也用失笑散二服而愈
地黃散 治產後惡血不盡腹中疼痛
生地黃 當歸 生薑
右為細末每服二錢空心溫酒調下
當歸血竭丸 治婦人產後惡露不下結聚成塊心
胸痞悶及臍下堅痛
當歸 血竭 芍藥
蓬朮 五靈脂
右為細末醋糊和丸如梧桐子大每服五拾丸食
前溫酒送下
澤蘭湯 治產後惡露不盡腹痛往來兼胸
滿少氣
澤蘭 生乾地黃 當歸
芍藥 生薑
甘草 大棗

右切水玖升煮取叁升分三服欲死塗□得活

□荷散　治產後血上衝心血刺血暈血氣腹痛惡露不快

荷葉　紅花　當歸

蒲黃　牡丹皮

右為細末每服貳錢空心鹽酒調下一服內童子小便調

又方　產後下血不盡腹內堅痛不可忍

當歸　芍藥　桂心

桃仁

右水陸升煮取貳升溫分兩服未差加大黃

又方　產後血結下不盡腹中絞痛不止

大黃　生乾地黃　當歸

川芎　桂心　芍藥

甘草　黃芩　桃仁

細切水柒升煮取貳升半入大黃煎三沸分溫三服

又產後血下不盡腹中痛無計

青木香　當歸　牛膝

川芎　黃芪　芍藥

大黃　芒硝

細切水柒升煮取貳升半入大黃更三沸分溫三服

又產後惡露不盡結聚小腹疼痛

當歸　製香附子　琥珀

沒藥　牡丹皮　赤芍藥

木香　桂心

右為細末以□酒調貳錢

產寶　治產後□□作□惡露者

桂心　蒲黃　酒調方寸匕血下甚妙

產乳方　芸苔散　產後惡露不盡血結刺痛名血瘕塊並治心腹諸疾

芸苔子　當歸　桂心

赤芍藥　細末酒調貳錢產後可常服

黑神散　治產後惡露不盡心胸痞悶臍腹撮痛污血諸疾

又治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂　香附米

右分和醋為丸甚者加留尖桃仁

救急療惡露不盡腹中痛　取亂髮如雞子大灰水洗垢淨燒存性末之酒調服貳錢

又療產後血不盡心腹痛悶方　取荷葉燒灰存性

熱湯和服煮取汁飲之亦良

又方 以鐵秤錘一枚燒赤投酒中[illegible]用此酒煮

當歸□兩取貳升去滓分溫再服千金同一方無

當歸

本事以產後惡露不盡腹痛及兒枕心腹刺痛不可疼痛

寒痛分為四門[illegible]胎中宿有血塊產後不與兒俱

下而仍在腹作痛謂之兒枕其痛[illegible]向作痛

皆胎中宿血凝聚不為兒枕也若惡露[illegible]或由

[illegible]枳實芍藥散[illegible]痛如神

[illegible]諸證之治[illegible]湯證自當別論故復臚列諸名方

[illegible] 門 女科五 [illegible]

[illegible]服枳實芍藥散不愈仍當求責瘀血也故下

瘀血湯當方附焉而補虛當方終之不復立寒疝條

金匱云產後腹痛煩滿不得臥枳實芍藥散主之

枳實芍藥散方

枳實燒令黑勿太過 芍藥各等分

右二味杵為散服方寸匕日三服并主癰膿以麥

粥下之

[雜]病證若因氣滯用延胡索散若因外寒用五積

散若因怒氣用四物加木香柴胡若因血虛用四

物參朮炮薑若因陽氣虛弱用四君當歸炮薑若

因脾虛血弱用六君[illegible]治之一產[illegible]患

前證或作[illegible]此脾氣虛也[illegible] 參理中湯

漸愈又以補中益氣[illegible] 後復作

痛而兼[illegible]仍用[illegible]湯[illegible]補脾[illegible]

師曰[illegible]以枳實芍藥散假令[illegible]此

為腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯主之

下瘀血湯方

大黃 [illegible] 桃仁 貳拾枚 䗪蟲 貳拾枚去足

右三味末之煉蜜和為肆丸以酒壹升煎壹丸取

捌合頓服之新血下如豚肝

產後 [illegible] 門 女科九 四之

保命方治血當血結或聚於胸中或偏於小腹或[illegible]

於脇肋四物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭羽紅花

玄胡索各壹兩同為粗末如下四味煎調沒藥散服

䗪蟲[illegible] 水蛭[illegible] 麝香[illegible]

沒藥

右為末入前藥調服血下痛止只服一服

千金桃仁芍藥湯 治產後腹痛

桃仁 半升 芍藥 川芎

當歸 桂心 乾漆 碎熬

甘草 各貳兩 細切水捌升煮取貳升半分三服

延胡索散　治産後臍下痛

延胡索　桂心各半兩　當歸壹兩

右為細末熱酒調下貳錢

香桂散　治産後臍下疼痛不止

川芎　當歸各壹錢半　桂心壹兩

右為細末分為三服每服酒一盞煎三五沸更入童便少許煎至柒分溫服甚者不過再服即瘥

又方

釜底墨研細　延胡索　劉寄奴

桂心　蒼閭子

右等分為末熱酒調下貳錢

紫金丸　治産後惡露不快腰痛小腹如刺時作寒熱頭痛不思飲食亦治久有瘀血月水不調黃瘦不思飲食並能治之亦可療心痛與失笑散同

五靈脂水淘去砂石焙　真蒲黃各等

右以好米醋調五靈脂慢火熬成膏次以蒲黃末搜和丸如櫻桃大每服一丸以水與童便各半盞煎至柒分令藥化溫服之少頃再一服惡露即下久有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下

當歸養血丸　治産後惡血不散發渴心腹疼痛及惡露不快臍下急痛連及腰脚疼痛

當歸　赤芍藥　牡丹皮

延胡索各[illegible]　桂心[illegible]

為末煉蜜丸如梧子大空心酒下叁拾丸

細嚼下

[illegible]治産後腹中㽲痛並治腹中寒疝虛勞不足

當歸生薑羊肉湯

當歸叁兩　生薑伍兩　羊肉壹斤

右三味以水捌升煮取叁升溫服柒合日三服若寒多者加生薑成壹斤痛多而嘔者加橘皮貳兩白朮壹兩　加生薑者亦加水伍升煮取叁升貳合服之

一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不得犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂有瘀血[illegible]投之[illegible]曰非其治也可服[illegible]二服遂愈

産後六七日忽然臍腹痛[illegible]由呼吸之間冷氣乘虛而入宜服當歸建中湯四順理中丸[illegible]丸飯飲吞下極妙

仲景内補當歸建中湯治婦人産後虛羸不足腹中

刺痛不止吸吸少氣或若少腹中急摩痛引腰背不
能飲食產後一月日得服四五劑為善令人強壯

當歸三兩　桂枝各三兩　芍藥六兩
生薑三兩　甘草二兩　大棗十二枚

右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日令盡若
其大虛加飴糖六兩湯成內於火上煖令飴消若
去血過多崩傷內衄不止加地黃六兩阿膠二兩
合八味湯成內阿膠服之

濟生增損四物湯　治產後陰陽不和乍寒乍熱惡
露停滯亦令寒熱但看小腹急痛為異

當歸去蘆　白芍藥　川芎
人參各一兩　甘草炙半兩　乾薑炮一兩

右㕮咀每服肆錢薑三片水煎無時熱服

千金治產後餘疾腹中絞痛瘦乏不下食

當歸　黃芪　芍藥各陸分
乾地黃　白朮各捌分　桂心
甘草各肆分　大棗廿枚

右㕮咀水貳升煮取捌合空心服忌生葱

丹溪云局方五積散治產後餘血作痛以蒼朮為君
麻黃為臣厚朴枳殼為佐雖有當歸芍藥之補血僅
及蒼朮三分之一不思產後之婦有何寒邪血氣未
充似難發汗借曰藥性溫和可以推陳致新豈可用
麻黃之悍附以蒼朮枳朴之散乎虛而又虛禍不旋
踵矣

[illegible]　治婦人產後腸中癢不可忍以針線袋安
所臥蓆下勿令人知　又方取箭簳及鏃安所臥席
下勿令婦知

腸脹痛

大凡産後肚腹脹滿氣痛由膀胱宿有停水因産後惡露下不盡水壅痞與氣相搏積在膀胱故令腸脇脹滿氣與水相激故令痛也愚按前證若肝經血瘀用玄胡索散若肝經氣滯用四君子加青皮柴胡若肝經血虛用四物參朮柴胡氣血俱虛用八珍柴胡若腎水不足不能生肝用六味丸若肺金勢盛剋制肝木用瀉白散仍參前各論主之一産婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛余以爲氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮薑而血頓止又用十全大補湯而寒熱漸退此證苟非用薑桂辛溫助脾肺以行藥勢不惟無以施其功而反助其脹耳

經効療産後血氣腸脇脹痛

當歸壹拾貳分 芍藥 苦梗

檳榔 枳殼各捌分 桂心

青木香 柴胡各陸分

右㕮咀以水貳升煎取捌合去滓空心分溫貳服

療産後惡露不下血氣壅痞腸脹痛不下食

蘇木 紫葛各拾貳分 芍藥

當歸各捌分 桂心 蒲黃各陸分

生地黃汁叁合

右㕮咀以水貳升煎取柒合下蒲黃分兩服

當歸散 治産後腹痛腸脇脹滿

當歸 乾薑等分

右爲末每服叁錢水壹盞煎捌分入鹽酢少許食前熱服

經効理血氣煩悶腸脇脹滿及痛

芍藥捌分 蒲黃 延胡索各肆分

當歸陸分 荷葉蒂炙赤叁枚

右水貳升煎取柒合後入蒲黃空心分作三服

療産後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微利

茯苓 人參 當歸

甘草各陸分 生薑 陳皮各肆分

厚朴捌分

右㕮咀以水貳升煎取捌合去滓分溫服

抵聖湯 治産後腹脇悶滿或嘔吐者

赤芍藥 半夏 澤蘭葉

陳皮 人參 甘草壹分

右㕮咀每肆錢薑伍片煎溫服

腰痛

本腎主腰腳產後腰痛者爲女人腎位繫於胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平復而風冷客之冷氣乘腰故令腰痛也若寒冷邪氣連滯背脊則痛久未已後忽有娠必致損動蓋胞絡屬腎腎主腰故也【附】前證真氣虛邪乘之者用當歸黃芪湯或十全大補爲主佐以寄生湯如不應用十全大補加附子一產婦腰痛腹脹善噫諸藥皆嘔余以爲脾虛血弱用白术一味炒黃每劑一兩米泔煎時飲匙許四劑後漸安百餘劑而愈

療產後風冷腰痛不可轉側四肢沉重行步艱難

獨活　川芎　芍藥炒黃

桂心　續斷　生薑

桑寄生各陸分　當歸　防風各捌分

右㕮咀以水八升煮取二升去滓空心分二服

千金大豆酒　療產後中風腰背強痛中風煩熱苦渴頭身皆重此因風冷及傷寒所致

用大豆壹升炒令熟以酒貳升投之密蓋令溫去豆服壹升日夜數服卧取微汗避風亦有加羌活服者亦佳

生料五積散加桃仁煎亦妙

滑血

保命治血瘀腹乃刺刺腰痛用四物湯細末叁兩加酒煮玄胡索末貳兩每服叁錢酒下

廣濟療產後虛冷血氣流入腰腿痛不可轉

敗醬　當歸各捌分　川芎

桂心　芍藥各陸分

右㕮咀水貳升煮取捌合分溫二服忌葱

救急療婦人產後餘血不盡血流入腰腳疼痛胸滿氣急兩脇痛方

生薑壹斤　淡竹葉切壹升

右二味以水貳升煮取壹升去滓分溫貳服

生地黃湯產寶　療產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手腳疼不下食

生地黃汁壹升　芍藥　甘草各貳兩

丹參肆兩　蜜壹合　生薑汁半合

右以水叁升煮取壹升去滓內地黃汁蜜薑汁微火煎一兩沸一服叁合日二夜三利一兩行中間進食與藥更進服

如神湯方附腰痛

產後惡露方行忽然漸少斷絕不來腰中重痛下注兩股痛如錐刀刺痛入骨中此由血滯於經絡不即

通之有大痛處必作癰瘀宜桃仁湯恐作癰者預服
五香連翹湯

桃仁湯方

桃仁去皮尖　蘇木　生地黄各半兩
虻虫去翅足炒　水蛭炒各卅枚

右為粗末每服叁錢水壹盞煎至陸分去滓溫服
無時惡露下即住服

五香連翹湯方 一方有大黄壹兩

木香　沉香　丁香
乳香　麝香　升麻各壹兩
獨活　桑寄生　連翹
木通各貳兩為粗末

每服伍錢水貳盞煎壹盞去滓入竹瀝少許溫服

紫金丸治產後惡露不快腰痛小腹如刺寒熱腹痛
久有瘀血月水不調亦可治心痛方見前

當歸黄耆湯 治產後腰痛不可轉側自汗壯熱身
體強氣短

黄耆　白芍藥各壹兩　當歸叁兩

右剉每服肆錢薑肆片水煎溫服

頭痛

夫人頭者諸陽之會也凡產後五臟皆虛胃氣虧
弱飲食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上湊于
頭陽實陰虛則令頭痛也　又有產後敗血頭痛不
可不知黑龍丹言之甚詳　評前證若中氣虛頭痛
用補中益氣湯加蔓荊子若血虛用四物加參朮氣血俱
虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎則痊
一產婦患頭痛日用補中益氣湯不缺已三年矣
稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加附子一錢數
劑不發　一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物
等藥不應腎水不能生肝木而血虛用六味丸加五
味子兩月而愈

川芎散 治產後頭痛

真天台烏藥皮　大川芎等分

右為細末每服叁錢燒紅秤錘淬酒調服

一奇散 治同前

取當歸川芎為細末每服貳錢水壹盞煎柒分溫
服

芎附散 治產後敗血作梗頭痛諸藥不效者

大附子壹枚釅醋壹碗用火四畔炙透蘸醋令盡

去皮臍別川芎各一兩並為末仍服[illegible]入[illegible]清
調下

當歸[illegible]一合[illegible]七日不食[illegible]
心[illegible]如[illegible]
[illegible]取大[illegible]久[illegible]心[illegible]以
十日[illegible]流滿[illegible]復[illegible]又以[illegible]
之[illegible]日不已[illegible]
中[illegible]下[illegible]平[illegible]消[illegible]下 一 行約三升
[illegible]痰[illegible]半已刻又行如前則[illegible]

丹一婦年三十餘產後身熱頭痛肚痛

陳皮 白朮 白芍藥各貳
黃芩 川芎 乾薑
牡丹皮 甘草 荊芥

右分四貼水煎服

加減四物湯 治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令
頭痛

蒼朮 羌活 川芎
防風 香附炒 白芷
石膏 細辛 當歸

甘草各[illegible]

右細末每服一兩[illegible]不拘時服 如有汗者細
氣虛頭痛也方中加黃芪參兩桂壹兩半[illegible]
如痰癖頭痛加半夏參兩茯苓壹兩[illegible]煎
如熱痰頭痛加白芷參兩石膏參兩知母壹兩
如寒厥頭痛加天麻參兩附子壹兩半生薑參片
煎服、

脚氣

大全 產後熱悶氣上轉為脚氣者何答曰產卧血虚生熱復因春夏取凉過多地之蒸濕因足履之所以著為脚氣其狀熱悶[illegible]心煩嘔吐氣上皆其候也可服小續命湯[illegible]兩三劑必愈若痛者從以逐敗血藥攻之則血去而疾益增矣 陳無擇評曰脚氣固是常病未聞產後能轉為者往往[illegible]金見產婦多有此疾之語使出是證文辭害意[illegible]可見矣設是熱悶氣上如何便服續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經脚氣要須依脚氣方論陰陽經絡調之此涉專門未易輕論既非產後要病更不繁引 陳無擇雖有此論然小續命湯加減與之用無不効設有閉寒中三陽所患必冷小續命湯主之若中三陰所患必熱小續命湯[illegible]大便[illegible]秘[illegible]最良[illegible]如無紫雪用真薄荷煎冷水嚼下[illegible] 薄荷煎當補氣血為上佐以小續命湯寄生湯如不應用大防風湯 產婦患前證或用獨活寄生湯而痊後復作服前湯其汗如水更加口噤吐痰余用十全大補湯培養血氣漸愈後飲食日少肌體日瘦吐痰如湧

此命門火衰脾土虛寒用八味丸及加味歸脾湯諸證漸退肌肉漸生

獨活寄生湯 治肝腎虛弱或久履濕冷之地或洗足當風濕痺内攻兩腿緩縱或痺弱或皮肉紫破足膝攣重又專治產後脚氣

川獨活(三兩) 桑寄生 杜仲(炒)
牛膝(酒浸) 細辛 官桂(不見火)
白茯苓 防風 川芎
當歸 人參 熟地黄
芍藥 秦艽(各貳兩) 甘草(炙)

右為㕮咀每服肆錢姜伍片水煎空心服

遍身疼痛

大全產後遍身疼痛者何各因產後百節開張血脈流散遇氣弱則經絡肉分之間血多流滯累日不散則骨節不利筋脉急引故腰背不得轉側手足不能動搖身熱頭痛也若誤以為傷寒治之則汗出而筋脉動惕手足厥冷變生他病但服趁痛散除之 薛立齋按若以手按而痛甚是血滯也用四物炮薑紅花桃仁澤蘭補而散之若按而痛稍緩此是血虛也用四物炮薑人參白朮補而養之 一產婦身腹作痛發熱不食煩躁不寐盜汗脇痛服解散祛血之藥不時

昏憒六脈洪大如無用補中益氣加炮薑半夏一劑而諸症頓退又劑飲食甘美但背強而痛用八珍散大補湯調理而安 一產婦遍身頭項作痛惡寒拘急脉浮緊此風寒之證也用五積散一劑汗出而愈但倦怠發熱此邪氣去而真氣虛也用八珍湯調補而痊 一婦人月產後多汗人倦不收衣被致汗出被裡冷則汗流得風遂疼痛遂以羌活續斷湯數服而愈

趁痛散治產後氣弱血滯遍身疼痛

牛膝　當歸　桂心

白朮　黃芪　獨活

生薑各半兩　甘草　薤白各二錢半

右㕮咀每服半兩水三盞煎至一盞半去渣食前服 陳無擇評曰趁痛散不特治產後氣弱血滯兼能治太陽經感風頭疼腰背痛自汗發熱若其感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發熱頭痛況有蓐勞諸證尤甚趁痛散皆不能療不若五積散入醋煎用却不妨

五積散加醋煎治感寒頭痛身疼方見傷寒門恐與

四物各半服之穩當加桃仁煎治腰痛逐敗血去風濕

【大】治產後遍身青腫疼痛及眾疾

牛膝　大麥蘗各等分

右為細末以新瓦罐子中填一重麥蘗一重牛膝如此填滿用鹽泥固濟火煅過赤放冷研為散但是產後諸疾熱酒調下二錢

活血

蒼朮四物各半湯

烏金散治產後骨節四肢疼痛

夫產後中風者由產時傷動血氣勞損[illegible]未
平復起早勞動致使氣虛而風邪乘虛入之故中風
風邪冷氣客於皮膚經絡但[illegible]不仁或乏少氣力大
凡筋脈挾寒則攣急喎僻[illegible]挾溫則縱緩[illegible]弱若入諸
藏[illegible]恍惚驚悸[illegible]斷其所傷[illegible]經絡而生病焉　郭稽
中論曰產後中風者何答曰產後五七日內強力下
床或一月之內傷於房室或懷憂怒[illegible]或因
食生硬傷動藏府得病之初眼濇口噤肌肉瞤搐漸
至腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶爾中風
所得也　薛[illegible]外邪[illegible]形氣不足病氣有餘

當補元氣爲主稍佐以治病之藥若強力不休月內
入房傷形氣俱不足當純補元氣多有復甦者若誤
投風藥乃促其危也
丹產後中風口眼喎斜必用大補氣血然後治痰當
以左右手脈分其氣血多少以治切不可作中風治
用小續命湯及發表治風之藥

防風湯　治產後中風背項強急胸滿短氣

防風　獨活[illegible]　葛根[illegible]
當歸　人參各[illegible]　白芍藥

甘草[illegible]各
右爲㕮咀每服捌錢水[illegible]
煎至[illegible]去滓溫服不拘時

川芎散　治產後中風[illegible]

川芎　羌活　酸棗仁
羚羊角　芍藥　桑白皮[illegible]
防風[illegible]
爲㕮咀每服[illegible]水[illegible]大[illegible]去滓不
拘時服日進三服

獨活茯苓湯　治產後風虛頭痛語[illegible]

茯苓[illegible]　防風[illegible]　乾葛[illegible]
麥門冬[illegible]　芍藥　黄芩[illegible]
犀角屑[illegible]　甘草[illegible]
右㕮咀每服[illegible]兩水[illegible]大[illegible]盞半煎至[illegible]盞去滓溫
服不拘時

鹿肉湯　治產後中風頭痛壯熱言語寒澀

鹿肉[illegible]　阿膠[illegible]　黄芩
茯神[illegible]　黄芪[illegible]　甘草[illegible]
白芍藥　人參　獨活[illegible]
桂心　乾地黄　川芎[illegible]

此方八分

右為末每服伍錢水煑豬肥肉伍錢［illegible］伍片
煎至［illegible］去豬肉再煎至［illegible］半入阿膠消化去柤
溫服不拘時日進二服

一方治產後中風半身手足不遂言語［illegible］恍惚多
忘精神不定

獨活　當歸　芍藥
防風　川芎　玄參
天麻各伍錢　桂心不見火

右㕮咀以水捌升煮取貳升半分為三服［illegible］效更
作一劑又作丸每服貳拾丸如有［illegible］
有冷加白朮伍錢　若有風［illegible］
手足不遂加牛膝［illegible］
若腹痛加當歸芍藥各柒錢半　若不冷加人參
伍錢玄參［illegible］兩　若寒中三陰所患必冷小續命
湯加生薑煎　若中三陽所患必熱小續命湯
去附子減桂心一半加薄荷煎

保命血氣湯　治產後諸風痿攣無力

秦艽　羌活　防風
白芷　川芎　芍藥

當歸　白朮　茯苓
熟地黃各等分

右為末一半蜜丸一半散［illegible］
治產後風虛五緩六急手足［illegible］
升炒令熟［illegible］升酒中［illegible］
小品治產後中風語澁四肢拘急［illegible］為末每
服伍錢水酒各半盞煎［illegible］溫服

華佗愈風散　治婦人產後中風口噤手足瘈瘲如
角弓或產後血暈不省人事四肢強直或心眼倒
築吐瀉欲死　川荊芥穗微焙為末每服叁錢豆淋酒
調服或童子小便服之口噤則挑齒灌之齗噤則
灌入鼻中其效如神大抵產後大眩則汗出而腠
理疎則易於中風也　時珍曰此方諸書盛稱其
妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立
待應效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老
錢煎湯服名一捻金王貺指迷方加當歸等分水
煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功
一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫
用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用
之果然昝殷產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂

氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥 見後○氏陳

治要訣名獨行散 賈似道悅生隨抄 呼為[illegible]

右產後中風用續命湯及石膏黃芩[illegible]參忝

詳氣血以四物四君子相兼各半[illegible]分兩服

之可也

虛極生風 大產後下血過多虛極生風者何答曰婦人以榮血為主因產血下太多氣無所主唇青肉冷汗出目眩神昏命在須臾者此但虛極生風也如此則急服濟危上丹若以風藥治之則誤矣 詳前證

若心脾血氣俱虛用十全大補湯如不應加附子鈎藤鈎若肝經血虛用逍遙散加鈎藤鈎經云脾之榮在唇心之液為汗若心脾二臟虛極急用參附湯救之一婦人患前證或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸鳴腹痛余以陽氣虛寒用六君子薑附各加至五錢不應以參附各壹兩始應良久不服仍腸鳴腹痛復灸關元穴百餘壯及服十全大補湯方效

濟危上丹

乳香　五靈脂　硫黃

玄精石 研極細　阿膠 炒脆　卷柏 生用

桑寄生　陳皮 去白各等分

右將上四味同研停於銀石器內微火炒[illegible]再研極細復入餘藥為末拌勻生地黃汁[illegible]丸如梧子大每服貳拾丸溫酒或當歸酒送下食前

當歸建中湯 見虛勞後

口噤 大產後中風口噤者是血氣虛而風入於頷頰夾口之筋也手三陽之筋結入於頷產則勞損臟腑傷於筋脈風若乘之其三陽之筋脈則偏搐之筋得風冷則急故令口噤也

葛根湯　治產後中風口噤仆地頭目眩暈痰盛氣急及治產後諸疾

葛根　生薑 各六兩　獨活 去蘆四兩

當歸 去蘆各三兩　甘草 炙　桂心

白茯苓 去皮　石膏　人參 去蘆

白朮　防風 去蘆　川芎 各二兩

右為㕮咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞半去滓溫服無時日進三服

乾葛湯　治產後中風口噤不能言

獨活 去蘆兩　乾葛 各半兩　甘草 炙

生薑 壹兩半

右為㕮咀每服壹兩水貳大盞煎至壹大盞去滓

溫服無時

天麻散　治產後中風口噤

天麻　白附子炮　天南星炮

半夏[illegible]　乾蝎[illegible]各[illegible]

右爲細末每服一錢生薑薄荷酒調下急用口灌之不拘時

當歸散　治婦人產後中風牙關緊急不省人事口吐涎沫手足瘈瘲

當歸去蘆　荊芥穗各等分

右爲細末每服二錢水一盞酒半盞煎至一盞灌之如牙關緊急斡開微微灌之但下咽即生屢用救人大有神效

伏龍肝散　治產後中風口噤不能語腰背疼痛

伏龍肝一兩　乾薑炮半兩

爲細末每服二錢溫酒調下不拘時候二三服

交加散　治產前後百病兼治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚爲瘕產後中風並宜服之

生地黃一斤研取汁　生薑十二兩研取汁

右先將地黃汁炒生薑滓生薑汁炒地黃滓各稍乾焙爲細末每服三錢溫酒調下尋常腹痛亦宜服產後尤不可離

產後風痙　大夫產後[illegible]風入諸陽之經也人之陰陽經絡[illegible]虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀也　薛曰產後發痙因氣血耗損腠理不密汗出過多而患之者乃虛象也宜固氣血爲主佐以本方[illegible]宜大補氣血爲先佐以本治之如[illegible]乃氣血虛甚之極也宜大劑參芪芎歸[illegible]如不應急用炮附子再不應用人參[illegible]附子二錢名參附湯猶未應乃藥力未能及也宜多用之

愈風散　當歸湯　羌活酒並見[illegible]

羚羊角散　治產後中風身體反張

羚羊角屑　當歸酒浸　獨活

防風去蘆　麻黃去根節各　人參去蘆

赤芍藥　細辛去苗　桂心各半兩

右爲㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓溫服不拘時

小品療產後中風虛人不可服他藥者一物獨活湯

主之及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煮之

川獨活（叁兩 細切）

右水叁升煮取壹升分服奈酒者亦可酒水煮

一物白鮮湯　用白鮮皮亦依獨活法

産後中風痙口噤面青手足急強者

以竹瀝壹升分為五服溫溫頻服大効

治産後中風角弓反張口噤不語方

川烏（[illegible]）

右取黑豆半升同炒半黑以酒叁升傾於鐺內急攪以絹濾取酒微溫服壹小盞取汗若口不開者

產寶　八　女科九　七十

斡開口灌之未効加烏雞糞壹合炒熟入酒中服之以汗為度

千金雞矢醴　療產後中風及男子諸風并產後百疾神効方又治產後中風口噤拘困為腰背強直時時反折

烏雞屎（叁升）　大豆（貳升）

右先炒豆令聲絕次炒雞屎令黃以酒壹升先淋雞屎取汁淋大豆每服壹升重者凡四五服極妙

紫宋伯　療產後中風風痙偏身冷直口噤不識人方

白术（肆兩 細切）以酒叁升煮取壹升頓服効

汗出多而變痙　本產後血虛[illegible]故多汗出[illegible]風邪搏之則變痙痙者口噤不開背強而直如發癇狀搖頭馬鳴身反折須臾十發氣息如絕宜速斡口灌小續命湯稍緩即汗出如雨手拭不及者不可治也

治產後發痙因大血過多元氣[illegible]以致牙關緊急四肢痙強或腰背反張[illegible]有汗而不惡寒者曰柔痙若無汗而惡寒[illegible]產後患之實由亡血過多筋無所養而致傷寒汗下過多溺濕腠血大泄多患之乃敗症也[illegible]血氣多損無復若攻風邪死無疑矣　一產[illegible]

產寶　八　女科[illegible]　七十[illegible]

為痙并及張四肢抽搐兩目連劄余以為[illegible]元氣虧損陰火熾盛用十全大補加桂[illegible]又數劑而安　余在吳江史萬湖[illegible]云其家人婦忽汗出閉緊[illegible]出血[illegible]傷血[illegible]加附子[illegible]人推正其身一人以[illegible]牙關其口將續命灌之不能嚥已[illegible]正其面復灌以藥又灌如此[illegible]灌以熟藥遂甦　東堅志云[illegible]四日爽癇數眼頭背反張壬以為痙病與大豆紫湯獨

活湯而愈政和間余妻方分娩猶在蓐中忽作此證頭足反接相去幾二尺家人驚駭以數婢強拗之不直適記所云而藥肆有獨活乃急爲之召醫未至連進三劑遂能直醫至即愈矣更不須用大豆紫湯古人處方神驗屢矣

小續命湯　治産後中風及剛痓柔痓

陳臨川云雖然陳無擇評曰産後汗出多變痓亦令服續命湯此又難信既汗多如何更服麻黄官桂防已黄芩並不若大豆紫湯爲佳局方大聖散亦良藥也愚觀朱奉議云凡剛柔二痓小續命湯

並可加減與之若柔痓自汗者去麻黄加葛根之說朱奉議必有所據雖大豆紫湯大聖散良亦不可偏見曲說有妨古人之意

大豆紫湯　治中風頭眩惡風自汗吐冷水及産後百病或中風痱痓背強口噤直視煩熱脉緊大者不治　小品方主産後中風困篤背強口噤或但煩躁或頭身皆重或身重癢發嘔吐直視並宜服之

川獨活去蘆壹兩半　大豆半升　酒叁升

右先用酒浸獨活煎一兩沸別炒大豆極焦烟出

急投酒中密封候冷去豆每服[illegible]

則愈日進十服此藥能去風消血[illegible]

胎死腹中服此得瘥

陳臨川云凡産後[illegible]皆名

曰瘛又名曰瘲[illegible]陰陽

而治今産寶諸書有中風[illegible]門又有角弓反

張一門其實一也如增寒發熱有類傷寒皆不論

及豈可只以一二藥治之

大豆湯　治産後中風[illegible]及妊娠挾風兼治[illegible]之間諸般病證

大豆[illegible]　獨活[illegible]　葛根[illegible]

防已[illegible]

右㕮咀每服伍錢酒[illegible]温服

不拘時日三服

羚羊角飲子　治産後風[illegible]服滿心中煩熱渴欲飲水欲成剛痓[illegible]疾

羚羊角[illegible]　防風　羌活

桔梗[illegible]　敗醬[illegible]　桂心

柴胡[illegible]　大黄[illegible]

爲㕮咀每服五錢水壹大盞半同煎至壹盞去柤

溫服不拘時候更服地黃酒用地黃切壹升炒令黑甆瓶中下熱酒叁升密封口煮令減半任意服之

防風當歸散

防風　當歸　川芎

地黃各壹兩

右剉每服壹兩水叁盞煎至壹盞溫服

薛氏云續命湯大豆紫湯舉卿古拜散太陽厥陰藥也邪實脉浮弦有力者固宜但產後血氣大虛之人不宜輒發其表但用防風當歸散治之為妙

瘈瘲

瘈者筋脉拘急也瘲者筋脉弛縱也經云肝主筋而藏血蓋肝屬陽為火肝血為陰為水前證因產後陰血去多陽火熾盛筋無所養而然耳故癰疽膿水過多金瘡出血過甚則陽隨陰散亦多致此治法當用八珍加丹皮鈎藤以生陰血則陽火自退諸證自愈如不應當用四君芎歸丹皮鈎藤以補脾土蓋血生於至陰至陰者脾土也故小兒吐瀉之後脾胃虧損亦多患之乃虛象也無風可逐無痰可消若屬陽氣脫陷者用補中益氣加薑桂陰陽俱脫者用十全大補加附子亦有復生者此等證候若肢體惡寒脉微細者此為真狀若脉浮大發熱煩渴此為假象惟當固本為善若無力抽搐戴眼反折汗出如流者皆不治

一產婦因勞兩臂不能屈服蘇合香丸肢體痿軟汗出如水余謂前藥辛香耗散真氣腠理虛而津液妄泄也先用十全大補加五味子麥門實腠理收斂真氣汗頓止又佐以四君子調補元氣漸愈用逍遥散大補湯調理而痊

一產婦先胸脇乳內脹痛後因怒口噤吐痰臂不能伸小便自遺左三部脉弦余謂此肝經血虛而風火所致不能養筋先

用加味逍遙散治之脅能歸作又以補肝散六味丸
治之痊愈　一婦人發痓搐搦自汗面赤或時作泣
飲食如故肝脈弦緊看曰此肝經血燥風熱名痓也
肝主小便其色青入心則赤法當滋陰血清肝火遂
用加味逍遙散不數劑諸證悉退而安　一婦人產
後血風患此以小續命湯數服而安
產後因虛傷風發痙因傷寒表證未傳入裏宜服防
風湯
防風湯　治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍惚狂
言來去無時不自覺悟亦治脚氣緩弱甚效此藥

溫和不虛人
秦艽去蘆土　獨活去蘆　麻黃去節
半夏湯洗七次切片　防風去蘆各一兩　升麻
防己　白朮　石膏煅
芍藥　黃芩　甘草
當歸去蘆　遠志去骨　人參去蘆各半兩
右為粗末入半夏片令勻每服肆錢水一盞半生
薑七片煎至一盞去滓取清汁陸分入[illegible]
少許食後臨卧溫服
愈風湯即華佗愈風散　交加散即當歸散見前婦人中風

增損柴胡湯　治產後感異證手足牽搐涎潮昏悶
柴胡去蘆八錢　黃芩去蘆四錢　人參
甘草炙　半夏各四錢　知母壹錢
石膏二錢　黃芪二錢
右㕮咀分二服水二盞薑五片棗二枚煎捌分不
拘時服
秦艽湯　前證已去次服此藥去其風邪
秦艽　芍藥　柴胡各一錢
甘草炙各壹錢　黃芩　防風各壹錢
人參　半夏各壹錢

右為㕮咀分二貼每貼水二盞薑三片煎捌分食
遠服

產後中風筋脉四肢攣急者是氣血不足藏府俱虛月内未滿起早勞役動傷藏府虛損未復爲風所乘風邪冷氣初客於皮膚經絡則令人頑痹不仁羸乏少氣風氣入於筋脉挾寒則攣急也　蓋肝屬木而主筋前證若肝經風熱血燥用加味逍遥散如不應當用六味地黄丸以補腎水經云風客淫氣精乃亡邪傷肝也仍參前雜證諸風血方論治之　一產婦筋攣癖欬肌肉掣動此氣血俱虛而有熱也用十全大補湯而安　一產婦手麻服愈風丹遍身皆麻神思倦怠余謂氣血虛弱用十全大補加炮薑數劑漸愈又數劑及逍遥散而痊

羚羊角散　治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強急

防風　羌活　當歸各去蘆
酸棗仁一兩　羚羊角屑　防風去蘆
牛蒡子炒　桂心　赤芍藥各半兩

右爲㕮咀每服四錢水壹大盞半煎至壹大盞去柤溫服不拘時

薛前方如未應當用八珍湯更不應當用十全大補湯

防己膏　治產後中風四肢筋脉攣急身體麻痺並宜用之

漢防己半斤去皮　茵芋伍兩

右爲㕮咀用酒五升浸藥一宿取豬肪脂壹斤文武火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處以熱手不住摩膏上

不語

夫人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語但服七珍散　薛按經云大腸之脉散舌下又云脾之脉是動則病舌本強不能言又云腎之別脉上入于心繫舌本虛則不能言竊謂前證若心腎氣虛用七珍散腎虛風熱地黃飲大腸風熱加味逍遙散加防風白芷脾經風熱秦艽升麻湯肝經風熱柴胡清肝散加防風白芷脾氣鬱結加味歸脾湯加升麻肝木太過小柴胡加鈎藤鈎脾受土侮六君加升麻白芷鈎藤鈎肝脾血虛用佛手散脾氣虛用四君子氣血俱虛八珍湯如不應用獨參湯更不應急加附子補其氣而生其血若竟用血藥則誤矣　一產婦不語用七珍散而愈後復不語內熱晡熱肢體倦怠飲食不進用加味歸脾湯爲主佐以七珍散而愈後因怒不語口噤腰背反張手足發搐或小便見血面赤或青或黃或時兼赤余曰面青肝之本色也黃者脾氣虛也赤者心血虛也用八珍湯加鈎藤鈎茯苓遠志漸愈又用加味歸脾湯而痊

七珍散

人參　石菖蒲　生地黃

川芎各壹兩　細辛壹錢　防風

辰砂[illegible]各

右爲極細末每服[illegible]薄荷湯調下無時

胡氏孤鳳散　治產後閉目不語用白礬末[illegible]熟水調下

治產後不語

人參　石蓮肉不去心　石菖蒲各等分

右每服伍錢水煎

逐血補心湯　治產後失音不語

紅花　赤芍藥　生地黃

桔梗　蘇葉　前胡

茯苓　防風　牛膽南星

黃連　粉葛各貳錢　當歸各叁錢

薄荷　人參　升麻各壹錢伍分

半夏[illegible]

右剉爲散分作二服每服水壹鍾半薑叁片煎至柒分空心服滓再煎服

狂言譫語

凡大產後語言顛倒或狂言譫語如見鬼神者其源不一須仔細辨證用藥治療產後驚風言語亂道如見鬼神精神不定者研好朱砂酒調下龍虎丹作丸作一服與琥珀地黃丸服之 一則因產後心虛敗血停積上干於心而狂言獨語者當在乍見鬼神條求之 二則產後臟虛心神驚悸志意不安言語錯亂不自覺知神思不安者當在驚悸條求之 三則宿有風毒因產心虛氣弱腰背強直或歌哭嗔笑言語亂道當作風痙治療當在心驚中風條求之

四則產後心虛中風心神恍惚言語錯亂當在中風恍惚條求之 五則產後多因敗血迷亂心經而顛狂言語錯亂無常或暈悶者當於本卷血暈類中求之 六則因產後感冒風寒惡露斬然不行增寒發熱如瘧晝日明了暮則譫語如見鬼狀當作熱入血室治之宜琥珀地黃丸及四物湯只用生乾地黃加北柴胡等分煎服如不退者以小柴胡湯加生乾地黃如黃芩分兩煎服愈雖然已上諸證大抵胎前產後自有專門一定之法毫髮不同如產後首當逐散生新然後仔細詳辨疾證不可妄立名色自生新

意加減方藥大宜對證依古法[illegible]若[illegible]於[illegible]攻痰則誤矣 一產婦形[illegible]用柳散消食又用加味[illegible]湯而愈又因怒仍狂[illegible]小便下血[illegible]又佐以加味歸脾湯而安

奪命散 血暈 治產後敗血衝心發熱狂言奔走脈虛大者

乾荷葉 生乾地黃 牡丹皮等分

右三味濃煎湯調生蒲黃末貳錢匕一服即定

局方妙香散治產後心神顛倒語言錯亂如見鬼神用生乾地黃當歸二味煎湯調服立效

烏金散 治產後三五日或半月之間忽狂言亂語目見神鬼等證

當歸 遠志肉 川芎

酸棗仁 白朮 赤芍藥

香附子 辰砂另研入 熟地黃

羌活 防風各壹錢 茯神去木

半夏 全蠍 麥門冬

人參 牛膝 天麻各壹錢

甘草 㕛分　陳皮　白芷 各壹錢

右剉散作二服水壹鍾半薑叁片葱三枝入金銀同煎壹碗不拘時溫服

四物補心湯　治産後言語恍忽顛倒錯亂

當歸 伍錢　川芎　生地黄

白芍藥　茯神　半夏

桔梗　白术 各肆錢　陳皮 叁錢

甘草 壹錢

右剉爲散分作六服每服用水壹鍾薑叁片煎至柒分空心溫服滓再煎服　有熱加酒炒黄連貳錢無熱不用

　

癲狂

一因産後因驚敗血衝心昏悶發狂如有鬼祟宜用局方大聖澤蘭散 加好辰砂研令極細每服加壹字許煎酸棗仁湯調下　一服可安　薛立齋乃血虚神不守舍非補養元氣不可治　參後各門互用

一産婦患前證或用大澤蘭湯而愈後又怔忡妄言其痰甚多用茯苓散補其心虚頓愈又用八珍散加遠志茯神養其氣血而痊　一産婦亦患此證用化痰安神等藥病益甚神思消鑠余以爲心脾血氣不足用大劑參术芎歸茯神酸棗仁四斤餘而安乃以歸脾湯五十餘劑而愈

　

大聖澤蘭散　治婦人血海虚冷久無子息及産後敗血衝心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便得無恙治墮胎腹中攻刺疼痛横生逆産胎衣不下血運血癖血滯血崩血入四肢應血藏有患及諸種風氣或傷寒吐逆咳嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎藏虚冷數曾墮胎崩中不定因此成疾室女經脉不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退風冷消除諸病兼療丈夫五勞七傷虚損等病

澤蘭葉　石膏(研)　[illegible]
白茯苓(去皮)　防風　厚朴
細辛　柏子仁　桔梗
吳茱萸　五味子
人參　藁本　乾薑
川椒　白芷　白朮
黃芪　川烏頭(炮去皮臍)　丹參(各[illegible])
蕪荑(微炒赤)　甘草(炙)　川芎
芍藥　當歸　白薇
阿膠　肉桂　生乾地黃
[illegible]
右為細末每服二錢空心臨卧熱酒調下若急疾不拘時日三服
何氏方治產後因敗血及邪氣入心如見祟物顛狂用大辰砂[illegible]錢重研令極細用乳三四茶脚許調仍掘紫項活地龍一條入藥候地龍滾三滾取出地龍不用不令帶藥出但欲得地龍身上涎耳却入無灰酒與前乳汁相和七八分盞重湯溫過遂作分三服

乍見鬼神

[論]心者身之主血脈因產傷耗血脈心氣虛則敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛錯醫人不識呼為風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦一捻得睡即安

[附]前證若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮薑若心血虛損用柏子仁散大抵此證皆心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之過也　一產婦患前證或用調經散愈而復作仍服前藥益甚痰涎上湧朝寒暮熱余朝用八珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

一婦治產後發熱狂言奔走脈虛大者四物湯加柴胡如不愈加甘草柴胡生地黃等分煎服亦可

一婦治產後血迷心悶不識人神言鬼語氣急欲絕

調經散

沒藥　琥珀(並細研)　桂心(各壹錢)
芍藥　當歸(各壹錢)　麝香(研)
細辛(各半錢)

又爲細末每服半錢小麥汁溫酒各少許調服

琥珀散 治產後血邪心神恍惚言語失度睡臥不安

辰砂別研 人參 龍齒研

琥珀研 赤茯苓 黃芪

牛膝各半 生地黃各壹兩 桂心半兩

右爲細末每服貳錢水壹盞煎至柒分不拘時去滓溫服

治方產一日言語顛倒用蘇合香丸壹錢以童便調服即甦

柏子仁散 治產後狂言亂語皆因內虛敗血挾邪氣攻心

柏子仁 遠志去心 人參

桑寄生 防風 琥珀別研

當歸 生地黃焙 甘草各等分

右爲粗末先用白羊心一箇切片以水壹大盞半先煮至玖分去羊心入藥末伍錢煎至陸分去滓無時服

與前顛狂條同語門參看

驚悸

大產後臟虛心神驚悸者由體虛心氣不足心之經爲風邪所乘也[illegible]於心則驚不自安[illegible]不寧而不能動[illegible]弱則爲悸[illegible]心血一虛神氣不守[illegible]所由作也當補血氣爲主

一產婦患前症[illegible]服[illegible]妙香散[illegible]散隨劾再患服之其病益甚而脈浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱虛用八珍加大劑[illegible]二湯各

百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

一產後心悶氣短不眠[illegible]如痴狀心悸[illegible]氣虛痰盛成風也[illegible]用[illegible]

但[illegible]不可[illegible]當大補氣血爲主可用十全大補湯以補元氣如不應急加附子[illegible]服不當治[illegible]一產婦患此不省人事[illegible]

後宜服虛浮無力余謂血氣虛寒用十全大補湯
十餘劑不應又二十餘劑稍緩乃兩尺脈
服數劑諸症減二三又二十餘劑十退三四乃大附
子五分數劑諸症頓退而安又發乃如前
二五分而愈

白茯苓散　治產後心神驚悸言語失常心神昏憒

白茯苓　熟地黃　人參
遠志　白芍藥　黃芪
桂心　當歸　川芎
麥門冬 各壹兩去心　石菖蒲　炙甘草

右為㕮咀每服四錢水壹大盞半生薑伍片棗叁
枚竹葉叁柒片煎至壹大盞去滓溫服無時

熟乾地黃散　治產後心虛驚悸神思不安

熟乾地黃　黃芪　白薇
龍齒　人參　茯神 去木
羌活　遠志肉 各壹錢半　桂心
防風　甘草 炙各

右為㕮咀每服五錢水壹大盞半生薑五片棗叁
枚煎至壹大盞去滓溫服不拘時

產乳七寶散　初產後服之調和血氣補虛安心神

鎮驚悸

朱砂 水飛　桂心　當歸
川芎　人參 去蘆　白茯苓
羚羊角 燒存性各　乾薑 錢

為細末每服壹錢用羌活豆淋酒調下　不
飲酒用清米飲調下　如覺心煩熱悶以麥門冬
去心煎湯調下若心下煩悶而痛用童便調下若
覺心胸煩熱即減乾薑桂覺寒却加之腹痛加當歸
心悶加羚羊角心虛氣怯加桂心不思飲食或惡
心加人參虛煩加茯苓以意斟酌日二夜一服之

□臟大効牡丹散　治血臟虛風及頭目不利不思
飲食手足煩熱肢節拘急疼痛胸膈不利大腸不
調陰陽相干心驚怯悸或時旋運

牡丹皮　川芎　枳殼 麩炒各
陳皮　玄胡索　甘草 壹兩
羌活　半夏 湯洗各　木香
訶子肉　芍藥 各　三稜 炒
乾薑 炮　桂心 各伍錢　當歸 壹兩
白朮 炒叁錢

右為細末每服貳錢水壹盞半煎至七沸食前溫

腹中血滿其[illegible]消[illegible]痰實腰背[illegible]理血氣

又別及風虛[illegible]熱[illegible]

治產後[illegible]不足心神[illegible]恍惚意不安腹

中[illegible]心神恍惚不安

遠志 麥門冬 去心 黃芪

當歸 人參 白朮

獨活 [illegible] 去皮 桂心

白茯苓 石菖蒲 熟乾地黃

山茱萸 鍾乳粉 阿膠 杵碎炒各壹兩

右為細末煉蜜和搗五七百下丸如梧桐子大每

服[illegible]溫酒送下不拘時候日進二服

人參丸 治產後心虛驚悸神志不安

白茯苓 去皮 熟乾地黃 各壹兩 人參 去蘆

桂心 遠志 去心 石菖蒲

柏子仁 琥珀 各半兩別研細

右為細末煉蜜和搗三二百下丸如梧子大每服

參拾丸不拘時粥飲送下

右[illegible]但用[illegible]脈遲且致昏憒之

人參散 治產後臟虛心怔驚悸言語錯亂

人參 去蘆 麥門冬 去心各 牛黃 研

白薇 各半錢 茯神 去木 獨活

防風 各去蘆 遠志 去心 生地黃

朱砂 水飛 天竺黃 研 甘草 炙

龍齒 研各 [illegible] 麝香 各研各半錢

右為細末每服二錢薄荷湯調下不拘時

琥珀地黃散 治產後驚悸及產後敗血諸疾

辰砂 [illegible] 沒藥 各[illegible]

當歸 各[illegible]

右為細末每服二錢空心白湯調下日三服

茯苓散 療產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛

風邪所致

茯苓 一兩 或茯神 一方用 生地黃 各壹二兩 遠志

白薇 龍齒 [illegible] 防風

人參 獨活 [illegible]

右以銀石器大斤水[illegible]升煮取米升下諸藥煮

取癸升溫分三服[illegible]

[illegible]

療產後多虛羸弱若大[illegible]利皆至於死此重虛故也

若中風語謬昏悶不知人者宜服此

人參 茯苓 [illegible] 羌活

大棗 遠志各貳兩 竹瀝壹升

右用水陸升煮取叁升下竹瀝更煎取貳升半分三服

抱膽丸 治產後血虛驚氣入心及癲癇風狂或室女經脈通行驚邪蘊結

水銀貳兩 黑鉛壹兩半 朱砂壹兩細研

乳香壹兩細研

右將黑鉛入銚子內鎔化下水銀結成砂子次下朱砂滴乳末乘熱用柳木搥研勻丸如芡實大每服一丸空心金銀薄荷湯化下得睡切勿驚動覺來即安 妙香散亦善

恍惚

夫產後中風恍惚者由心主血血氣通於榮衛臟腑遍循經絡產則血氣俱傷五臟皆虛榮衛不足即為風邪所乘則令心神恍惚不定也 治法當大補血氣為主而佐以後方為當蓋風為虛極之假象也固其本源諸病自退若專治風則速其危矣 一產婦患前證盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加炮薑脾二湯始應後因勞怒發厥昏憒左目牽緊兩手抽動下便自遺余謂肝火熾盛用十全大補加鉤藤山梔而安再用十全大補湯辰砂遠志丸而愈

千金療產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆因心虛所致

茯苓叁兩 芍藥貳兩 甘草

桂心 當歸各壹兩 生薑壹兩半

麥門冬去心 大棗弍拾枚

右為散水叁升煎取壹升去滓分作兩服

經効療產後心虛忪悸志意不定煩躁恍惚

茯神 當歸 黃芩

麥門冬去心 甘草 人參

芍藥炒　酸棗仁　白鮮皮各等分
大棗參枚
右為粗末水貳升煮取柒合去滓溫服
琥珀散　治產後中風恍惚語澁心神煩悶四肢不
隨
琥珀另研　茯神去木各　遠志去心
石菖蒲　黃芪　防風
獨活　人參各壹兩　麥門冬去心
川芎　桑寄生　赤芍藥
羚羊角屑各半兩　甘草貳錢半炙

右為㕮咀每服五錢水壹中盞半煎至壹大盞去
滓溫服不拘時
遠志散　治產後中風心神恍惚言語錯亂煩悶睡
卧不安
遠志去心　防風去蘆各壹兩　麥門冬去心
酸棗仁炒　桑寄生　獨活去蘆
桂心　當歸去蘆炒　茯神去木
羚羊角屑各柒錢半　甘草炙半兩
右為㕮咀每服伍錢煎服法同前
天麻丸　療產後中風恍惚語澁四肢不隨

天麻　硃砂水飛　防風去蘆
羌活各去蘆壹兩　僵蠶炒柒錢半　乾蝎炒
白附子炮　五靈脂炒各半兩　雄雀糞炒
牛黃另研各貳錢半
右為細末糯米飯為丸如梧子大每服貳參拾丸
薄荷酒送下日進二服
辰砂遠志丸　主產後中風消風化痰安神鎮心
石菖蒲　遠志肉甘草煮　人參
茯神去木　辰砂各伍錢　川芎
山藥　鐵粉　麥門冬去心

細辛　天麻　半夏湯泡
南星　白附子各壹兩
右為末薑汁煮糊丸如菉豆大別以朱砂為衣每
服叄拾丸夜卧生薑湯吞下

虛煩

薛論見發熱條 四物湯加茯神遠志治產後虛煩

十全大補湯尤効

餘血奔心

大餘血奔心蓋是分娩了不便與童子小便幷擀心

下及臥太速兼食不相宜之物所致但能依方療之

無不痊可

療產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛

川芎 生乾地黃 枳殼

芍藥各等分 右為散服方寸匕日三服

集驗療產後血氣煩方 千金同

生地黃汁 清酒各壹升

右相和煎壹沸分為兩服

濟療血氣煩悶方 生藕汁飲貳升効竹瀝亦得

療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉炙令黃香 延胡索貳兩 地黃汁貳合

右水貳升煮二味取捌合下延胡索分三服空心

忌肉食一日

療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕

羊血壹盞頓服若不定更服立効

經効療產後氣血冷搏於血血氣結滯上衝心腹脹

滿

當歸 桂心 川芎 吳茱萸

橘皮 生薑各壹兩 芍藥貳兩

右㕮咀以水叁升煮取壹升去滓空心服

治產後餘血奔心

用陳白梅捶碎濃煎湯飲

金黃散 治產後惡血衝心時發狂走

玄胡索 蒲黃各半兩 桂心貳錢半

右為細末烏梅煎湯冷調下貳錢

沒藥丸 治產後心胸煩躁惡血不快

沒藥研 蠻薑 延胡索

乾漆炒 當歸 桂心

牛膝 牡丹皮 乾薑各等分

右為細末醋煮麵糊丸如梧桐子大煎麵湯下叁

丸至伍拾丸

補遺治產後餘血衝心煩悶腹痛 用蒲黃多少炒

紙炒為末每服貳錢東流水煎湯調下 又失笑散亦佳

悶絕

治產後氣欲絕心中煩悶竹葉湯

竹葉切細 麥門冬 小麥各壹升

甘草壹兩 生薑貳兩 大棗拾伍枚

右切以水壹斗煮竹葉小麥至捌升去滓納餘藥煮取叁升去滓溫服虛悸加人參貳兩少氣力加糯米伍合

甘竹茹湯 治産後內虛煩熱短氣方

甘竹茹壹升 人參 茯苓

甘草各壹兩 黃芩叁兩

右㕮咀以水陸升煮取貳升去滓分三服日三

人參當歸湯 治産後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱令人心煩短氣自汗頭痛

熟地黃 人參去蘆 當歸身去蘆

肉桂去粗皮 麥門冬去心各貳錢 白芍藥炒各壹錢半

血熱甚者加生地黃貳錢

右貳錢粳米壹合竹葉拾片煎至壹鍾食遠服

薤白湯 治産後胸中煩熱逆氣方

薤白 半夏 甘草

人參各貳兩 栝樓根貳兩 麥門冬半升

右㕮咀以水壹斗叁升煮取肆升去滓分伍服日三夜二熱甚加知母壹兩

雲岐治産後虛煩不得眠芍藥梔豉湯

芍藥 當歸 梔子各伍錢 香豉半合

右如梔子豉湯修服産後傷寒便同下後變證法

[illegible]

仲景二物黃芩湯 婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩壹兩 苦參貳兩 乾地黃肆兩

右三味以水捌升煮取貳升溫服壹升多吐下蟲

婦人産中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之

生竹茹 石膏各貳分 桂枝

白薇各壹分 甘草柒分

右五味末之棗肉和丸彈子大每以飲服壹丸日三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加柏實壹分

尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知産後與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死

經驗方 治産後煩躁禹餘糧壹枚狀如酸餡者入地埋一半四面築緊用炭壹秤發頂火壹斤煆去火三分耗二爲度用濕沙土罨一宿方取出打去外面一層只用裏內細研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍用甘草煎湯調貳錢匕一服立効

渴

一產後心煩發渴宜清心蓮子飲（方見淋病門）○前證若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白朮茯苓丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛發熱用八珍加麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散 一產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以為血氣俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復

熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

熟地黃（酒洗蒸焙壹錢半） 人參（去蘆）
麥門冬（去心各壹錢） 瓜蔞根（貳錢） 甘草（炙半錢）

右作一服水貳鍾糯米壹撮生薑叁片紅棗叁枚同煎至壹鍾不拘時服

產寶療產後大渴不止

蘆根（壹兩） 瓜蔞 人參
甘草 茯苓（各叁兩） 大棗（貳拾枚）
麥門冬（肆兩）

右以水玖升煮取叁升分三服頻服（忌熱物）

藥錄

黃芩散 治產後血渴飲水不止

黃芩 麥門冬（各等分）

㕮咀每服叁錢水壹盞半煎捌分去滓溫服無時

栝蔞根湯 療產後血渴

栝蔞根（肆兩） 麥門冬（去心） 人參（叁兩）
生乾地黃 甘草（炙各貳兩） 土瓜根（伍兩）
大棗（貳拾枚）

㕮咀以水捌升煮取貳升半分三服

千金竹葉湯 療產後虛渴少氣力

竹葉（叁升） 甘草 人參
茯苓（各壹兩） 小麥（伍合） 生薑
半夏（各叁兩） 麥門冬（伍兩） 大棗（拾伍枚）

右㕮咀以水九升先煮竹葉小麥薑棗取柒升去滓內藥再煎取貳升去滓一服五合日三夜一

七味白朮散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致者

人參 白朮（炒） 木香
白茯苓 甘草（炒） 藿香

乾葯各等分　右水煎服

竹葉歸芪湯　治胃氣虛弱口乾作渴惡心[illegible]

竹葉五錢　黃芪　白朮

人參　當歸　麥門冬

甘草伍分　右水煎服

玄胡索散　治產後失血渴不止

鬱金　乾葯　桂心

青皮　枳殼　玄胡索

右各等分以好醋浸一宿焙乾末之每服貳錢陳皮湯調下日三夜一

桃花散　治產後不煩血渴

新石灰壹兩　黃丹伍錢

右爲細末渴時井水調下壹錢

又方治產後出血太多虛煩發渴用真正蒲黃末貳錢白湯調下如渴燥甚井花水下

治產後中風煩渴用紅花子伍合微炒研碎以水煎濃徐徐呷之

療血渴及產後渴疾用蓮子心生取爲細末米飲調下貳錢効

自汗

產後虛汗不止者由陰氣虛[illegible]陽氣獨發於外故汗出也[illegible]血[illegible]氣虛弱[illegible]汗出不[illegible]多汗因[illegible]經[illegible]乾燥又則經水[illegible]

產後[illegible]虛[illegible]表[illegible]汗多[illegible]陽[illegible]

[illegible]先生云頭汗出至頸而還額上偏多[illegible]爲六陽之所會也[illegible]之額左屬肝額右屬肺[illegible]

[illegible]

人凡產後忽[illegible]出不[illegible]人

[illegible]其汗不止必[illegible]

東垣先生云婦人分娩及半產漏下昏冒不省瞑目無所知覺蓋因
血暴亡而火上熾但補其血則神自昌若常時血下
當補而升舉其氣陽得血而神安則目明矣今立一
方以補手足厥陰之血兼益陽氣名曰全生活血湯

全生活血湯　治發熱自汗盜汗目䀮䀮四肢無力
口乾頭暈行步欹側

升麻　芍藥各叁錢　柴胡
當歸　防風　羌活
獨活　葛根　甘草各貳錢
川芎　藁本各壹錢伍分　生地黃
熟地黃各壹錢　細辛　蔓荊子各伍分
紅花叁分

產後門十　卌八　女科五　百六

右每服伍錢水煎熱服

麻黃根散　治產後虛汗不止

當歸　黃芪　麻黃根
牡蠣煅　人參　粉草炙各等分

右㕮咀每服肆錢水壹盞煎至柒分去滓溫服

又方

當歸　黃芪各壹兩　麻黃根貳兩

右㕮咀每服叁錢水壹盞煎柒分去滓服

十全(?)　療產後風虛汗出不止小便難四肢拘急難以
屈伸

甘草炙壹兩　附子半兩炮去皮尖　桂心
芍藥各壹兩　右㕮咀每服叁錢水壹盞生薑肆
片棗壹枚煎柒分去滓空心溫服

經效　療產後汗出不止

黃芪貳分　白朮　牡蠣
茯苓　防風　麥門冬去心
生地黃各伍分　大棗柒枚

右㕮咀水貳升煮取柒合去滓空心分溫兩服

產後門十　四八　女科五　百七

療產後血氣暴虛汗出　淡竹葉煎湯叁合微溫服
之須臾再服

又方　馬齒莧研取汁叁大合煮一沸投蜜匙許令
停頓服

止汗散　治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

牡蠣煅研　小麥麩炒令黃色

右等分和勻煮生豬肉汁調下貳錢無時

人參湯　治產後諸虛不足發熱盜汗

人參　當歸各等分

右為末以豬腰子壹隻去脂膜切小片子以水叁

用猪蹄半合通草一兩條煮熟濾取清汁食之亦可
二錢煎至捌分溫服不拘時

當歸六黃湯　治氣血虛盜汗不止不應加人參
白朮心血不足加酸棗仁一錢炒
當歸　熟地黃自製　黃芪炒各一錢
生地黃　黃蘗炒黑　黃芩炒黑
黃連炒各五分　右水煎服

參附湯　治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便
自利或臍腹疼痛吃逆不食或汗多發痙等證
人參一兩　附子炮五錢
右作一服薑棗水煎徐徐服去人參加黃芪名芪
附湯

芪附湯　治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰涌四肢
逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等證
黃芪一兩　附子炮五錢
右作一劑薑棗水煎服如不應倍加附子方得全
濟

當歸補血湯見前　十全大補湯見下虛煩

黃疸

附治一婦人四月內產後發黃四肢倦怠飲少
寒時發熱脉弦
白朮土炒　人參　秦艽
牡丹皮　生地黃　木通
柴胡　芍藥炒　川芎
黃芩　乾葛各一錢　甘草各五分
右分十二貼水煎食前熱服

發熱

產後虛煩發熱，乃陽隨陰散，氣血俱虛。若惡寒發熱，煩躁作渴，急用十全大補湯。若熱愈甚，急加桂附。若作渴面赤，宜用當歸補血湯。若誤認為火證，投以涼劑，禍在反掌。王太僕先生云：如大寒而甚，熱之不熱，是無火也；熱來復去，晝見夜伏，夜發晝止，不時而熱，是無火也，當治其心。如大熱而甚，寒之不寒，是無水也；熱動復止，倏忽往來，時動時止，是無水也，當助其腎。故心盛則生熱，腎盛則生寒；腎虛則寒動於中，心虛則熱收於內。又熱不勝寒，是無火也；寒不勝熱，

是無水也。治法：前證無水者，六味丸；無火者，八味丸。氣血俱虛者，八珍湯與十全大補湯。　大尹俞君之內，產後發熱晡熱，吐血便血，兼盜汗，小便頻數，胸脇脹痛，肚腹痞悶。余曰：此諸臟虛損也，治當固本為善。自恃知醫，用降火之劑，更加瀉利，腸鳴嘔吐不食，腹痛足冷，始信余言。診其脈，或浮洪，或沉細，或如無，其面或青黃，或赤白，此虛寒假熱之狀。時雖仲夏，當舍時從證，先用六君子湯加炮薑、肉桂數劑，胃氣漸復，諸證漸退，更佐以十全大補湯，半載全愈。　儒者楊敬之內人所患同前，但唯痰涎，或用溫補化痰之劑

不應，面色黧黑，兩尺浮大，按之微細，此因命門火虛不能生脾土，脾土不能生肺金而為患也。用八味丸補土之母而愈。　一婦人產後三日，起早況氣血未定，遂感身熱目暗如風狀，即以清魂散二服，得微汗而愈。　一產婦惡露不行，臍腹痛，頭疼寒熱，眾皆以為感寒，溫以薑附，益大熱，手足搐搦，語譫目撥。診其脈弦而洪數，面赤目閉，語澀不可，舌黑如焰爍，無津潤，腹按之不勝手。蓋燥劑搏其血，內熱而風生，血蓄而為痛也。曰：此產後熱入血室，因而生風。即先為清熱降火，治風涼血，兩服頗爽，繼以琥

珀牛黃等稍解，人事後以參從攻巨石散行血破瘀，三四服，惡露大下，如初時，產已十日矣，于是諸證悉愈。　一婦盛暑月中產三日，發熱，其脈虛疾而大，惡露不行，敗血攻心，狂言叫呼奔走，拿捉不住。以乾荷葉、生地黃、牡丹皮濃煎湯，調下生蒲黃二錢，一服即定，惡露旋下而安。　一婦產後時發昏瞀，身熱汗多，眩暈口渴，或時頭痛惡心，皆用四物涼血之劑，病不減；又用小柴胡湯，益甚。余至，診得浮洪搏指，汪曰：產後而得是脈，又且汗多而脈不為汗衰，法在不治。所幸者，不喘不泄耳。其脈如是，蓋涼藥所激也。用人

參炙各錢黃芪[illegible]當歸各柒分白朮川芎各壹
錢乾薑陳皮茯苓各五分煎服五劑脈斂[illegible]
王金壇治一人産後因沐浴發熱[illegible]冷水
瓜果譫語若狂飲食不進[illegible]不[illegible]脈滑
洪熱增劇診得六脈浮大洪數而口[illegible]産後暴損氣血
孤陽外浮內真寒而外假熱宜大補氣血與八珍湯
加炮薑八分熱減大半病人自以為不宜參芪不肯
再服過一日復大熱如火復與前劑潞加參芪炮薑
連進二三服熱退身涼而愈

當歸養血丸 治産後[illegible] 八女科五
當歸黃芪湯 [illegible] 百十[illegible]
當歸補血湯 [illegible]
當歸散 [illegible]
人參湯 [illegible] 治産後亡津液虛損時自汗出發
熱困倦唇口乾燥
羅氏[illegible]飲子
柴胡 麥門冬 白朮 柴胡 [illegible]兩
枳殼 [illegible] 地骨皮 生地黃 甘艸 炒
當歸 人參 茯苓 黃芩
黃芪 各柒錢
右㕮咀每服肆錢薑叁片浮麥柒拾粒水煎服

十全大補湯 治産後虛勞發熱日久不安

柴胡 黃芩 人參 半夏
川芎 當歸 芍藥 [illegible]
甘草 [illegible]
作一服水貳鍾薑叁片紅棗[illegible]煎[illegible]鍾[illegible]服
三合散 治産後日久虛勞發熱
川芎 當歸 芍藥 [illegible]
白朮 白茯苓 黃芪 [illegible]
人參 [illegible] 黃芩 半夏 [illegible]
右作一服水貳鍾生薑叁片[illegible]
食前服
加味逍遙散 [illegible] 八女科五 治産後發熱口乾作渴[illegible]
當歸 白芍藥 乾葛 [illegible] 生地黃
川芎 黃芩 [illegible] 人參 [illegible] 麥門冬 [illegible]分
柴胡 [illegible] 烏梅 [illegible] 甘草 [illegible]
右剉散分作二服用水[illegible]鍾煎至柒分空心服
凡産後發熱多屬虛寒惟乾葛加入補藥中有效此
其法也
人參當歸湯 治産後去血過多血虛則陰虛陰虛
則生內熱心胸煩滿呼吸短氣頭痛悶亂晡時轉
甚與大病後虛煩相類 [illegible]

往來寒熱

新產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能令
乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽
勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟腑
血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於
脾則寒醫人若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜
增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別
之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和
也增損四物湯不一皆隨病加減　愚按產後寒熱因
氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之證經云陰虛則發

熱陽虛則惡寒若兼大便不通尤屬氣血虛弱切不
可用發表降火若寸口脈微名陽氣不足陰氣上入
於陽中則惡寒用補中益氣湯尺部脈弱名陰氣不
足陽氣下陷於陰中則發熱用六味丸若陰陽
不足陽亦從之則陽內陷而發熱陰亦從之
則陰上入而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭
故惡寒而發熱也當用八珍湯若病後四肢發熱或
形氣倦怠此元氣未復濕熱乘之故耳宜補中益氣
湯若肌熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱用當歸
補血湯若認為寒則誤矣　一產婦惡寒發熱用十

全大補加炮薑治之而寒熱退飲食不甘肢體倦怠用
補中益氣湯而安又飲食後犯怒惡寒發熱抽搐咬牙
難候其脈視其面色青黃按其腹以手護之
此肝木侮脾土飲食停滯也用六君子加木香一劑
而安　一產婦惡寒發熱余欲用八珍加炮薑治之
其家知醫以為風寒用小柴胡湯余曰寒熱不時乃
氣血虛也不信仍服一劑汗出不止譫語不絕煩熱
作渴肢體抽搐余用十全大補湯二劑益甚脈洪大
重按如無仍以前湯加附子四劑稍緩數劑而安

吳癸山治一婦人產後大便泄瀉多食後發熱頭疼身
痛寒熱如瘧左手弦大微有寒邪右手弦滑不勻食
飲痰火也一者因虛而得之先以攻邪之藥遂以茯苓補
心湯大劑加減治之服後頭痛二服汗出才涼其患
漸差然後以八物湯調理而安　一婦產後
惡寒未發熱而入絡又以為身熱如瘧用以牛杜
仁散加當歸芍藥作丸服熱除　又一婦產後惡
寒未食因風寒身寒氣急乃為發作寒熱脈緊而
弦以蔘蘇飲二劑而安　一少婦初產四日冷物傷脾
胃但覺身分不快惱逆飲食少　心腹滿悶時或腹
脇刺痛發惡寒晚潮熱夜則恍惚譫語晝則抽搐頭

[illegible]風狀變異多端將產後[illegible]或作虛風或云血[illegible]
專用甘溫而行血以寒涼退實此所[illegible]不效者
全見產後諸症不離潤補診其脈弦而[illegible]
各兆痰血未盡也惡退者大勞[illegible]不瘀[illegible]
行陰血衝因與涼所傷瘀血停滯[illegible]日久發于經
經所以變生諸證須得大劑溫經行經入裏化瘀逐
血成不可混投合前藥服之產日後行忌水十
日負不可近惡人覺依病勢漸減然後以人參養榮
湯數十貼月餘如初

治產後往來寒熱四物內加小柴胡湯 [illegible]
[illegible] 女科五 [illegible]

保治日久虛勞微有寒熱脉沉而數宜柴胡四物湯

川芎　當歸　芍藥
熟地黃　柴胡　人參
黄芩　甘草　半夏

右為末水煎服

治產後往來寒熱脉弦者少陽也小柴胡加生地黃湯

柴胡　黄芩　人參
半夏　大棗　生地黃
梔子　枳殼

右如前煎服

增損柴胡湯　治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡　人參　甘草
半夏　陳皮　川芎
白芍藥 [illegible]

右[illegible]片棗[illegible]枚水同煎食後[illegible]服

[illegible]以新[illegible]敗血不散[illegible]入[illegible]大抵
一陰閉一陽開作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可
云敗血循經流入陰諸陰則寒陽則熱血氣
[illegible]氣[illegible]則伏過再會而復作[illegible]經散五積散
[illegible] 女科五 [illegible]

[illegible]熟地黃散　治產後蓐勞皆由體虛氣力未壯
勞復所起四肢煩疼時發寒熱不思飲食

熟地黃　人參　白芍藥
白茯苓　白朮　續斷
黃芪　桂心　五味子
當歸　川芎

右㕮咀每服四錢薑三片棗一枚水煎服　一方
無桂心五味續斷有柴胡黃芩半夏　作散

大[illegible] 治產後停勞寒熱往來[illegible]

右[illegible]分爲之

黃連　鱉甲　[illegible]

柴胡　白芍藥　[illegible]

川芎　牛膝　[illegible]

茯苓　柏子仁　[illegible]

五味子　熟地黃各[illegible]

右爲末煉蜜和丸梧子大每服[illegible]丸空心食後湯飲下

大調經散 治產後血虛惡露未消氣爲敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆敗血未下之所爲也

[illegible] 女科五 [illegible]

大豆[illegible]　茯神壹兩　真琥珀壹錢

右爲細末濃煎烏豆紫蘇湯調下

加減烏金散 治產後寒熱似瘧

厚朴　柴胡　黃芩

麻黃各貳錢　陳皮　當歸

川芎　桔梗　茯苓[illegible]

桂枝　蒼朮　白芷

枳殼各壹錢　羌活　草果

半夏各[illegible]　甘草玖分　白芍藥

熟地黃各壹錢

右剉爲散分作兩服每服用水壹鍾半煎至[illegible]

發熱[illegible]鍾不拘時服 有汗多[illegible]

芍藥熟地黃 有咳多厚朴陳皮 有[illegible]

黃芩 有寒多[illegible]草果桂枝 有[illegible]

柴胡 有[illegible]多用[illegible]羌活[illegible]

甘草[illegible]

[illegible]

[illegible]

產寶療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時乾嘔困乏悶絕

[illegible] 女科五 [illegible]

人參　獨活　白鮮皮　葛根

防風　青竹茹　遠志[illegible]　茯神[illegible]兩

白薇[illegible]　玄參[illegible]　竹瀝[illegible]

右取銀[illegible]斤水[illegible]煎[illegible]升[illegible]下諸藥重煮

取[illegible]升分溫爲服忌魚[illegible]

知母湯 治產後乍寒乍熱通身溫壯胸心煩悶

知母[illegible]　芍藥　黃芩[illegible]　桂心

甘草[illegible]

右水五升煮取貳升半分三服 一方不用桂心

用生地黃

瘧

夫產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調之寒多者宜草果飲子 [illegible]

產後瘧疾因脾胃虛弱飲食 [illegible] 因外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加桔梗蒼朮藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用人參養胃湯 [illegible] 分後用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補 [illegible] 桂元氣脫陷急加附子大劑 [illegible] 氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡 [illegible] 大下 [illegible]

寒作或吐瀉不食腹痛煩渴 [illegible] 或手足逆冷寒戰如慄雖見百證皆 [illegible] 若誤用清脾截瘧之類多致不起 [illegible] 作渴煩悶腹滿遍身作痛三日不食 [illegible] 此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神麴 [illegible] 而不作瘧乃大劑麴山查又數劑 [illegible] 人便不通三十五日計進飲食七十餘碗 [illegible] 用猪膽汁導而通之其糞且不甚燥 [illegible] 產後瘧久不愈百病蜂起其脈或洪大或微細 [illegible] 或沉伏難以名狀用六君加炮薑二十餘劑脈證稍得入用參朮煎膏佐以歸脾湯百餘劑而瘥 [illegible] 不時寒熱久不愈用六君子補中益氣湯服百餘劑而尋愈

草果飲子 治婦人產後瘧疾寒熱相半者或多熱者宜此

半夏 [illegible] 赤茯苓 甘草炙 草果 [illegible]

川芎 陳皮 白芷 [illegible] 青皮 [illegible]

良薑 紫蘇 [illegible] 乾葛 [illegible]

右㕮咀每服叁錢水一盞大 [illegible] 同煎至柒分去滓當發日侵早連進 [illegible] 服無有不安

生熟飲子 治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻 草果仁 厚朴 [illegible] 半夏

陳皮 甘草 大棗 [illegible] 生薑

右八味等分細剉和勻一半生一半用濕紙裹煨令香熟去紙與一半生者和勻每服秤伍錢重水貳盞煎至柒分食前一服食後一服

補遺 產後瘧疾熱多寒少者清脾湯 寒多熱少者養胃湯 久而不已者七寶飲截之 方並見雜病瘧

蓐勞

夫產後蓐勞者，此由生產日淺，血氣虛弱，飲食未平復，不滿日月，氣血虛羸，將養失所，而風冷客之。風冷搏于氣血，則不能溫于肌膚，使人虛乏勞倦，乍卧乍起，顏容憔悴，食飲不消。風冷邪氣而感于肺，肺受微寒，故咳嗽口乾，遂覺頭昏，百節疼痛，榮衛受于風邪，流注臟腑，須臾頻發，時有盜汗，寒熱如瘧，背膊煩悶，四肢不舉，沉重著牀，此則蓐勞之候也。又曰：婦人因產理不順，疲極筋力，憂勞心慮，致令虛羸喘乏，寒熱如瘧，頭痛自汗，肢體倦怠，咳嗽痰逆，腹中絞刺，名曰蓐勞。

[薛按]前證當扶養正氣為主，用六君子湯加當歸。若脾肺氣虛而咳嗽口乾，用補中益氣加麥門、五味。若因中氣虛而口乾頭暈，用補中益氣加蔓荊子。若肝經血虛而肢體作痛，用四物、參、朮。若因肝腎虛弱而自汗盜汗，寒熱往來者，用六味丸加五味子。若因脾虛血弱，肚腹作痛，月經不調，用八珍湯倍加白朮。若因脾虛血燥，皮膚搔痒，用加味逍遙散。大抵此證多因脾胃虛弱，飲食減少，以致諸經疲憊而作，當補脾胃，飲食一進，精氣生化，諸臟有所倚賴，其病自愈矣。仍參前後虛煩發熱方論主治。

[治]一婦產未滿月，因怒氣血流如水，三日方止，頭又發熱，自汗困倦，乏力，脈[illegible]而汗出，[illegible]之類，其熱愈熾，[illegible]，以四物湯加[illegible]，半錢數服，熱退身涼，後以八珍湯加[illegible]調理而安。

[治]猪石子湯　治產後虛羸，喘乏，乍寒乍熱如瘧，四肢疼痛，面色痿黃，名曰蓐勞。

猪石子（[illegible]）　香豉（[illegible]）　當歸

粳米　　蔥白

右㕮咀，分兩劑，每劑用水三升，煮[illegible]取[illegible]，去滓，分三服。廣濟無方，藥有人參。

增損柴胡湯（見前發熱）

猪腰子粥　治蓐勞發熱。用猪腰子一枚，去白膜，切作柳葉片，以鹽酒拌，先用粳米一合，入蔥椒煮粥，鹽醋和，將腰子鋪盆底，以熱粥蓋之，如作盦生粥，空心服。

人參鼈甲散　治蓐勞，皆由在產內未滿百日，體中虛損，血氣尚弱，失於將理，或勞動作傷，致成蓐勞。其狀虛羸，乍起乍卧，飲食不消，時有咳嗽，頭目昏痛，發歇無常，夜有盜汗，寒熱如瘧，背膊拘急，沉困

在床服此大効

人參　桂心　當歸　桑寄生
白茯苓　白芍藥　桃仁　麥門冬去心
熟地黄　甘草[illegible]　[illegible]
鱉甲　黄芪[illegible]

右爲粗末每服先以猪腎壹對去筋膜以水兩大
盞煮至壹盞半分[illegible]大猪腎[illegible]去滓從
入藥末貳錢葱白叁寸[illegible]
柒分去滓空心晚食前溫服[illegible]神妙

許仁則療産後日淺久坐視聽言語多故運用氣力
遂覺頭項肢節皮肉痛乍寒乍熱此爲蓐勞
猪腎壹雙去脂膜　當歸　芍藥
生薑各[illegible]兩　葱白切　桂心各貳兩
右水捌升煮腎取陸升下藥煮取貳升分溫二服

熟地黄散[illegible]

白茯苓散[illegible]
白茯苓　當歸　川芎　桂心
白芍藥　黄芪　人參各半兩　熟乾地黄[illegible]
㕮咀先以水煮猪腎[illegible]入猪腎[illegible]當歸[illegible]
薑三物入藥半兩煎柒分去滓食前分溫三服

黄芪丸[illegible]

胡氏牡丹散[illegible]
白芍藥　當歸　五加皮　地骨皮
人參各半兩　没藥　桂心各[illegible]　牡丹皮[illegible]
右爲細末每服貳錢水酒各半盞如不飲酒只用
水壹盞開元錢壹枚麻油蘸之[illegible]分入滓通
口服煎不得攪喫不得吹

黄耆煮散[illegible]
鱉甲醋炙　黄芪各壹兩　桂心[illegible]
桑寄生　白茯苓　白芍藥　人參
熟地黄　麥門冬去心　甘草[illegible]
右爲細末每服用猪石子壹對[illegible]
水壹盞入藥半分[illegible]煎至柒分去石子[illegible]
却下藥伍錢更煎至肆分去滓空心晚食前溫服
一滓併煎

黄芪建中湯　治産後諸虛不足[illegible]
黄芪　肉桂各[illegible]　白芍藥[illegible]　甘草[illegible]
右服伍錢[illegible]

紫河車丸　治蓐勞及産後虛羸大効[illegible]
此是[illegible]

虛羸

產寶云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當慎起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中年及難產者毋論日期必須調養平復方可少為動作則氣血復傷虛羸之證作矣 薛前[illegible]若用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯[illegible]若用六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若[illegible]風寒者[illegible]藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以調脾胃若胃氣一健血氣自生諸證自愈矣

丹產後補虛

人參 白术各壹錢 黃芩[illegible]

歸身[illegible] 川芎[illegible] 陳皮[illegible]分

右水煎服如有寒加[illegible]炙芩壹錢

保命[illegible]湯治產日久[illegible]大者即小柴胡合四物也

治產後日久虛勞發熱不効者三合散即四君子四物小柴胡[illegible]

白术 川當歸 芍藥

黃芪 茯苓 熟地黃各壹兩

柴胡 人參各壹兩半 黃芩

半夏 甘草[illegible] 川芎[illegible]

右為粗末每服[illegible]

當歸羊肉湯 治產後[illegible]疾若[illegible]心腹痛

肥羊肉[illegible] 當歸[illegible]

黃芪[illegible] 生薑[illegible]

右以肉汁煮三味取汁伍合分[illegible]惡露不盡加桂[illegible]惡露下多加芎[illegible]有寒加茱萸壹兩有氣加細辛貳兩有熱加生地黃汁貳合

保命治產婦虛勞不能食十全散[illegible]

十全大補湯 治諸臟虧損氣血俱虛惡寒發熱或自汗盜汗便血吐血或大便不實飲食少思或胸腹作痛口舌生瘡或耳目不明牙齒不固

人參 白术 白茯苓

黃芪 當歸 熟地黃[illegible]

白芍藥[illegible] 川芎[illegible] 肉桂

甘草[illegible]伍分 右用水煎服

當歸建中湯見前[illegible]

保命治產後虛損飲食不下四物加建中人參白术茯苓主之

療產後大虛心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益之
黃芪　白朮　當歸　人參
甘草各二　生薑肆兩　先以白羊肉叁斤去脂水
壹斗玖升煮肉取汁伍升下諸藥煮叁升分三服
評此大產則血氣勞傷臟腑虛弱而風冷客之冷
搏於血氣血氣不能溫於肌膚使人虛乏疲頓致羸
損不平復若久不平復風冷入於子臟則胞臟冷亦使
人無子　前湯若血氣虛弱用本湯加減代參
用十全大補湯胃氣虛弱用補中益氣湯脾氣虛弱
用六君子湯命門火衰用八味丸肝脾血虛用加味

逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯
産寶療產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉
黃耆　當歸　芍藥　人參各叁分　桂心
甘草　川芎　生薑各肆分　大棗拾貳枚
右九味水柒升煮取叁升分溫叁服
療產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出
當歸　人參　生薑各貳兩　黃芪叁兩
淡豉叁合　豬腎壹雙　粳米叁合　蔥白
右水壹斗伍升先煮豬腎取陸升下諸藥煮取貳升分溫叁服
又方　豬腎壹雙煮入蔥豉作臛如常食之

痞悶

郭問產後口乾痞悶者何答產後榮衛大虛血氣未
定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃脘上熏胸
中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胸膈壅
滯以藥下之萬不得一但服見晛丸則愈　陳無擇
評曰產後口乾痞悶未必只因食麵或產母內積憂
煩外傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調
之可也心煩宜四物湯去地黃加人參烏梅煎若外
傷燥熱看傷何經當隨經為治難以備舉飲食所傷
見晛丸却能作效　薛前證若宿食停滯用六君枳

實神麯若因肉食所致更加山查若因魚鱠之類再
加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔此脾胃受
傷用六君子湯或嚥酸噯腐加炮薑作瀉更加升麻
如不應佐以四神丸或間用補中益氣湯　一婦人
食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不去服消導之藥
不應飲食日減肌體日瘦半年矣余謂此食積為患
用大酒麯炒為末溫酒調服貳錢俄而腹鳴良久仍
下粽而愈　一婦人食魚鮓腹痛患痢諸藥不應用
陳皮白朮等分為末以陳皮湯送下數劑而愈
見晛丸

薑黃炒　三稜醋炒　蓽澄茄
陳皮去白　良薑　人參
蓬莪茂醋炒各等

右為細末用蘿蔔搗爛絞取汁煮麵糊丸如梧子大每服五拾丸蘿蔔湯下白湯亦可

腹脹

鄭產後腹脹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血散於脾胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服抵聖湯則愈　薛前證若敗血傷於脾胃宜用前方若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷於胃宜用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食為善

一產婦患前證或用抵當湯敗血已下前證益甚小腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益氣湯加炮薑溫補脾氣重墜如失又用六君子湯而安

抵聖湯入生薑半兩焙乾水煎方見嘔吐類○薛氏云此方最宜用之局方平胃散加人參亦可

水腫

論產後四肢浮腫者，敗血乘虛停積，循經流入四肢，留淫日深，却還不得，腐壞如水，[illegible]醫人不識，便作水氣治之，[illegible]人大產後既虛，又以藥虛之，[illegible]謂[illegible]枳[illegible]但服小調經散，[illegible]浮腫多[illegible]於將理，外感寒邪，[illegible]滯經絡，氣分血分不可不辨，要當隨所因脈證治之，宜得其情，不可[illegible]小調經散治血分固妙，但力淺難憑，不若吳茱萸湯、枳朮湯、奪魂散、大調經散，皆要藥也。

又論曰：夫產後勞傷血氣，腠理虛則為風邪所乘，邪搏於氣，不得宣越，故令虛腫輕浮，是邪搏於氣，氣腫也。若皮膚如熟李狀，則變為水腫。氣腫者發汗即愈，水腫者利小便乃愈也。[illegible]如[illegible]風寒在表，面目四肢浮腫，[illegible]七味白湯[illegible]加以利為度。如浮腫至膝，喘嗽，加木香、檳榔倍之，謂氣多也。如浮腫又頭痛昏眩，加羌活、川芎，謂風多也。如只浮腫止[illegible]本方服[illegible]中滿分消丸[illegible]用[illegible]湯吞之。凡產後腫必用大補氣血為主，少佐以蒼朮、茯苓，使水自利。[illegible]若氣虛浮腫，宜益脾胃[illegible]

經[illegible]不開，宜[illegible]肢浮腫[illegible]調中氣不足[illegible]大君子湯而愈。後因怒腹脹[illegible]不止，飲食不進，小便不利，肚腹[illegible]脹[illegible]氣化而愈。

一產婦泄瀉，四肢面目浮腫，喘促惡寒，余謂脾肺虛寒，用六君加[illegible]而泄瀉愈，用補中益氣而脾胃健。[illegible]惡寒浮腫急名產科醫治經半月不差[illegible]治之枉至日，諸醫作何病[illegible]非也。且水氣發咳嗽，小便澀是也。今[illegible]小便不[illegible]不作咳嗽，惟手足寒，乃血[illegible]遂用益血和氣藥治之[illegible]用之藥乃[illegible]今產科家多用此藥[illegible]者見也。[illegible]敗血流入經絡，滲入四肢，氣[illegible]咳嗽，胸膈不利，口吐酸水，兩脇疼痛，遂用旋覆花湯，微汗漸解，頻服小調經用澤蘭[illegible]湯調下，腫氣漸消。

大調經散　治產後腫滿喘急煩渴小便不利方見產後

小調經散

沒藥　琥珀　桂心

芍藥　當歸各壹錢　細辛

麝香…

右為細末每服半錢薑汁溫酒各少許調停服

治產後遍身浮腫疼痛及產後血水疾

乾漆　大麥蘗等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘗一重乾

漆如此填滿用鹽泥固濟火煅通赤放冷研為散

但是產後諸疾熱酒調下貳錢

經…治產後肌浮柑皮酒服…

白朮湯　治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名

曰氣分

枳實　白朮

右㕮咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服

腹中耎即當散也

可婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脈皆沉此

體虛而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中導水行

氣可也

白朮　陳皮　川芎

木通　茯苓…

右用水煎下…

治喘散　治產後…

半夏…　人參　半夏

右以生薑汁搜麵裹煨…焦…為末

木調…小便利為效

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉　防己等分

右為末每服貳錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可

漢防己散　治…

漢防己　豬苓　…

桑白皮　商陸　…

右為粗末每服肆錢水壹盞…煎至柒分

去滓空心溫服

七聖丸…

加減吳茱萸湯　治婦人臟氣本虛宿挾風冷胸膈

滿痛腹脅絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡

寒戰慄或泄瀉不止少氣羸困及因生產藏氣暴

虛羸少內勝須茯苓增

吳茱萸[illegible] 桔梗 [illegible]

甘草 麥門冬 [illegible]

半夏 細辛 [illegible]

赤茯苓 牡丹皮 桂 [illegible]

右[illegible]每服[illegible]水[illegible]煎[illegible]分[illegible]食

前溫服

金匱加減腎氣丸[illegible]

加味八物湯 治產後遍身浮腫[illegible]

人參 白茯苓 [illegible]

小[illegible] 白朮 川芎[illegible]

當歸 白芍藥 [illegible]

甘草 黃芩 [illegible]

右[illegible]分作八[illegible]服水[illegible]全

米[illegible]服[illegible]加

[illegible]若[illegible]砂

仁 若手足麻痺加肉桂[illegible] 若咳嗽加

五味子款冬花杏仁

【產】[illegible]夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成[illegible]

皆由飲食不節寒溫不調[illegible]

聚者[illegible]

積為陰[illegible]

浮[illegible]為

[illegible]當

因[illegible]矣

當察而雜[illegible]積聚者而治之[illegible]腹中似有

一塊或時作痛而轉動按之不痛[illegible]則散

曰脉浮而澀余謂此肝氣虛而[illegible]乃用[illegible]

血行[illegible]血

驅逐之藥[illegible]

等藥夫血[illegible]於肉

裏以為[illegible]筋

此因肝血[illegible]肝

臍部分[illegible]用

八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治而愈 一婦月經

不調兩拗腫脹小便澀滯腹中一塊作痛或上攻脇

腹或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌膚消瘦飲食無味
錯類瘵證久而不愈者胃肝脾血氣虧損用小柴湯
逍遙散歸脾湯隨證治服而愈
產新產後有血與氣相搏而痛者謂之瘕瘕之言假
也謂其痛浮假無定處也此由夙有風冷血氣不治
至產血下則少故致此病也不急治則多成積結妨
害月水輕則否澁重則不通也聖惠方云乃寒邪乘
於氣血凝結此因氣病而血病也當補養胃氣調和
月經寬緩靜養為善雖經云任脈之病男子為七疝
女子為瘕聚當參前後各論治之

附南山婦人年三十八於九月二十三日月經行比
前過後十日得草藥以敗血消為下胎之謀有數滴
血下因此腹痛在小腹下有塊如碗大不可按湯熨
則痛稍定大小便抽痛小便澁大便略下少赤積垢
食不進口略渴發熱此胃氣為草藥所敗加以受傷
之血妄行而不得洩所以為病也

砂仁 甘艸炙 川芎
黃芩各炙分 滑石壹錢 牛膝壹錢
桃仁一十粒 右水酒煎服

芍藥湯 治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自
安

芍藥壹斤 黃芩 茯苓各陸兩

右剉散每以半兩水煎溫服日三

附產後消血塊

滑石二錢 沒藥 血竭各貳錢

右為細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末
麵糊丸白术湯陳皮湯任下

又方消血塊

香附童便浸 桃仁去皮各等分 為末醋糊丸

治血瘕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸貳兩 桂心 芍藥炒
血竭 蒲黃炒各壹兩 延胡索炒壹

右為末每服貳錢空心熱酒調下

錢氏方治血瘕 桂心為末每服壹錢空心酒調下

產寶療血瘕痛無定處

童便叁升 生地黃汁 生藕汁各壹升
生薑汁叁升

右先煎前三味約三分減二次下薑汁慢火煎如
稀餳每服取壹合暖酒調下

千金療血瘕

生乾地黃 [illegible]

右為細末空心溫酒調下 [illegible]

四神散 治產後瘀血不消 [illegible]

川芎 赤芍藥 各等分 當歸 [illegible] 乾薑 [illegible]

右為細末每服二錢食前用溫酒調服

桂心丸 治產後血氣不散積聚作塊上攻心腹或成寒熱四肢羸瘦煩疼

桂心 當歸 赤芍藥

牡丹皮 沒藥 檳榔 各半兩

青皮 乾漆 炒烟盡各 大黃

桃仁 去皮尖 三稜 煨 玄胡索

鼈甲 醋炙 厚朴 製各壹兩

右為細末煉蜜和丸梧子大每服叁拾丸食前用溫酒送下

霍亂

論 夫產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風冷所致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下利故曰霍亂 [illegible] 而飲水者五苓散寒多不飲水者 [illegible] 虛冷者加附子來復丹亦妙 [illegible] 一產婦 [illegible] 霍亂 [illegible] 者 [illegible] 已愈後 [illegible] 即嘔吐或作瀉 [illegible] 此脾胃俱虛用六君子 [illegible] 治之漸愈後因飲食失調兼之怒惱霍亂 [illegible] 手足逆冷用附子散又用八味丸以補土母而康設泥痛無補法而用辛散或用平補之劑必致不起 一產婦吐瀉嘔酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而嘔酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康

白朮散 治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白朮 橘紅 麥門冬 去心

乾薑 人參 各壹兩 甘草 半兩

為粗末每服肆錢水壹盞生薑伍片煎大溫服

溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

人參 白朮 當歸

薏苡仁 乾薑各壹兩 厚朴薑汁製

右為粗末每服叁錢水煎服

附子散 治產後霍亂吐瀉不止手足逆冷

附子炮 白朮 當歸

吳茱萸泡 桂心 人參

丁香 橘紅 甘草各半兩

右為細末每服貳錢粥飲調下不拘時

白朮散 治產後霍亂吐利腹中㽲痛

良薑 當歸 草豆蔻仁

右等分為細末每服貳錢用粥飲調下

右二方其寒不可用

茯苓白朮散 治產後霍亂吐利身熱煩渴者良

[illegible]各等分

右㕮咀不拘多少為散以伏龍肝研細末二錢米湯調下即

愈

伏龍肝即竈額中對釜月

嘔吐

大抵胃為水穀之海水穀之精以為血氣榮潤臟腑因產則臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸胃燥澁其氣則逆故嘔逆不下食也一若胃滑者若因飲食過時用理中湯若脾胃虛弱飲食過時而兼勞役用補中益氣湯若飲食停滯用人參養胃湯脾胃氣虛用六君子湯脾胃虛寒用六君子加炮薑木香肝木侮脾土用六君子加升麻柴胡命門火衰不能生土用八味丸嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯多有生者

一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日少前證愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味逍遙散加味歸脾湯以次調理而痊

開胃散 治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜服此

訶子肉壹兩半 人參壹兩 甘草半兩

右三味為細末別以半夏半分生薑壹分棗子貳枚水壹大盞煎至陸分去滓分為兩服

療[illegible]之不止 劉知縣傳

半夏麴[illegible]兩 甘草[illegible]兩

[illegible]兩

右[illegible]細末每服貳錢水一盞半薑叁片煎至陸分

[illegible]

治產後[illegible]

[illegible]

右[illegible]各[illegible]煎服[illegible]

[illegible]逆不止[illegible]湯加[illegible]仁

[illegible]散 治產後咳逆嘔吐心忪目暈

[illegible]

[illegible]

[illegible]煎[illegible]湯入[illegible]半盞和[illegible]

吃逆

夫肺之氣五臟六腑[illegible]

[illegible]

中伏寒因食熱物冷熱[illegible]

吃逆[illegible]

水[illegible]

[illegible]

期門穴乃胃之大絡[illegible]

如用後方未應灸法[illegible]參附湯亦有救生者

參附湯 見[illegible]

丁香散 治產後心煩咳噫不止

丁香 白豆蔻仁 各[illegible] 伏龍肝 [illegible]

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下壹錢如人行五[illegible]

[illegible]服

石蓮散 見[illegible]

產寶療產後吃逆三日不止欲死方

桂心 [illegible] 薑汁 [illegible]合

右同煎取貳合以大火炙手摩背熱時塗[illegible]

妙

治產後吃逆方 川乾柿壹枚切碎以水一盞煎[illegible]

陰分熱用之

又方　丹礬錢半棗肆個水壹小盞煎至半小盞熱

服

羌活散 婦人良方　治呃逆

羌活　附子炮　茴香炒各半兩

木香　白薑炮各一錢半

右為末每服二錢水一盞鹽一捻煎十數沸

熱服一服止

補遺　凡産後呃逆橘皮湯及夾小橘皮湯皆效

在前方當審寒熱虛實用之如寒者宜丁香桂

熱者宜乾柿竹茹實者宜香附橘皮虛者宜人參

甚則附子佐之誤施則有噬臍之悔也

咳嗽

【大全】夫肺者主氣因産後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若産後吃鹽太早而咳嗽者難治　産後血氣不和未可妄治

曰産後咳嗽多因食熱麪壅納或熱病或有氣塊發時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛肢體無力宜服局方黑神散五積散加棗煎服

【附】産後咳嗽或因陰血耗損或因肺氣虧傷或陰火上炎或風寒所感主治之法若陰血虛者用芎歸熟地參朮肺氣傷者用四君芎歸桔梗陰

火上炎者六味地黃加參朮風寒所感者補中益氣加桔梗紫蘇若瘀血入肺發喘急用二味參蘇飲多有得生者若兼口鼻起黑或産出血急用前飲亦有得生者然而所患悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根本人身之根蒂胃氣一虛五臟失所百病生焉但患者多謂腠理不密所致殊不知肺屬辛金生於己土亦因土虛不能生金而腠理不密外邪所感其陰火上炎亦壯土金生水以制火為善若逕治其病則誤矣

一産婦咳嗽聲重鼻塞流涕此風寒所感用參蘇飲一鍾頓愈六七乃與補中益氣加桔梗茯苓

宜以一劑而瘥又須不若加黃芪以實其腠理而安
一產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱晡熱彷作經聲
此陰火上炎當補脾胃遂用補中益氣湯六味地黃
丸而愈
一產婦咳嗽腹滿不食涕唾面腫氣逆此
病在胃關於肺用異功散而愈

旋覆湯

知母飲　治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服
此藥若傷風痰嗽即以尋常傷風藥主治

知母　貝母　白茯苓
人參各貳錢　桃仁　杏仁

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服

集驗療產後感風傷寒咳嗽多痰唾粘
甘草　苦梗各壹兩半　款冬花壹兩
生麥門冬　生地黃各叁兩　葱白壹握
豉　舊方無葱白與豉
右㕮咀水貳升煮取捌合去滓食後分兩服

經効療咳嗽多痰唾粘氣急
前胡　五味子　紫菀
貝母各壹兩半　桑白皮　茯苓各壹兩
淡竹葉拾片

右㕮咀水貳升煎取捌合去滓食後分兩服

療產後咳嗽氣喘
百部根　苦梗各捌分　桑白皮拾分
乾百合　赤茯苓各捌分
右㕮咀水貳升煮取柒合去滓食後分兩服

自製蛤化丸

喘

產後喘極危多死也[illegible]

何者口鼻名血也衝脉者氣[illegible]衝任[illegible]

上下周之衝衝以[illegible]

上行於肺中致令喘也[illegible]惡

露不快敗血停凝上熏於肺[illegible]

經閉血去喘自定[illegible]可服

若是敗血上熏於肺[illegible]或

因學怒飲食鹹冷等[illegible]孤陽絶陰

乙者榮血暴絶宜大料煮芎藭湯[illegible]傷風寒宜

旋覆花湯[illegible]理鬱發宜小調經散用桑白皮杏仁煎

湯調下[illegible]五積散[illegible]前證

若脾肺氣虛弱用[illegible]若兼外邪更加紫蘇若

中氣虛寒用補中益氣加炮薑[illegible]陽氣虛脫

加附子[illegible]血入肺急用二味參蘇飲[illegible]一產婦

[illegible]俱冷當以手[illegible]氣虛脫用[illegible]

[illegible]四劑[illegible]七日[illegible]

產後[illegible]坐不得臥者[illegible]

得[illegible]兩關脉動尺寸皆虛[illegible]不効用[illegible]

遂[illegible]人參[illegible]

蘇

藥[illegible]服之即蘇[illegible]

血成塊宜治之也

血湯服　治產後敗血衝心[illegible]命在須臾

服

真血竭[illegible]

右等分為細末[illegible]

便令好酒半大盞煎一沸[illegible]

未良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生

百病

二味參蘇飲　治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參[illegible]　蘇木[illegible]

右以水兩碗煮取蘇木汁一碗以下人參末調服隨

時加減服神效

旋覆花湯　治產後傷風寒喘嗽痰涎壅盛坐臥

不寧

旋覆花　赤芍藥　荊芥穗

半夏麴　前胡　甘草[illegible]

茯苓　五味子　杏仁[illegible]

麻黃[illegible]　一方芍藥作茯苓[illegible]

右㕮咀每服四錢水一盞半生[illegible]

[illegible]

若傷[illegible]大[illegible]而[illegible]宜[illegible]

右[illegible]從脈伏而厥

[illegible]人參

[illegible]陳皮 [illegible] 杏仁 [illegible]

右[illegible]水煎服

大補湯 治產後百日外面青浮腫唇白氣促有汗

乃大虛之證急宜服此

當歸頭　大川芎　大白朮

白芍藥　白茯苓多　人參多

黃芪多　五味子　熟地黃

乾薑　甘草少

右判散水煎服此二貼不退即加川烏木香

入服　右[illegible]加[illegible]肉豆蔻粟殼

鼻衄

產後口鼻黑氣起及鼻衄[illegible]

之派起於鼻交頞中[illegible]

右產後氣虛[illegible]

得故令口鼻黑[illegible]

此證胃絕肺敗不可治　[illegible]急取緋線[illegible]

并產婦頂心髮兩條[illegible]中指節上即止無藥可治

亦懷俠之一端也　產後胃脈俠口繞承漿[illegible]鼻準

陽明上鼻孔陽明為合[illegible]胃虛肺損氣脫血死之證急

用二味參蘇飲加附子五錢亦有得生者　汪一婦

產後血逆上行鼻衄口乾心躁舌黑盖因瘀血上升

遂用益母丸[illegible]便化下鼻衄漸止下血漸通

血崩

問產後血崩者何答曰產卧傷耗經脉未得平復而勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷蠹榮衛衰弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞爲難治急服固經丸以止之　陳無擇云血崩不是輕病況產後有此是謂重傷恐不止醎酸不節而能致之多因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸自難責効不若大料煮芎藭湯加芍藥候定續次隨證合諸藥治之爲得

薛前證若血滯小腹脹滿用失笑散血少小腹虛

痞者芎藭湯肝火血妄行加味逍遥散脾鬱不統血加味歸脾湯脾氣虛不攝血補中益氣湯厚味積熱傷血清胃散加槐花風熱相搏傷血四君子防風枳殻

一產婦血崩小腹脹痛用破氣行血之劑其崩如湧四肢不收惡寒嘔吐大便頻瀉余用六君加炮薑乾薑四劑稍愈又以十全大補三十餘劑而痊　一產婦血崩因怒其血如涌仆地口噤目斜手足抽搐此肝經血耗生風余用六味丸料一劑諸證悉退但食少晡熱佐以四君柴胡牡丹皮而愈

固經丸

艾葉　赤石脂（煅）

木賊（各半兩）　附子（一枚）

右爲末陳米飲和丸如梧子大每服三十丸食前温酒下米飲亦可

芎藭湯加芍藥方

芎藭　當歸　芍藥（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓熱服無時

熟乾地黄散治產後崩中頭目旋運神思昏迷四肢煩亂不知人事

熟乾地黄　伏龍肝　黄芪

赤石脂（各一兩）　阿膠　甘草

白术（各半兩）　當歸　川芎

人參（各三分）

右㕮咀每服四錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服

白芍藥散　治產後崩中下血淋瀝不絕黄瘦虛損

白芍藥　牡蠣　乾薑

熟乾地黄　桂心　黄芩

烏賊魚骨　鹿角膠　龍骨（各壹兩）

右爲細末每服弍錢食前温酒下

又方

鹿茸　赤石脂　熟地黄[illegible]

艾葉[illegible]　當歸[illegible]

右爲細末食前以[illegible]温酒下弍錢

阿膠丸　治産後[illegible]血不止虚羸無力

阿膠[illegible]　赤石脂[illegible]　續斷

川芎　當歸　甘草

丹參[illegible]　龍骨　鹿茸[illegible]

烏賊魚骨[illegible]　艾葉[illegible]

右件爲末煉蜜丸如梧桐子大空心温酒下弍叁拾丸[illegible]

[illegible]四　女科五

[illegible]　治産後崩中下血不止　芎藭[illegible]以

酒弍盞煎取壹盞去滓分温三服食前

瑞蓮散　治産後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮[illegible]　棕櫚[illegible]　當歸

桂心[illegible]　鯉魚鱗[illegible]　川芎[illegible]　御[illegible]

右爲細末每服叁錢煨生姜酒調下如未止更進一

服或用將血崩無杂可治但進三服即止

補遺治産後血崩　香附子[illegible]　蓮蓬殼[illegible]

右爲末米飲調下弍錢

産後血崩杂有熱者有効四物湯[illegible]

月水不用

夫産後月水不調者由産後勞傷氣血[illegible]　小便[illegible]

邪冷熱之氣客於經絡[illegible]血

滑或冷或熱或多或少或在月前或在月後[illegible]不調

也[illegible]若過期而作痛者[illegible]不參加

爲[illegible]不及期而來血熱也[illegible]

而作痛者血實也四物加桃仁[illegible]色者血

虚也四物加參术紫黑成塊者血熱也四物加炒梔

炒黄連丹皮作痛面色淡者痰多也四物合二陳湯當

臨證制宜　一産婦月經不調內熱渴服寒涼之

産後[illegible]　女科五　[illegible]

劑經更如崩腹脹寒熱作嘔少食用六君子二十餘

劑[illegible]以加味逍遥散調理而安

牡丹散　治産後經脈不調[illegible]疼飲食全少

澤蘭葉

琥珀　牛膝　熟地黄

當歸[illegible]　桂心　赤芍藥

右爲細末每服叁錢水[illegible]片煎至[illegible]分去

滓服

澤蘭丸　治産後虚乏不足胸心短氣腹内緊急腰

背疼痛月水不調食少[illegible]

生地黃　當歸　熟地黃
牡丹皮　厚朴製　桂心
川芎　續斷　桃仁
白术[illegible]　赤芍藥　木香各半兩
[illegible]前服[illegible]
右[illegible]末煉蜜丸如梧子大每服叁拾丸食前溫
酒下

女科五　百[illegible]八

月水不通

夫産傷動於血氣其後虛損未復而爲風冷所傷血之爲性得冷則凝結故風冷傷於經血結於胞絡之間故令月水不通也凡血結月水不通則成血瘕水血相併復遇脾胃衰弱肌肉虛者則爲水腫也婦人衝任之脉爲經絡之海皆起於胞内而手太陽小腸之經手少陰心之經此二經上爲乳汁下爲月水若産後月水不通者蓋新産之後勞傷氣血或去血過多乳汁通行自是不通若乳子歲半或一歲之内而月經不行此是常候即非病也何必通之諺云

産後 月水不通　女科五　百五十九

妳假是也若半歲而行者或四五箇月便經行者皆是少壯血盛之人注受極易産乳必衆其子失乳必四肢尫羸肚大青筋頭大髮焦好喫泥土病名無辜若經血有餘者不可以藥止之若産後一二歲月經不通而無疾苦何必服藥或勞傷氣血衝任脉虛氣血衰少而不能行者但服健脾胃資氣血之藥自然通行若用牛膝紅花蘇木乾漆虻蟲水蛭等藥以通之則爲害滋大經水枯竭則無以滋養其能行乎初虞世所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並下而不可得也後之學者更宜詳審而療之 [愚按]前證脾

胃虛弱用六君子湯若兼鬱火傷脾用歸脾湯加柴
皮山梔若怒火傷血宜用四物合小柴胡氣血俱虛
用八珍牡丹皮仍參前論主之一產婦月經年餘
不通內熱晡熱服分氣丸經行不止惡寒作渴食少
倦怠胸滿氣壅朝用加味逍遙散夕用四君子湯月
許諸證稍愈佐以八珍湯兼服兩月而愈
以上三證宜於調經門中參看通用

瀉利

鄭產後腹痛及瀉利者何答曰產後[illegible]
易侵若未滿月飲冷當風乘[illegible]
腸故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化
洞泄腸鳴或下赤白胠脅[illegible]宜服調
中湯六[illegible]若醫者以為積滯取之[illegible]之謹
之　陳無擇評曰產後下痢非止一證[illegible]其所因而
調之既云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因
喜怒憂思還從內性況勞逸飢飽皆能致病若其洞
泄可服調中湯赤白滯下非此能愈各隨門類別有
正方　愚按產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛
不能消食當審而治之若米食所傷用六君加穀蘗
若麪食所傷用六君加麥蘗若肉食所傷用六君加
山楂神麴凡兼嘔吐皆加藿香[illegible]用
前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用六君加柴胡炮
薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣
下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾
土真氣宜加木香肉果若脾土虛寒當用六君子加
木香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及四神丸若屬
命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小便

濟滯股體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補脾腎
利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫治須補胃爲主
久而不食或非飲食所傷而致泄瀉者須補脾
胎主於任而繫於腎況九月十月乃腎與膀胱所養
必用四神六味八味三藥以補腎若用分利導水之
劑是虛其虛也　一產婦泄瀉發熱作渴吐痰甚多
肌體消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹墜痛作脾
矣余以爲脾腎泄瀉朝用四神丸夕用六君子三月餘
而痊　一婦產後泄瀉兼嘔吐嗌酸面目浮腫此脾
氣虛寒先用六君加炮薑爲主佐以越鞠丸而嘔酸
愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康　一產婦
瀉利年餘形體骨立內熱晡熱自汗盜汗口舌糜爛
日吐痰二碗許脈洪大重按全無此命門火衰脾土
虛寒而假熱吐痰者乃脾虛不能統攝歸源也用八
味丸補火以生土用補中益氣湯兼補肺金而脾胃
健　一產婦腹痛後自大便無度形體倦怠飲食不
進與死爲鄰此脾腎俱虛用四神丸十全大補湯而
愈但飲食難化肢體倦怠用補中益氣湯而康　一
婦人五月患痢日夜無度小腹墜痛發熱惡寒用六
君子湯送香連丸二服漸愈仍以前湯送四神丸四

服全愈至七月終忽怠惰嗜臥四肢不收
舌乾燥飲食無味大便不實小便頻數洒淅惡寒凄
慘不樂此肺之脾胃俱虛而陽氣不伸也用升陽
益胃湯而痊　汪石山治一婦產後泄瀉
粥容時即泄下如此半月餘衆皆
平胃散病益甚汪診之脈皆濡緩而弱曰此產中勞
力以傷其胃也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也令以
參苓白朮散除砂仁加陳皮肉豆蔻煎薑棗湯調服
旬餘而安
泄治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸爲瀉洞
泄不禁下青白黑色用荊芥大者四五穗於盞內燒
灰不得犯油火入麝香研湯二呷調下此藥雖微能
治大病

產後泄方

茯苓　川芎　黃芩
白朮　乾薑　滑石
陳皮　芍藥炒各

右水煎服之

調中湯

高良薑　當歸　桂心

訶子[illegible]　附子炮　川芎各[illegible]
甘草炙

右為粗末每服三錢匕水一盞半煎至七分去滓熱服

右治產後中寒洞泄者宜之其腸胃有熱者當服黃連阿膠丸如金丸香連丸之類若戊己丸胸腸丸四神丸五味子丸之類治產後大便不實必用之藥也[illegible]穀雜病及[illegible]洞泄[illegible]不[illegible]

[illegible]　女科五　百[illegible]

產後赤白痢

產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛之未復或勞動太早或誤食生冷若行起太早則外傷風冷乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變為痢也若血滲入大腸則為血痢[illegible]得冷則白或如魚腦得熱則赤[illegible]若冷熱相搏則[illegible]赤白相雜[illegible]痢青色[illegible]極冷也[illegible]便利無常[illegible]日夜[illegible]不[illegible]加久[illegible]不止氣力疲乏愈見羸弱謂之虛痢下痢又有產後風邪不順而下痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則調之滑者澀之虛羸者補之水穀不分者當利小便若產婦性情執著不能寬解須當順其氣未有不安者也　雖前[illegible]白屬氣分而赤屬血分也其論詳見滯利　一產婦食雞子腹中作痛面色青黃服平胃[illegible]下痢更下滯腹脹用流氣飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木乘侮所致用補中益氣加木香吳茱萸漸愈又用八珍大補兼服調理而愈　一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒冷熱與血攻擊滯下純血纏墜極痛其脈大無力口

乾用黃芩芍藥湯三服而安

〔集〕治產後赤白痢腹中用當歸芍藥湯加黃芩黃連神效

〔寶〕救急散　治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥　阿膠　艾葉

熟地黃各壹兩　甘草　當歸各參兩

右㕮咀水煎分　溫空心飲

〔大〕當歸芍藥散治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產

後血崩中久痢方見

療妊娠血痢用阿膠貳兩以酒壹升半煮令消頓服

產後諸痢煮雞子食之　又方羊脂炒雞子空心

一食之甚佳

〔經〕治產後胎前痢疾敗龜甲一枚米醋炙研為末醋

湯調下

〔丹〕婦人患臨胎後腸痢食少痢不止脉虛左手尤甚

滑石　白芍藥炒　蒼朮各伍錢

白朮貳錢伍分　訶子貳錢煨　乾薑貳錢

茯苓壹錢

右為細末調下保和丸肆伍拾粒

〔丹〕產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃連御米殼

等藥

黃連丸　治產後赤白痢腹中痛不可忍

黃連肆兩　阿膠　黃柏

梔子仁各壹兩　當歸貳兩　黃芩

黃蘗各貳兩

右為末蜜煉丸如梧桐子大每服陸柒拾丸米飲吞

下日三夜一

〔仲〕產後下痢虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之

白頭翁　阿膠　黃連

黃蘗　秦皮

右以水柒升煮取貳升半納膠令消盡溫分三服

婦人臨產痢疾由梔不拘多少燒灰為細末空心溫

熟水調下壹錢甚者不過五服

產後血痢小便不通臍腹疼痛用生馬齒莧搗汁二

大合煎沸下蜜一合調頓服

〔補〕治產後血湧不禁餘血作痛兼塊桂心乾薑等分

為末空心酒調服方寸匕

〔本〕療產後痢日五十行者取木裏蠹蟲糞炒黃急

以水沃之令稠稀得所服之即瘥

〔衍〕治產後諸痢方取蒼耳葉搗汁半盞日三四溫服

一產後下痢作渴者水穀之精化為血氣津液以養臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止反溢水氣脾胃既虛不能尅水水自流溢浸漬肌膚則令人腫但止其渴痢則自瘥 [illegible] 不喜冷飲屬胃氣虛不能化津液宜用七味白朮散 [illegible] 口渴喜冷腎水弱而不能消潤宜用六味丸 [illegible] 以滋化源 一產婦瀉痢發熱作渴吐痰 [illegible] 飲食少思或胸膈痞悶或小腹 [illegible] 以為脾腎之瀉朝用 [illegible] 夕用 [illegible] 一產婦患前證形體倦怠飲食不進與死為鄰此脾

胃俱虛也用四神丸十全大補湯而愈

治產後瀉痢而渴飲無度者 麥門冬叁兩 烏梅 [illegible]

右細剉水壹升煮取柒合細呷

經効療產後久痢津液涸渴不止

龍骨拾貳分 厚朴 茯苓 黃芪

麥門冬 人參各捌分 生薑 [illegible] 分 大棗拾肆個 [illegible]

右以水壹大升煮取柒合空心分兩服

療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥

冬瓜壹枚 黃泥糊厚伍寸煨爛熟去皮絞汁服之瘥

補遺人參白朮散治產後痢津液竭渴不止 [illegible]

大便秘澀

郭產後大便秘澀者何也 [illegible] 水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中悶脹者此乃燥屎在臟腑以其乾澀未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱而投之寒藥則陽消陰長變證百出性命危矣 [illegible] 產後大便不通因去血過多大腸乾涸或血虛火燥乾涸不可計其日期飲食數多用藥通之潤之必待腹滿覺脹自欲去而不能者乃結在直腸宜用豬膽汁潤之若服苦藥潤通反傷中焦元氣或愈加難通或通而瀉不能

止必成敗證若屬血虛火燥用加味逍遙散氣血俱虛八珍湯慎不可用麻子杏仁枳殼之類 一產婦大便不通七日矣飲食如常腹中如故余曰飲食所入雖倍常數腹不滿脹用八珍加桃仁杏仁至二十一日腹滿欲去用豬膽汁潤之先去乾糞五七塊後皆常糞而安 一產婦大便八日不通用通利之藥中脘作痛飲食甚少或云通則不痛痛則不通乃用蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎復傷用六君加吳茱肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然多致不起 一產婦大便秘結小腹脹痛用大黃等

飧後吐瀉不食頻嘔胸痞余用木香丸加木香炮薑
治之而愈。一婦人大便秘澀諸藥不應苦不可言
令飲人乳而愈
麻仁丸
麻仁（兩半） 枳殼 人參（各半兩）
大黃（一兩）
右為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十丸
未通漸加丸數不可太過
評曰產後不得利者百無一生去血過多臟燥
大便秘澀則固當滑之大黃似難輕用唯葱涎調

臘茶為丸復以臘茶下之必通（[illegible]以葱地黃湯[illegible]）
（[illegible]肯服下亦[illegible]服[illegible]效）
本事婦人產後有三種疾鬱冒則多汗汗多則大便
秘故難於用藥惟麻子蘇子粥最為穩當用紫蘇子
大麻子二味各半合淨洗研極細用水再研取汁一盞
分二次煮粥啜下此粥不惟產後可服大抵老人
諸虛風秘皆宜服之嘗有一人母年八十四忽爾腹
痛頭疼惡心不食召醫數十輩皆用補脾進食治風
清利頭目等藥數日雖愈全不入食其家憂惶余辨
說前藥皆誤矣此證正是老人風秘臟腑壅滯聚於
胸中則腹脹惡心不思飲食又上至於頭則頭痛神
不清也若臟腑流暢諸疾悉去矣予令作此粥兩啜
而氣泄先下結糞如胡椒者十餘枚後漸得通利不
用藥而自愈矣
治產後秘結不通膨滿者氣忿坐卧俱難用大麥芽
炒黃為末酒下一合神效（[illegible]）

大小便不通

大産後大小便不通者，[illegible]
下津液燥竭，腸胃痞澁，[illegible]故令大小便
不通也。[illegible]
危矣。令飲甘乳一日稍通，三日而[illegible]

桃花散　治膀胱氣滯血澁，大小便秘。
桃仁　葵子　滑石
檳榔各等分
右為細末，每服貳錢，空心葱白湯調下。

療産後大小便不利下血。
車前子　黄芩　蒲黄
牡蠣　生地黄　芍藥各壹兩伍錢
右為細末，空心米飲服方寸匕，忌麵蒜。

通氣散　治産後大小便不通，亦可用封臍法。[illegible]

心　治婦人産後忽小腹脹如蠱，大小便不通，氣海、三里、關元、三陰交、陰谷主之。

[illegible]
[illegible]
[illegible]
按産後[illegible]
[illegible]
[illegible]
小便[illegible]
六君子湯一劑，又用五苓散一劑而[illegible]亦
可用

廣濟療産後淋瀝方
取故燕窠中草燒為末，以酒調下半錢，亦治男子。

集驗方　療産後淋瀝，亦治男子。
[illegible]石　[illegible]
右為末，服方寸匕，日三服。

補遺　療産後遺尿不知出時方
白薇　芍藥各等分　為末，酒服方寸匕。

補遺　治産後遺尿不知，可服固腸丸。
又仙方　病人睡遺尿不覺者死。

[illegible]熱氣壅於膀胱[illegible]

[illegible]又有肉[illegible]

[illegible]胞中故每隨小便[illegible]

[illegible]產後[illegible]

[illegible]則不失所[illegible]

[illegible]虛熱用本味丸若陰虛[illegible]以化

[illegible]丸益上生金金生水當滋化源也

[illegible]不淋癃或腹內出用分利降火之劑二年不

[illegible]氣虛用補中益氣湯不味地黃花

[illegible]治產後[illegible]

白茯苓　　白茯苓

葵子　　蒲黃

桃膠　　甘草

[illegible]

右剉散每服四大錢水一盞半[illegible]

薑煎至柒分去滓溫服亦可為末木通煎湯調下

[illegible]以木通煎湯調下

滑石散　治產後淋

滑石　　通草　　車前子

葵子

右為末以漿水調服方寸匕至二匕為妙

桃膠散　治產後小便不通淋閉

[illegible]空心溫酒調下貳錢一服便通

療[illegible]不得小便方

冬葵子[illegible]　右[illegible]

療產後淋小便痛及血淋

白茅根伍兩　瞿麥　車前子各貳兩

鯉魚齒壹百枚　通草貳兩　冬葵子貳合

右水貳升煮取壹升入魚齒末空心服

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未產之前內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用鹽於產婦臍中填可與臍平卻用葱白剝去麄皮拾餘莖作一切作一指厚安鹽上用大艾炷滿葱餅上大小以火灸之覺熱氣直入腹內即時便通神驗不可具述

小便數

右論夫產後小便數者乃氣虛不能制故也 薛按前證若因稠熱不衞以致脬損小便淋瀝者用八珍湯以補氣血若因脾肺氣虛而小便頻數宜補脾肺若肺腎俱虛而小便淋瀝須滋化源 一方婦人小便頻數時作後重乃脾肺虛弱用補中益氣湯加山茱山藥[illegible]以桑螵蛸散而愈後患發熱晡熱盜汗自汗月水不調用加味逍遙散而安 一產婦患前證[illegible]晡作渴此脾腎虛用補中益氣湯以六味丸而愈又患前後小便頻數下足冷屬陽[illegible]用桑螵蛸湯及六味丸而痊

桑螵蛸散 治產後小便數及遺尿

桑螵蛸 [illegible] 鹿茸 [illegible] 黃芪 各三兩

牡蠣 人參 厚朴 赤石脂 各二兩

右為末空心粥飲調下二錢 [illegible]

栝蔞湯 治產後小便數兼渴

黃連 [illegible] 栝蔞根 [illegible] 人參 [illegible] 甘草 [illegible]

右細切用水二升煮取升七分二服忌猪肉冷水

補遺 治產後小便數或遺尿 益智仁 [illegible] 米飲調服

小便不禁

陳無擇 婦人產蓐產理不順致傷膀胱[illegible]見收生者不謹損破尿脬[illegible]一月有徐婦年壯[illegible]宜可補完胞雖在腹恐亦可治[illegible]難產之由多是氣虛[illegible]血氣不虛[illegible]以參芪為君[illegible]桃仁陳皮[illegible]茯苓為佐煎以猪羊胞中湯[illegible]月而安[illegible]令氣血[illegible]胞自完恐稍緩亦難成功矣 薛按婦人產後小便不禁而微渴[illegible]後此膀

胱為坐婆所傷

黃芪 歸身尾 [illegible]

白朮 [illegible] 人參 [illegible]

甘草 [illegible] 以水煎[illegible]服

薛按前證若脾肺氣虛[illegible]用補中益氣湯[illegible]用不應佐以黃丸為主用腎氣丸[illegible]小便不禁一年不食面色或青或赤[illegible]肝脾氣血虛用加味逍遙散為主[illegible]真丸而愈後因怒小便自遺大便不實[illegible]遺頻亦仍用前散佐以六君子湯以滋肝火[illegible]

……血瘡

療治產後小便不禁　鷄尾毛燒存性酒調下方寸匕日三服

千金治產後遺尿不知出

白薇　芍藥各等分

為末酒服方寸匕日三

又方

桑螵蛸[illegible]　龍骨[illegible]

右為末食前粥飲調下貳錢

固脬散　治婦人臨產時傷手脬破小便不禁

黃絲絹[illegible]

右用水貳升煎至壹盞空心頓服服時飲氣服之不得作聲如作聲無效

補脬飲　治產後傷動脬破終日不小便但淋瀝不乾

生絲絹[illegible]　白牡丹根皮末　白芨各壹錢

用水壹碗煎至絹爛如餳服之勿作聲作聲無效

雞內金散　治產後溺床失禁

以雞肶胵壹具并腸洗燒為末酒調服方寸匕

小便出血

夫產後小便出血者因血氣虛[illegible]血得熱則流滲於胞內故血隨小便出[illegible]脈血崩

黃瘦肢少食此皆[illegible]補中益

氣湯服而後[illegible]

仍作用[illegible]

補[illegible]

治小便利血方

亂髮[illegible]

右燒研為末米飲調服方寸匕

又方　用滑石[illegible]亂髮[illegible]每服貳錢生地黃汁調下

崔氏方　療產後血滲入大小腸

髮[illegible]

右相和[illegible]分兩服

備急方治產後小便出血

用牛膝[illegible]水煎服

又方

生地黃汁[illegible]　生薑自然汁[illegible]

右相和服之

大便下血

婦人便血或飲食起居或六淫七情以致元氣虧
損陽絡外傷[illegible]不損絡用加味清胃散若
[illegible]若因怒動肝火[illegible]
[illegible]補中益氣湯[illegible]
[illegible]氣虛用四物加[illegible]
[illegible]用四物湯[illegible]若因[illegible]
[illegible]
[illegible]補中益氣[illegible]若因氣虛用六君
[illegible]因血虛用四物氣血俱虛用八珍俱加柴
[illegible]六味丸[illegible]
[illegible]大便下血久或元氣虛弱見腐[illegible]因脾胃
虛寒而外假熱症用木香[illegible]或補中益氣加
[illegible]脾氣[illegible]
[illegible]
[illegible]後[illegible]不[illegible]此中氣
虛有用補中益氣加[illegible]五分四劑頓止但
怔忡少寐[illegible]用歸脾湯治之而痊 一婦人
但怒便血寒熱口苦或胸脇脹痛或小腹痞悶此木
乘土用六君加山梔柴胡而愈又用補中益氣加吳
茱[illegible]藥而不復作 一婦人久下血在糞前屬脾
胃虛寒元氣下陷用補中益氣湯加連炒吳茱一錢
數劑稍緩乃加生吳茱五分數劑而愈 一婦人產
後便血口乾飲湯胸脇膨脹小腹悶墜內熱晡熱飲
食不甘體倦面黃日晡則赤洒淅惡寒此脾肺氣虛
先用六君加炮薑木香諸證漸愈用補中益氣將愈
用歸脾湯全愈後飲食失節勞役兼怒氣發熱血崩
[illegible]絕近熱入血室用加味小柴胡二
[illegible]補中益氣而血止用逍遙散歸脾湯調
[illegible]痊

產門不閉

婦人趣產勞力努嚥太過致陰戶……及陰戶突出產道腫痛……

續小便淋瀝

硫黃散 治產後勞傷陰脫

硫黃 烏賊魚骨 五味子

右為末……

桃仁膏 治產後陰腫妨悶

桃仁 枯礬 五倍子

右以下二味為末研桃仁膏拌勻傅之

補中益氣湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃 吳茱萸 兔絲子 蛇床子

右每服四錢水煎數沸……

驗法

……

當歸散 治陰下脫

當歸 黃芩 芍藥 蝟皮 牡蠣

為末每服二錢溫酒米湯任意調下……

治驗 一婦人三十餘歲生女二日後玉戶一物如手帕下有帕尖約重斤許……此因胎前勞之傷氣成肝痿所致……壞了急與參芪……錢當歸……錢半升麻五分……但下腑消痛處乾者落一片約五六兩……食進得眠診其脈皆滑……芍藥各錢……

一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀有二岐其夫來求治予思之此子宮也必氣血弱而下墜遂用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日後其夫復來……因服二次後覺響一聲視之已收陰戶……但因經宿乾著席上破一片如掌心大……傷成不可復生……尚可復完若氣血充盛必可生滿……參與二百貼……錢半人參……貼水……湯洗又用末傅之如此數次……

一……陰門不閉氣血虛弱也用十全大補湯……

正經[illegible]逍遙散若內熱寒熱[illegible]傷也
加味[illegible]恚怒肝火血傷[illegible]
[illegible]憂思[illegible]用十全大補[illegible]
[illegible]用補中益氣加茯苓[illegible]
[illegible]無有[illegible]丸[illegible]
[illegible]飲[illegible]
起此[illegible]
[illegible]歸脾[illegible]以升陽[illegible]
[illegible]治[illegible]潰不已形體[illegible]
[illegible]汗盜汗十年矣用補中益氣[illegible]
附方[illegible]
[illegible]水漸少飲食漸進又用歸脾湯共五十餘
一產婦玉門不閉小便淋瀝腹內一塊攻
[illegible]或脹或痛用加味逍遙散加車前子而愈
[illegible]二月乃入[illegible]以[illegible]
[illegible]用十全大補
湯[illegible]
治產後陰[illegible]下脫[illegible]不閉 石灰[illegible]
[illegible]澄清[illegible]水中以[illegible]
半後如故 又方以鐵精粉上推內之 又[illegible]
下[illegible]伍米[illegible]

[illegible]

一法[illegible]
[illegible]
[illegible]治產後[illegible]
補遺治產後[illegible]
又方[illegible]
名[illegible]
下[illegible]洗並收入而安
又方[illegible]脫出以溫水洗軟却用[illegible]燒[illegible]熱入
又法[illegible]拾肆粒[illegible]頂心如入即洗
去
新[illegible]附方[illegible]
東婦人陰門[illegible]不收[illegible]
[illegible]女人陰門[illegible]
用婦人陰[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
日即[illegible]服失笑散[illegible]歸湯[illegible]
不可治矣

陰蝕

右凡婦人少陰脉數而滑者陰中必生瘡名曰䘌瘡或痛或痒如蟲行狀淋露膿汁陰蝕幾盡者此皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡皆屬於心又云陽明主肌肉痛痒皆屬於心治之當補心養胃外以藥洗坐導藥治之乃可

肝脾鬱結之證木旺生蟲耳宜解鬱清肝

陰中生瘡類 一庵[illegible]有肝火[illegible]此因[illegible]食少熱渴小水淋瀝用加味逍遙散加味歸脾湯兼服間以補昔丸外以鶴虱草煎洗而愈

千金方 蒲黃 水銀壹兩 二味研勻以粉上

又方 肥豬肉拾斤水[illegible]碩煮水汲冷即易不過三

洗搨湯方

甘草 乾漆各壹兩 黃芩

乾地黃 當歸 芍藥各貳兩

龜甲伍兩

右細切以水柒升煮耗一半以綿帛內湯中以搨瘡處良久即易日二度每搨湯可人行十里許即裹乾捻取甘濕散薄傅瘡上使遍可經半日又以

湯搨搨訖如前傅藥 余家婢遇此疾醫療不差[illegible]蝕處作痛[illegible]檢得此方仍以自瘡[illegible]蛇牀散不[illegible]平復甚效凡治數十人隨手而愈

甘濕散 治陰蝕

蚺蛇膽 青木香 石硫黃

鐵精 麝香

右件味等分為末更細研有患取如一棗子和井花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部訖然後取藥如棗子安竹管中吹入下部中亦用再度老少量減其病[illegible]不用者[illegible]之良

療腐蟲蝕下部及五臟方 取桃東南枝[illegible]提頭使散以綿纏[illegible]將此綿桃枝燃[illegible]令木少[illegible]竹筒中內下部中以所燃藥桃枝熏[illegible]

文仲療陰蝕欲盡者方 以蝦蟆兔屎等分為末傅之良

狼牙湯古今錄驗 療婦人陰蝕其中爛傷膿水淋漓臭

稜

狼牙[illegible]

右㕮咀以水四升煮取半升去滓內苦酒如雞子[illegible]

中黃大沸湯[illegible]消盡復滴[illegible]

如有瘡湯以瀝瘡中日四五度即愈

治[illegible]後陰戶生瘡

白薟　黃丹　水粉

右件[illegible]

用豬肉鋪上拭肉中燒為末和前藥更以荊芥薄

荷[illegible]煎湯洗淨後摻藥如瘡乾可用油調末塗

治[illegible]

又方　平胃散加貫眾末每服二錢熟煮豬肝拌藥內

陰戶中

乳少

凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡

不調所致也乳汁多令投於地[illegible]乳無汁

若乳盈溢可淺東牆上作或有產後[illegible]若乳雖

脹而產後未作者此年少之人初經產乳有風熱[illegible]

須服清利之藥則乳行若累經產[illegible]津液

故也須服滋益之藥以動之若雖有乳卻又不甚多

者須服通經之藥以動之仍以羹臛引之蓋婦人之

乳資於衝脈與胃經通故也有屢經產[illegible]多

者亦婦人血氣不衰使然也大抵婦人[illegible]在衝

任經者乳汁少而其色帶黃所生之子[illegible]多疾

產婦有二種乳脈不行有氣血盛而壅閉不

行者有血少氣弱澀而不行者虛當補之盛當疎之

盛者當用通草漏蘆土瓜根輩虛者當用成鍊乳

粉豬蹄鯽魚之屬概可見矣[illegible]

而不能化生宜壯脾胃怒動肝脈而乳[illegible]

肝火大乳汁乃氣血所化在上為乳在下為[illegible]

產後乳或大便澀滯當滋化源

涌泉散　治乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡[illegible]

婦乳脹痛欲為邪毒或作癰腫此藥服之自然[illegible]

消乳汁通行

滑石（貳兩半） 蚯蚓（壹條） [illegible]

右為末溫酒調下貳錢並服後服藥後以豬蹄

羹投之經驗方有牡蠣燒存性 一方只用牡蠣

燒末酒調

又方

葵菜子（炒香） 縮砂仁（各等分）

右為細末每服貳錢熱酒調下滋益乳脈宣行

津液 上蔡張不愚方常用極有驗

產寶療產後乳無汁方

土瓜根 滑石（各壹兩） 甘草（壹兩）

通草（壹兩）

右以水剉升煎取壹升分溫貳服如常法 一方

加桂心為末酒服方寸匕

產書下乳汁

土瓜根為末酒調服壹錢日三四服

下乳汁以京三稜參個水貳碗煎取壹碗洗取汁下

為度極妙

湧泉散 成都教授單驤方療產乳無汁亦治乳結

癰腫

穿山甲（炮） 為細末溫酒調服方寸匕

必用方云滑石[illegible]多食豬蹄羹 括

蔞取子淨洗炒令香熟[illegible]取仁瓦上攤泡令白

色研為細末溫酒調下壹錢服了合面臥少時未

効再作 一方瓜蔞壹枚熟搗以白酒壹斗煮取肆

升去滓溫飲壹升日三

成煉鍾乳散 療乳婦氣少血衰脈澀不行乳汁絕

少

成煉鍾乳粉 濃煎漏蘆湯調下貳錢

產寶下乳汁立効方

粳米 糯米（各半合） 萵苣子（壹合並淘淨）

生甘草（半兩）

用水貳升煎汁壹升去滓分參服立下

又方 豬蹄（壹隻） 通草（肆兩） 水[illegible]作羹食之妙

餘一產婦因乳少服藥[illegible]乳腫脈[illegible]作渴

食罷[illegible]氣虛以上當服補[illegible]

玉露散 治乳脈不行身體壯熱[illegible]頭目昏痛大

便澀滯等證

川芎 桔梗 白芷（各貳錢）

芍藥 當歸（各壹錢半） 人參

白茯苓　甘艸各[illegible]錢

右作一服水貳鍾煎至壹鍾食後服如頭熱者[illegible]

便秘者加大黃伍錢

羅氏湧泉散　治婦人乳汁因氣絶少

瞿麥穗　麥門冬去心　龍骨

穿山甲炮黄　王不留行各等分

右為細末每服壹錢熱酒調下後吃猪蹄羹少許

又用木梳於左右乳上各梳數十遍[illegible]依

前法

又方治嬭汁少

產後乳少

瓜蔞根　薄荷幹身等分

右為粗末先吸羊蹄汁壹[illegible]後服藥後再吸葱絲

羊羹湯少許出效

有人乳汁不行已十七日諸藥無效遇有人送赤豆

一斗遂時常煮粥食之當夜乳脈通行

又方

麥門冬不拘多少去心焙為末以酒磨犀角

約[illegible]錢許調門冬末貳錢服之不過兩

服乳汁便下

乳汁自出

產後乳汁自出乃是身虛所致宜服補藥以止之

[illegible]多溫湯急痛者溫補[illegible]

以治之若有此證但以[illegible]

汁自出者謂之乳泣[illegible]

獨前證氣血俱虛用十全大補湯[illegible]

逍遙散用綿[illegible]加

秫歸脾湯　治婦人産後亡血乳汁[illegible]

陽氣虛而厥也宜以獨參湯[illegible]

數劑而安若婦人氣血方盛乳房[illegible]

漏增寒發熱用麥芽[illegible]兩炒[illegible]

以血氣如此何邪耶虛弱[illegible]

產後乳少　女科五

消癰散見前

吹嬭

產後吹嬭若因兒飲嬭之次兒忽自睡[illegible]

乳不時泄[illegible]積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通

腫結疼痛亦有不痒不[illegible]　吹嬭若不

急治腫甚成癰[illegible]　結癰速存

死者速服皂角散栝蔞散傳以[illegible]之

則散矣　獨前證用藥切不可[illegible]

乳癰條

栝蔞散方

乳香[一錢]研　括樓實[一个]研勻溫酒調服

天蔴菱散　南星為末　溫湯調以鵝翎掃塗患處

皂角散　歌曰

婦人吹妳治如何　皂角燒灰蛤粉和　熱酒一盃調

八字　須臾揉散笑呵呵

治乳結硬疼痛

百藥煎為細末　每服三錢　酒一盞煎數沸熱服

乳癰作痛　蔓荊子所以不飲調擦紙花貼腫處

補遺治產後吹妳結實腫痛

青橘皮[一兩]　甘草[一錢]　水或酒煎　分兩服

淡溫爛者　蘆薈獨活煎湯洗即散

妒乳

夫妒乳者由新產後兒未能飲之及乳不泄或乳脹

捏其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大

渴引飲牢強掣痛手不得近是也初覺便須以手捋

捏去汁更令傍人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱

勢盛必成癰也　輕則為吹乳妒乳重則為癰有

專門不可不知

連翹湯　治產後妒乳并癰

連翹　升麻　芒硝

玄參　芍藥　白斂

防風　射干　大黃

杏仁　甘草[各等分]

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

療產後婦乳仍結腫不消令吹乳自退方

瓜蔞　大份

右同剉用酒一盞煎服

不可忍即搜去敗乳時一服

臥於床上令其藥行故也

療產後吹乳作癰

蔡蛻及子

右擣篩為散酒服方寸匕即愈

又方　雞屎乾為末酒服方寸匕須臾三服愈

又方　皂角拾條以酒一升揉取汁硝石半兩煎成

膏傅之

療乳癰將大結成瘡方　右以白礬調塗之立愈

仲景療產後吹妳妬乳未結成膿成膿未作有

服之

敗荊子搗爛酒服仍以滓敷患處

又方用赤小豆酒研爛溫酒服滓封患處

又方仙人掌草壹握小酒糟壹塊生薑壹大塊同研
細入桂末少許炒 酒服渣罨患處

飛烏膏 聖惠曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁
出浸淫為長百種療不差者動經年月名為妒乳病
婦人飲兒者乳皆欲斷世謂苟抄乳是也宜以赤龍
皮湯及天麻湯洗之傅二物飛烏膏及飛烏散佳始
作者可傅以黃芩漏蘆散黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯
槲皮 切三升 右以水壹斗煮取五升夏冷用秋冬
溫之分以洗乳

天麻湯
天麻草 切五升 右以水壹斗半煎取壹斗隨寒
溫分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏著花
赤如鼠尾花亦以洗浸淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕
瘡小兒頭瘡洗畢傅膏散

飛烏膏散方
用燒朱砂作水銀上黑煙 一名細粉者三兩熬令焦燥 礬石 三兩燒粉
右二味以絹篩細以甲煎和之令如脂以傅乳瘡
日三作若不須和有汁自著可用散亦傅諸熱瘡
黃爛浸淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡
疳蝕口邊肥瘡蝸瘡等並以此傅之

又黃連胡粉膏散方
黃連 二兩 胡粉 十分 水銀 一兩同研令消散
右三味搗黃連為末三物相和合皮裹熟挼之自和
合也縱不成一家少水銀和之以傅乳
瘡諸濕瘡黃爛肥瘡等若著甲煎為膏

補遺 婦人乳頭小淺熱瘡以蒼耳花或葉為末
摻之又有婦人乳頭裂取秋後冷落茄子花裂
開者陰乾燒存性水調塗之

女科證治準繩卷之五 終

幼科證治準繩自序

醫家以幼科爲最難謂之啞科謂其疾痛不能自陳說也稱黄帝之言曰吾不能察其幼小爲別是一家調理耳吾獨謂不然夫幼小者精神未受七情六欲之攻藏腑未經八珍五味之漬投之以藥易爲見功猶草菜之變難窮而萌蘖之腹易材也何謂難乎然古今輯是科書未有能善者如心鑑之蕪穢類萃之粗略新書則有古無今百問則挂一漏萬皆行於世未足爲幼科準繩也故吾輯爲是編而痲痘一門尤加詳焉平生聚痲痘書百數十家率人所寶祕三人不傳者然多猥陋不足采擇益可以見世之無其興矣或曰夫人之病無論男女長幼未有能越五藏者也子於它科不分五藏而獨幼科分之何居曰正以精神未受七情六慾之攻藏腑未經八珍五味之漬獨有藏氣虛實勝乘之病耳粗工不能精究而臆指之曰此爲內傷此爲外感此爲痰此爲驚此爲熱妄投湯丸以去病爲功使輕者重重者死亦有不重不死幸而得愈者然已傷其眞元夭其天年矣吾之獨分五藏以此也大中丞沈太素公從大梁寄余俸金百以助刻費而是書稿適成遂鳩工刻之又踰年始竣因序而識之使後之人有考焉時

萬曆三十五年歲在丁未夏五十又三日念西居士

王肯堂宇泰甫書

幼科證治準繩目錄 [illegible]方名皆其單方無名者多

不互用故不復列覽者詳之

集之一　初生門

證治通論

錢氏論五臟所主　五臟病　五臟相勝

潔古論五臟五邪相乘補瀉大法　五臟補瀉法

察色　聽聲　脉法　死證　雜病

乳哺　雜將護法

初生

拭口法　浴兒法　斷臍法

灸臍法　裹臍法

服藥下胎毒法　甘草法　朱蜜法　黃連法　牛黃法　韭汁法　豬乳法　臍帶法　三朱粉法　藏衣法　剃頭法

百壽散　兒初生日與平和飲子

生下胎疾　月內不調諸病

初生不能啼　眼不開　生地黃湯　四聖散

洗眼方　不乳　茯苓丸　聖惠人參丸

朱砂丸　吐不止　木瓜丸　聖惠藿香散

不小便　葱乳湯　豆豉膏　不大便　大小便不通

如聖散　一字散　重舌　地黃膏

金朱飲　口中有蟲

定命散　聖惠牛黃散　張渙立聖散

張渙保命散　辰砂全蠍散　急風散

辰砂僵蠶散　千金龍膽湯　辰砂膏

控痰散　撮風散　宣風散

防風散　益脾散　一字金

黑白飲　劫風膏　封臍散　三方

錢乙藥黑散　張渙封臍散　異功散

龍骨散　張渙胡粉散　外消散

二豆散　張渙金黃散　驅風散

獨活湯

青金丸　太乙散　參蠍散

豬乳膏　朱銀丸　張渙聖星丹

白金散　烏金膏　天南星煎

祛風散　鐵粉散　羌活膏

麝香膏　胎癇　胎風　胎熱　生地黃湯

木通散　釀乳法　胎寒　甘豆湯

四聖散　地黃膏

胎肥　胎怯　浴體法　大連翹飲　胎黃　生地黃湯

地黃湯　地黃飲子　犀角散

二金散　真金散　洗心散

肝　瀉青丸　抑肝散
驚搐
大青膏　黃連安神丸　鎮心丸
急驚參蘇飲　人參羌活散　惺惺散
獨活湯　木通散　巴風丹
加味導赤散　仁齋犀角湯　通關散
嚏驚散　茅先生奪命散　錢氏涼驚丸
蠍天麻防風丸　全嬰方睡紅散　定搐散

順搐散　瀉青丸　羅氏鎮肝丸
防風湯　宣風散　定命丹
踈風散　演山截風丹　定搐散
牛黃清心丸　鄭氏比金丸　利驚丸
太白散　防風丸　全蠍散
火府散　湯氏金星丸　茅先生朱砂膏
大黑龍丸　小黑龍丸　謝氏奪命丹
比金丸　利驚丸　演山青金丸
真珠天麻丸　鄭氏驅風膏　睡安散
蛇頭丸　直指天麻丸　直指銀白散

定志丸　溫膽湯　加味地黃丸
五福化毒丹　安神丸　曾氏瓜苓散
百解散　木通散　三解散
牛蒡湯　防風湯　半夏丸
寬氣飲　五和湯　茯神湯
鎮驚丸　截驚丸　朱砂膏
不驚丹　薛氏參朮柴苓湯　安神鎮驚丸
慢驚瓜蔞湯　青州白丸子　溫白丸
釣藤飲子　羌活膏　海藏返魂丹
湯氏八仙散　醒脾散　礞乳方

撩痰方　陳氏方芎蠍散　油珠膏
補脾益真湯　前朴散　曾氏沖和飲
七寶散　六柱散　回生湯
固真湯　醒脾散　沉香飲
天麻飲　薛氏朮附湯　太乙保生丹
聚寶丹　金箔鎮心丸　天南星散
烏沉湯　沉香散　蘇青丸
銀白散　釣藤散　黑附子湯
生附四君湯　辰砂膏　七寶辰砂丹
觀音全蠍散　古州醒脾散　本事醒脾丸

蝎稍丸　錢氏利小散　梓朴散
豆卷散　東垣黃芪益黃散　生氣散
王氏惺惺散　醒脾散　大醒脾散
湯氏醒脾散　演山觀音全蝎散　直指八仙全蝎散
烏蝎四君湯　四八散　八味黑附湯
金液丹　生附四君子湯　異功散
大醒脾散　寶脾散　鎮驚丸
急慢驚　湯氏奪命散
保命丹　温驚丸　抱龍丸
琥珀抱龍丸　劉氏奪命散　天麻散

雄黃散　天麻防風丸　七味羌活膏
褊銀丸　防風膏　辟邪散
目睛瞤動　唇口瞤動　目白睛多　眼中瘀筋　目動咬牙
腹脹　蟬蛻鈎藤飲　清心丸　神芎丸
瘈瘲無汗　清暑清心飲

驚悸

温膽湯　寧志丸　茯神散
治要茯苓補心湯　茯神湯
酸棗仁丸　定志丸　治要茯苓散
朱雀丸　推傳寧志膏散　丹溪朱砂丸

本事辰砂遠志丸　加味歸脾湯
辰砂膽星膏　木通散

癇

錢氏五色丸　三因六珍丸　散風丹
保安丸　獨活湯　細辛大黃湯
牛黃丸　化風丹　比金丹
蛇黃丸　鎮驚丸　虎睛丸
七寶鎮心丸　清神散　妙聖丹
天麻丸　蛇黃丸　地龍散
龍腦安神丸　奪魂散　雌黃丸

拔萃妙香丸　鎮心丸　密陀僧散
代赭石散　神應丹　牛黃清心丸
清神湯　養心湯　妙香散
星蘇散　礬丹　元戎二白丸
朱砂滾涎散　琥珀壽星丸　南星五生丸
斷癇丸　定癇丸　碧霞丹
控涎丸　當歸大黃湯　元戎小靈寶丹
沉香天麻湯　牛黃丸　斷癇丹
紫河車丸

中風

角弓反張
搖頭
清肝益胃丸
偏風口噤
錢氏全蝎散　胃風湯
口噤失音
朱砂丸　全蝎散　寬氣飲
木通湯
天釣
乳能控涎散　釣藤飲　一字散

雙金散　牛黃散　白餅丹
抱聖丹　釣藤飲四方　乳香丸
木香丸　牛黃丸　塗頂膏
天漿子散　青黛丸　再生散
三仁散
拘攣
續命湯　追風散　手拳不展 薏苡丹
薏苡仁散　羚羊角散　脚拳不展 海桐皮散
當歸散　乾地黃丸
鷲癰鶴膝

大防風湯　獨活寄生湯　防己湯
袪風散　獨活湯　黑虎丹
排風湯
眼目
目赤腫痛 導赤散　小防風湯　小流氣飲
小菊花膏　通頂散　九仙散
三解散　草龍膽散　瀉肝飲
金波散　黃連膏　清涼膏
辟塵膏　速効飲　生熟地黃散
犀角飲　廣大重明湯　助陽和血補氣湯

柴胡復生湯　黃連羊肝丸　外障 保命羚羊角散
東垣補陽湯　羌活退翳湯　五秀重明丸
鎮肝散　井泉石散　羅氏煮肝散
龍膽飲子　內障 人參補胃湯　冲和養胃湯
滋陰腎氣丸　瀉熱黃連湯　千金補肝散
局方菊睛丸　眞珠膏　雀目 復明散
眼白多 山茱萸丸　通睛 湯氏牛黃丸　眼翻
小便不通
錢氏捻頭散　湯氏木通散　冬葵子散
張氏滑石散　車前散　蒲黃散

朱砂丹　朱砂散　瀉肺散
八正散　梔子仁散

淋

五淋散　局方五淋散　導赤散
葵子散　香芎丸　清心蓮子飲
金沙散　立効散　張渙石燕丹
石韋散　葵子散　滑石散
蒲黃散

遺尿

雞腸散二方　益智丸　破故紙散

尿白便濁

君朴丸　茯苓散　三稜散
香砂丸

疝

茱萸內消丸　當歸散　川楝丸
曾氏白芍湯　烏梅散　金鈴散
金茱丸　散氣丸　匀氣散
木香飲　龍膽瀉肝湯

陰腫

桃仁丹　切逆散　海蛤散
桃仁丸　[illegible]散　蚯蚓散
牡蠣散　牡蠣大黃湯　青木香湯
立消散　天花散

偏墜

黑散

陰瘡

臘茶散

不寐

仲景酸棗湯　本事鱉甲丸　真珠母丸
人參竹葉湯

咽喉

甘桔湯　立効散　吹喉散
牛蒡湯　化毒湯　備急散
牛蒡子湯　枝苓桔梗湯　消毒飲

集之三　心臟部一

心

安神丸　八物定志丸　瀉心湯
導赤散　生犀散　秘旨安神丸

發熱

五臟　梔子清肝散　柴胡清肝散

柴胡飲子 龍膽飲子 滋腎丸
實熱 茅先生三解牛黃散 牛黃涼膈丸
虛熱 當歸補血湯 補中益氣湯
加味逍遙散 表熱 敗毒散 清解散
集驗荊朮散 人參羌活散 羌活散
人參辛梗湯 紅綿散 裏熱 四順清涼飲
大黃朴硝湯 柴胡飲子 五和湯
寬熱飲 三黃丸 表裏熱 七寶散
白虎湯 餘熱 實脾散
參苓白朮散 安神散 簡易茯神散

壯熱 地黃煎 火府丹 金蓮飲子
黃龍湯 牛黃膏 梔子仁湯
六物黃芩湯 五物人參散 溫壯 柴芩湯
二黃犀角散 牛黃散 驚熱 天竺黃散
甘露散 辰砂金箔散 骨蒸熱 人參生犀散
地骨皮散 柴胡飲 鄭氏犀角飲
靈犀飲 煩熱 一粒金丹 絳雪丹
地黃煎丸 竹葉石膏湯 潮熱 地骨皮散
田氏犀角散 秦艽散 人參芎歸散
十味人參散 曾氏百解散 當歸散

一解散 大柴胡湯 龍膽丸
六合湯 豬膽丸 金星丸
四物二連湯 紅綿散 六神散
銀白散 桃枝丸 梔豉飲子
梔子湯 玉露飲 益元散
蘖安飲 調胃散 寒熱
柴陷薑散 柴胡湯 調氣散
當歸散 平和飲子 參杏膏

心痛

錢氏靈苓散 聖惠芍藥散 茅先生金鈴散

煩躁

清熱解毒丸 橘皮湯 黃連解毒湯
至寶丹 神芎丸 酸棗仁湯

注夏

清暑益氣湯 清燥湯

舌

重舌 烏魚散 青液散 當歸連翹湯
一捻金散 綠袍散 木舌 消黃散
川硝散 舌白胎 舌上瘡 舌上血出

諸失血證

人參當歸湯　黃芩丸　茅花湯
鈕血 四物湯　犀角地黃湯　黃芪芍藥湯
人參黃芪散　柏枝飲　阿膠散
紫參散　溺血 湯氏地黃湯　麥門冬飲子
龍膽丸　檗皮湯　槐花散
膠黃散　大小便血 五倍丸　河灰散
桃膠丸　火府散　車前散
語遲
錢氏菖蒲丸　張氏菖蒲丹　聖惠芍藥散
雞頭丸

汗
自汗 香瓜丸　止汗散　薛氏十全大補湯
團參湯　牡蠣散　撲汗方
血餘散　盜汗 錢氏黃芪散　白术散
當歸六黃湯　沉香鱉甲丹　茯苓丹
升麻湯　牡蠣散　虎杖散
噫氣
木香枳殼散　四味萸連丸
下氣
尋衣撮空

生地黃連湯
喜笑不休
瘡瘍
四黃散　一抹金　解表消毒飲
攻裏消毒飲　連翹飲　寄生散
玄參劑　凉膈散　托裏榮衛湯
秘方托裏散　仙方活命飲　神効解毒散
玄參丸　犀角消毒丸　托裏消毒散
托裏散　八味茯苓補心湯　天烏散貼方
青露散　驚毒掩　驚毒腫痛掩子

鐵箍散　神功散　丹毒 葛根白术散
犀角解毒散　防風升麻湯　荊芥散
防巳散　化丹湯　漏蘆湯 一名漏蘆散
藍葉散　升麻散　大黃散 二方
升麻膏　生料四物湯　藍青散
解毒散　赤葛散　紅散子
硝石散　綠袍散　白玉散
碧雪　冰黃散　撲丹 黃芩四物湯
五色丹　白丹 張渙香豉散　五香連翹湯
赤丹 升麻膏　張渙升麻膏　黑丹 張渙祛毒丹

一人丹　　賜火丹　　家火丹

張氏奪命散　　張渙玳瑁散　　朱田火丹 天竈火丹

縷竈火丹　　赤火丹 升麻湯　　乳香散

安先犀牛黃散　　張渙人參散　　玄胡散

消腫散　　身赤 丹參散　　麥門冬散

鉛霜散　　丹所起形狀及治法

五色丹 犀角散　　升麻膏　　鬱金散

丹入腹　　　　紫丹

飛龍奪命丹　　調氣散　　犀角升麻湯

枇杷仁湯　　枳殼牛蒡子湯　　健脾滲濕飲

和血定痛丸　　蔥熨法　　隔蒜灸法

如聖餅　　天蛇毒　　天泡 柴芎參苓散

加味解毒散　　金黃散　　楊梅瘡 換肌消毒飲

王瘤瘡 發瘡瘡　　紅絲瘡　　惡核瘰瘡 大聖散

玄參飲　　升麻湯　　柴芎參苓飲

清肝益榮湯　　加味小柴胡湯　　益氣養榮湯

必效散　　皂角子丸　　九味柴胡湯

琥珀膏　　加味羌活散　　當歸飲子

牛黃解毒丸　　立效散　　敗藥解毒散

苦狐散　　青金散　　枳根樹皮湯

玄參升麻湯　　化斑湯　　荊防敗毒散

人參敗毒散　　人參安胃散　　犀角消毒飲

地龍散　　九味解毒散　　加味清涼飲

人參消風散　　連翹防風湯　　和肝補脾湯

益脾清肝湯　　三黃散　　立效散

養心湯　　牛黃解毒散　　拔毒散

青金散　　水銀膏　　胡粉散

蔓荊子湯　　清上散　　當歸龍薈丸

清黃散　　清心丹　清白散　　交感丹

禹餘糧丸　　龍骨散　　羊角散

滋陰地黃丸　　白斂散　　口瘡 拔毒散

立效飲　　黃金散　　天竺黃散

地黃膏　　清胃散　　清熱消毒散

柳葉散　　如聖散　　牡蠣散

升麻防風湯　　清咽利膈湯　　白芷升麻湯

大連翹飲　　腹癰　　加味歸脾湯

腹癰　　內托羌活湯　　腿癰

小青龍湯　　桔梗湯　　升麻湯

排膿散　　排十湯　　人參平肺散

參芪補肺湯　　人參補肺湯　　大黃湯

薏苡仁湯　桃仁湯　牡丹皮散
便毒 內補黃芪湯　囊癰 托裏清肝散　山藥膏
附懸癰 白斂散　附人面瘡 神效當歸膏　乳香定痛散
豬蹄湯　附翻花瘡 藜蘆膏　多骨疽 漏瘡
集之四　心臟部二
痘疹上
溯源　預防　運氣　疫癘
辨疑似　五臟見證　部位　脉候
氣血　虛實　陰陽　形氣
輕重　順逆　動靜　形色
疏密　老嫩　乾溼　榮枯
標本　始終　日數　禁忌
汗下　證治大法　初熱證治　見形證治
預防
三豆湯　代天宣化丸　遡源解毒湯
養脾丸　消癌丹　秘傳保嬰丹
滋陰三寶散　四製白朮散　八珍膏
衛元湯　內托至奇湯　滴滴金
犀角地黃湯　茯神湯　野仙獨聖散
參苓白朮散加減　四真湯　龍金湯

紫草快斑飲　龍旋散　貞元散
龍蟠散　穀精龍膽散　消毒飲
磨積散　浚牛膏
大法
解毒防風湯　消毒救苦湯 又名束紅 消毒散
參芪飲 即保元湯萬氏名調元湯　十神解毒湯
羌活散鬱湯　太乙保和湯　益元透肌散
保嬰百補湯　八味二花散　保生散
初熱
升麻葛根湯　惺惺散　荊芥散
羌活散　薄荷散　羌活散
人參敗毒散　李氏敗毒散　正氣散
調解散　蘇解散　和解湯
王朝奉四物解肌湯　防風蒼朮湯
雙解散　葛根橘皮湯　五積散
桂枝葛根湯　柴葛桂枝湯　七物升麻丸
備急丸　加味四君子湯　和中散
六一散　大靈丹　無比散
小無比散　大無比散　玳瑁湯
犀角飲子　犀角湯　奪命散

牛蒡散　獨勝散　解毒跌痘湯
安斑散　西來甘露飲　渾元丹
蟬蛻膏　辰砂散
見形
快斑湯　消毒飲　奪命丹
發熱二三日痘未出　實表解毒湯　消毒快斑湯
清地退火湯　托裏快斑湯　十宣散
增損八物湯　匀氣散　加減參蘇飲
加減調中湯　連翹升麻湯　東垣鼠黏子湯
犀角消毒飲　麻黃甘草湯　田氏調肝散
龐氏地黃膏　出不快　消毒散　鼠黏子湯
化毒湯　透肌湯　九味羌活湯
辰砂五苓散　人參竹葉湯　白虎湯
紫草散　四聖散　紫草回斑散
紫草木通散　人參蟬蛻散　透肌散
紫草透肌湯　紫草快斑湯　烏金膏
紫金散　蘇葛湯　野通散
秘傳大透肌散　活血散　通天散
人參透肌散　升均湯　二花散
異功散　十補散　藍根散

絲瓜散　甘桔牛蒡子湯　水解散
胡荽酒　紫草飲　加味四聖湯
臙脂塗法　阮氏萬全散　化毒湯
解毒散　落桃花散　黃連解毒湯
加減犀角地黃湯　五龍湯　化斑湯
四仙散　玉泉散　玄參解毒湯
加味犀角飲　神應膏　黃檗膏
集之五　心臟部三
痘疹中
起發證治　灌漿證治　收靨證治　落痂證治
發熱　渴　煩躁　譫妄
驚搐　中風　自汗　失血
不能食　咳嗽　喘　涕唾稠粘
失音　嗆水　吐利　吐逆
瀉利　大小便閉
起發
活血散　芎歸湯　參耆四聖散　胎元散
獨參湯　水楊湯　祛邪湯
玉樞正氣丹　九味順氣散　紫草飲子
內托散　迴漿丹　茵陳熏法

不二散　快斑越婢湯　消斑化毒湯
羌活救苦湯　起發不透雞鳴散　震黃丹
天元接髓丹　內托散

灌漿

辟穢香　六一湯　助漿丸
升大散　補漿湯　漿泉散
轉環丹

收靨

回漿散　象牙散　敗草散
替參散　滅瘢救苦散　百花膏

排毒散　升陽解毒湯　雄黃散
綿繭散

落痂

四白滅瘢散　鉛粉散　調元固表湯
人參固肌湯　人參清神湯　馬齒莧散
羊剛骨髓

發熱

羌活湯　加味葛根湯　如聖湯
柴胡麥門湯　連翹散　梔子金花丸
三黃丸　白瓜散　通膈丸

渴

葛根解毒湯　人參麥門冬散　六味人參麥門冬湯
退火回生散　人參白虎湯　竹葉石膏湯
麥門冬湯　人參白朮散　生脈散
神功散　紅花湯

煩躁

活人酸棗仁湯　梔子豆豉湯　黃連解毒湯
牛黃清心丸　人參蟬蛻散　人參竹葉湯

譫妄

安神丸　梔子仁湯

驚搐

紅綿散　麻痘風搐方　解毒丸
柴胡二連丸　栝蔞散　保命丹

中風

消風散

自汗

浮麥散　敗蒲散　溫粉撲法

失血

犀角地黃湯　二宜散　衄血吐血玄參地黃湯
斷衄散

不能食
四君子湯　六神散　七珍散
人參養胃湯　麥冬參术散　二和湯
白术苦參湯　陳皮枳實湯
咳嗽
白术湯　五味子湯　人參清膈散
生地黃散　赤茯苓湯　桔梗湯
喘
杏甘湯　麻黃湯　前胡枳殼湯
葶藶丸　葶藶木香散　紫蘇甘草枳殼湯

葛根黃芩湯　五味子湯　六味凉血消毒散
涕唾稠粘
失音
補肺散　八風散　天花散
清肺散　梔子菖蒲湯　紫河車散
噙化丸
瘡水
吐利
理中湯　香蘇飲　紫草木香湯
人參胃愛散　黃芩加半夏湯　小和散

竹茹湯　和中湯　藿香正氣散
吐逆
柴連散　橘皮湯二方　橘皮半夏湯
丁香煮散　加味鼠粘子散　燈心竹葉湯
瀉利
黃芩湯　九味理中湯　陳氏豆蔻丸
理中湯丸　參术丸　香連丸
十一味木香散　治中散
大小便閉
八正散　滋腎丸　黃芩清肺飲

紫草木通湯　通關散　連翹湯
紫草冬葵湯　當歸丸　秦艽百祥丸
洗心散　三乙承氣湯　膽導法
加味四君子湯　潤腸湯　紫草麻仁湯
集之六　心臟部四
痘疹下
寒戰咬牙　厥逆　眼目　咽喉
腰痛　腹痛　腹脹　痛癢
一痛　身痛　癢塌　陷伏倒靨
黑陷　灰白　夾疹　夾斑

痘疔　痘癩　痘腫　潰爛
臭痘　虹痘　驗頭面　驗耳目鼻
驗咽口齒　驗喉舌　驗頸項　驗胸腹
驗手足　驗腰脇　驗飲食　痘後餘毒
水痘　麻疹
寒戰咬牙
柴葛桂枝湯　養衛化毒湯　袁氏獨附湯
清神化毒湯　無憂散　透骨解毒湯
催漿丹　滴滴金
厥逆

參附散　二神散
眼目
蟬蛻膏　治痘疹入眼方二　海藏地黃散
決明散　撥雲散　蜜蒙花散
通聖散　蛤粉散　洗肝明目散
蟬蛻明目散　蟬蛻散　密蒙花散
兎糞散　兎糞丸　吹耳丹二方
洗肝散　防風散　加味四物湯
羌活防風散　秦皮散　仙靈脾散
蒺藜散　蟬菊散　菊花散

消[illegible]散　羚羊角丸　羚羊角散
羚羊角飲子　撥雲散　兎糞[illegible]方
咽喉
活人如聖餅子　甘桔[illegible]湯　甘露飲子
地黃丸　甘桔防風湯　玄參升麻湯
射干鼠粘子湯　玉鑰匙　加減射干鼠粘湯
利咽解毒湯　三黃熟艾湯
腰痛
加味地黃丸　羌活當歸湯　如神湯
腹痛

定痛散　桂枝芍藥湯　黃連湯
一味異功散　蟬蛻一物湯　桂枝大黃湯
桂枝芍藥湯　黃芪建中湯　化毒湯
牛黃散　和解湯
腹脹
紫蘇承氣湯　桔梗枳殼湯　二陳加枳殼湯
加味透肌散　紫草厚朴湯　紫草枳實湯
木通芍藥湯
痛癢
痂

五物木香散　[illegible]

身痂

消毒飲　勻氣散

癢塌

參芪內托散　紫草木香散　一消風化毒湯

蟬花散　二物湯　金鉀散

震澤湯　天元二仙丹　七星散

白龍散　浴法

陷伏倒靨

龐氏鬱金散　四聖散　無價散

南金散　橄欖飲　白花蛇散

黑陷

寇氏麻黃湯　豬尾膏　龍腦膏子

四聖散　百祥丸　牛李膏

活人無比散　斑疹黑陷方　紫草散

奪命丹　談笑博金丹　大造保童丸

一字金丹　至寶丹　一粒金丹

天真膏　大成散　無價散

灰白

加減大紫草散　補元湯　活血散

[illegible]

助陽丹　回生起死丹

夾疹

荊防敗毒散　人參羌活散　清和散

夾斑

山梔子湯　陽毒升麻湯　陰毒升麻湯

痘疔

四聖散　二聖散　拔毒膏

飛龍奪命丹

痘癩

苦參丸

癰腫

潰爛

牛黃丹　生肌散　金華散

白螺散　乳香韶粉散　秘傳茶葉方

臭痘

蟬花散

定命湯　寒水丹

蛆痘

[illegible]

涼血解毒湯 人參敗毒散
樺皮散 十三味敗毒散 保命集木香散
流氣飲 小柴胡加生地湯 六味活血散
五福化毒丹 犀角消毒丸 托裏散
托裏消毒散 東垣瓜蔞湯 濟生歸脾湯
拔毒膏 隔蒜灸法 竹鍼丸
神效太乙膏 神效當歸膏 豆豉餅
如聖餅 神功散 三豆散 鐵箍散
連翹散 三黃散 草衣湯
蜆子水 玄參化毒湯 犀角消毒散

加味解毒散 蜞鍼法 涼肝明目散
望月沙散 羌菊散 木香大安丸
養脾丸 柴胡梔子散 小柴胡湯
槐花散 黃芪散 鉤藤湯
當歸桂枝湯 燈心湯 赤茯苓湯
太和散 五皮湯 塌氣丸
四苓湯 桃仁承氣湯 道閉湯
化䘌丸 黃連阿膠丸 洗心散
甘露飲 雄黃散 馬鳴退散
人中白散 吹口散 赴筵散

水痘
麥湯散 麥煎散
麻疹
瀉白消毒散 加味人參白虎湯 防風解毒湯
黃連解毒湯 朴硝 升麻解毒湯
麻黃湯 樺皮散 黃連湯
茅花湯 加味黃芩湯 銅壁山人黃芩湯
十全散 葛根麥門冬散 白虎合解毒湯
養血化斑湯 大青湯 加味地骨皮散
柴胡橘皮湯 柴胡麥門冬散 柴胡四物湯

文蛤散 雄黃散 門冬清肺湯
清熱除疳丸 當歸養血湯 黃連安神丸
卷之七 脾臟部上
脾
益黃散 人參安胃散 瀉黃散
不乳食
平胃散 調中丸 八味地黃丸
參苓白朮散 健脾飲 藿香飲
茅先生和氣散 調理衆病醒脾散 健脾散
調中飲子 白朮散

張渙集香煎　調中丹　和中丹
丁香黃芪散　千金地黃丸
脾弱多困
人參散
痰涎
半夏丸　白附丸　勝兒天竺丸
牛蒡子散　萬全鬱金散　小朱砂丸
金朱丹　譚氏金珠丸　半夏丸
劉氏消乳痰丸
吐瀉
（夏秋治裏）玉露散　香薷飲　車前子散
不換金正氣散　二順散　六和湯
（冬春治表）大安膏　守胃散　釣藤飲
（霍亂多熱為熱宜凉）（霍亂寒熱作）和胃丸　理中湯
理中丸　金液丹　豆蔻散
張渙勻胃散　助胃膏　（霍亂似寒熱雜合病）
（補虛）四君子湯　六君子湯　錢氏異功散
和劑觀音散　溫中丸　和中散　曾氏和中散
銀白散　（吟嘔）胃苓湯　（止渴）半粟散
（治吐）竹瀝丸　（治瀉）張渙和散　香豆散

丁時發人參散　（補虛）人參散　吟嘔散
吐
（寒吐）萬安膏　朱沉丹　定吐紫金核
香銀丸　木香白术散　薑橘湯
定吐飲　參香飲　（熱吐）香薷飲
竹茹湯　錢氏藿香散　木香麥門冬散
湯氏消脂飲子　聖惠麥門冬散　蘆根粥
大順飲　綠豆飲　益元散
濟生竹茹湯　（積吐）烏犀丸　（傷風吐）茯苓厚朴湯
（乳吐）消乳丸　消食丸　（風痰吐）青州白丸子
半夏散　錢氏鐵粉丸　茯苓半夏湯
二陳湯　白附飲　（毒氣）千金藿香湯
（挾驚）張渙三香丹　朱砂歸命丹　定吐丸
四季散　王氏睡驚丸　萬安膏
全蠍觀音散　（安胃）六神湯　人參散
掌中金　碌乳法
瀉
茅先生香連丸　乳香散　（冷瀉）守中湯
沒石子丸　張渙川椒丸　粟煎湯
（熱瀉）黃芩人參湯　張渙清胃散　香連丸

瀉 香橘餅　[illegible]散　[illegible]中散
生薑瀉心湯　保安丸　木香丸
醫局開胃丸　水瀉 聖惠厚朴散　張渙厚朴散
萬金龍骨丸　積瀉 香橘餅　驚瀉 至聖保命丹
定命飲子　朱君散　睡驚太乙丹
四神丸　二神丸　積瀉 沒石子丸
暴瀉 聖惠胡連散　龍骨散　張渙阿膠丹
玉粉丹　久瀉 千金七味散　聖惠丁香散
黃連丸　譚氏斗門散　嬰孺龍骨湯
龍骨湯　黃連煎　雞骨丸

溫白丸　猩猩散　香蔘丹
發瀉 聖惠厚朴散　地榆散　醫局胃風湯
赤白痢
羌活散　冰凌丹　寬腸丸　熱痢 黃連解毒湯
潑火散　芍藥蘗皮丸　寬腸枳殼散
三黃熟艾湯　地榆散　地榆飲
川草散　錢氏黃蘗丸　梔子丸
外臺子芩湯　聖惠梔子仁散　烏梅散
[illegible]治開胃散　冷痢 大順飲　養臟湯
雄朱散　玉脂散　治白痢艾湯

[illegible]湯　[illegible]香連丸　金粟丸
白附香連丸　豆蔻香連丸　木香丸
小香連丸　古氏香連丸　白膿 葛氏雞子餅
王氏脂附丸　丁時發附子散　赤白 聖惠黃連散
馬齒莧汁粥　張渙木蓼丹　張渙黃連丹
茜根湯　厚腸丹　聖效散
必效丹　古氏地榆散　膿血雜痢 白頭翁丸
肘後乳汁方　肘後近效方　千金黃蘗湯
聖惠吳藍散　椿根皮散　人參散
雞屎礬丸　養生黃連阿膠丸　燒髮散

張渙建胃丹　青橘丹　王兗通神丸
五色痢 澳東王先生餅湯丸　三霜丸
至聖丸　定粉散　噤口痢 石蓮散
香脯散　休息痢 松脂餅子　玉命丹
蠱痢 聖惠蘘荷散　聖惠黃連散　聖惠犀角散
嬰孺蘘荷根湯　嬰孺犀角煎　張渙白頭翁散
地榆丹　宣連丸　收澀 雙金散
萬金散　神效散　補養 升陽益胃湯
瀉痢兼證
[illegible]湯　[illegible]之湯　外臺[illegible]皮飲子

聖惠黄芪散 黄芩散 當歸散
龍骨散 藍葉散 地榆散
黄連散 檗皮散 甘草散
黄芩丸 太醫局人參散 嬰孺子芩湯
菰蘇湯 冬瓜湯 張渙建胃散
碧香丹 寶鑑竹茹丸 人參白扁豆散
吉氏六神丸 泄瀉 聖惠黄連散 黄檗丸
木香散 肉豆蔻散 龍骨丸
張渙順胃丹 建中丹 茯苓衛生固氣丸
張氏聖餅子 吉氏紫霜丸 寫痢後 聖惠桔梗丸

雄黄散 雞子粥 張渙龍骨湯
瀉渴 惠濟論塌氣散 止渴聖効散
腹痛
寒痛 調中丹 當歸散 七氣湯
指迷七氣湯 張渙寬中湯 蓬莪朮丹
溫胃丹 橘香散 曾氏檳香湯
熱痛 茯苓丸 積痛 湯氏三稜散 蟲痛 錢氏安蟲散
安蟲丸 蕪荑散 史君子丸
化蟲飲 二聖丸 鎖肚痛 烏梅散
盤腸內 錢氏釣藤膏 魏香散

蒜乳丸 乳香散 夜啼 芍藥甘草湯
聖惠人參散 錢乙和中散
腹脹
塌氣丸 木香消中丸 訶梨勒丸
張氏溫脾散 沉香煎 三因肥兒丸
六神丸 褐丸子 五疳保童丸
楊氏塌氣散 塌氣丸 塌氣散
分氣飲 三稜煎丸 三稜丸
阿魏丸 二方 小阿魏丸 真珠天麻丸
大柴連丸 下蟲丸 遇仙丹

中滿分消丸 消痞丸 升陽滋血湯
麻黄升麻湯
水腫
南星腹皮散 香陸胃苓丸 赤蒼飲
三白散 商陸丸 濬川丸
榮衛飲子 分氣飲子 大効神功救生丹
金匱加減腎氣丸
集之八 脾臟部下
疳
肝疳 天麻丸 [illegible]湯 [illegible]湯

張渙龍腦天麻丹　　烏蟾丹
蘆薈丸　皂角膏　神妙觀音散
人參散　通神丸　金箔茯苓散
心疳朱砂安神丸　茯苓丸　茯神湯
張渙參黃丹　天竺黃丹　朱砂丸
萬金真珠散　麝香丸　睡驚丸
桃花丸　脾疳四味肥兒丸　靈脂丸
神効換肌丸　張渙木香散　獺肝丹
肉豆蔻丹　聖惠木香丸　訶梨勒丸
芫花散　大胡黃連丸　大蕪荑湯

黃耆散　蘆薈丸　虎睛丸
肺疳地黃清肺飲　　化䘌丸
□□散　張渙麝香丹　靈砂丹
五靈脂丹　胡黃連丸　張國材肺疳散
腎疳調元散　九味地黃丸　張渙熊膽散
熊膽膏　立聖膏　二金散
通五疳保童丸　大蘆薈丸　蘆薈丸
萬應丸　博濟青金丹　靈苑紅丸子
譚氏蝦蟆丸　張渙夜明丹　劉氏金蟾丸
張氏香蟾丹　莊氏□□□丸　丁氏保童丸

吳氏[illegible]　胡連丸
熱疳胡黃連丸　無辜疳肥兒丸　聖惠鼈甲散
張渙蝦虎丹　香甲湯　張渙玉粉散
二肝丹　梅肉散　藍葉湯
天靈丹　溫臟湯　朴附丹
人中白散　朱砂丸　決明子丸
漏蘆散　漏蘆丸　五疳出蟲朱砂丸
聖惠乾蟾丸　麝香丸　蘆薈丸　出蟲丸
乾蟾丸　熊膽丸　定命散
青黛丸　錢乙胡連麝香丸　錢乙榆仁丸

蛔疳史君子散　蘆薈丸　張渙三根散
除毒丹　豬肚丹　殺疳丹
桃柳湯　苦楝丸　下蟲丸
脊疳聖惠金蟾散　地骨皮丸　殺疳丸
蘆薈丸　青黛丸　朱砂丸
腦疳聖惠牛黃丸　龍腦丸　吹鼻龍腦散
安息丸　龍膽丸　乾疳聖惠天竺黃散
青黛丸　牛黃丸　胡黃連丸
青黛散　牛黃丸　內疳史君子丸
東垣厚腸丸　張渙金粟丹　本事□朴丸

聖惠朱砂丸　麝香丸　麝香散
胡粉丸　譚氏寶命丹　外科紫金散
秋霜散　惠眼秋霜散　乳香丸
錢乙龍骨散　茅先生朱砂方　定命散
蟾灰散　聖散子　生金散
李琬麝香散　黑神散　孔氏無比散
曾氏燒鹽散　內金散　密陀僧散
紅鉛散　演山麝香散　傅齒立效散
獨活飲子　三黄散　人參散
檳榔散　黄芪散　地骨皮散

茅先生朱砂膏　牛黄膏　天竺黄散
三解牛黄散　檳榔散　口齒黄蘗散
吳氏青霞散　鼻湯氏五福化毒丹
澤瀉散　枇杷葉散　青金散
錢乙蘭香散　張渙石膽散　吹鼻蟾蜍散
錢氏白粉散　耳龍木殺疳散　退翳丸
下火瀉肝散　蕤仁膏　靈苑羚羊角丸
譚氏退雲散　張渙井泉石散　豬膽黄連丸
渴千金除熱結腸丸　黄芩湯
杏仁湯　張渙兆白沙　如聖湯

錢乙人參散　聖惠丸　張渙四珍丹
熊膽膏　通治集聖丸　疳積散
集驗神效丹　元和麝香丸　靈苑千金丸
太醫局蘆薈丸　錢氏肥磐丸
丁氏蝦蟆丸　張氏神麴散　張道人定命丹
演山史君檳榔丸　胡黄連丸　肥肌丸
熱湯氏鱉甲散　化蟲丸　豬肚丸
龍膽丸　烏犀丸　二丁丸　譚氏金瓜丸
蘆薈丸　茅先生柴胡散　六物黄芩湯
莊氏青黛丸　王氏史君子散　地骨皮散

豬肚黄連丸　柴胡飲　骨蒸乾地黄煎
雞肉煎丸　張氏三和飲子　犀角散
鱉血煎　黄連丸　渴聖惠天竺黄散
五膽丸　胡黄連散　黄連丸
錢乙龍粉丸　張渙青香丸　防己丸
溫肺散　杏仁散　積錢乙牛黄丸
張渙褐丸子　換骨丹　莊氏參苓散
香甲丸　趙氏青蒿丸　青金膏
豆蔻散　知母飲　經驗檳榔丸
疳仙人水鑑粉霜丸　錢乙一聖丸

胡黃連俱丸　張氏黃連丸　錢乙如聖丸
博濟胡連丸　香蔻丸　錢氏木香丸
沒石子丸　聚寶方黃龍丸　吉氏蘆薈丸
良方吳婆散　一本云聖惠肉豆蔻散　殺疳丸
白龍骨丸　肉豆蔻丸　聖惠黃連散
蕪荑丸　八香丸　張道人沉香丸
木香丸　白朮散　胡黃連丸
疳腫脹勻氣散　疳氣入陰烏金膏
虛羸
補中益氣湯　聖惠黃芪丸　秦艽丸

麥門冬丸　燒黃瓜丸　大黃丸
豬肚丸　香甲丸　聖惠訶梨勒散
溫脾散　五香煎　蘆薈丸
露星膏　錢氏橘連丸　二聖丸
香蟾丹　萬全雷丸丹　孔氏神聖丸
豬肚丸　趙氏斧槌丸　玉拄杖散
蘆薈丸　吉氏益兒丸　朱氏肥兒丸
六味肥兒丸　秘方肥兒丸
鶴節
地黃丸
丁奚
十全丹　褪劑散　快活丸
聖惠赤芍藥丸　嬰孺芍藥丸　張渙大麝香丹
哺露
聖惠人參丸
宿食
保和丸　木香大安丸　消食丸
七聖丸　三稜散　莪朮丸
丁香脾積丸　三黃枳朮丸　聖惠訶梨勒散
朱氏木香丸　朱氏洗心散　養脾丸

痞結
聖惠前胡散　聖惠甘遂破結散　進食丸
枳朮丸　枳實理中丸　快膈湯
參朮陷胸湯
積
千金紫雙丸　茅先生青金丹　萬靈丸
錢乙消積丸　紫霜丸　真珠丸
消堅丸　白餅子　張渙萬靈丹
剪紅丸　真方五色丸子　下積丸
[illegible]診丸　秘方進食丸　六聖丸

[illegible]丹丸　[illegible]　[illegible]
古氏追魂散　沉香檳榔丸　集驗蓬术丸
聖惠三稜散　張渙三稜散　聖惠化癖丸
丁香化癖散　青礞石丸　玉訣銀白散
快膈消食丸　莊氏紫金丸　莊氏快金丸
劉氏桃紅散　丁先生硇砂丹　小沉香丸
良方妙香丸　[illegible]茅先生蓬莪散　聖惠鱉甲散
化癖丸　木香丸　取癖丸
挨癖丸　聖惠前胡丸　朱氏知母丸

渴

三黃湯　聖惠黃連飲　麥門冬散
聖惠銀飲子　葛根散　茅先生胡黃連散
聖惠蘆根散　嬰孺麥門冬湯　蘆根飲子
葛蘇湯　錢氏白术散

黃疸

茵陳湯　梔子柏皮湯　犀角散
連翹赤小豆湯　加減瀉黃散
張渙蘆根湯　子芩散　茵陳湯
三黃散　雙連丹　當歸丸
小半夏湯　茯苓滲濕湯　[illegible]

瓜蒂散　[illegible]

滯頤

張渙溫脾丹　溫胃散　金朱丹
牛蒡丹

大小便不通

神芎丸　錢氏郁李仁丸　犀角丸
惠眼芍藥散　[illegible]丸

大便不通

聖惠芎黃散

集之九　肺臟部　腎臟部

肺

阿膠散　瀉白散

咳嗽

麻黃湯　三拗湯　加減三拗湯
五拗湯　百部丸　九寶飲
華蓋散　金沸草散　麥煎散
小青龍湯　清肺飲　解表散
和解湯　錢氏葶藶丸　人參荊芥散
褊銀丸　瀉肺湯　聖惠天門冬散
[illegible]　[illegible]　柴胡石膏湯

張渙杏膠湯　葶藶煎　木香半夏丹
順肺湯　聖惠陳橘皮散　麥門冬煎
茅先生妳豆膏　注唇膏　蜜瓜膏
生犀散　保肺湯　天麻防風丸
紫蘇子散　馬兜鈴丹　人參半夏丹
貝母湯　深師黃芪湯　加味四君子湯
赤貞蟬殼湯　白术五味湯　人參平肺散
葶五味子湯　薑苓半夏麻黃湯　甘桔湯
芍藥甘艸湯　烏梅丸　赤石脂禹餘糧湯
麻黃附子細辛湯　茯苓甘草湯　天麻散

天麻圓　琥珀散　貝母湯
匡寶散　外臺四物湯　張渙雄黃膏
精散　王氏解肌丸　附參丸
雞清散　聖惠射干散　陳橘皮散
蘿蔔子散　蟬蛻散　張渙桔梗湯
知母湯　雄黃散　如意膏
雄黃丹　玉訣貝母丸　油滚丸
惠眼內金丸　腦子散　聖惠杏仁煎
金杏丸　勻氣散　聖惠蘇蘇煎
不灰木散　桑白皮煎　知母散

貝母散

喘

碧玉丸　補肺散　坎離湯
聖惠杏仁煎　八味理中丸　張渙蟬殼湯
聚寶平氣飲　生白丸　枳實湯
半夏丸　大効雄朱化痰定喘丸
天麻定喘飲　紫蘇飲子　麻黃杏子甘艸石膏湯
青龍加石膏湯　真珠散　千金射干湯
梅花飲子　二聖散　定喘飲

馬脾風

牛黃奪命散　無價散

悲哭

錢氏蟬花散　本事龍齒散　乳香丸
木香丸　牛黃膏　青雲散
聖惠犀角散　羚羊角散　龍齒散
柏子仁散　腹啼 養臟湯　嬰孺黃芪散
魏香散　開胃丸　白术當歸煎丸
六神散　夜啼 花火膏　錢氏當歸丸
張渙萬金散　田氏五味子散　釣藤膏
釣藤飲　聖惠乳頭散　古氏朱砂膏
安神散　三月桃花散　茅先生抹唇膏

痞

王先生通關散　千金大補心湯　張渙竹瀝膏

救生菖陽湯　刪脾散

鼻

消風散　薄荷湯　張渙辛夷膏

吉氏蔥涎膏　聖惠龍腦散　張渙清肺膏

張渙菊花散　聖惠菊花散　萬全芎藭散

聖惠木通散　張渙犀角升麻散　萬全麥門冬丸

楊氏地黄散

龜胸

聖惠大黄丸　張氏百合丹

龜背

張氏松蘂丹

脫肛

張渙蕪荑丹　妙應散　曾氏薄荷散

聚寶象豆丸　紫古方倍子散　錢氏赤石脂散

曾氏蟠龍散　伏龍肝散　澁腸散

肛癢

勝雪膏　蓖麻膏　苦參湯

化𧏾丸　雄黄散

腎

地黄丸

解顱顖陷顖填總論

張渙封顖散

解顱

天南星散　曾氏調元散　張渙玉乳丹

雙猴狗腦丸　小兒鋼顖藥　參苓散

王氏封顖散　三辛散

顖陷

烏附膏　聖惠生乾地黄散

顖填

行遲

張氏麝茸丹　錢氏羚羊角丸　生乾地黄丸

虎骨散　三因五加皮散　柴胡飲

良方左經丸　丁時發續命丹

齒遲

張渙香附丹　湯氏芎黄散

髮遲

張氏生[illegible]丹　[illegible]　香[illegible]煎

髮黃
齒
清胃散　張渙藁本散　雄黃丸、
莊氏麝香散　聖惠蝦蟆散　聚寶黃龍散
耳
張渙通鳴散　聖惠細辛膏　麝香散
菖烏散　張氏紅綿散　田氏紅玉散
湯氏龍黃散
五輭
全靈散　生筋散　竹茹散

貼頭起項膏　狼毒丸
五鞕
小續命湯
寒熱往來
太陽病小柴胡湯　張渙秦艽湯
人參前胡散　芍藥湯　王氏柴胡人參湯
全生荊芥散　全生備急丸　玉訣真珠丸
嬰孺六味湯　大黃丸　聖惠柴胡散
五味子散　人參散　黃芪丸
張渙香□散

瘧
全生指迷葳蕤湯　清脾飲子
全生薑桂湯　草果飲　清脾湯　二薑丸
胡黃連散　張渙桃仁湯　全生鱉甲湯
張渙烏梅丹　全生旋覆花丸　半硫丸
張渙知母丹　桂枝麻黃各半湯　知母麻黃湯
柴胡桂枝湯　白虎加桂湯　十味香薷散
養胃湯　四獸飲　鬼哭散
丁香大五補湯　聖惠犀角散　三聖丸
二仙散　祛瘧丹　鱉甲飲子

經效瘧丹　瘧母丸　消癖丸
大腹皮湯　青皮湯
鬼病
龍膽湯　聖惠甘草散　大黃丸
張渙虎骨丹
客忤
真珠散　安神丸　真珠散
張渙辟邪膏
中惡
蘇合香丸　沉香降氣湯

聖惠桃奴散　聖惠鬼箭羽散　聖惠雄黃丸

鬼箭羽湯

卒死

鬼持

外臺深師五邪丸

痓病

太乙備急散　錢仲陽白朮湯　聖惠木香散

犀角散　張渙雌黃丹　立効湯

七物紫參丸　聖惠羖羊角散　升麻散

雄黃散　嬰孺雄黃丸　張渙雄麝散

麝犀湯

證治通論

金壇王肯堂宇泰甫輯

錢氏論五藏所主

心主驚　實則叫哭發熱飲水而搐　虛則卧而悸動不安　肝主風　實則目直大叫呵欠項急頓悶　虛則咬牙多欠氣熱則外生氣濕則內生[illegible]　脾主困　實則困睡身熱飲水　虛則吐瀉生風　肺主喘　實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者　虛則哽氣長出氣　腎主虛無實也惟瘡疹腎實則變黑陷　更當別虛實證假如肺病又見肝證咬牙多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目直大叫哭項急頓悶者難治蓋肺久病則虛冷肝強實而反勝肺也視病之新久虛實虛則補母實則瀉子

五藏病

肝病哭叫目直呵欠頓悶項急　心病多叫哭驚悸手足動搖發熱飲水　脾病困睡泄瀉不思飲食　肺病悶亂哽氣長出氣氣短喘急　腎病無精光畏明體骨重　潮熱則從心寒則從腎嗽而氣上從肺風從肝瀉從脾假令瀉兼嗽又氣上

爲病也宜瀉白益黃散合而服之脾苦濕肺苦燥氣上逆也其症見瀉又兼面色黃腸鳴呦呦者宜服理中湯瀉而嘔者宜服茯苓半夏湯如瀉而渴熱多者宜服黃芩厚朴湯不渴而熱少者宜服白术厚朴湯其他五藏若有兼症皆如此類推之更詳後論四時推移用藥

五藏相勝

肝病秋見肝勝肺也肺怯不能勝肝當補脾治肝益脾者母能令子實也補脾益黃散治肝瀉青丸主之　肺病春見肺勝肝也肝怯故受病當補肝腎治肺補肝腎地黃丸治肺瀉白散主之　肝病見秋木旺肝勝肺也宜補肺瀉肝輕者肝病退重者唇白而死　肺病見春金旺肺勝肝也當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當搐海藏云爲肝怯故目淡青色也　心病見冬火旺心勝腎也當補腎治心輕者心病退重者下竄不語腎怯虛也　腎病見夏水勝火腎勝心也當瀉腎輕者腎病退重者悸動當搐　脾病見四旁皆倣此治之順者易治逆者難治脾怯當面目赤黃五藏相反隨證治之

要右五藏相勝病隨時令乃錢氏擴充內經藏氣法時論之旨實發前人所未發者也[illegible]見於條

又早晨乃肝自病於本位也今反見於秋及日晡肺之位知肺虛極肝往勝之故當補脾肺瀉肝也餘倣此

潔肝勝肺則肝病身熱發搐又見肺虛喘而氣短病見於申酉戌時是肝真強也內經云受所制而不能制謂之真強法當補脾肺而瀉肝導赤散瀉黃散主之　劉宗厚云此皆五藏相勝病機不離五行生尅制化之理者蓋小兒初生機稚未有七情六慾只是形體脆弱血氣未定藏府精神未完所以有藏氣虛實勝乘之病但世俗不審此理往往遇是率指爲外感內傷而用藥致枉死者多矣悲夫錢氏論時令臟腑略舉而瀉補之今特參附誠無窮之惠也

五藏五邪往來相乘補瀉大法

五藏子母虛實鬼賊微正若不達名意不易得而入焉　在前者爲實邪子能令母實也賊傷於母其子又引母所勝者妻來相助故曰實邪也在後者爲虛邪母引子之鬼賊至而母能使子虛也內經云子能令母實母能令子虛此之謂也　妻來乘夫爲微邪夫來乘妻爲賊邪法當瀉鬼補本藏本藏自病爲正邪當虛則補之實則瀉之內經云滋苗者必固其根伐下者必枯其上逆其根伐其本則敗其真矣　心主熱自病或大

瀉心湯主之實則煩熱黃連瀉心湯主之虛則驚
悸生犀散主之　肺乘心微邪喘而壯熱瀉白散主
之　肝乘心虛邪風熱煎大羌活湯下大青丸主之
脾乘心實邪泄瀉身熱瀉黃散主之　腎乘心賊
邪恐怖惡寒安神丸主之　肺主燥自病則喘嗽燥
則潤之實則喘而氣盛瀉白散主之虛則喘而少氣
先益黃散後阿膠散主之　心乘肺賊邪熱而喘嗽
先地黃丸中導赤散後阿膠散主之　肝乘肺微邪
惡風眩冒昏憒嗽羌活膏主之　腎乘肺實邪惛寒
嗽清利白部丸主之　脾乘肺虛邪體重吐痰泄瀉

嗽人參白术散主之　肝主風自病則風搐拘急肝
苦急急食甘以緩之佐以酸苦以辛散之實則風搐
力大瀉青丸主之虛則風搐力小地黃丸主之　心
乘肝實邪壯熱而搐利驚丸涼驚丸主之　肺乘肝
賊邪氣盛則前伸呵欠微搐法當瀉肺先補本藏補
肝地黃丸主之瀉肺瀉白散主之　脾乘肝微邪多
睡體重而搐先當定搐瀉青丸主之搐止再見後證
則別立法治之　腎乘肝虛邪憎寒呵欠而搐羌活
膏主之　脾主濕自病則泄瀉多睡體重昏倦脾苦
濕急食苦以燥之實則泄瀉赤黃睡不露睛瀉黃散
主之虛則泄瀉白睡露睛白术散主之　肝乘脾
賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之　心乘脾虛邪壯
熱體重而瀉羌活黃芩蒼术甘草湯主之　肺乘脾
實邪能食不大便而嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下葶藶
丸　腎乘脾微邪惡寒泄瀉理中丸之類主之　腎
主寒自病則足脛寒而逆人之五藏惟腎無實小兒
瘡疹變黑陷則是腎實水尅退心火　心乘腎微邪
內熱不惡寒桂枝湯主之　肺乘腎虛邪喘嗽皮澁
寒百部丸主之　肝乘腎實邪拘急氣搐身寒理中
丸主之　脾乘腎賊邪體重泄瀉身寒理中丸主之

凡五藏虛弱是自己正令不行乃鬼賊之所尅害
當補本藏之正氣假令肺病喘嗽時於初春見之法
當補腎見於夏救肺見於秋瀉肺見於冬補心瀉本
藏又名寒嗽大抵五藏各至本位即氣盛不可更補
到所尅位不可更瀉

五藏補瀉法　錢　凡病先虛或已經下有合下者必先
實其母後瀉其子也假令肺虛而痰實此可下之證
先當益脾後方瀉肺也　瀉青丸又名瀉肝丸　錢
氏謂肝無補法故無補肝藥王海藏以四物湯內加
防風羌活等分爲細末煉蜜丸名補肝丸　又以瀉

丸去梔子大黃名鎮肝丸治肝虛　導赤散瀉丙
小腸　瀉心湯瀉丁心　安神丸治心虛疳熱神思
恍惚　海藏八物定志丸補心正藥　益黃散又名
補脾散海藏云此劑補脾以燥濕東垣云治胃中寒
濕嘔吐腹痛瀉利清白之聖藥也　瀉黃散又名瀉
脾散海藏云瀉脾熱　阿膠散又名補肺散海藏云
杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之類也　瀉
白散又名瀉肺散海藏云治肺熱骨蒸自汗用此直
瀉之梔子黃芩亦瀉肺當以氣血分之　地黃丸即
金匱八味丸去桂附海藏云治腎虛解顱即蹇病也

治脉毛而虛　錢氏謂腎無瀉法故無瀉腎藥海藏
瀉腎丸治脉洪而實即前地黃丸熟地改生地去山
茱萸是也此治左手木部脉者有尺洪實以鳳髓丹
瀉之　詳見五臟各門總論

察色　古稱望而知之謂之神而小兒醫號爲啞科脉
來馳疾難於指下分明尤以察色爲要故首叙之
夫嬰兒惟察其面部必有五色以知病源人身五體
以頭爲首首中有面面中有睛睛中有神神者目中
光彩是也隱顯横衝應位而見以應五臟五色者青
黃赤白黑五臟之色心赤肝青脾黃肺白腎黑五臟

所主病證繫於內必形色見於外故小兒有病先觀
其本部形色以論其五行生尅吉凶形色若不相應
然後聽聲切脉

觀面上部　左顋爲肝合左手關位肝膽之分應於東方木爲初之氣　右顋爲肺合右手寸脉肺與大腸之分應於西方金爲五之氣　額上爲心合左手寸口心與小腸之分應於君火爲二之氣　鼻爲脾合右手關脉脾胃之分應於中土爲四之氣　頦爲腎合左手尺下部腎與膀胱之分應於寒水爲終之氣　赤者熱也

黃者積也白者寒也青黑者痛也隨證治之　水熱
錢方云青色者爲驚積不散欲發風候　紅赤色者
爲疳爲痰積壅盛發搐煩躁增進　黃色者亦爲熱

爲食積癥傷欲作疳候或作痃癖若神思昏沉其候
潮熱氣癃困倦或嘔噦或瀉痢　白色爲寒爲肺氣
不利大腸滑泄欲作吐利　黑色者爲痛所傳不順
變證即爲逆候榮衛失序爲殆危惡　全嬰方云左
頰屬肝東方之位春見微青者平深青者病白色者
絕赤色主身熱拘急肝熱生風青黑色主驚悸腹痛
淺赤色主潮熱夜間發日中歇啼紅焦燥脉必緊數
右頰屬肺西方之位秋見微白者平深白者
病赤色者絕淺色主潮熱或大便堅而氣粗喘嗽青
白色主咳嗽惡心青色主風入肺時時咳嗽青黑色

主驚風欲發或用攻驚勝風藥　額上屬心南方之
位火性炎上故居上夏見微赤者平深赤者病黑色
者絕赤色主心經有風熱心躁驚悸睡臥不安青黑
色主心中有邪熱腹疼手足厥逆面啼叫青黑甚
至心腹疼黃色主發熱背熱渴及乾燥夜多盜汗
頭髮焦黃　鼻上屬脾中央之位故居中而四季見
微黃者平深黃者病白色者絕赤色主身熱不思乳
食深黃色主小便不通鼻孔乾燥氣粗鼻衄夜間多
哭淡白色主泄瀉食不化青色主吐乳口舌乾燥大
小便不利　下頦屬腎北方之位水性潤下故居下

冬見微黑者平深黑者病黃色者絕赤色主膀胱與
腎經有熱則水道不利故小便癃閉　永類鈐
方肝經所主瞳中屬人肉藏其神外先五輪眶眥屬
心熱即生眵兩眥總心熱痛如鍼白睛屬肺家熱赤生
翳黃睛屬肝藏從下降翳障中心瞳人腎熱不明眼忽眵
脣發風發搐　心部所主額面臉頰皆屬心位黑即
死困青即發搐赤心發風白即邪氣虛黃衛積浮腫
病道心絕何因人叫數聲過關不叫必有驚聲加熱
發癇散熱清心　脾部所主唇口兒病人中承漿四
圍上下合口脾經開口[illegible]有瘡腫殺舌瘡三
焦積熱銜和如血深紅主瀉熱口薰口木舌重舌脾
肺熱就口內噴臭脾腎氣寒色如死肝大驚一嚇口
乾唇白常時積熱漸必傳心心氣不足令兒煩哭何
知脾絕指甲皆黑目無神光定期用藥五種撮口驚
風更惡不治証　肺部所主鼻準兩孔并連山根大
小二背肺部所在鼻孔黑燥即肺經焦黑燥如墨肺
經即絕鼻中赤癢瘡盛蛔長或瀉白痢膈寒困寐或
流清涕傷風青腫肺熱鼻塞因息吹得或感風寒亦
有陽隔鼻燥即痰鼻積熱　腎部所主耳穴之前
一曰耳花耳孩名輪輪裏名廓輪廓焦黑腎家虛熱

其黑如炭腎絕死且耳門生瘡衛積非常耳中膿出
腎熱病極臭名聤耳膿汁不止瘡癢如烈其候虛熱
忽聾不聰心腎氣虛常作閃閃然氣上攻或如蟲刮
榮虛衛熱耳輪如冰耳後有紅絲麻痘相侵耳輪紅熱
傷寒是則熱極內痛膈氣相攻痛心涼腦關竅通塞
兒孩兩腎常虛無病切莫攻擊補亦無益　察肝病
面白　肺病面赤　脾病面青　腎病面黃　心病
面黑　若肝病驚搐而又加面白痰涎喘急之類此
皆難治餘倣此推之假令春分前風寒也宜用地黃
瘥活防風或地黃丸及瀉青丸相間服之春分後風

熱也宜用羌活膏用以散風邪化痰導赤散下之立夏後熱也宜用三黃丸導赤散夏至後濕熱也宜用導赤散瀉黃散合而服之或黃芩人參木香之類秋分後用瀉白散立冬後用地黃丸上之謂腎不受瀉也　髮青主驚積不散欲發風候紅主痰積驚悸熱者食積發傷欲作疳疾紅主下痢青主水殺吏欲作吐當主驚悸欲絶　印堂青主初患驚瀉紅主大驚夜啼黑主客忤　山根青主二次發驚瀉後發躁黑黃甚者死　年壽平陷主夭青主發熱生驚黑主利死紅主躁死微黃曰平黃甚曰霍亂　承漿青主食時被驚

黃主吐逆赤主血利黑主驚風　兩眼黑睛黃主有熱白睛黃主食積疳痢白睛青主驚風黑睛黃主傷寒　眉上青吉忽紅主煩躁夜啼黃主霍亂久病紅者死　風氣二池青主風候紫主吐逆或發熱黃主吐逆赤主煩躁夜啼　兩頰赤主肺有客熱　兩太陽青主一次受驚青自太陽入耳者死紅主血淋　兩臉青主客忤黃主痰溢赤主風熱　兩頰赤主傷寒　兩頤青主吐蟲　兩金匱青主第三次驚風黑逆口二日死青連耳入耳七日死　兩風門紅主風熱黑主面青主水驚黑從耳入耳即日死唇黑不食者死　面青肝病面赤心病面白肺病面黃脾病面黑腎病　額間赤色主心經有熱煩躁驚悸若飲水或叫哭屬本經實熱用瀉心散以清心火微赤因臥驚悸熱渴飲湯屬虛熱用秘旨安神丸以生心血青黑主驚風腹痛或痰疾啼叫用五味異功散加木香柴胡鈎藤鈎補脾肝青黑主心腹作痛此寒水乘心用益黃散微黃主驚疳用安神丸　左臉青或兼赤主肝經風熱項強頓悶目劄痰疾用柴胡清肝散色微赤倏熱咬牙屬虛熱用地黃丸青黑主肝尅脾而驚搐腹痛用六君子加薑桂微赤主潮熱血虛心

躁先用秘旨安神丸次用地黃圓　右臉赤主風邪氣壅咳嗽發熱飲水爲實熱用瀉白散若哽氣出氣唇白氣短屬虛熱用五味異功散若脾熱所傳用清胃散心火所刑用人參平肺散淡赤主潮熱心躁或大便堅秘用宜明柴胡飲子以疏導如潮熱未止更用鈎藤飲以清肝色青白主咳嗽惡心先用惺惺散解表邪健脾土更以六君子湯調補中氣色青黑主驚風腹痛盤腸內鈎用六君鈎藤鈎平肝補脾　鼻微黃爲平赤主脾胃實熱身熱飲水乳食如常用瀉黃散青熱理脾微赤主脾經虛熱身凉飲湯乳食少

思用五味異功散補中健脾色深黃主小便不通
中乾燥氣虛衄血乃脾熱傳於肺腎先用濟生犀角
地黃湯後用地黃丸色淡白乃脾虛泄瀉乳食不化
用六君子湯調補中氣青色主脾土虛寒肝木所勝
用五味異功散加木香炮薑溫中平肝黑爲死候
頦間色赤主腎與膀胱氣滯熱結而小便不通用五
苓散以分利鼻準微黃兼右腮微赤乃脾肺燥熱不
能化生腎水用黃芩清肺飲膀胱陰虛陽無所生用
滋腎丸若頦間微赤乃膀胱陽虛陰無所化用六味
地黃丸若小腹脹滿或陰囊腫脹屬陰虛濕熱壅滯

用六味丸加車前牛膝脾肺氣虛不能通調水道者
亦用前藥其小便赤色久而尿血亦屬肝腎氣虛有
熱用六味地黃丸如不應則用補中益氣湯益脾肺
生肝腎若小便後出白津或莖中作痛屬肝經濕熱
先用龍膽瀉肝湯後用六味地黃丸　印堂青黑主
腹痛夜啼此脾氣虛寒也脾爲至陰故夜間腹痛而
啼用鈎藤飲色淡白主泄瀉乳食不化屬脾氣虛弱
用五味異功散加木香　人中黃主傷乳胃逆青主
下利乳食不化噯氣酸腐此脾虛停滯先用大安丸
消食後用異功散[illegible]唇色白主

吐瀉嘔逆或吐血便血乃脾[illegible]能攝血統血
歸源急用六君子湯色赤乾燥而皺者主脾經熱瀉
大便不通煩熱不寐先以清胃散治其熱次以四君
黃連山梔調其脾黃主食積泄瀉乳食不化以六君
子湯健脾色赤兼白主衄血乃脾肺虛熱不能攝血
歸源用聖濟犀角地黃湯清熱補血用四君子湯以
補脾氣如久不應用麥門冬散或人參安胃散　口
吻色黃主脾經積熱用清胃散久病用四味肥兒丸
以治疳熱唇口抽動主驚熱不安用異功散加山梔
鈎藤鈎補脾平肝若口流涎唇色紫乃脾氣虛寒用

異功散加炮薑木香若腹中痛口吐涎乃蟲作痛先
用蕪荑散後用調中丸不吐涎是積痛也用異功散
手足厥冷用理中湯加烏梅溫補中氣而痛自止或
吐後或大便去後而痛止者先用下積丸後用異功
散　白主失血死青主驚風死黑色繞口者不治耳
後微赤此少陽經風熱用柴胡飲子清肝生血微黃
主睡中驚悸咬牙用四君子加芎歸升麻以補脾
氣　耳乾燥主骨疳蒸熱作渴盜汗用地黃丸若小
便後出白津或玉莖癢痛屬肝經濕熱先用龍膽瀉
肝湯後用地黃丸若稟賦腎不足或近女色所致

小便澀滯或作痛如淋者急用地黃丸補中益氣湯
滋其化源或大小便後穀道牽痛者其虛尤甚用
前丸加牛膝車前肉桂如手足逆冷或畏寒少食陽
氣虛寒也急加附子多可得生大抵多因稟賦臟氣
不平或乳食寒暑失節或姙娠乳母飲食起居六淫
七情所致若初病元氣無虧乳食如常發熱壯熱二
便秘結作渴飲水睡不露睛者悉屬形病俱實當治
邪氣若病久元氣已虧食少發熱口乾飲湯嘔吐泄
瀉肢體畏寒而露睛者悉屬形病俱虛當補正氣更
宜審胎氣之虛實臟腑之相勝而治之庶無悮矣

錢氏目內證　赤者心熱導赤散主之　淡紅者心虛
熱生犀散主之　青者肝熱瀉青丸主之淺淡者補
之　黃者脾熱瀉黃散主之　無精光者腎虛地黃
丸主之　如見面目浮腫上久咳嗽乃脾受病積也
凡小兒唇白主吐涎嘔逆吐血便血唇紅渴飲煩躁
如久渴瀉唇紅者是虛證也不可用凉藥唇黃主脾
受積後發腫唇口紫及吐涎者主蟲痛不吐涎者是
積痛唇口四畔黃如橘主口臭乃脾之積熱也唇青
主血虛脾寒為冷所乘蠶唇主脾土木來剋土知脾
弱不能食也

凡小兒[illegible]主大便
不通或通利必色焦黃如舌裂舌上芒刺舌上出血
皆熱極腸毒也舌上生瘡心脾有熱舌捲主驚久患
瀉利舌黑必潤不可認為熱蓋久病上焦虛熱故也
久瀉痢舌黑者必死

聲證　重實聲重實雖聲啞熱為三焦氣壅在心脾傷風咳
嗽喉咽痛結澀腸中糞出遲
悲焦聲聲悲焦有燥恐怖欲生風重濁聲沉靜瘡攻
必耳聾

啼哭聲但哭無啼只是驚多啼不哭痛分明聲輕頗
叫風癇病速緩聲頻吐瀉成
噎煎聲噎煎煩躁病難安燥促聲音為感寒語短氣
微尿主澀長延聲細痢多般
延緩聲語短聲遲緩腸鳴泄瀉頻嗄聲多不響風熱
肺家因

脉法　候兒脉當以大指按三部一息六七至為平和
八九至為發熱五至為內寒脉弦為風癇沉緩為傷
食促急為虛驚弦急為氣不和沉細為冷浮為風大
小不勻為惡候為鬼祟浮大數為風為熱伏結為物

緊難細為疳勞凡腹痛多啼叫而脈洪者為有蟲沉
而遲潮熱者胃寒也溫之則愈訣曰小兒脈緊風癇
候沉緩食傷多嘔吐弦急因知氣不和急促驚神
不守冷則沉細風則浮牢實大便應秘久腹痛之候
緊而弦脈亂不治安可救變蒸之時脈必亂不治自
然無過繆單細疳勞洪有蟲大小不勻為惡候脈沉
而遲有潮熱此必胃寒來內冠瀉利脈大不可醫仔
細酌量宜精究（[illegible]）
不[illegible]變蒸氏論又[illegible]上下說

脈應雜病

諸數脈　為熱屬腑
諸遲脈　為冷屬臟
陽數脈　主吐逆不吐必發熱
陰微脈　主泄瀉不瀉必盜汗
沉數脈　寒熱寒多熱少亦主骨蒸熱
緊數脈　寒熱熱多寒少又主骨熱急則驚癇
沉緊脈　心腹痛短數同亦主咳嗽
沉細脈　乳食不化亦主腹痛下痢
沉伏脈　為積聚亦主霍亂
微緩脈　乳不化泄瀉沉澀亦同

微澀脈　瘛瘲筋攣
微急脈　寒熱唾血
浮滑脈　宿食不消亦主咳嗽
浮緊脈　疳氣耳聾
浮弦脈　頭疼身熱
緊滑脈　吐血惡
心脈急數　驚癇不驚者有淋
肝脈急甚　顛癇風癇痰涎流液
肺脈浮實　鼻塞升大小便不通
腎脈緊滑　主蚵蟲尺脈沉亦主蚵

尺脈微細　瀉泄冷痢乳食不化
尺脈微澀　便血無血者必盜汗
脈過寸口入魚際　主遺尿

審脈逆順

驚搐脈　浮數順沉細逆身溫順肢冷逆
夜啼脈　微小順洪大逆身冷逆
心腹痛　沉細順浮大逆身溫順肢冷逆
傷寒脈　洪弦順沉細逆浮大順微伏逆
汗後脈　沉細順洪緊逆困睡順狂躁逆
溫病脈　洪大順沉細逆身熱順腹痛逆

咳嗽脉　浮濇順沉細逆身温順肢冷逆
霍亂脉　浮洪順遲微逆身温順肢冷逆
吐哯脉　浮大順沉細逆身温順肢冷逆
泄瀉脉　緩小順浮大逆身温順肢冷逆
諸痢脉　沉細順浮大逆身温順肢冷逆
諸渴脉　洪數順沉細逆身温順肢冷逆
諸腫脉　浮大順沉細逆臓實順腸泄逆
腹脹脉　浮大順虚小逆臓實順泄瀉逆
痰喘脉　滑大順沉細逆身温順肢冷逆
寒熱脉　緊數順沉細逆倦怠順強直逆

疳勞脉　緊數順沉細逆臓實順脾泄逆
蟲痛脉　緊滑順浮大逆身温順唇青逆
諸失血　沉細順浮數逆身温順發熱逆
中惡腹脹　緊細順浮大逆身熱順身冷逆
黄疸脉　浮大順沉細逆腹寛順泄瀉逆
火痺脉　浮洪順沉細逆身熱順身冷逆

錢仲陽云小兒之脉氣不和則弦急傷食則沉緩虚驚則促急風則浮冷則沉細脉亂者不治　水鏡訣云陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臓六腑部分既列逆順難明若憑寸口之浮沉必乃横亡於孩子須明虎口辨別三關消詳用藥始無差誤未至三歲看虎口食指第一節名風關脉初見易治第二節名氣關脉見病深難治第三節名命關脉見死不治三關青是四足驚赤是水驚黑是人驚紫色瀉利黄色雷驚三關通度是極驚之症必死或青或紅有紋如線一直者是乳食傷脾必發驚熱左右一樣者是驚與積齊發有三條或散是肺生風痰或似齁齁聲有赤是傷寒及嗽如紅火是瀉紅黑相兼主下痢青多白痢紅多赤痢紫色相兼加渴虎口脉紋亂主胃氣不和青是驚與積青黑發慢驚脉入掌乃内釣指紋曲裏風盛彎外食積此論三歲以上之法

若三歲以下更用一指按高骨乃分三關定其息數呼吸八至爲平脉九至不安十至危困浮主風沉遲主虚冷實主有熱緊主癲癇洪主熱盛沉緩主虚瀉微遲有積有蟲遲濇主胃脘不和沉主乳食難化沉細主乳食停滯緊弦主腹中熱痛牢實主大便秘沉而數者骨中有熱弦長是肝膈有風緊數乃驚風爲患四肢掣顫浮洪乃胃口有熱沉緊主腹痛有寒虚濡者有氣又主慢驚芤主大便利血　四歲以下用一指滚轉尋三部以關爲準七八歲移指少許九歲

次第依二圖部位為取十一寸二歲亦同十四十五
歲依大方脉部位脉䚡　凡看脉先定浮沉遲數陰
陽冷熱沉遲為陰浮數為陽更兼看部位青主驚風
白主虛瀉赤主痰熱黑色病甚黃主脾府以此相參
察病治療庶無誤矣　全幼心鑑云小兒半歲之際
有病當於額前眉端髮際之間以名中食三指曲按
之兒頭在左舉右手在右舉左手食指為上中指為
中名指為下三指俱熱主感風邪鼻塞氣麤發熱咳
嗽若三指俱冷主外感風寒內傷飲食發熱吐瀉若
食中二指熱主上熱下冷名中二指熱主夾驚之疾

食指熱主胸滿食滯又當參辨脉形主之　流珠形
主飲食所傷內熱欲吐或腸鳴自利煩躁啼哭用助
胃膏消飲食分陰陽若食消而病仍作用香砂助胃
膏以補脾胃　環珠形主脾虛停食胸膈脹滿煩渴
發熱用五味異功散加山查枳實健脾消食後用六
君子湯調養中氣　長珠形主脾傷飲食積滯肚腹
作痛寒熱不食先用大安丸消其積滯次以異功散
健其脾氣　來蛇形主脾胃濕熱中脘不利乾嘔不
食此疳邪內作先用四味肥兒丸治疳後用四君子
湯補脾　去蛇形主脾虛食積吐瀉煩渴氣短喘急

不食困睡先用六君子湯加枳實健脾消積次以七
味白术散調補胃氣　弓反裏形主感冒寒邪哽氣
出氣驚悸倦怠四肢稍冷小便赤色咳嗽吐涎先用
惺惺散助胃氣祛外邪後以五味異功散加茯苓當
歸養心血助胃氣若外邪既解而驚悸指冷脾氣受
傷也宜用七味白术散補之若悶亂氣麤喘促哽氣
者難治脾虛甚故也　弓反外形主痰熱心神恍惚
夾驚夾食風癇痰盛先以人麻防風丸祛外邪又用
五味異功散調中氣　鎗形主風熱生痰發搐先用
抱龍丸如未應用牛黃清心丸若傳於脾肺或過用

風痰之藥而見一切諸症者專調補脾胃　魚骨形
主驚痰發熱先用抱龍丸治之如未應屬肝火實熱
少用抑青丸以清肝隨用六味丸以補肝或發熱少
食或痰盛發搐乃肝木尅脾土用六君子湯加柴胡
補脾土以制肝木　水字形主驚風食積胸膈煩躁
頓悶少食或夜啼痰盛口噤搐搦此脾胃虛弱飲食
積滯而木尅土也先用大安丸消導飲食次以六君
鈎藤鈎補中清肝若已服消食化痰等劑而病不愈
者用四君升麻柴胡鈎藤鈎升補脾氣平制肝木
針形主心肝熱極生風驚悸煩悶困倦不食痰盛搐

搦先用抱龍丸祛風化痰次用六君子加釣藤鈎平肝實脾　透關射指形主驚風痰熱聚於胸膈乃脾肺虧損痰邪乘聚先用牛黃清心丸清脾肺化痰涎次用六君子湯加桔梗山藥補脾土益肺金　透關射甲形主驚風肝木尅制脾土之敗症急用六君木香釣藤鈎官桂温補脾土未應即加附子以回陽氣多得生者嘗聞古人云小兒為芽兒如草之芽水之漚蓋因臟腑脆嫩口不能言最難投劑當首察面色而知其所屬次驗虎口以辨其所因實為治法之簡要也

虎口三關脈紋

十三指形



流珠形

長珠形



環珠形



來蛇形

去蛇形

弓反外形

弓反裏形



鎗形

魚骨形

鍼形

水字形

透關射甲形

透關射指形



流珠只一點紅色環珠差大長珠圓長已上非謂圈
子總皆紅脉貫氣之如此來蛇即是長珠散一頭大
一頭尖去蛇亦如此分上下朝故曰來去角弓反張
向裏爲順向外爲逆鎗形直上魚骨分開水字即三
脉並行鍼形即過關一二粒米許射甲命脉向外透
指命脉曲裏雖然余常治之亦有不專執其形脉而
投劑者蓋但有是症即服是藥而亦多驗

死證 凡小兒顖腫顖陷汗出不流如珠如油舒舌出
口舌腫發驚瀉黑黯血髮直如麻皮膚無血色此心
絕也並壬癸日死 病重啼哭無淚及病不哭下淚
爪甲青黑眼深如陷舌捲囊縮發搐目斜連唇口動
手如抱頭之狀或脚面直素問云其華在爪其充在
筋肝絕也並庚辛日死 人中滿人中黑唇縮反張
唇焦枯燥唇乾紫黑唇不蓋齒血漉尿血舌縮或捲
鼻孔開張齒禁冷涎如油啜口如饕面如土色四肢
逆冷如濕石之狀吃乳不收瀉糞赤黑脾絕也並甲
乙日死 有熱嚥湯水并藥食喉中鳴是胃脘直不
能蔭肺此證醫書少有蓋累曾試之有驗並死不治
目直青鮮氣喘不回吃食咳嗽痰涎塞口喉中鳴響
鼻塞不通鼻乾黑燥肺脹胃脇頭汗四肢冷此肺絕

也並丙丁日死 面黑神昏眼黑眼腫目無光彩耳
輪青黃焦枯瘡牙齒落髮疎黃燥皮膚黑燥驚風咬
牙及齒瀉屁黑色遶口此腎絕也並戊己日死
小兒死證十五候 眼上赤脉下貫瞳人顖門腫起
兼及作坑鼻乾黑燥肚大青筋目多直視覩不轉睛
指甲黑色忽作鴉聲虛舌出口齧齒咬人魚口氣急
啼不作聲蚘蟲既出必是死形用藥速救十無一生
小兒病困汗出如珠著身不流者死 小兒病其
頭髮皆上逆者必死 小兒病而顖陷其口唇乾目
皮反口中氣出冷手足四垂其卧如縛掌中冷皆不

治　小兒中風熱喘鳴肩息脈緩則生急則死　小兒痢疾脈浮大而腹痛者必死　乳子病熱脈懸小手足溫則生寒則死

護養　千金論云小兒用父故絮著衣女用母故衣勿使新綿切不可過厚恐令兒壯熱生瘡發癇皆自此始　巢氏云兒始生肌膚未成不可煖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易傷損　嬰兒若常藏在幃幙之內重衣溫煖譬如陰地草木不見風日軟脆不任風寒　嬰兒皆當以故絮著衣莫用新綿也天氣和煖無風之時令母將抱日中嬉戲數見風日則令血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒不致疾病　嬰兒又當習薄衣之法當從秋習之不可以春夏卒減其衣則令兒中風寒　嬰兒冬月但當著夾衣及衲衣之類極寒即漸加以舊綿人家多愛子乃以綿衣過厚適所以為害也　嬰兒又當消息無令汗出汗出則致虛損便受風寒晝夜寤寐皆當戒之　初生兒出月必須人強襁褓之道必須得宜如春夏之月乃萬物生長之時宜教令地臥使之不逆生長之氣如秋冬之月乃萬物收藏之時宜就溫煖之處使之不逆收藏之氣然後血凝

氣和則百病無自而入矣　丹溪曰人生十六歲已前血氣俱盛如日方升如月將圓惟陰常不足養之之道不可不謹童子不衣裘帛前哲格言具在人耳裳下體之服帛溫煖甚於布者也裘皮服溫軟甚於帛者也蓋下體主陰得寒涼則陰易長得溫煖則陰暗消是以下體不與絲綿夾厚溫煖之服恐妨陰氣實為確論

乳哺　湯氏曰小兒乳哺須要得法乳者奶也哺者食也乳後不得便與食哺後不得便與乳小兒脾胃怯弱乳食相併難以尅化周歲以上必成乳癖食癖於腹中作疼作熱疳病從此起也　丹溪曰血氣俱盛食物易消故食無時然腸胃尚脆而窄若稠粘乾硬酸鹹甜辣一切魚肉木菓濕麪燒炙煨炒俱是發熱難化之物皆宜禁絕只與熟菜白粥非惟無病且不縱口可以養德此外生栗味鹹乾柿性涼可為長陰之助然栗太補柿太澀俱為難化亦宜少與婦人無知惟務姑息畏其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迨至成人筋骨柔弱有食則不能忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大節有虧可不慎歟至於乳母尤宜謹節飲

食下咽乳汁便通胸脅中動乳脈便觸癖氣至乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瀉則熱或爲口瘡或爲驚搐或爲夜啼或爲腹痛病之初來其溺必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患於未形也　乳兒法凡乳母血氣爲乳汁也五情善惡悉血氣所生宜戒喜怒一切禁忌不用狐臭癭瘻氣嗽病者及身體疥癬頭瘡髮少緊唇耳聾齆鼻癲病等方可乳兒　夏中盛熱時乳母浴後或兒啼不可與妳能使兒成胃毒秋成赤白痢浴後可令定息良久熱燥乳之故無患也　聶氏曰盛啼不可食乳

恐氣逆不順聚而爲噎亦能成驚風也　千金論曰凡乳兒不可過飽飽則溢而成嘔吐若乳來多猛取出捋後再乳切須乳時合先令捏去宿熱乳然後乳之如乳母欲臥寐當以臂枕之令乳與兒頭平母欲睡著時即奪其乳恐其不知飽足亦成嘔吐父母交合之間兒臥於側或驚起不可乳兒蓋氣亂未定必能殺兒也　巢氏云小兒啼未定氣息不調母不可以乳飲蓋恐乳不得下停滯胸膈則爲嘔吐也　顱顖經曰夏不去熱乳令兒嘔吐冬不去寒乳令兒泄瀉腹痛尤不可不謹　夜間乳兒母起身坐抱兒餧

之[illegible]乳汁勿投[illegible]地蟲蟻食之令乳無汁可以求得上佳　乳令兒病逆乳[illegible]乳涎喘生驚[illegible]怒乳疝氣腹脹[illegible]寒乳妳片不化[illegible]熱乳面黃不食[illegible]氣乳泄瀉腹脹[illegible]病乳能生諸疾[illegible]逆乳吐逆生痰[illegible]醉乳恍惚[illegible]忌乳腹急[illegible]淫乳必發驚癇

[illegible]已上乳急欲乳兒能生諸病不可不忌也凡喜怒氣亂未定乳兒則成吐瀉腹痛癖黃不食寒熱新積不散乳兒則成痰癖涎欬肺脹氣悶醉淫喘乳多發驚癇聖惠方云醉淫喘乳能殺小兒聖濟經論乳者夏不欲熱熱則致吐逆冬不欲寒寒則致下痢母不欲怒怒則令上氣顛狂母不欲醉醉則令身熱腹滿母方吐下而乳則致虛羸母有積熱而乳則變黃不能食新房而乳則瘦悴交脛不能行大抵乳食不使則生疾病　哺兒法肘後云兒初生三[illegible]可哺以[illegible]碎米濃作飲如乳

醋頭另入盆中研之與三豆等三七日可哺

千金云兒哺早不勝穀氣令頭面體生瘡愈而復發又尪弱難養三十日後雖哺勿多不嗜食強與之不消復生病哺乳不進腹有痰癖四物紫丸微下之節哺數日自愈　寶鑑云兒五十日可哺如棗核百日彈丸早晚二哺與抱橋下澡浴當風解衣哭未斷而乳目冷而哺又不可在神佛前驚鳴畔各房異戶之粧諸色粉器並不可觸犯之宜子性為驚癇經云三歲下滿歲食雞肉子腹生蟲　錢乙云兒多因愛惜

通治　幼科　二十

過當三兩歲猶未飲食致脾胃虛弱平生多病半年後宜煎陳米稀粥粥面時時與之十月後漸與稠粥爛飯以助中氣自然易養少病惟忌生冷油膩甜物等　外臺崔氏初哺兒法以平定成日丑寅辰巳酉日大吉　男忌戊巳日女忌丙丁日　斷乳法小兒年至四五歲當斷乳而不肯斷者宜用畫眉膏斷乳之道方可漸與肉食則無疳癖之患

畫眉膏

山梔三箇燒存性　雄黃少　朱砂少

右為極細末入生麻油輕粉各少許調勻候兒睡着濃抹於兩眉上醒來便不食乳未效再用加黃

丹臺鑑

雜將護法　萬全論田婦養兒總無他疾譬之草木生於深山大澤容易合抱至於異果奇材縱加培養間有不秀實者豈貴賤異哉兒數見風日即血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒以田舍兒較之相似　田氏曰大凡小兒過煖生熱熱極生風提抱生癥餵飼生癖最宜慎之　張渙曰乳母須每日三時摸兒項後風池若壯熱者即須熨之使微汗即愈　諺云戒養小兒謹護風池風池在頸項筋兩輳之邊有病乃治之疾微切不可妄鍼灸亦不用輙吐下所以然者鍼灸

通治　幼科　三十一

傷兒經絡吐下傷動臟腑故也　嬰兒暑中常令在涼處乳母勿禁新水即不宜多　嬰兒春夏間有疾不可亂有動下使下焦虛上焦熱變成大病矣　嬰兒須看南受南北之殊蓋地土寒溫不同故也　嬰兒生後兩滿月即目瞳子成能笑識人乳母不得令生人抱之及不令兒非常之物　嬰兒百晬任脈生能反復乳母當存節喜怒適其寒溫　嬰兒半晬尻骨已成乳母當教兒學坐　嬰兒二百日外掌骨成乳母教兒地上匍匐　嬰兒三百日臏骨成乳母教兒獨立　嬰兒周晬膝骨已成乳母教兒行步

上件並是定法蓋世之人不能如法行節節御抱兒
過時損傷筋骨切宜戒之為吉　羅謙甫曰一小兒
五月間因食傷冷粉腹中作痛遂於市藥鋪中購得
神芎丸服之臍腹漸加冷疼時發時止逾七八年不
已因思古人云寒者熱之治寒以熱良醫不能廢其
繩墨而更其道也據所傷之物寒也所攻之藥亦寒
也重寒傷胃其為冷痛可知矣凡人之脾胃喜溫而
惡冷況小兒血氣尚弱不任其寒故陽氣潛伏寒毒
留連久而不除也治病必先其本當用和中養氣之
藥以救前失服之月餘方愈嗚呼康子饋藥孔子拜

而受之以未達不敢嘗此保生之重者也奈何常人
拱默而令切脈以謂能知病否且脈者人之血氣附
行經絡之間熱勝則脈疾寒勝則脈遲實則有力虛
則無力至於所傷何物豈能別其形象乎醫者不可
不審其病源而主家亦不可不說其病源且此子之
父不以病源告醫而求藥於市鋪中發藥者亦不審
病源而以藥付之以致七八年之病皆昧此理也孫
真人云未診先問最為有準東坡云只圖愈疾不欲
困醫二公之語其有功於世大矣

初生門

初生

論小兒在胎稟陰陽五行之氣以生臟腑百骸藉胎
液以滋養受氣既足自然生育分娩之時口含血塊
啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門遇天行時氣久
熱或飲食停滯或外感風寒驚風發熱等因發為瘡
疹須急於未啼時用軟帛裹指挖去其血用黃連豆
豉硃蜜甘草解之後雖出痘亦輕矣有藥入即時腹

脹嘔吐短氣不乳者用茯苓丸治之但黃連性寒若
稟母氣膏粱積熱者宜服若滋味淡薄胎氣元弱者
又不宜用其硃砂固能解毒恐金石鎮墜不若只以
牛黃分許蜜調與吮為佳世多用犀角解毒丸其胎
氣虛寒虛弱者反傷脾胃生氣甚致不育又有嬰兒
因其難產或冒風寒而垂危者切不可便斷臍帶急
烘綿絮包抱懷中急以胎衣置火中煨燒更用大紙
撚於臍帶上往來燎之使煖氣入腹須臾氣復自甦
尤戒洗浴恐腠理不密元氣發泄而外[illegible]
護臍法　嬰兒新產出胎急以綿裹[illegible]古

口與血和勢可之王稍若吮齊一殺則入腹成百病
又看舌下若連舌有膜如石榴子若啼不出聲不
轉速以指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即
活 若舌下血出多者以燒亂髮灰同豬脂少許和
塗之 兒上
下唇與齒齦連處皆有一筋牽引若上唇筋緊即生
上爍下唇筋緊即生下爍上爍生瘡滿頭或有間如
癬狀瘙癢不已復流黃汁至處生瘡下爍起腰背漸
至四肢患亦如上若疾甚不治或頭面上下相通累
年不輕又夭折或成大病是唯每日早辰拭口佳

浴兒法 兒生三日以桑槐榆桃柳各取嫩枝三寸長
者二三十節煎湯看冷熱入豬膽汁二三枚浴之
浴湯用豬膽益母草不生瘡疥川金銀虎頭骨辟丹
砂辟惡氣客忤驚癇用桃梅李根葉解體熱溫壯
之病須浴時煮 湯須不冷不熱於無風密室浴之
勿令久 浴訖以粉摩之或以光粉蚌粉撲身辟邪
吉 紀用經浴法寅卯酉日吉壬午丁未癸巳凶不
能上三日勿犯下三日 小兒洗浴不可
先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍
瘡等證用清油調髮灰傅臍洗兒不可用水打濕臍

帶

斷臍法 千金云臍不得以刀割隔單衣咬斷以煖氣
呵七遍即纏結所留帶致兒足趺上斷訖連臍帶中
多有蟲急剔撥去不爾入臍成疾臍當長六寸長則
傷肌短則傷臟不以時斷及接汁不盡暖氣漸微即
生寒令兒臍風 寶鑑論斷臍者用剪刀先於懷中
令煖又水入臍多天釣痛苦啼叫面青黑臍傷動令
久不乾傷外風即口噤不可救

灸臍法 聖惠云兒生一宿抱近明無風處看臍上有
赤脉直上者即於脉盡頭灸三壯赤散無患矣

裹臍法 千金論治白練令柔軟方四寸新綿厚半寸
與帛等合之裹臍調其緩急急則吐哯二十日乃解
若十許日怒啼必衣中有刺或臍燥刺腹當更裹臍
冬時須閉戶下帳然火令溫煖換衣亦然仍以溫粉
粉之

服藥下胎毒法 心鑑曰古人皆言兒始生落草服黍
粉朱砂白蜜黃連欲下胎毒今人率承用之不知今
人稟受攝養與古人不同其藥乃傷脾敗陽之藥若
與兒服後必生異證只宜用淡豆豉煎濃汁與三五
口其毒自下又能助養脾氣消化乳食然古人之法

終不可濟洩今人用之而效者多或不然如心鑑所云者今次第列於左方

張渙云嬰兒初生第一日總斷臍備施看兒形色若面紅潤色赤啼聲響快者宜用汞粉法良久有臍糞便下為佳次用甘草法次用朱蜜法臨時更看形色若面色多青白啼聲不響即不須服次用牛黃法

古方又有黃連法韭汁法豬乳法等在人看兒寒熱怯壯擇所宜而用之爾

甘草法用好原州甘草中指一節許拍碎以水二蜆殼煎一蜆殼以綿纏蘸令兒吮之若吐出惡汁為佳若服一蜆殼不吐即不須更服不問嬰兒虛實寒熱皆須服之服後方吐後更與兩服吐止須盡壹合 薛氏預以甘草細切少許臨產時以綿裹沸湯盞內覆溫收生之際以軟綿裹指蘸甘草汁拭其口次用黃連法朱蜜法

黃連法集驗方初生兒惡汁留胸膈壅塞易生蘊熱驚癇瘡癤用好肥黃連數塊搥碎綿裹如妳頭狀湯內浸成黃汁拈擦一二點兒口中惡汁自下乳食便美未盡用空綿別浸黃連後以朱蜜間與之 海藏方淨黃連壹錢水壹盞煎先煎下待兒生未出聲時便用灌下人去腹中惡物將來兼解胎中蘊積熱毒終身不生瘡疥又以[illegible]

韭汁法本草云兒初生與韭根汁灌之即吐出惡水 聖惠方甘草後煖水浸韭子汁塗兒唇上乾又塗數次止不令入口

朱蜜法好朱砂一大豆許細研水飛煉赤蜜一蜆殼看稀稠和成膏每用一豆大乳汁化下時時滴口中三日內止三粒臨時更看形色若面色多青白啼聲不響即不須服

牛黃法千金方朱蜜兒與牛黃不獨益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣又除百病 張渙法真牛黃一塊

好蜜煉熟和成膏每服一豆大乳汁化時時滴口中[illegible]色不實者不宜多服若嬰兒胎熱或身體黃色宜多服之

汞粉法張渙方兒紅潤色赤啼聲響快者用汞粉半錢旋旋令兒吮之良久有臍糞便下為佳 寶鑑錄粉抹口舌上下左右兩頰然後飼朱蜜

豬乳法嬰兒初生至滿月內常時時旋取豬乳滴口中佳 豬兒飲母次便提後腳離乳急捋之即得

臍帶法用本兒落下臍帶丸上焙燥為末入辰砂黃連甘草各末五分和勻蜜拌做三五次塗乳母乳上

俟兒吞之㕥使一日夜吞盡次日惡毒皆從大便而
出日後不但痘疹稀疎竟有不出痘者俟臍帶落下
即便製服在六七日之間為妙其辰砂必須研極細
末以甘草湯飛過任服無害此方一以解毒一以補
養益臍帶乃有生初之[illegible]也繫於母之命門兩腎
之所主乃以腎補腎腎既充足即不受邪故無他日
變黑歸腎之證亦無顖門不合之疾生一兒即得一
兒真保生第一良法

藏衣法[illegible] 崔氏云兒衣清水洗勿令沙土草污又
清酒洗之仍內錢一文在衣中盛新瓶內青[illegible]瓶

初生 八幼科 [illegible]

口密蓋置便宜處三日後依月吉地向陽高燥處入
地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸須牢築令兒長壽
智慧若不謹為豬狗食令顛狂蟲蟻食令病惡瘡犬
鳥食令兵死近社廟令兒鬼近深水汙池令溺死近
故竈令驚惕近井令聾盲棄道路街巷令絕嗣當
門戶令聲不出耳聾著水流下令青盲棄火裏令生
爛瘡著林木頭令自絞死此忌須慎 每於天德月
空處埋之正月天德在丁月空在丙壬餘詳官本曆日 若遇反支宜挂宅
外福德上向陽高燥處行過月然後依法埋藏吉
甲乙日[illegible]丙丁日藏[illegible]戊己日藏戊己日生
庚辛日藏庚辛日生壬癸日藏吉

剃頭法集驗方云小兒初剃頭俱不擇日皆於滿月
日剃之蓋風俗所尚前產婦未得出房於滿月即與
兒俱出謂胎髮穢惡有觸神竈令小兒不安故於此
日必剃頭而出凡剃頭就溫煖避風處仍剃後須以
杏仁叁枚去皮尖研碎入薄荷叁葉再同研却入生
麻油叁肆滴膩粉拌和頭上擦以避風邪免生瘡疥
熱毒其後小兒亦宜此法

附方

百壽散小兒初生未滿月已裏用之者老無瘡疥

初生 八幼科 [illegible]

黃連壹兩 硃砂壹錢

右水煎令老母拭去口涎淨灌下餘藥傾盆中浴
兒遍身搽妙

顧顖兒初生日與平和飲子指述兒生三日後與母服

人參 茯苓 甘草
升麻各貳錢伍分

水一盞煎一合半時時與之乳母忌油膩滿月後
百晬加時冷加白朮熱加[illegible]各[illegible]

生下胎疾 月内不乳諸疾

總論 千金論曰芽兒出腹骨肉未斂肌肉未成猶尚是血血凝則堅而成肌肉也又云如水上之泡草頭之露夫初生一臘之内天地八風之邪豈能速害良由在胎之時母失爱護或勞動氣血相干或坐卧饑飽相役飲酒食肉冷熱相制恐怖驚撲血脉相亂蘊毒於内損傷胎氣故降生之後有胎熱胎寒胎肥胎怯胎驚胎黄諸證生焉外因浴洗拭口斷臍炙顖之不得法或綳縛驚恐乳哺寒温之乖其宜致令噤口

臍風鎖肚不乳等證病患致此亦難救療坐視其斃良可哀憫故黄帝云吾不能察其幼小謂别是一家調理耳用藥者必明消息形候審定生死察病患之淺深知藥性之寒温而後庶乎少失也

初生輒死 千金兒初生輒死觀兒口中懸癰前上齶有胞者總錄云胞以指甲摘取頭決令潰去血勿令血入咽入咽殺兒愼之

不能啼 三因云小兒初生氣絶不能啼者必是難産或冒寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置熾炭中燒之仍燃大紙條蘸油點火於臍帶下熏之蓋臍帶連兒火熏時有火氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可洗浴了即斷臍帶 嬰兒以哭遲者以葱白細鞭背上即啼

水鑑方云胎風生下不能啼須使採中小葉葵搗取汁調熊膽末纔交入口兒便活 看舌下法見前

兒生下地即不啼哭不能食乳奄奄如死者急看喉間懸癰前腭上有一泡用指摘破以帛拭去惡血勿令嚥下即能通聲吞乳

眼不開 兒生眼閉口開常呻吟因受胎熱用涼五藏藥天竹黄散方見重舌及與母喫復以竹筒煎湯洗眼

小兒初生眼閉者由產母食熱物毒物致成斯疾治法當以熊膽少許蒸水洗眼上一日七次如三日不開用生地黄湯服仍須乳母服山茵陳湯凡初生小兒須洗令淨若洗不淨則穢汁浸漬於眼眥中使眼赤爛至長不瘥

生地黄湯 治初生小兒眼不開

乾地黄　赤芍藥　川芎
當歸去蘆　瓜蔞根　甘草

右為細末少許用燈心煎湯調抹入口中速服一

四聖散 治嬰孩胎受熱毒生下[illegible]

燈心　黃連　秦皮

木賊　棗子各一個

右㕮咀每服一錢水一盞煎七分澄清去滓無時

頻洗兩目自開

洗眼方

黃連　秦皮　燈心

大棗各等分

右用竹瀝煎湯

不乳 謂初出胞胎而不吮乳也嬰兒初出胎時其聲未發急以手拭其口令惡血淨盡不得下咽即無他病若拭口不全惡穢入腹則令腹滿氣短不能吮乳或產母取冷過度胎中受寒致令兒腹痛也宜用茯苓丸及木香檳榔散治之

茯苓丸

赤茯苓　川黃連去鬚　枳殼炒

右等分為末煉蜜丸桐子大每服一丸乳汁調下

治穢惡入腹令兒嘔吐不乳方

木香　乾薑生　茯苓

甘草　酸木瓜　丁香各等分

右為麤末一捻水煎頻頻滴與之

外治方

乳兩合葱白一寸煎一兩沸去葱與即乳

聖惠人參丸

人參　龍膽　黃連

馬牙硝　甘草炙微赤　枳殼麩炒微黃各半兩

右搗羅為細末煉蜜丸如桐子乳汁研二丸灌口中日四五服差

朱砂丸　治三歲以下胃口閉不哽乳

朱砂　牛黃　麝香

丁香　甘草炙微　人參各壹分

犀角　黃耆　石膏細研水飛

五靈脂各半兩

右搗羅研勻蜜丸如菉豆熟水下三丸日四五服

灸法兒生二七日內不吮奶多啼者客風中臍循流心脾灸承漿在下唇稜下宛宛中次灸頰車在耳下頰骨後灶如雀屎各七壯此非灸不療　兒喉中鳴咽乳不利灸旋璣三壯在天突下一寸陷者中

吐不止 嬰初生下吐因穢惡下咽故也用木瓜丸主之凡初生急須拭淨口中否則啼聲一發穢物嚥下致生諸病　〔回〕川嚢[illegible]用木瓜丸下之如利後

用朱沉煎散□乳汁調化候觸物自下而不嘔也

錢氏木瓜丸

木瓜　麝香　膩粉

木香　檳榔各等分

右同研細末麪糊丸如小黃米大每服一二丸甘草水下無時

【論】芽兒初生之患多因乳母不慎七情不節厚味傳兒為病當審其因以調治其母前所用之藥恐臟腑脆嫩不能勝受用者審之

聖惠藿香散　治兒生至半月嘔逆不止

藿香　紫苑洗去苗土各壹分　甘草半兩炙

麥門冬去心焙參分　桂心半分

右為散每服一錢水一盞煎五分去滓溫綿點滴口中

【不小便】小兒初生不小便者多因在胎時母恣食嗽熱毒之氣流入胎中兒飲其血是以生而臍腹腫脹如覺臍四旁有青黑氣色及口撮即不可救也如未有青黑色不飲乳者宜服葱乳湯

葱乳湯

葱白三四寸四破之以乳汁半盞煎灌　一方葱

生用搗爛入乳汁入兒口以開其嘴乳吮嚥下即通

豆豉膏

黑豆壹分　田螺十九枚　葱一大把

右搗爛芭蕉汁調貼臍下

按觀丹溪治鄭樂使之子患淋痛乃因父服下部熱藥遺毒在胎留於子之命門而然以紫雪和黃檗末為丸投之下如黍如粟者數許而安則初生不小便亦當審其內而處治不言可知也

【不大便】俗名鎖肚由胎中受熱熱毒壅盛結於肛門閉而不通無復滋潤所以如此至若第三日不通急令婦人以溫水漱口吸咂兒前後心幷臍下手足心共七處凡四五次仍以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時將少許服之以通為度如更不通即是肛門內合當以物透而通之金簪為上玉簪次之須刺入二寸許以蘇合香丸納入孔中糞出為快若肚腹膨脹不能乳食作呻吟聲至於一七難可望其生也　田氏治法先用硬葱鍼紙肛門如大便不下後用牛黃散嚥方見送朱砂丸一時自見

【大小便不通】小兒初生腹脹欲絕大小便不通亦如前法吸咂得前後心手足心臍下七處以紅赤色為

皮須臾自退

懸癰千金云小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆籜盛水狀者若懸癰有脹起者可以綿纏長鍼留刃處如粟米許大以刺決之令氣泄去青黃赤血汁也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小不消三刺亦止自然得消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏及上腭如此者名重腭有著齒斷上者名重斷皆刺去血汁也 刺後用鹽湯洗拭急用如聖散或壹字散摻刷

如聖散

鉛霜　真牛黃　太陰玄精石

朱砂水飛研乾

右四味各研極細秤准各一錢五分拌勻入白龍腦五分再研勻每用藥抄壹字至半錢止摻兒口中時時用

壹字散

朱砂　鵬砂各半錢　龍腦

朴硝各壹字

右為極細末用蜜調少許鵝翎蘸刷口內嚥下無妨

重舌巢氏云心候於舌而主血脾絡脈又出舌下心火脾土二藏子母也有熱即血氣俱盛其狀附舌下近舌根形如舌而短名重舌 指爪摘斷及葦刀子割法見前拭口法條 惠濟論口重舌重腭口瘡皆上焦熱因受胎時大受熱毒忽以雞內金為末摻口內及朱砂膏地黃膏輪流摻之仍服天竺黃散

地黃膏

鬱金皂莢水煮乾切焙　豆粉各半兩研　甘草炙壹分

馬牙硝研壹錢

生地黃汁蜂蜜對合熬成膏和藥每服兩皂子大香熟水含化或鵝翎掃口內

金朱飲 治驚壯熱傷寒伏熱上焦虛熱重舌口鼻生瘡致赤眼方本名大金朱散

川鬱金皂莢不蛀者煮焙乾　天竺黃

甘草炙　馬牙硝各半　朱砂研壹分

蟬殼洗去土　荊芥

右為末每服半錢至一錢蜜湯調下

重齶重腭千金治法總前重舌門 刺去血汁後鹽湯先拭宜摻如聖散洗刷法同前條 茅先生云心熱壅

滯先用朱砂膏(方見積門)塗舌上後用牛黃膏(方見驚門)
聖惠牛黃散(方無第三味有不效方始)
牛黃　白龍腦　朱砂(各壹分)
鉛霜(半兩)　太陰玄精石(壹兩)
右細研為散先於腫處以鈹鈹破出血鹽湯洗拭口後摻藥神効

口中有蟲 外臺療兒喫奶不穩七日以來壯熱顏色赤鼻孔黃恐作撮口及牙關蟲似蝸牛亦似黃頭白蚌螺用竹瀝半合和少許牛黃服差　又豬肉拭口即蟲出

噤風 巢氏云兒口內忽結聚生舌上如黍不能取乳名噤由在胎熱入藏心偏受熱　聖惠初生兒須防三病一撮口二著噤三臍風皆急病著噤尤甚過一臘方免牙關緊急喫乳不穩啼聲漸小口吐涎沫臘開人見大小便通以為冷熱所得不知病在喉舌狀亦極重善救療者十不得三四依將護法防於事先必無此患　但有此證急看兒上腭有點子先以指甲輕輕刮破次服定命散辰砂全蝎散之類如口噤不開服諸藥不効者生南星去皮臍研為極細末龍腦少許合和用指蘸生薑汁於大牙根上擦之立開

凡臍風撮口噤風三者雖異其受病之源則一也大抵裏氣鬱結壅閉不通並宜服煎豆豉汁與喫取下胎毒千金云小兒初生其氣高盛若有微患即須下之若不時下則成大疾難為療矣紫霜丸最佳與之

定命散　治初生兒口噤不乳
蟬蛻(二七枚去大觜脚)　全蝎(二七箇去毒)
右為極細末入輕粉少許和研用乳汁乳遠調化服

辰砂全蝎散　治初生兒口噤
辰砂(半錢水飛)　全蝎(全者去毒貳拾枚炙)
硼砂　龍腦　麝香(各壹字)
右為極細末用乳母唾調塗口唇裏及牙齒上或用豬乳少許調入口內

紫霜丸(方見變蒸)

張渙立聖散　治妊娠之時母服熱藥過多或食炙煿熱物等致令嬰兒初生下口噤不乳口舌上瘡如黍粟大吸咂多啼名曰口噤
乾蜘蛛(壹箇去口足以新竹火上炙取汁一蜆殼許浸壹宿炙令焦取末)
乾蝎梢(柒箇為末)　膩粉(半錢)
右件並同研極細每服壹字乳汁調時時滴口中

千金治口噤赤者心噤白者肺噤
雞糞白如大豆許綿裹水一合煮二沸分再服（聖惠用豆大叁粒）
（飲水下）
又雀糞四枚末之着乳頭飲兒大十枚
外臺若噤病在咽如麻豆許令兒吐沫不乳
水銀如黍米與服下咽便愈以意量之不過小麻子
許（用事急）
食療茶葉研汁灌口中死亦生（[illegible]）二葉花
聖惠川椒一兩搜麪裹三角角樣燒黃熟以綿蓋兒
口掐去尖如筋頭使椒氣入口効未覺再作

蜈蚣方 治小兒口噤不開不能吮乳
赤脚蜈蚣（半條去足炙令焦為末） 麝香（少許）
右以猪乳和之蓋猪乳能獨主小兒口噤不開
蜘蛛方 治小兒口噤不開不能吮乳
蜘蛛（一枚去足及口炙令焦細研）
用猪乳一合和爲三服徐徐灌之神妙入麝香治
牙疳極好
牛涎方
取東行牛口沫塗小兒口及頰上即効
治噤搐鼻法川鬱金藜蘆瓜蒂（等分）為末水調搐之

巢先生云凡小兒[illegible]口噤者[illegible]以其受胎
有疾故受毒氣生來血氣未調又被風邪所擊致之
治法先與奪命散吐風涎（方見驚門）後下醒脾散（方見胃氣門）
（不乳門 慢脾風門）一見 又勻氣散與服（方見[illegible]）又下銀朱散（方見[illegible]）
白又朱砂膏（方見急驚）常服即愈如手足捉拳噤口不開死

鵝口 巢氏云兒初生口裏白屑滿舌上如鵝之口故
名由在胎受穀氣盛心脾熱氣熏發於口 治用髮
纏指頭蘸井花水揩拭之睡時黃丹煅出火氣摻於
舌上 如用前法其舌上白屑不脫可煮栗荴汁令
濃以綿纏指頭拭之若春夏無栗荴可煮栗木皮如

用井花水法 簡要用牙硝細研於舌上摻之日三
五度 秘錄用桑白皮汁和胡粉傅之 雞肶胵黃
皮燒末水和服
張渙保命散 治嬰兒初生七日內胎毒者其舌上
有白屑如米連舌下有膜如石榴子大令兒語不
發名曰鵝口病
白礬（燒灰） 朱砂（水飛各貳錢半） 馬牙硝（半兩）
右各研極細再同研勻服一字取白鵝糞以水攪
取汁調塗舌上頰頰內未用藥時先以手指纏亂
髮揩拭舌上垢然後使藥傅之

茅先生論兒喉中壅一塊肉瘤閉却為喉痺身大熱舌硬不轉為木舌口開滿口黃如膏名鵝口三候皆熱甚生風壅熱毒至此為實熱先用三解牛黃散見吐門微與吐惡涎後用勻氣散見胃氣不和門及用天竺黃散見驚門牛黃膏見驚熱門與服愈如喉響似鋸及眼視面青黑妳食死候

撮口外證與唇青聚口撮面目黃赤氣息喘急啼聲不出飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救療其或肚脹青筋吊腸卵疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疎利辰砂膏初生一臘乃兒七日也

千金云小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂也多不育若有如此者皆宜與龍膽湯也

龍膽湯方　治嬰孩小兒胎驚月內氣盛發熱臍風撮口壯熱

龍膽草　釣藤　柴胡去蘆

黃芩炒　桔梗炒去蘆　赤芍藥炒

茯苓去皮　甘草炙各五錢　蜣螂去頭翅足炙

大黃壹分紙裹煨

右合研為極細末用棗大核煎或加防風去蘆麥門冬去心以導心熱食前調服

張渙云嬰兒胎氣挾熱亦因母有邪熱傳染或生下洗浴當風襁褓失度致令嬰兒啼聲不出乳哺艱難名曰撮口不開病七日之內尤甚急風散主之

急風散方

蛇蛻皮炙焦　釣藤　乾蝎稍各壹分

朱砂細研水飛　好麝香　真牛黃各半錢研細

右件都拌勻再研為細末每服壹字取竹瀝一合點同乳汁調下

辰砂殭蠶散　治初生撮口

辰砂水飛半錢　殭蠶直者去絲嘴炒壹錢　蛇蛻皮炒壹錢

麝香研半錢

右為極細末少許用蜜調傅唇口

撮風散　治小兒撮口

赤脚蜈蚣半條炙　釣藤貳錢　朱砂

直殭蠶炒　全蝎梢各壹錢　麝香壹字

右為末每服一字取竹瀝調下竹瀝解熱極好

辰砂膏

辰砂叁錢　鵬砂　馬牙硝各壹錢伍分　玄明粉貳錢　全蝎　真珠末各壹錢　麝香壹字

右爲末和棗同好單包起自然成膏每服一字或一豆許治諸驚用金銀薄荷湯下潮熱甘草湯下月內嬰兒用乳汁調傅妳上令吮下

臍風鎖口方

金頭蜈蚣壹條　蝎梢伍箇　直殭蠶柒箇　瞿麥半錢

右爲末每一字吹入鼻中啼則可用薄荷湯調下一字然後服千金龍膽湯朱銀丸

殭蠶方

直殭蠶貳枚去嘴略炒爲末調傅唇口中

甘草方　治小兒撮口取吐

甘草壹錢

右煎服令吐出痰涎即以豬乳點入口中即差

臍風　千金有臍風臍濕臍瘡三者皆因斷臍後爲風濕傷而成夫風入臍臍腫腹脹四肢不利多啼不能乳甚者發搐爲臍風腫濕經久不乾爲臍濕風濕相

搏令臍生瘡久不差爲臍瘡有一不已入於經脉多變爲癇搐或作癲治　臍風者謂斷臍之後被水濕風冷所乘風濕之氣入於臍而流入心脾遂令肚腹脹滿臍腫身體重著四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發爲風搐若臍邊青黑撮口不開是爲內搐不治爪甲黑者即死其或熱在胸堂伸縮努氣亦令臍腫宜千金龍膽湯主之方見驚風　錢氏云小兒洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虛胃氣不和宜調氣益黃散主之方見脾部　類萃云宜先用控痰飲吐風痰次用益脾散和脾又用辰砂膏利驚即愈或手足攣拳禁口不開者不治　曾氏法先投劫風膏次以五苓散加寬氣飲入薑汁葱白燈心煎湯調服與解風痰及用一字金煎荊芥湯或薄荷湯調抹口內證輕即快　如稟賦充實發熱有痰發搐投黑白飲溫蜜湯空心調下微泄似茶褐色二三行進白芍藥湯水薑棗煎服常用此法亦妙　若臍凸赤腫肚緊微有青色口撮不開肝風盛而脾土受制不可施治凡有此候百無一治縱使得安亦非長壽

控痰散

蝎尾　銅青各半錢　朱砂壹錢

膩粉[illegible]　麝香少許

右為末每服一字臘茶清調下先吐風痰然後和

胃或有股甘草方吐痰隨嚥而用

益脾散

白茯苓　人參　草菓煨

木香濕紙裹煨　甘草　陳皮

厚朴薑製　紫蘇子炒各等分

右為末每服一錢薑棗水煎

辰砂膏方見驚搐

宣風散　治初生兒因斷臍後外傷風濕唇青口撮

多啼不乳口出白沫

全蝎貳拾壹箇頭尾全去毒用無灰酒少許塗炙為末　麝香壹小字別研

右研為極細末用半字金銀煎湯或麥門冬去心

煎湯調化食遠服

防風散　治初生兒臍風

防風去蘆　羌活　黃耆蜜炙

當歸　川白芷　甘草各半錢

右為極細末少許用燈心麥門冬去心煎湯調化

不拘時候服

劫風膏　治急慢驚搐臍風撮口牙關緊閉痰涎壅

盛咽喉腫痛

威靈仙[illegible]

右用皂莢叄兩去皮弦擂碎揉溫水一盞絹濾過

慢火熬若稀糊入[illegible]五沸去火候

冷用前藥末壹分[illegible]炎實人先用鹽

梅肉擦牙根次以此[illegible]溫白湯濃調

抹入左右牙關內即開續進別藥然時得在器為

上銀器尤佳及解風痰殊減淡薑湯調化無時少

與含嚥咽喉腫痛溫茶清調下或薄荷湯

五苓散

寬氣飲俱驚

一字金　治初生嬰孩一七之外欲成臍風撮口及

卒中急慢驚風牙關緊閉涎上痰涎

殭蠶炒去絲　威靈仙去蘆各[illegible]　明白礬生用貳錢

細辛去葉[illegible]錢　甘草[illegible]

右剉焙為末每服壹字至半錢薑汁沸湯調勻以

指抹入牙關內治卒中急慢驚證口[illegible]用鹽

梅湯調擦上下牙根二處

黑白飲　治臍風氣實者及[illegible]

黑牽牛半生半炒　白牽牛半生半炒　[illegible]用

陳皮去白
玄明粉半兩　檳榔各半兩　甘草炙各三錢
右除檳榔不過火餘藥味或曬或焙仍合檳榔為
末同玄明粉入乳鉢內研杵勻每服半錢至一錢
溫蜜湯調化空心投服或無時此藥新合最妙久
則効遲
白芍藥湯方見疝門
臍濕　封臍散　治嬰兒初生因乳母不謹洗浴水入
臍中或兒尿在襁褓之內濕氣傷於臍中或解脫
風冷邪氣所乘令兒臍腫多啼不能乳哺名臍風

病宜急用此
好川當歸焙乾半兩洗　天漿子三個微炒
亂髮灰存性壹錢燒
右件同搗羅為細末入麝香壹字拌勻用藥壹字
至半錢傅臍中時時用
三因小兒初生一七日內忽患臍風撮口百無一効
坐視其死良可憫也有一法世罕知者凡患此證看
兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹指
輕輕擦破即開口便安不藥神効
小兒初生臍風撮口諸藥不効者灸然谷穴在內踝
前起大骨下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立
効　臍風日上抓刺絲竹空　臍腫灸腰對臍骨節
間三壯炷如麥
臍風撮口在百日內多不治
臍腫　嬰兒臍中腫濕經久不差者至百日即危急宜
速療之　顖頭經治臍濕方枯礬龍骨為末入麝少
許拭臍乾用避風　絳帛灰傅臍中　乾蝦蟆牡蠣
各壹枚燒灰細研少許傅臍中日三兩上差
封臍散

臍帶灰　亂髮灰　白薑灰
紅帛灰四灰不得別灰　南星
白斂　當歸頭　赤小豆
五倍子　血竭　龍骨
赤石脂煅　海螵蛸　百草霜
臙脂各半錢
右合研為極細末濕乾傅乾則清油調忌生水浴
臍
又方
紅綿灰　黃牛糞灰　龍骨
髮灰　乾臙脂各入半字

右爲極細末以[illegible]乾擦乾清油塗臍

又方　治臍內出水汁不乾

當歸頭（大者二錢）　絹（燒灰各[illegible]錢）

右爲極細末入麝香一小字同研少許乾摻臍

錢乙黃蘗散

黃蘗　釜下墨　亂髮灰（各等分）

右爲細末每用少許傅之

張渙胡粉散

胡粉　乾薑（燒灰）　白石脂（燒存性）

右[illegible]等分研極細再同研勻用藥一字至半錢傅臍中時時用

幼科十　六十二

氣臍大如栗虛腫而軟疼用竹瀝塗日數上消

兒臍濕淹破瘡爛以爲末頻摻効

臍瘡　巢氏曰因浴兒水入臍中或尿濕綳袍致臍中受濕腫爛成瘡或解脫爲風邪所襲入於經絡則成風癎若臍腫不乾久則發搐　用後乾蝦蟆燒灰傅日三四度（聖惠有搐臍）

異功散　治臍中瘡

龍骨（煅）　薄荷葉　蛇床子（各貳錢）

輕粉（半錢）

右爲極細末以少許乾摻臍

龍骨散　治臍中瘡

龍骨（煅）　輕粉（各半錢）　黃連（去鬚壹錢半）

右爲極細末少許乾摻臍

治兒滿月臍呼臍中出血用白石脂炒研極細末乾摻

治兒因剪臍傷於外風致臍瘡不乾方

白明礬（煅）　龍骨（煅各半錢）

右研爲極細末乾摻

張渙金黃散　治臍瘡久不差風氣傳於經絡變爲癎疾

幼科十　六十三

川黃連（半兩貳錢）　胡粉　龍骨（燒灰各壹錢）

右各另研復合研爲細末每用少許傅臍中時時用

臍風　初生兒臍風宜禁撮口最爲急證十難救一兩治之法宜時用軟帛包指拭口中牙齦上有筋脈絲便用竿刀輕輕剖斷以綿乳點

黃連（去鬚半錢）　豆豉（拾粒）　甘草（[illegible]）

蔥白（貳寸）

右用童子小便煎綿蘸拭口中

抱兒向明看臍上有赤脉直上便赤脉頭上灸三壯
者生

臍突 初生之兒有熱在胸堂則頻頻伸引呢呢作聲
努脹其氣抑入根本之中所以臍突腫赤虛大可畏
無識之夫將謂斷臍不利而使之然者非也此由胎
中母多驚悸或恣食熱毒之物所致宜對症與藥其
熱自散其臍歸本不必以藥傅之恐反為害　曾氏
曰臍突一證又非臍風此亦因初生洗浴繫臍不緊
穢水侵入於內產後旬日外臍忽光浮如吹捻動微
聲間或驚悸作啼治用白芍藥湯加薏苡仁水煎空
心溫服次以外消散塗貼自然平復

白芍藥湯 見癇

外消散　治嬰孩初生旬日外臍突或痛或不痛
則啼聲不已及療小兒因感濕熱傳致陰器腫
浮腫

大黃　牡蠣各半兩　朴硝一錢

右前二味剉焙為末仍入朴硝乳鉢內同杵勻抄
一錢或二錢取田螺淨洗用以水半盞活過一宿
去螺用水調塗腫處即消其螺仍放水中勿害之
昔賢有曰殺生放生大小遂矣物命雖微亦可戒

也治陰器腎囊腫車前子煎湯候冷調傅

三豆散　治嬰孩小兒臍突腫

赤小豆 去皮　豆豉　天南星 去皮臍
白斂 各一錢

右為極細末半錢用芭蕉自然汁調傅臍四傍一
日一次二日一次若得小便下自即安

胎驚 小兒壯熱吐哯心神不寧手足抽掣身體強直
眼目反張是胎驚風證　胎驚者以妊婦調攝乖常
飲酒嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風
邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月內壯
熱翻眼握拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚
啼腮縮顖開或頰赤或面青眼合 凡胎風眼合不可作慢驚脾風妄用溫藥
其有搭眼噤口之類亦此一種之所發也視其眉
間氣色赤而鮮碧者可治若黯青黑者不治虎口指
紋曲入裏者可治反出外者不治先宜解散風邪利
驚化痰調氣及貼顖法甚則以朱銀丸利之若面青
拳搐用保命丹 見急驚 釣藤散 見慢驚 全蝎散 見臍風方 之
類大抵小兒臟腑脆弱不可輒用銀粉鎮墜之劑如
遇此候急取豬乳細研牛黃麝香各少許調抹入口
中仍服導赤散以瀉肝之子即愈矣　石壁經歌未

出胎中一月來母驚凡起了臨胎腹直哭時先口撮
面青拳搐縮雙腮眼閉咬牙筋脉急受胎氣易驚若陰肉氣
精甚陽氣弱胎難嘗落手足掣引肉瘦弱胎不盡驚人年若日月滿因驚落口撮腰痠起身瘦口噤勿作驚治
徵开欠治驚調氣乳母服調氣藥兒貼顖任喚千聲眼不開退却風涎爲
治療涎去驚邪自不回失治則目暖先治驚以風邪必瞬風初見勿作驚風
治恐开不出生猴風痛馬犀先欠生銀丸蘇合丸服驚門錢自日內發搐眞者
不過三兩次必死假者頻發不爲重眞者內生驚癎
假者外傷風冷蓄血氣未實不能勝任乃發搐也欲
知假者口中氣出熱治之可發散大青膏主之可用
塗顖法　田月裏生驚急取豬乳細研辰砂牛黃各
嬰孩 幼科一　六十五
少許調抹口中神効乳母服防風通聖散三劑其驚
自消　田小兒未滿月驚搐似中風欲死者用辰砂
以新汲水濃磨汁塗五心上最効　湯治胎癎驚風
皆可服全蝎頭尾全者用生薄荷葉包外以麻線纏
火上炙燥爲末別研生硃砂麝香各少許煎麥門冬湯
調下　鋟一小兒患胎驚諸藥不應用紫河車研爛
如泥每用錢許乳化服之更以十全大補湯加釣藤
鈎滴盧與母服兩月餘與發漸輕服年餘與發漸稀
服年餘不再發至出痘後復發取紫河車研爛入糯
米粉丸小豆大每服百丸以乳送下服二具全瘥畢

姻又發仍用前丸及十全大補湯六味丸加當歸黃
耆肉桂五味子年餘喜其能遂帷幕得痊後因勞役
更作又用前丸及十全大補等藥不應用大劑獨參
湯服數斤然後與發稍緩乃用人參貳兩附子壹錢
數服頓止仍用前藥間用獨參湯而痊　一小兒患
胎驚用紫河車丸及十全大補湯及釣藤鈎而愈畢
姻後復發用大劑獨參湯六味丸加五味子黃耆當
歸煎服半載與發稍輕年餘不再發後每勞役怒氣
仍發卽用前藥隨愈又傷寒愈後復作虛症悉具莫
能名狀用紫河車二具獨參煎湯十餘斤而痊後患
嬰孩 幼科一　六十六
傷風咳嗽咽乾內熱用六味地黃丸料加五味子煎
服及十全大補湯而痊
獨活湯　治胎驚發散風邪
三　獨活　羌活各壹分　檳榔
天麻　麻黃去節　甘草各半分
右剉散每服半錢煎服於內加南星末蜜調下可
貼顖用
驅風散
胡黃連貳錢半　全蝎去毒炒　犀角
天竺黃　竺黃　麻黃去節各半錢　麝香壹字

右爲細末用乳汁調化食遠服

右二方發散之劑實有表證方可用之

青金丸 治嬰孩小兒解散胎熱化痰涎鎮驚邪

人參去蘆 天麻去 茯神去皮

白附子炮 牛膽南星 各貳錢 甘草 炙半錢

青黛壹錢 朱砂壹錢 麝香半字

右爲極細末煉白蜜同如梧桐子大用釣藤皂莢

子煎湯研化不拘時候服

太乙散 治芽兒胎驚病痓亦宜常服

天漿子去殼 南星 白附子各炮 貳錢

天麻 防風 茯苓各貳錢

全蝎 朱砂各壹錢 麝香少許

右爲末每服半錢乳汁化下張渙方天漿蝎梢各

貳拾壹箇防風天麻朱砂各半兩麝香壹錢無茯

苓白木

參蝎散 治小兒胎驚定心神

天漿子 天竺黃 人參

朱砂 全蝎 天麻

蟬蛻各等分 麝香少許

右爲末煉蜜丸桐子大每服一丸金銀湯下

豬乳膏 治小兒諸驚胎癇

全蝎 琥珀 朱砂少許

右爲末每服一字麥門冬煎湯調下

朱銀丸 治小兒胎風壯熱痰盛翻眼口禁取下胎

中蘊受之毒亦治驚積量與之

水銀壹錢蒸棗肉研如泥 白附子 全蝎

南星 朱砂 天漿子

蘆薈 牛黃各半字 鉛霜

腦壹字 麝香少許 直殭蠶

右爲末煉蜜丸桐子大薄荷湯化下

張渙聖星丹 諸癇皆宜服之曾經大効

天南星一般大者四十九箇端午取活蝎四十

九箇瓦器盛隨泥固濟吊靜室中臘日取出揀

南星蝎螫著處有小竅子者其餘不用只將蝎

螫南星以酒浸一宿焙研細末次用

牛黃 麝香 龍腦各壹錢研細

辰砂細研水飛半兩

右件再一處研勻薑汁和桐子大服一粒至二粒

人參薄荷湯化下

白金散 治諸癇潮發不省者

白殭蠶（…炒微黃） 天竺黃（…）
牛黃（…錢） 麝香 龍腦（各半錢）
細研拌勻每服半錢薄荷汁調放溫灌之
烏金膏 治胎癇潮發無時
烏梢蛇（…酒浸一宿取肉焙） 全蝎 蠶紙（燒灰）
蟬殼 朱砂（飛各半兩）
金箔（…） 龍腦 麝香（各半錢）
右各取細末研勻煉蜜和如皂子大每服壹粒人參薄荷湯化下
天南星煎 治胎癇潮發無時

天南星（炮微黃） 白附子 白花蛇（酒浸去皮骨炙）
黃丹（各壹兩） 乾蝎（炒） 天麻（各半兩）
巳上擣羅為細末用好酒兩大盞慢火熬不住手攪以酒盡為度次用
朱砂（細研水飛半兩） 膩粉（貳錢半分） 牛黃
麝香 龍腦（各半錢）
細研入膏內和如皂子大每服一粒竹瀝化下無時
祛風散 治胎癇多啼叫
胡黃連（…） 全蝎 犀角
天竺黃 麻黃（去節各貳錢伍分）

右各取細末和勻每服半錢入麝一字乳汁調下
鐵粉散 驚風面赤口乾大便不利尤宜服
鐵粉（半兩） 鬱金 牛黃
真珠 胡黃連（…各貳錢）
各研細拌勻每服一字溫粥湯調下
羌活膏 治胎癇昏困不省
羌活 獨活（各…） 天麻
全蝎 人參（去蘆） 白殭蠶（…炒各半兩）
烏蛇肉（壹兩酒浸…）
右擣羅為細末煉蜜和膏每服皂子大麝香荊芥湯化下

麝香膏 治胎癇不得安臥
麝香（研） 牛黃（研） 白附子
蠶蛾（微炒） 白殭蠶（微炒各貳錢伍分）
全蝎（貳錢壹箇）
右取淨末更研細蜜和膏如皂子大每服一粒人參荊芥湯化下
胎癇論 胎癇者因未產前腹中被驚或母食酸鹹過多或為七情所汩致傷胎氣兒生百日內有者是也發時心不寧面微黃氣逆痰作目上視身反張啼聲

不出先用參蘇飲和解次以不驚丹或琥珀抱龍丸間投輕則可愈重者難全

參蘇飲 發熱　　不驚丹 驚

琥珀抱龍丸 驚

胎風 小兒初生其身有如湯潑火傷者此皆乳母過食膏粱所致也其母宜服清胃散 方見牙齒門 及逍遙散 方見婦人虛勞門 以清其氣血兒亦飲數滴可也有身無皮膚而不燃赤者皆由產母脾氣不足也用粳米粉傅之燃赤發熱者皆由產母胃中火盛也用石膏傅之經謂脾主肌肉肺主皮毛故知病脾肺也如臍顖

生瘡者火土相合遂成濕熱下流攻擊腎水也難治如脚上有瘡者陰虛火盛也此不滿五歲而斃如未滿月而撮口握拳腰軟如醉者此肝腎中邪勝正弱所致也三日內必不治如男指向裏女指向外尚可治眉紅亦不可治可治者用全蝎散 方見口噤 釣藤散 方見慢驚 等類治之若因大病虧損胃氣而諸臟虛弱所致者用補中益氣湯 方見虛羸 錢氏地黃丸 方見腎臟 若面唇赤色正屬腎水不足肝經陰虛火動而內生風熱爾當滋腎水以制陽光其身軟者內稟氣不足肌肉未堅也當參五軟而施治之 聖惠所云胎風原與胎驚混濫故此不取

胎熱 兒在胎中母多驚悸或因食熱毒之物降生之後旬日之間兒多虛痰氣急喘滿眼閉目赤目胞浮腫神困呵欠呢呢作聲遍體壯熱小便赤色大便不通時復驚煩此因胎中受熱或恨服溫劑致令熱蓄於內熏蒸胎氣故有此證若經久不治則鵝口重舌木舌赤紫丹瘤自此而生宜先以木通散煎與母服使入於乳令兒飲之通心氣解煩熱然後以四聖散溫洗兩目目開進地黃膏天竺黃散及牛蒡湯當歸散亦令母服凡有胎疾不可求速効當先令乳母服

藥使藥過乳漸次解之百無一失若即以凉藥攻之必生他病乳母仍忌辛辣酒麪庶易得安不致反覆

生地黃湯 湯氏 治小兒在胎時因母有熱或恣飧酒麪熱毒之物傳於胎中令兒生下面赤眼閉身體壯熱哭啼不止口熱如湯乃胎熱之候也

生地黃　赤芍藥　川芎
當歸　栝蔞根

右件等分㕮咀每服半兩水一盞煎六分產婦亦可服以此少抹入兒口中

木通散 主小兒上膈熱小府閉諸瘡丹毒母子同

服

木通　地骨皮各半　大黃

甘草　赤茯苓各半錢　瞿麥

滑石　山梔子　車前子

黃芩各貳錢半

右水一鍾燈心三莖煎入薄荷同煎

嚥乳法

豬苓去黑皮　澤瀉　赤茯苓去皮

天花粉　茵蔯　生甘草

生地黃　山梔去殼

右剉散用水煎食後令乳母捏去宿乳却服此藥

甘豆湯　治小兒胎熱

甘草壹錢　黑豆貳錢　淡竹葉拾壹

右㕮咀用水一鍾入燈心七莖煎不拘時候服

四聖散　主芽兒胎受熱毒生下兩目不開

燈心　黃連　秦皮

木賊　棗子各半兩

右水一鍾煎澄清去查無時起洗兩目自開後服

地黃膏

地黃膏　治胎熱

山梔仁　綠豆粉各壹兩半　粉草陸錢

右爲末用生地黃爛杵壹兩半和好蜜壹兩半以

薄瓷器盛在銅銚中煮成膏如稀糊相似候冷停

分入前藥末同在乳鉢內研勻丸芡實大每以半

丸麥門冬湯化服

天竺黃散治兒口瘡　牛蒡湯治兒咽

當歸散治兒潮熱

清胃散治兒牙齦病　薛氏治胎熱用此

胎寒　嬰兒初生百日內覺口冷腹痛身起寒栗時發

戰慄曲足握拳晝夜啼哭不已或口禁不開名曰胎

寒其證在胎時母因腹痛而致產經云胎寒多腹痛

有產婦喜啖甘肥生冷時果或胎前外感風寒暑

濕治以涼藥內傷胎氣則生後昏昏多睡間或哯乳

瀉白若不早治必成慢驚慢脾凡有此候宜以冲和

飲當歸散合和水煨薑煎服使之微泄泄行進勻氣

散調補泄止氣勻神安痛定手足舒伸次用參苓白

朮散以養胃氣白芍藥湯去其寒濕乳母宜節生冷

飲食庶易瘥也　又有手足稍冷唇面微青額上汗

出不顧乳食至夜多啼頗似前證但無口冷寒戰名

曰藏寒其疾夜重日輕腹痛腸鳴泄瀉清水間有不

泄者此證亦在百日內有之皆因臨產在地稍久冷氣侵逼或以涼水參湯洗兒或斷臍帶短而又結縛不緊爲寒氣所傷如此宜以白芍藥湯及冲和飲加鹽炒茴香茱萸木香煎服仍乳母同服

湯 小兒胎中有寒生下不能將護再傷於風其候面色青白四肢逆冷手足顫動口噤不開乃胎寒之故或寒乘虛入藏作腹疼盤腸內弔 治法詳寒腹痛條

冲和飲 方見上　當歸散 方見熱條

白芍藥湯 方見上　勻氣散 方見瀉

參苓白朮散

異功散 方見上　薛氏治胎寒用此

胎肥胎怯 錢氏曰胎實面紅目黑睛多者喜笑胎怯面青目黑睛少白睛多者多哭更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥也

胎肥者生下肌肉厚遍身血色紅滿月以後漸漸羸瘦口白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎浴體法主之

天麻 貳錢　蝎尾 去毒　硃砂 各伍分

烏蛇肉 酒浸焙乾爲末　白礬 各叁錢　麝香 壹字

青黛 叁錢

右研勻每用叁錢水叁碗桃枝壹握并葉伍柒枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

大連翹飲 治胎熱臍風小便不通及諸般瘡毒

連翹　瞿麥　荊芥

木通　赤芍藥　當歸

防風　柴胡　滑石

蟬殼　甘草 炒各壹錢　山梔子

黃芩 炒各五分

右爲末每服二錢加紫草水煎熱甚加大黃更詳證加減

薛氏曰胎肥乃受母胃熱所致兒用浴體法以疎通其腠理乳母服大連翹飲

胎怯者生下面無精光肌肉薄大便白水身無血色時時哽氣多噦目無精彩亦宜以浴體法主之 初虞世曰母氣不足則羸瘦而肉薄父精不足則解顱眼白多

胎黃 小兒生下遍體面目皆黃狀如金色身上壯熱大便不通小便如梔汁乳食不思啼哭不止此胎黃之候皆因乳母受濕熱而傳於胎也凡有此證母子皆宜服地黃湯及地黃飲子有生下百日及半週不

因病後身微黄者胃熱也若自生而身黄者胎疸也
經云諸疸皆熱色深黄者是也犀角散主之若淡黄
兼白者胃怯也白朮散主之
生地黄湯　治小兒生下胎黄
生地黄　赤芍藥　川芎
當歸　栝蔞根各等分
右㕮咀每服半兩水煎乳母服時時少抹入兒口
中
地黄湯
生地黄　赤芍藥　天花粉

赤茯苓去皮　川芎　當歸去蘆
豬苓　澤瀉　甘草
茵陳各等分
右剉散用水煎食前服
地黄飲子　治小兒生下滿身面目皆黄狀如金色
或面赤身熱眼閉不開大便不通小便如梔子汁
滿身生瘡
生地黄　赤芍藥各貳錢　羌活去蘆
當歸去蘆　甘草壹錢
右為極細末用燈心煎湯食前服乳母宜服仍忌

酒麪五辛之物
犀角散　治小兒胎黄一身盡黄
犀角　茵陳　栝蔞根
升麻　甘草　龍膽草
生地黄　寒水石各等分
右㕮咀用水煎不拘時候服
曾氏　田氏云月裹生赤肌膚如赤丹塗者先用牛黄
散托裹續用藍葉散塗外乳母服清涼飲子三大劑
牛黄散即牛黄奪命散方見瘡門清涼飲方見腹痛　張渙云嬰兒初生須
洗口令淨若洗不淨則穢汁浸漬於眼眥中使瞼赤

爛至長大不差者名曰胎赤宜用二金散　曾　純陽
之子始生旬月忽兩目俱紅弦爛澀癢成翳此因在
胎為母感受風熱傳於心肝而得先以百解散加當
歸散木通燈心煎服次導赤散及牛蒡湯加黄連木
賊蟬殻水煎服自効　有因難產胎氣頗澀轉側差
緩其血壓於兒首遂至濺血滲下盛則灌注其眼不
見瞳人輕則外胞腫赤上下弦爛若投涼藥必寒臟
腑宜與生地黄湯主之
百解散方見驚搐　當歸散方見
導赤散方見心藏　牛蒡湯方見喉痹

二金散方

黄連（去鬚） 黄蘗（各壹錢）

右搗爲麤末以乳汁浸一宿焙乾每用少許以新綿裹用荊芥湯浸放溫熱時時洗之

真金散 治小兒初生洗眼不淨則穢汁浸漬於眼背中使瞼赤爛至長不瘥俱含熱毒藥名曰胎赤

黄連（去鬚） 黄栢 當歸

赤芍藥（各壹錢） 杏仁（去皮尖半錢）

右剉散乳汁浸一宿曬乾爲極細末用生地黄汁調一字頻頻點眼新綿裹荊芥湯浸溫時時洗

母服洗心散

洗心散

甘草（生） 當歸 麻黄

芍藥 白朮 荊芥（各壹錢）

大黄（煨各半錢）

右爲極細末用生薄荷煎湯調化食遠服

生地黄湯（見眼不開）

金壇王肯堂宇泰甫輯

肝

錢 肝主風 實則目直大叫呵欠項急頓悶 虛則咬牙多欠氣熱則外生氣溫則內生 肝病哭叫目直視呵欠頓悶項急 外生感風呵欠頓悶口中氣熱當發散大青膏主之若能食飲水不止當大黄丸微下之餘不可下 肝熱手尋衣領及亂捻物瀉青丸主之壯熱飲水喘悶瀉白散主之 肝有風目連劄不搐得心熱則搐治肝瀉青丸治心導赤散 肝有熱目直視不搐得心熱則搐治肝瀉青丸治心導赤散 肝有風甚身反折強直不搐心不受熱也當補腎治肝補腎地黄丸治肝瀉青丸 凡病或新或久皆引肝風風動而上於頭目目屬肝風入於目上下左右如風吹不定兒不能任故目連劄也若熱入於目牽其筋脈兩眥俱緊不能轉視故目直也若得心熱則搐以其子母俱有實熱風火相搏故也（潔古主搐身熱則尋衣捻物目連劄直視不能轉視或極則身反潤項折皆風熱也目屬肝之竅屬木木性急故如是） 肝病秋見（一作日晡）肝強勝肺肺怯不能勝肝當

補脾肺治肝益脾者母令子實故也補脾益黃散治
肝瀉青丸主之　肝病春見卜以肺勝肝當補腎肝
治肺臟肝怯者受病也補肝腎地黃丸治肺瀉白散
主之　五臟相勝輕重肝病見秋木旺肝勝肺也宜
補肺瀉肝輕者肝病退重者□目閉死　謹五臟相
勝病隨時令乃錢氏悟元內經熱論法時論之旨實
發前人所未發者也假如肝病見於春及早晨乃肝
自病於本位也今反見於秋及日晡肺之位知肺虛
極肝往勝之故當補脾肺瀉肝也餘倣此　瀉肝主
風自病則風搐拘急急食甘以緩之佐以酸苦以辛

散之　實則風搐力大瀉青丸主之　虛則風搐力
小地黃丸主之　心乘肝實邪壯熱而搐利驚丸涼
驚丸主之　肺乘肝賊邪氣成則前伸呵欠微搐法
當瀉肺先補本臟補肝地黃丸主之瀉肺瀉白散主
之　脾乘肝微邪多睡體重而搐先當定搐瀉青丸
主之搐止再見後證則別立法治之　腎乘肝虛邪
憎寒呵欠而搐羌活膏主之　讚凡肝得病必先察
其肺腎兩臟根其病之所起然後將其肝家本臟之
虛實方可治療然腎者肝之母金者木之賊今肝之
得病若非腎水之不能相生必是肺金之鬼來相攻

擊不得不討伐而求之故其來在肺先治其肺攻其
鬼也其來在腎先補其腎滋其根也然後審其肝家
本臟之虛實而寒溫之　腎若肝經實熱而外生風
者宜用大青膏散之若既服而前證仍作或益甚者
此邪氣已去而脾氣虧損也宜用異功散加芍藥補
之若肝經虛熱或因剋伐而內生風者宜用異功散
地黃丸補之若風邪入臟能食飲冷大便秘結者此
邪氣內實也宜用大黃丸下之若既下而食少飲湯
或腹作脹者此脾氣內虛也宜用白术散補之氣血
素弱或因病後或服攻伐之劑而手尋衣領咬牙□

欠目淡青者乃肝經虛甚也急用地黃丸以補腎肝
呵氣短氣長出氣乃肺經虛甚也急用異功散以補
脾肺若申酉時叫哭直視呵欠煩悶項急驚悸手足
搐動發熱飲水者此風火相搏而勝肺金也用柴胡
梔子散以治肝火生肝血用異功散補脾土生肺金
若唇白者為脾絕不治
海肝苦急急食甘以緩之甘草　肝欲散急食辛以
散之川芎　以辛補之細辛、以酸補之芍藥　肝
虛以生薑陳皮之類補之虛則補其母腎者肝之母
也以熟地黃柏補腎如無他證錢氏地黃丸補之

補肝丸四物湯內加防風羌活等分為細末煉蜜丸是也　鎮肝丸即瀉青丸去梔子大黃是也治肝虛錢氏補腎地黃丸　肝實以白芍藥瀉之如無他證錢氏瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉心

瀉青丸錢氏　又名瀉肝丸

當歸去蘆焙　龍膽焙　川芎

山梔子仁　川大黃濕紙裹煨　羌活

防風去蘆各等分

右為末煉蜜和丸芡實大每服半丸至一丸煎竹葉湯同沙糖溫水化下

按前方足厥陰經解散肌表疏通內熱之藥也若大便秘結煩渴飲冷飲食如常者屬形病俱實宜用此以瀉之若大便調和煩渴飲冷目淡青色屬病氣實而形氣虛宜用抑肝散平之若大便不實作渴飲湯飲食少思肢體倦怠者屬形病俱虛宜用地黃丸補之

抑肝散　治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱或木乘土而嘔吐痰涎腹脹少食睡臥不安

軟柴胡　甘草各伍分　川芎捌分

當歸　鈎藤鈎各壹錢　白朮炒　茯苓

右水煎子母同服　如蜜丸名抑青丸

大青膏方見驚搐　大黃丸方見實熱

異功散方見吐瀉　白朮散方見渴

柴胡梔子散方見發熱　利驚丸

涼驚丸　羌活膏方見

瀉心散

驚

要驚搐一也而有陰陽之分表裏之異身熱力大者為急驚身冷力小者為慢驚仆地作聲醒時吐沫者為癇頭目仰視者為天吊角弓反張者為痓而治各不同也

錢氏五臟時補瀉法 錢因潮熱發搐在寅卯辰時者此肝用事之時也身體壯熱目上視手足動搖口內生熱涎項頸急此肝旺也當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸見肝部

〔附〕寅卯辰時搐而發熱作渴飲冷便結屬肝膽經虛熱用柴芍參苓散作渴引飲自汗盜汗屬肝膽經血虛用地黃丸口吻流涎屬肝木剋脾土用六君子湯 一小兒寅卯時發熱痰搐服抱龍丸而愈後復患因自用前藥更加咳嗽氣喘不時發搐面赤或青黃或浮腫或流涎余謂咳嗽氣喘乃脾肺氣虛不時發搐乃木乘土位面青而黃赤乃肝助心脾浮肺流涎乃脾氣虛弱用益智丸以補心神補中益氣湯以養脾肺頓愈

錢因潮熱發搐在巳午未時者此心用事之時也心惕目上視白睛赤色牙關緊急口內涎生手足動搖此心旺也當補肝治心治心導赤散涼驚丸補肝地黃丸 廣親宅七太尉方七歲潮熱數日欲愈錢謂父二大王曰七使潮熱將安八使預防驚搐王怒曰但使七使愈勿言八使病錢曰八使過來日午間即無苦也次日午前果作搐急召錢治之三日而愈蓋預見其目直視而腮赤必肝心俱熱更坐石杌子乃欲就冷此熱甚也又肌膚素肥盛而本實其脉急促故發搐克言午時者自寅至午皆心肝用事之時治之乃瀉心肝補腎自安矣 薛巳午未時發搐若兼作渴飲水屬風火相搏以地黃丸補肝導赤散涼驚

丸治心若作渴飲湯體倦不乳土虛而木旺也用地黃丸以補腎六君子湯以補脾 一小兒巳午時搐熱驚悸發時形氣倦怠而黃懶食流涎飲湯此心火虛而不能生脾土也不信自服涼心之藥更加吐瀉睡而露睛幾成慢脾風用六君薑桂佐以地黃丸而愈 一小兒七歲驚搐發熱不已巳午未時益甚形氣殊倦熱定飲湯此心脾氣虛朝用補中益氣湯加益智仁夕用六君當歸鈎藤鈎尋愈後飲食過多復作吐瀉或治以保和丸又加寒熱發搐此脾土復傷而肝木所侮也用六君柴胡與熱止而飲食進但午

未時仍泄用補中益氣湯加茯苓半夏鈎藤鈎而全
錢因潮熱發搐在申酉戌時者此肺用事之時也不
甚搐而喘目微斜視身熱如火睡露睛手足冷大便
淡黃水是肝旺當補脾益黃散方見脾部治肝瀉青丸治
心導赤散[illegible]
徐氏子三歲病潮熱每日西則發搐身微熱而目微
斜露睛四肢冷而喘大便微黃請錢與李同治錢問
李曰病何搐也李曰有風何身熱微溫曰四肢所作
何目斜睛露曰搐則目斜何肢冷曰冷厥心內熱曰
何喘曰搐之甚也曰何以治之曰涼驚丸鼻中灌之
必搐止錢又問曰既謂風病溫壯搐引目斜露睛內
熱支冷及搐甚而喘併以何藥治之李曰皆此藥也
錢曰不然搐者心肝實也身微熱者日西肺用事之
時也肺主身溫今且熱者肺虛也目微邪露睛者肝
肺相乘勝也四肢冷者脾虛也肺若虛甚則脾母亦
弱木氣乘脾四肢即冷治之當先補脾肺用益黃散
阿膠散得脾虛證退然後治其心肝瀉青丸導赤
散涼驚丸治之九日愈　薛申酉戌時微搐而喘目
微斜身似熱睡而露睛大便淡黃屬脾肺虛熱用異
散手足逆冷或喘瀉不食屬脾肺虛寒用六君抱
加木香久病而元氣虛者用六君子丸八味丸二藥主
之

錢因潮熱發搐在亥子丑時者此腎用事之時也不
甚搐而臥不穩身體溫壯目睛緊斜視喉中有痰大
便銀褐色乳食不消多睡不省當補脾治心補脾益
黃散治心導赤散涼驚丸[illegible]　薛
亥子丑時微搐身熱目睛緊斜吐瀉不乳厥冷多睡
屬寒水侮土用益黃散未應用六君薑桂
[illegible]錢傷風發搐因傷風後得之口中氣出熱呵欠
頓悶手足動搖當發散大青膏主之小兒生來怯弱
者多此病也　薛傷風發搐因傷風而得之證同大
人傷風寒痰之類當辨有汗無汗陰陽二證用大青
膏小續命之類開發則愈[illegible]　薛傷風
發搐口氣不熱肢體倦怠用異功散補脾土鈎藤飲
清肝木若因風邪內鬱發熱而變諸證者當理肺金
清風邪若外邪既解而內證未除當理肺補脾若肺
經虧損而致驚搐等證者當補脾肺以平肝心則驚
搐自止矣　一小兒月內發搐鼻塞乃風邪所傷以
六君子湯加桔梗細辛子母俱服更以葱頭七莖生
薑一片細擂攤紙上合置掌中令熱急貼顖門少頃

兒剎搐止
大青膏
天麻（末，壹分） 白附子（末，壹錢半） 青黛（研，壹錢）
蝎尾（去毒，生，末） 烏蛇梢肉（酒浸，焙乾，取末，各壹錢）
朱砂（研） 天竺黃（研）
右同再研細，生蜜和成膏，每服半皂子大至一皂子大，月中兒粳米大，同牛黃膏溫薄荷水化一處服之，五歲已上同甘露散服之
小續命湯（方見中風）
傷食發搐，因傷食後得之，身體溫，多唾多睡，或吐不思乳食而發搐，當先定搐，搐退，白餅子（方見癖）下之，後服安神丸（方見心臟）。〔按〕傷食發搐，謂不因他證，忽然而搐，此因飲食過度，致傷脾胃，故兒多睡多吐，不思飲食，脾胃既虛，引動肝風，則發搐，當先定其搐，如羌活防風煎下瀉青丸，後用白餅子下其食，漸漸用調中丸（方見腹脹）異功散（方見脾臟）等補之。一停食發搐，嘔吐乳食者，宜用消食丸（方見傷食），既消而前證仍作，或變他證者，脾土傷而肝木乘之也，用六君子加鈎藤鈎以健脾平肝（方見傷食）
因外物驚，宜鎮平之，以黃連安神丸，若氣動所驚，宜寒水石安神丸。〔要〕外物驚者，若元氣本不病，故治以黃連安神之苦寒，氣動驚者，不因外物驚，元氣自有病，故治以寒水石安神之甘寒也
黃連安神丸
黃連（酒炒，壹錢半） 朱砂（細研，水飛） 生地黃
當歸（各壹錢） 甘草（炙，伍分）
右為極細末，蒸餅和丸如黃米大，每服十丸，津下
寒水石安神丸（即錢氏安神丸，方見心臟）
鎮心丸 涼心經，治驚熱痰盛
甜硝（白者） 人參（去蘆，取末，各壹兩） 甘草（炙）
寒水石（煅，各壹兩半） 乾山藥（白者） 白茯苓（各貳兩）
朱砂（壹兩） 龍腦 麝香（各壹錢，另研）
右為末，熟蜜丸，如雞頭大，如要紅入坯子臙脂二錢（即染胭脂），溫水化下半丸至一二丸，食後
急慢驚總論 小兒急慢驚風，古謂陰陽癇也，急者屬陽，陽盛而陰虧，慢者屬陰，陰盛而陽虧，陽動而躁疾，陰靜而遲緩，皆因臟腑虛而得之，虛能發熱，熱則生風，是以風生於肝，痰生於脾，驚出於心，熱出於肝，而心亦熱，以驚風痰熱合為四證，搐搦掣顫反引竄視為八候，凡眨眼搖頭張口出舌，唇紅臉赤，面眼唇青

及瀉皆青髮際印堂青筋三關虎口紋紅紫或青者
皆驚風候也大抵肝風心火二者交爭必挾心熱而
後發始於搐故熱必論虛實證先分逆順治則有後
先蓋實熱爲急驚虛熱爲慢驚慢驚當無熱其發熱
者虛也急驚屬陽用藥以寒慢驚屬陰用藥以溫然
又必明淺深輕重進退疾徐之機故曰熱論虛實者
此也男搐左視左女搐右視右男眼上竄女眼下竄
男握拇指出外女握拇指入裏男引手挽左直右曲
女引手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有先搐
左而後雙搐者但搐順則無聲搐逆則有聲其指紋

彎弓入裏者順反外者逆出入相半者難痊故曰證
分逆順者此也陽病陰脈陰病陽脈亦爲反凡熱盛
生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐治搐先於截風
治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱其若
四證俱有又當兼施並理一或有遺必生他證故曰
治有先後者此也綱領如此若分三者言之暴烈者
爲急驚沉重者爲慢驚至重者肝風木之尅脾土則
爲慢脾風矣　【要】急驚證屬木火土實也木實則搐
而力大目上目劄所謂木太過曰發生其動掉眩癲
癇是也火實則身熱面赤土實則不吐瀉睡合睛故

其治法合凉瀉而用凉驚丸利驚丸之類慢驚證屬
木火土虛也木虛則搐而力小似搐而不甚搐經所
謂木不及曰委和其病搖動注恐是也謂手足搐動
腹注泄心恐悸也火虛則身冷口氣冷土虛則吐瀉
睡露睛故其治法合溫補而用羌活膏益黃散有熱
者用東垣黃耆益黃散其東垣并錢氏羌活膏治慢
驚者謂土虛泄瀉火木乘之謂手掌與腹俱熱之證
若火木土俱虛而搖動恐悸注瀉手腹冷者非羌活
膏不能治之　【丹】小兒驚風有二急驚屬痰熱宜凉
瀉慢驚屬脾虛所主多死宜溫補急驚用降火下痰

丸養血藥作湯下之慢驚當補脾兼用朱砂安神丸
清米湯下更於血藥中求之（如四物四君東垣黃耆益黃散之類）世以
一藥通治之甚妄

【急驚】急驚之候亦曰真搐牙關緊急壯熱涎潮竄視
反張搐搦顫動唇口眉眼眨引頻併口中氣冷臉赤
唇紅大小便黃赤其脈浮數洪緊此內挾實熱外感
風邪心家受熱積驚肝家生風發搐肝風心火二藏
交爭血亂氣并痰涎壅盛百脈凝滯關竅不通風氣
蕃盛無所發泄故暴烈也又有搐搦反張斜視而牙
關不緊口無痰涎而氣熱未可直指以爲驚風恐是

傷風傷寒夾食夾驚疹痘等證此即錢氏假搐之説又各依本證施治矣又急驚搐搦不可把握但扶持之否則風痾逆入經絡遂使手足拘攣成廢疾　錢急驚因聞大聲或大驚而後發搐發過則如故此無陰也當下利驚丸主之　急驚本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黄赤劇則發搐蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚丸主之以除其痰熱不可用巴豆及温藥大下之恐搐虛熱不消也小兒熱痰客於心胃因聞大聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不聞聲及驚亦自發搐　鄭氏云急驚內有熱即生風又或因驚而發則目上連劄潮涎搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故此急驚證也當其搐勢漸減時與鎮心治熱之藥一二服如麝香丸鎮心丸抱龍丸辰砂丸紫雪之類候驚勢已定須臾以藥下其痰熱如利驚丸軟金丹桃枝丸之類利下痰熱心神安寧即愈　潔古云急驚者陽證也俱腑受病熱痰客於心肺是少陽相火旺經云熱則生風因聞大聲而作蓋謂東方震卦得火氣而發搐火本不動焰得風而動當用利驚丸導赤散瀉青丸地黄丸搐止宜服安神丸　回治驚大忌防風丸防風辛温之藥必殺人何也辛散浮温熱者火也能令母實助子之氣盛皆殺人也如因驚而瀉青色先鎮肝以朱砂之類勿用寒凉之藥大禁凉驚丸風木旺必剋脾胃當先實其土後瀉其子　丹急驚風發熱口噤手足心伏熱痰嗽痰喘並用涌法重則用瓜蒂散輕則用苦參赤小豆末以酸齏汁調服後少定用通聖散蜜丸服之間以桑樹上桑牛陰乾研末調服以平其風（[illegible]）又以北薄荷葉寒水石各壹兩青黛白殭蠶辰砂各壹錢全蝎貳枚豬牙皂角槐角各伍分並為末燈心湯和乳汁灌之角弓反張目直視因驚而致宜南星半夏入薑汁竹瀝灌之更灸印堂　初驚用防風導赤散生乾地黄川木通防風甘草等分用竹葉叁錢煎服須用寧神膏麥門冬去心天竹黄茯神朱砂各壹兩麝香壹錢各搗研極細煉蜜和捏作小餅子臨卧薄荷湯化下一夜一餅　老醫常言小兒驚搐多是熱證若先便用驚風藥白附子全蝎殭蠶川烏之類便是壞證後有醫幼科者只用導赤散加地黄防風進三服導去心經邪熱其搐便止次服寧神膏神效（從係道闕幼時患驚其搐甚危延京口名有名幼科醫療之甚因驚其証易養兒未方於余以是授之二服立愈自後常以救人）

無仆劾者惡人物惕易驚者之 急驚之論前代書所不載惟曰陽癇大槩失所愛護或抱於當風或近於熱地晝則食多辛辣夜則衾蓋太厚鬱蒸邪熱積於心傳於肝再受人物驚觸或跌撲叫呼雷聲鼓樂雞鳴犬吠一切所驚未發之時夜卧不穩困中或笑或哭齧齒咬乳鼻額有汗氣促痰喘忽爾悶絕目直上視牙關緊急口噤不開手足搐掣此熱甚而然况兼面紅脉數可辨蓋心有熱而肝有風二藏乃陽中之陽心火也肝風也風火陽物也風主乎動火得風則煙焰起此五行之造化二陽相鼓風火相搏肝藏魂心藏神因

熱則神魂易動故發驚也心主乎神獨不受觸遇有驚則發熱熱極生風故能成搐名曰急驚治之之法先以五苓散加黃芩甘草水煎或百解散發表次通心氣木通散三解散疏滌肝經安魂退熱牛蒡湯防風湯主之驚風既除之後輕者投半夏丸重者下水晶丹與之去痰免成癡疾但不可用大寒涼藥治之熱去則寒起亢則害承迺制若倉卒之間驚與風證俱作只用五苓散加辰砂末薄荷湯調服少解其證蓋五苓散內有澤瀉導小便心與小腸為表裏小腸流利心氣得通其驚自減內有桂木得桂則枯是以能抑肝之氣其風自停况佐以辰砂能安神魂兩得其宜大略要解熱涼心肝後惟可用下和湯散調理 想當感慨古人每見驚風搐作不明標本混為一證遂然便用金石腦麝蜈蚕蛇蝎大寒搜風等劑投之耗傷真氣其證愈甚多致弗救殊不知驚生於心風生於肝搐始於氣是為三證其驚與風首已詳及然所謂搐者氣而成搐陳氏之論最為明理但未著其方余於此證則用寬氣飲治之只以枳殼枳實為主蓋其氣也四時平和則身安一息壅滯則疾作况小兒啼哭不常其氣蘊

蓄內則不能升降外則無出發泄展轉經時亦能作搐善醫者審察病源從而療之萬無一失更辨陰陽虛實不可輕忽若陽實證煎五和湯調三解散主之此急驚有搐之類若陰虛證煎固真湯調寬氣飲治之此慢驚有搐之類若祟感此證未別陰陽虛實先用五苓散和寬氣飲及少加寬熱飲三藥合用薑汁沸湯調灌即解大抵治搐之法貴以寬氣為妙氣順則搐停此自然之理 大凡幼科欲令常時驚悸不作在乎腎臟和平故戴氏曰治驚不若補腎謂心屬火火性燥得肝風則煙焰起致生驚悸補腎則水升

火降邪熱無侵餘有用風不生驚駭其法當於此用進補腎地黃丸一服或琥珀抱龍丸用此時若益水生於中佐之以藥則腎水得下心火不炎自無驚矣鈐方治法大要用藥有次序有輕重通關以後且與截風定搐風搐既定却下痰熱理爲至當若患在痰熱未有驚風只可退熱化痰不可妄投驚風藥蓋藥中多用寒涼恐引入痰熱入經絡凡病在熱不可妄治痰止當解表病在驚不可妄治風蓋驚由痰熱得只可退熱化痰而驚自止病在痰不可便治驚急須退熱化痰病在風不可便治搐蓋風由驚作只可利驚化痰其風自散若也有搐須用截風散驚至妙之道若治驚而痰不化熱亦不退驚安得自止化其痰熱若不退風亦不散痰安得去是知不治之治所以治之之謂歟急驚初傳風搐得定而痰熱一泄又須急與和胃定心之劑若搐定而痰熱無多則但用輕藥消痰除熱可也然急驚俯當下切不可過用寒涼及水銀輕粉巴豆之輩備等蕩滌太驟或當劑之皆不得已但使痰去即止或不當用而用或可用而過焉由此遂成慢驚矣且如只下痰熱不必太驟但此斯處用大黃一品足矣且急驚原在於去肝風降

心火幼幼書以爲至要之說也 附急驚之候牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顫動口中氣熱頰赤唇紅脈浮洪數者此肝經血虛火動生風蓋風生則陰血愈散陰火愈熾火動則肺金愈虧肝木愈盛宜滋肝血養脾氣若屢服祛風化痰瀉火辛散之劑便宜認作脾虛血損急補脾土若風火相搏抽搐目瞤筋急痰盛者用四物湯以生肝血加鈎藤鈎山梔仁以清肝火更用四君子以補脾六味丸以滋腎若肺金剋木而兼呵欠者用瀉白散以瀉肺邪地黃丸以益肝血若邪入肝則用柴胡清肝散加龍膽草亦可邪入心用梔子清肝散加炒黃連亦通邪入腎用六味地黃丸邪入肺用地骨皮散邪入脾用六君子加柴胡山梔若不養肝血不補脾氣純用祛風化痰之藥不已則脾益虛血益損邪氣延綿必傳慢驚矣

初有痰熱未有驚風先且解表祛肝風降心火〻

和劑香蘇散解肌加乾葛（見太陽傷寒症）

參蘇飲 解驚風煩悶痰熱作搐咳嗽氣逆脾胃不和

人參去蘆 紫蘇和梗 前胡去蘆

乾葛 半夏 赤茯苓去皮各一錢半

枳殼　陳皮去白　桔梗剉炒
甘草各等分　驚多入人參加川芎
右剉每服二錢水一鍾薑三片煎七分無時溫服
人參羌活散　治初作急驚散風邪除風熱
羌活　獨活　柴胡
川芎　人參　甘草炙
白茯苓各壹兩　前胡　桔梗
地骨皮　天麻各半兩酒洗焙　枳殼麩炒去瓤
右㕮咀每服一錢水半盞薑一片薄荷一葉棗半
箇煎服疹痘未發亦可服直指方每服三字末紫

蘇薄荷湯調搐掣緊急者去節麻黃煎湯調或惺
惺散加荊芥防風亦可免得遂施腦麝
惺惺散　除風熱及傷寒時氣瘡疹發熱
白茯苓去皮　細辛　桔梗
栝蔞根　人參　甘草炙
白朮　川芎各等分
右爲末每服一錢水半盞薑一片薄荷二葉同煎
湯氏細辛減半
獨活湯　治胎驚發散風邪
羌活　獨活各壹分　檳榔

天麻　麻黃去節　甘草炙各半分
右剉散每服半錢水煎於內加南星末蜜調可貼
顖門
木通散　治小兒肝心有熱驚怪用此藥瀉肝風降
心火利驚熱
羌活　山梔子各貳錢　大黃煨
木通　赤茯苓　甘草各壹錢
右剉碎每服二錢入紫蘇葉些少用水一盞煎至
五分不拘時服
巳風丹　祛風退驚

天竹黃細研　防風　鉤藤各壹兩
白殭蠶　乾全蝎　白附子各半兩
右爲細末煉蜜和如芡實大每服壹粒至貳粒麝
香荊芥湯化下
加味導赤散
生地黃上　木通上　防風中
甘草中　山梔子中　薄荷葉下
麥門冬中
入燈心草竹葉水煎
仁齋犀角湯　治心驚熱盛

犀角　防風　木通
赤茯苓　桑白皮炒　甘草炙各等分
右剉細每三字水煎服
急驚初傳且可通與定驚搐　諸風搐搦關竅不通
痰涎潮塞氣實使之先用蘇合香丸以通門然後薄
荷湯調與服使氣下則痰下關竅自通
通關散　治小兒驚風搐搦關竅不通
南星炮　殭蠶炒去絲嘴　麝香壹字
豬牙皂角去皮弦炙　赤脚蜈蚣壹條炙
右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴
入藥兩三點涎自出口自開皂角略燒存性為末

嚏驚散
半夏壹錢　豬牙皂角半錢
右為末用一豆許用管子吹入鼻立醒
茅先生奪命散
銅青　朱砂各貳錢　膩粉半錢
麝香少許　蠍尾拾肆箇去針
右為末每服半錢薄荷腦茶清調下此治天釣臍
風客忤卒死撬口鵝口木舌喉痹腑熱驚風痙吐涎
後依證調理

錢氏涼驚丸
草龍膽　防風　青黛各參錢
鉤藤貳錢　黃連伍錢　牛黃
麝香　龍腦各一字
麵糊丸粟米大每服三五丸金銀湯下
局方天麻防風丸　治小兒驚風身熱喘粗多睡驚
悸手足搐搦精神昏憒
天麻　防風　人參各壹兩
甘草　朱砂　雄黃各貳錢半
蠍尾炒　殭蠶炒各半兩　牛黃
麝香各壹錢

右為末煉蜜丸櫻桃大朱砂為衣每一丸薄荷湯
化下
三因方治陽癇驚風熱證面赤身熱發搐直視牙緊
蘆薈　白附子　甘草各貳錢
胡黃連　朱砂各壹錢　膩粉
麝香各半錢　蠍梢　殭蠶炒各七箇
金箔沐片　赤脚蜈蚣壹條炙
右為末二歲已下服半錢金箔薄荷湯下
全嬰方雌紅散　治小兒急慢驚風手足搐搦目睹

神昏

牛黃　鵬砂　腦子

真珠　水銀以上各半錢　青黛

蠍尾炒　京墨燒　南星

半夏湯洗七壹製一宿　蛇含石醋淬各壹錢　金銀箔各拾片

麝香壹字　烏蛇尾取生蛇頂下七寸酒浸一宿去皮骨炙壹錢

右為末三歲一字薄荷湯下

按此治風熱痰壅通關透肌骨之劑也非風邪下陷者不可輕用

定搐散　治小兒急驚定搐

赤脚蜈蚣大者壹條酒浸炙　麻黃去節

南星炮　白附子　直殭蠶炒

羌活　代赭石醋煅淬　蠍稍

川[illegible]黃各貳錢　朱砂壹錢

右為末每服一字荊芥紫蘇煎湯調下如搐不止加烏蛇肉

順搐散　解男右女左搐不順者

枳殼製　鉤藤去鉤　荊芥

羌活　防風去蘆　甘草各半

右㕮咀每服二錢水一盞順切生薑貳片煎七分無時溫服或入薄荷同煎

瀉青丸　治風凝發搐痰熱

龍膽草焙　梔子仁　大黃煨

羌活　防風各壹錢　川芎壹錢半

右為末煉蜜丸梧子大每一丸煎竹葉泡薄荷湯調下錢氏有當歸

錢氏鎮肝丸　治小兒急驚風目直上視抽搐昏亂不省人事是肝經風熱也此方瀉青之變

天竹黃研　生地黃　當歸

竹葉　草龍膽　川芎

大黃煨　羌活　防風各貳錢半

右為細末煉蜜丸如雞頭大每服二丸沙糖水化下先服此後服天麻散

凡欲下之須審問前人已下未下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但駈風化痰消熱而已大約痰熱十分且泄其三之二下劑中須用枳殼菖蒲寬心通氣之類佐之急驚急在一時治不可緩緩則候加深若一時體認不明又不可妄施藥餌　急驚既已傳截風定搐次第風驚已定而痰熱下劑有三初且輕下又稍重下又加重下之劑下後和胃助氣

而後兗志寧神驅風鎮驚防其再發若下後諸證猶
存未易痊愈更勿再下當作慢驚推詳

急驚輕下法

防風湯 治風熱痰壅大便不通
防風 羌活 枳實麩炒各半
川芎 甘草炙 大黄煨各貳錢半
剉末每服三字薑棗煎
小柴胡湯加枳殼防風最利風熱解血熱多用幾劑
巴硝重劑一方加大黄少許

宣風散 疎導風熱驚風痰熱四證俱備者極效
雞心檳榔貳箇 甘草 橘紅各半兩
黑牽牛取末貳兩半生半炒
右爲末每服半錢蜜湯調下

定命丹 治急驚天吊撮口通利痰熱
全蠍七箇 天麻 南星炮
白附子各貳錢半 朱砂 青黛各壹錢半
輕粉 麝香各半錢 龍腦壹字
右爲末粟米糊丸菉豆大每一丸荆芥薄荷湯調
下先研半丸吹入鼻中

疎風散 治驚風痰熱四證俱減

檳榔 陳皮去白各錢 牽牛
大黄略煨各炙錢
右爲末每服半錢生蜜湯調下演山加朴硝一錢
保嬰方大黄黑牽牛白牽牛二味各半生半熟檳
榔各半兩細末蜜湯調痰多加輕粉

演山治四證已作入候未甚截風丹
全蠍去毒十五箇 殭蠶 白附子炮
南星炮 天麻 朱砂壹錢
赤足蜈蚣酒炙 麝香
右爲末煉蜜丸梧子大每服三丸金銀薄荷湯化
下

定搐散 治急驚四證入候併作
天麻 白附炮 南星炮各半兩
蠍梢炒 白花蛇頭酒炙各貳錢半
朱砂 雄黄 乳香各壹錢
代赭石壹兩米醋淬煅七次 赤脚蜈蚣壹條酒炙
龍腦 麝香各壹字
右爲細末每服半錢金銀薄荷湯下煉蜜丸調亦
佳

牛黄清心丸 治四證入候去風痰散驚熱

南星　半夏　白附
川烏各炮去皮臍　川鬱金半兩
右五味爲末用臘月黃牛膽兩三枚取汁和藥
入膽中札懸當風處一月乾取出入添馬牙硝朱
砂雄黃硼砂各壹錢腦麝少許如臍樂同兩硝砂
四味各壹錢稀麪糊丸麻子大金銀薄荷湯下一
歲十九二歲倍之
鄭氏比金丸　治急驚壯熱喘嗽痰嗽大小便不利
輕粉　滑石各壹錢　南星壹錢
青黛半錢

爲末稀糊丸小豆大一歲二丸薄荷湯調下急驚
頭熱足冷口噤面青痰嗽加一丸桃皮湯下名桃
符丸疎流蘊積涎熱瘡疹餘毒宜服又去青黛加
蝎梢半錢名小青丸同治
利驚丸　急驚痰熱潮搐
輕粉　青黛各壹錢　牽牛末半兩
天竹黃貳錢
右爲末糊丸或煉蜜丸小豆大薄荷湯化下
太白散　急驚搐搦涎盛
粉霜貳錢　輕粉　白牽牛炒各壹錢

右爲末每服一字薄荷湯調吐痰効
防風丸　治驚風痰熱神昏驚悸
天麻　防風　人參
川芎各壹兩　全蝎　甘草
殭蠶　朱砂　雄黃
牛膽南星各貳錢伍分
右爲末蜜丸雞頭大每一丸薄荷湯下
保嬰方全蝎散　治急慢驚風發搐服之神効二急慢
加減方法在內製法更佳
全蝎貳拾肆箇新薄荷葉包以竹夾住於慢火上炙數次或乾薄荷葉濕浸開包炙亦可

殭蠶半兩炒去絲嘴用薄荷依法炙
南星壹兩取末以生薑壹兩切片新薄荷葉貳兩同搗和將作餅曬乾
如急驚不用南星加大黃壹兩煨若慢驚不用
大黃加製南星
白附子炮叁錢　防風去蘆叉　天麻
甘草炙　硃砂水飛　川芎各半兩
右爲末一歲兒服一字二三歲兒服半錢薄荷湯調
下量大小歲數加減身熱發搐煎後火府散調慢
驚吐瀉後發搐生薑湯調急驚搐煎火府散加大
黃湯調

火府散　治赤眼牙發熱脣口乾燥小便赤澀一切虛實邪熱並治

生地黃　木通各壹兩　黃芩

甘草炙各半兩

右㕮咀每服二錢水煎溫服無時

湯氏金星丸　治急驚壯熱痰涎大便不通

鬱金末　雄黃各一錢半　膩粉半錢

巴豆去油取霜

右為末醋糊丸黍米大一歲二丸薄荷湯下

茅先生朱砂膏　治驚熱驚積

朱砂半兩　硼砂　馬牙硝各叁錢

真珠壹錢　玄明粉貳錢　龍腦

麝香各壹字

各研拌久白成膏如諸驚眞以大金銀薄荷湯化潮熱甘草湯狂躁惡叫生地黃自然汁月內兒調塗乳頭令吮

大黑龍丸　治小兒急慢驚風神效

膽星　礞石焰硝煅各　天竺黃

青黛各半兩　蘆薈半兩貳錢　辰砂

蜈蚣燒灰壹　殭蠶伍分

右為末甘草汁為丸如雞頭大每服一丸或二丸蔥蜜薄荷湯下如慢驚用桔梗白木湯下即愈

小黑龍丸　治小兒急驚輕者

青礞石焰硝煅壹兩　青黛壹錢　蘆薈壹錢

膽星壹兩

右為極細末甘草湯為丸如雞頭大每一丸蔥蜜薄荷湯下

右二方礞石膽星治痰之劑為君痰多者宜之

急驚重下法

謝氏奪命丹　治急驚不省人事眼定不動牙關不開唇白并黑者

南星　半夏各肆錢為末並以生薑汁作餅子曬乾

真珠新白者貳錢　巴豆去油取霜錢　朱砂肆錢

金箔　銀箔各十片　輕粉

麝香各半錢

右各為末和勻飛羅麵打糊為丸如黍米大每歲兒一丸燈心湯下

比金丸　治小兒風熱丹毒急慢驚

前奪命丹中減去金銀箔加真珠鬱金末各一錢丸如上法

利驚丸

前兒金丸中去鐵粉加膩粉半錢白頸蚯蚓壹條

用刀截斷首尾兩頭彈跳者用之去土研二錢丸

服如上法

按此二方導痰藥也可隨證加減法

演山青金丸　治驚風久嗽咽喉痰涎壅盛

巴霜壹字　滑石二錢　南星半兩

輕粉二錢　滑石　全蠍各壹錢

右爲末稀糊丸如麻子大一歲五丸二歲七丸大

小加減薄荷茶清下以通爲度一方加白附子

眞珠天麻丸　治驚風痰熱壅盛及弔腸鎖肚撮口

絶效

南星炮　天麻　白附子炮各壹錢

膩粉半錢　巴霜壹字　蕪荑炒

全蠍麪炒　滑石各壹錢半

右爲末糊丸粟米大一歲五七丸二歲十丸大小

加減薄荷湯點茶清送下

鄭氏驅風膏　肝風筋脈拘急面紅目青眼上驚搐

及胎風

辰砂　蝎尾　當歸

龍膽草　川芎　山梔仁

大黄　羌活　防風

甘草各壹錢

右爲末入麝香壹字煉沙糖丸雞頭大三歲三丸

薄荷竹葉蜜湯化下

睡安散　治急慢驚風潮搐不得安睡

辰砂水飛　乳香　血竭各壹錢細研

麝香半錢研　人參　酸棗仁二錢

南星炮　白附炮各二字　全蠍貳拾枚

蜈蚣酒浸炙黃一條

右爲末壹歲壹字薄荷汁好酒煎沸調下得睡効

蛇頭丸　治急慢驚風涎搐搦來去不問陰陽二候

蛇頭壹箇炙　赤足蜈蚣參條　朱砂參錢

鉛白霜　輕粉各半錢　龍腦

麝香各壹錢　鐵液粉　百草霜各半兩

蛇含石醋淬壹兩　一方加全蠍壹分

右爲末米糊丸雞頭大三歲半丸薄荷湯磨下一

方慢驚加附子半兩去皮尖血竭壹分

直指天麻丸　利驚下痰吊腸鎖肚撮口可通用

南星炮　白附炮　馬牙硝

天麻　川芎　全蝎炒各壹錢
輕粉半錢　巴霜壹字
右為末稀糊丸麻子大每一丸薄荷湯送
下
右直下之劑惟壯實不閉而氣充實脉沉而有力
者宜之又閻氏所謂假搐勞定下其痰熱之類是
已
利驚後調胃助氣定志寧神防作慢驚
直指銀白散　助胃驅風臨時作慢驚候者通用
蓮肉　扁豆炒　白茯苓各壹分
人參　天麻　白附子炮
全蝎炒　木香　甘草炙
藿香半分　陳米炒香各壹錢　一方加白朮壹分
右為末每一錢薑錢一片入冬瓜子仁七粒同煎
或陳米調下
醒脾散大醒脾散王氏惺惺散皆和胃助氣可通用
三方見慢驚
定志丸　治驚風已退神志未定以此調之御院方
乳香
琥珀　茯神　遠志肉薑製
人參　白附子炮　天麻
天門冬去心　甘草炙　酸棗仁炒
右為末煉蜜丸皂子大朱砂為衣每服一丸燈心
薄荷湯調下
溫膽湯　治驚悸煩擾
製半夏　枳實炒　酸棗仁湯泡去殼各壹錢半
白茯苓半兩　陳皮去白　甘草炙各五錢半
右判散每服一錢入竹茹少許薑棗煎
加味地黃丸
地黃焙兩　山藥　山茱萸各肆兩
澤瀉　牡丹皮　茯苓各叁兩
羌活　防風各貳兩
右為末煉蜜丸如桐子大量兒大小加減
治五癇丸治急驚風生蚯蚓一條研爛入五福化毒
丹一丸再研如泥煎薄荷湯少許調化旋灌量兒
大小加減服之
五福化毒丹　治驚熱涼心膈
生地黃　熟地黃焙各五兩　天門冬
麥門冬去心焙各叁兩　甜硝　玄參
甘草炙各貳兩　青黛壹兩

右上六味爲細末後研入麝，煉蜜丸如雞頭大。每服半丸或一丸，食後熟水化下。

安神丸 治小兒驚悸，煩渴心悶，脈實面紅，頰赤口燥。

麥門冬　馬牙硝　白茯苓

山藥　寒水石（研）　朱砂（各一兩）

甘草（各一兩）　龍腦（一字）

右爲末，煉蜜丸如雞頭大。每服半丸，沙糖水下。

右四方甘寒瀉火之劑，爲君。小兒血氣虛而心驚者宜之。又潔古閻氏所謂候搐止，勢減，宜安神鎮心之類是也。

曾氏方

五苓散 解傷寒溫濕，若吐若亂，分陰陽，理煩渴。

澤瀉（去蘆 二兩半）　白茯苓（去皮）　豬苓（去皮）

白朮　肉桂（去粗皮）

右碎，入桂同研爲末。每服一錢，溫湯調下，不拘時。若作㕮咀，用赤茯苓分兩同前。每服二錢，水一盞，煎七分，溫服。

百解散 主和解百病，虛慢陰證不宜。

乾葛（二兩半）　升麻　赤芍藥（各一兩）

黃芩　麻黃（去節 二兩半）　薄桂（去粗皮 一錢半）

甘草（半兩）

右碎，每服二錢，水一盞，薑二片，葱一根，煎七分，無時溫服。有風熱盛，加薄荷同煎。

木通散 主上膈熱，小腑閉，煩躁生嗔，及淋澀諸瘡丹毒。

木通（去節）　地萹蓄（各一兩）　大黃

甘草　赤茯苓（去皮 各半兩）　瞿麥（去根）

滑石（末）　山梔仁　車前子

黃芩（各二錢半）

右件㕮咀，每服二錢，水一盞，燈心三莖，煎七分，無時溫服。或入薄荷同煎。

三解散 主上焦蘊熱，傷風，面紅目赤，狂躁，氣急渴，水驚啼煩悶，丹毒，口瘡，痰嗽，搐掣。

人參（去蘆）　防風（去蘆）　天麻

茯神（去皮木根）　鬱金（無以山梔仁代）　白附子

大黃（各二錢）　赤芍藥　黃芩

殭蠶（各一錢伍）　全蠍（十五尾 去毒）　枳殼（水浸潤去穰 麩炒）

（炒微黃 貳錢）　粉草（陸錢）

右碎焙爲末，每服半錢至一錢，用溫薄荷湯無時

調下或服瀉心湯

牛蒡湯 主傷風發熱煩躁鼻塞氣喘痰嗽驚啼及諸瘡赤紫丹毒咽喉腫痛

牛蒡子(炒二兩) 大黃(煨) 防風(去蘆)

薄荷(各去老梗) 荊芥(…) 甘草(各壹…)

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

防風湯 治急驚後餘熱未退時復手足搐掣心悸不寧及風邪中入肝經兩目視人開眨不常

防風(去蘆) 川芎 大黃

白芷 黃芩 甘草(各等分)

細辛(去葉貳錢) 薄荷葉(貳錢)

右件剉焙爲末每服一錢用溫湯無時調服

半夏丸 治痰證神効若驚搐後風涎潮作服之神効

半夏(貳兩生用) 赤茯苓(去皮) 枳殼(麩炒各壹兩)

風化朴硝(貳錢半)

右前三味爲末入乳缽同朴硝杵勻用生薑自然汁煮糯米粉爲丸菉豆大每服二十丸至五十丸仍以淡薑湯食後臨睡送下兒小者丸如粟穀大

水晶丹(方見癖積)

寬氣飲 主通利關節除胸膈痞結消痰逐水進美飲食及治驚氣成搐搦發急慢驚風氣逆不和精神昏倦

枳殼(…) 枳實(…) 人參(去蘆)

甘草(炙…)

右剉焙爲末每服半錢至一錢用湯無時調服驚熱發搐用薑汁葱湯同調熱極者入寬熱飲薄荷蜜湯調下或麥門冬湯

五和湯 主宣利臟腑積熱調和榮衛

當歸(酒洗) 赤茯苓(去皮各半兩) 甘草(炙)

大黃 枳殼(水浸潤去瓤麩炒微黃各半錢半)

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服

寬熱飲(方見驚熱)

茯神湯 治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩生下羸瘦多驚宜子母同服自然有効

茯神(去皮木…兩) 人參(去蘆) 當歸(酒洗各半兩)

甘草(炙…)

右件㕮咀每服二錢水一盞煎七分無時溫服有微熱煩躁入麥門冬去心同煎

鎮驚丸 主急慢二驚風痰上壅手足抽掣口眼喎

斜煩躁生嗔啼叫驚惕不思常服寧心鎮驚疏風順氣

人參（去蘆各貳錢） 粉草（炙） 茯神（去皮木根）

殭蠶（去絲） 枳殼（麩炒去穰） 白附子

南星（炮） 白茯苓（去皮） 鵬砂

牙硝 朱砂（水飛各錢） 全蝎（去尾毒）

麝香（壹字）

右除牙硝鵬砂麝香朱砂四味用乳鉢細研餘九味焙為末入乳鉢內和勻前四味用糯米粉水煮清糊為丸梧桐子大就帶潤以銀硃為衣每服三丸至五丸或七丸急驚用溫茶清磨化服慢驚以

生薑熟附子煎湯研化溫服薄荷湯化下或麥門冬湯

截驚丸 治驚風搐搦煩躁有熱兩目上視口禁牙關

龍膽草（去蘆） 防風（去蘆） 青黛

鉤藤（和鉤） 黃連（淨） 牛黃

甘草 硃砂（水飛各伍錢） 薄荷葉（各貳錢）

麝香（半錢）

右除牛黃麝香外餘八味剉炒為末仍同前二味乳鉢內杵勻煉蜜丸如芡實大每服一丸至二丸

溫湯化服或茶清

硃砂膏 主五心煩熱聲痰壅盛驚風搐搦渴飲無時睡中不寧見人煩躁口瘡咽爛

硃砂（水飛伍錢） 馬牙硝 鵬砂

玄明粉（各貳錢半） 麝香（壹字） 金箔

銀箔（各伍片） 白附子 枳殼（麩炒各壹錢）

川芎 粉草（各肆錢） 人參（去蘆）

黃芩 薄荷葉（各貳錢）

右前七味入乳鉢細研後七味剉焙為末仍入鉢中同前藥和勻煉蜜丸芡實大每服一丸至二丸

用麥門冬熟水無時化服

不驚丹 治因驚氣而吐逆作搐痰涎壅塞手足掣縮目睛斜視常服疏風順氣自不作驚和脾胃進飲食

枳殼（去穰麩炒微黃壹兩） 淡豆豉（焙乾） 南星

茯神（去皮根木各半兩） 蝎稍（去尾去火毒） 淨蕪荑（貳錢半先入乳鉢內細研）

右除蕪荑外餘五味焙為末再同蕪荑乳鉢內杵勻醋煮糯米粉糊為丸周歲內嬰孩粟穀大每服三十丸至五十丸乳汁下三歲以上者麻仁大每

服五十丸及六十丸溫米清湯下候一時得吃乳
食

薛氏方

四物湯（方見二卷九十）　四君子湯

六味丸（方見腎 地黃丸）　瀉白散（方見[illegible]）

柴胡清脾散　梔子清肝散（方見[illegible]熱）

參朮柴苓湯　治肝經風熱脾土受尅其證善怒睡
中抽搐遍身作癢飲食少思

人參　白朮　茯苓

陳皮各壹錢　柴胡　升麻各柒分

山梔炒黑分　鈎藤鈎壹錢　甘草炒伍分

右每服一二錢薑棗水煎

安神鎮驚丸　驚退後調理安心神養氣血和平預
防之劑也

天竺黃另研　人參　茯神

南星薑製各伍錢　酸棗仁炒　麥門冬

當歸酒洗　生地黃酒洗　赤芍藥炒各參錢

薄荷　木通　黃連薑汁炒

山梔炒　辰砂另研　牛黃另研

龍骨煅各貳錢　青黛壹錢另研

右爲末蜜丸菉豆大每服三五丸量兒大小加減
淡薑湯送下

慢驚　慢驚之候或吐或瀉涎鳴微喘眼開神緩睡則
露睛驚跳搐搦乍發乍靜或身熱或身冷或四肢熱
或口鼻冷氣面色淡白淡黃或青或青赤其脉沉
遲散緩蓋由急驚過用寒涼或轉太驟傳變成之又
有吐利不止而成者有氣虛暴吐瀉而成者有夏月
脾胃伏熱大吐瀉當解暑熱不可專曰固陽有藏虛
洞泄成者有久痢氣脫而成者有下積取瀉成者有
吐血瀉血而成者有傷寒傳變陰證成者有得之久
嗽作癇者有得之發癇不已者有得之蟲積衝心者
有得之卵腫疝氣腹痛其或汗出太過脾困煩渴四
肢浮腫大小便閉走馬急疳並傳慢候惟吐瀉積痢
成虛致之則證變甚速凡繼經吐瀉便是慢驚須用
溫中扶裏或搐來緊急乃慢驚初傳尚有陽證不可
誤作急驚用藥世言搐慢爲慢驚非也若泥此往往
指慢脾爲慢驚矣凡慢驚男子以瀉得之爲重女子
以吐得之爲重又吐有五證瀉有五證各明所因主
治古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如因泄
瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚如因他證

例當循原施治也其慢驚候若從急驚傳來只可截風調胃均平陰陽不可全用陽藥使陽歸陽復作急驚之候用藥施治無過不及可也　急驚以關格不通略施腦麝開通定其搐搦尚可慢驚陰重陽虧諸經已虛不宜通關又涼其臟易作慢脾風慢驚危急如眼睛昏定定而眨雖眨不左右顧或竄視四肢厥冷汗出如流口面黯黮指甲黑四體垂軃至重慢驚證眼半開半合似睡不睡是也其脉或浮或沉身或熱或涼或吐或瀉或不吐瀉或食乳或阻乳名半陰半陽合病即如傷寒半表半裏也　治法大要審問

源流施治不可槩曰慢驚證如因吐瀉得之用湯氏醒脾散之類他證可以類推次第於後然慢驚已傳屬陰亦須準較陰陽虧盛淺深不可溫燥之劑太過

錢慢驚因大病後或吐瀉或只吐不瀉變成脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時瘈瘲昏睡露睛此無陽也宜栝蔞湯主之　東都王氏子吐瀉諸醫用藥下之至虛變慢驚其候昏睡露睛手足瘈瘲而身冷錢曰此慢驚也與栝蔞湯其子胃氣實即開目而身溫王疑其子不大小便令諸醫以藥利之醫留八正散等數服不利而身復冷令錢氏利小便錢曰不當利小便利之必身冷一二日果身冷矣因抱出錢曰不能食而胃中虛若利大小便則脾胃俱虛當身冷而閉目即死今幸胎氣實而難衰也錢氏用益黃散史君子丸四服令微能飲食至日午果能飲食所以然者利大小便脾胃虛寒當補脾不可別攻也後又不語諸醫作失音治之錢曰既失音何開目而能飲食又牙不緊而口不噤也諸醫不能曉以地黃補腎錢曰此因用涼藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎尚虛故補腎必安治之半月而能言一月而痊

梁慢驚者陰證俱稟受病益小兒吐瀉病久脾胃虛損若不早治則成慢驚名曰瘓瘲似搐而不甚搐也因脾胃虛損故大便不聚當去脾間風先用宣風散導之後用益黃散史君子丸平之則其利自止既已失治則脾胃俱虛致被肝木所乘是爲慢驚當用溫補羌活膏主之　玨閻孝忠編集錢氏方以益黃補土誤矣其藥有丁香辛熱助火火旺土愈虛矣青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子今脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關脉洪大掌中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腹痛瀉痢青

白益黃散中藥也今立一方先瀉火補金大補其土是爲脾治之法以黃芪二錢人參一錢炙甘草五分加白芍藥一錢此四味皆甘溫能補元氣甘能瀉火内經云熱淫於内以甘瀉之以酸收之白芍藥酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金所補得金土之位金旺火虛風木何由而來尅土然後瀉風之邪夫益黃散理中丸養神之類皆治脾胃寒濕大盛神品之藥也若得脾胃中伏火勞役不足之證及服熱藥巴豆之類胃虛而成慢驚之證用之必傷人命夫慢驚風者皆由久瀉脾胃虛而生也錢氏以羌活膏療慢驚風誤矣脾虛者由火邪乘其土位故曰從後來者爲虛邪火旺能實其木木旺故來尅土當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒更於脾土中補金以酸涼致脾土中金旺火衰風木自虛矣　滿驚啼手足瘈瘲睡卧不穩四君子加全蝎去尾尖毒炒釣藤白附子炒等分同煎　脾胃虛弱生風多困四君子加炒半夏麵沒石子等分爲細末入冬瓜子少許同煎服　因頻吐瀉將成慢驚用錢氏白术散加山藥扁豆炒肉豆蔻麵煨各一錢入薑壹片煎服若慢驚已作加細辛天麻各八錢全蝎三箇

去稍白附子八分麪煨熟而瀉用參芪芍藥酒炒白术薑煎又用加黃連甘草竹葉服之　嘗治慢驚者考之古書亦無所據惟載陰癇而已蓋慢驚屬陰陰主靜而搐緩故曰慢其候皆因外感風寒内作吐瀉或得於大病之餘或傳誤轉之後目慢神昏手足偏動口角流涎身微溫眼上視或斜轉及兩手握拳而搐或兼兩足動掣各辨男左女右搐者爲順反此爲逆口氣冷緩或顖門陷此虛極也脉沉無力睡則揚睛謂兩目半開半合此眞陽衰耗而陰邪獨盛陰盛生寒寒爲水化水生肝木木爲風化木尅脾土胃爲脾之府故胃中有風瘈瘲漸生其瘈瘲證狀兩肩微聳兩手垂下時復動搖不已名爲慢驚宜以青州白丸子蘇合香丸入薑汁杵匀米飲調下虛極者加金液丹次用沖和飲同七寶散水煨薑煎服使氣順風散少解吐瀉間以胃苓湯救其表裏若吐不止可投定吐飲瀉不減宜服六柱散或曰生湯去胃風定瘈瘲濟神氣五苓散辯其逆調榮衛和陰陽若痰多脣白四肢如氷不省人事此虛慢之極用固眞湯速灌之以生胃氣胃氣既回投醒脾散沉香飲調理　辯

慢驚之證吐瀉痰鳴氣喘眼開神緩昏睡露睛驚跳

搐搦乍發乍靜或身熱身冷面淡青白或眉唇青赤其脈遲沉而緩是也原賦不足或久病脾虛及常服尅伐之藥者多致此證若因土虛不能生金金不能平木木來侮土而致前證者以五味異功散加當歸酸棗仁佐以鈎藤飲子補土平木若脾土虛寒者用六君子加炮薑木香不應急加附子以回陽氣蓋陰血生於脾土宜四君子當歸酸棗仁凡元氣虧損而至昏憒者急灸百會穴若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣

慢脾風慢脾風之候面青額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不收或身冷身溫而四肢冷其脈沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若治驚則無驚可治但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯而已然慢脾之名又曰虛風小兒或吐或瀉之後面色虛黃因虛發熱纔見搖頭斜視昏困額汗身亦粘汗聲沉小而焦即脾風之證不必皆因急慢風傳次而至又當識之又慢脾之候音啞而不言胃何也蓋胃為脾腑陽非若脾乃陰臟也故小兒病傳在

腑多自愈在臟不可不治蓋小兒純陽之氣在腑為順在臟為逆古人所理其臟不言治腑也又腎一臟常主虛不可攻治者腎臟有患但清心肺緣心與腎即既濟也肺與腎又子母也無與腎藥及諸補藥也慢脾惟吐與瀉積與痢傳入慢候其證變至速虛又速也治必須太平和無令速愈之理藥和且平調脾養胃不可過劑也錢氏有黃土湯以土勝水木得其平則風自止以脾土為本也　治法大要生胃回陽若眼半開半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽或已入慢脾而陽氣未甚脫者亦未可即用硫黃附子等劑手足漸煖仍以醒脾散等調之

曾氏用青金丹天麻飲灌服或六柱散固真湯

錢氏方

瓜蔞湯

瓜蔞貳錢　白甘遂木壹錢

右同於慢火上炒焦黃研勻每服　字麝香薄荷湯調服

右瓜蔞湯錢氏治慢驚沃脈有力者宜用蓋濕痰積於胸中使風火不得開發而身冷故用瓜蔞湯助去濕痰使風火得伸而身溫搐止若脈無力者

不宜用之候當補脾及溫白丸羗活膏之類

青州白丸子 治小兒驚風大人諸風

半夏（生用柒兩） 南星（生叁兩） 白附子（生貳兩）

川烏（生半兩去皮臍）

右為末以生絹袋盛井花水擺出如未出者更以手揉出如有滓更研再入絹袋擺盡為度於磁盆中日曬夜露至曉撇去舊水別用井花水攪又曬至來日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水曬乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸菉豆大每服三五丸薄荷湯下癱風酒下並無時

異功散 溫中和氣治吐瀉不思食（方見吐瀉）

溫白丸 治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病成慢驚搐瘲

天麻（生半兩） 白殭蠶（炒） 白附子（生）

天南星（剉湯洗焙各壹兩） 乾蝎（去毒壹錢）

右為末湯浸寒食麪為丸如菉豆大仍於寒食麪中養七日取出川每服五七丸至二三十丸空心生薑米飲下量病勢漸加丸數服之（寒食麪謂寒食日煮熟麪取之以焙[illegible]）

鈎藤飲子 治吐利脾胃氣弱虛風慢驚

鈎藤（半兩剉炒） 蟬殼 防風（去蘆）

人參（去蘆） 麻黃（去節） 白殭蠶（炒黃）

天麻 蝎尾（炒去毒各半兩） 甘草（炙）

川芎（各貳錢伍分） 麝香（壹錢另研） 一方有蜣螂叁箇去頭足炙黃

右為末每服二錢水一盞薑三片煎至六分溫服量多少與之寒多者加附子末半錢服無時

羗活膏 治脾胃虛或吐瀉後為慢驚者亦治傷寒無不効

防風（去蘆） 川芎 人參（去蘆）

白附子（炮） 赤茯苓（去皮各半兩） 天麻（壹兩）

白殭蠶（湯浸炒黃） 乾蝎（炒去毒） 白花蛇（酒浸焙各壹分）

川附子（炮去皮臍） 麻黃（去節各壹錢） 肉豆蔻

沉香 母丁香 藿香葉

木香（各貳錢） 輕粉 真珠末

牛黃（各壹錢伍分） 龍腦（半字） 麝香

辰砂 雄黃（各壹錢已上並各另研） 羗活（半兩）

右為細末煉蜜作劑旋丸如豆大每服一二丸食前服或薄荷湯或麥門冬湯化下實熱急驚勿服

性溫故也

海藏返魂丹 治小兒諸癇瘛瘲發搐目睛相引項背強直牙關緊急目睛上視及諸病久虛變生虛風多睡者因在前不解速宜服之

烏蛇 酒浸去皮骨　水銀　天麻 酒洗焙乾

檳榔 各半兩　殭蠶 去絲嘴微炒　硫黃 入水銀研末結砂

磁石 盆內慢炒火要看緊擲入醋淬　白附子 炮

川烏 炒去皮臍

獨活 去蘆　乾蠍 炙　萆薢 各壹兩

肉桂 去皮　當歸 酒浸焙　細辛 根

防風 去蘆　天南星 薑汁浸炒黃　阿膠 炒

藿香 去土　烏蛇 酒浸去皮骨炙　羌活

沉香　槐膠　麻黃 去節根

白花蛇 酒浸一宿去皮骨炙　羚羊角 鎊　陳皮 去白各壹兩

半夏 薑汁浸一宿炒　木香　人參 去蘆

天竺黃 研　茯苓 去皮　荊芥 去白

乾薑 炮　敗龜板 醋炙　蒼朮 去皮

晚蠶沙 微炒　白芷　何首烏 米泔浸

桑螵蛸 炒　砂仁　白朮

虎骨 酒炙

枳殼 麩炒　丁香　厚朴 去皮

蟬殼 炒　川芎　附子 去皮尖

石斛 去根　肉豆蔻 去殼微炒　龍腦 另研

雄黃 研水飛　硃砂 各研水飛　膩粉 另研

麝香 另研各壹錢　烏雞 嘴翅足去　狐肝 臘月內入

金箔 為衣

右藥五十八味炮製如法煉蜜合和搗三五千下丸如桐子大金箔為衣每一歲兒溫薄荷自然汁化下無時

右錢氏宗錢氏治慢驚法脈無力者宜之其法以青州白丸子兼異功散羌活膏溫白丸釣藤飲子之類服之至有往往死中得生者

鄭氏法

凡吐瀉成虛風慢脾先用奪命散青州白丸子末煎如稀糊入蜜調掃下涎後服祛風醒脾等藥

奪命散 方見慢驚門

治虛風八仙散風搐者服之

白天麻　白附子　花蛇肉

防風　南星　半夏

冬瓜子　全蠍 各等分　加川烏

右㕮咀每服一錢水半盞薑二片棗半枚煎三分熟服加薄荷尤佳

醒脾散　昏困者服之

白朮　人參　甘草

橘紅　茯苓　全蝎各半兩

半夏　木香炒各壹錢　白附子二箇炮

南星炮一兩　陳倉米貳伯粒一方無白朮半兩又加車前子二錢亦同

右為末每服一錢水半盞薑二片棗半箇煎三分漸漸服之不可頓服頓服必吐

[illegible]乳方

人參　木香　藿香

沉香　橘皮　神麴

麥芽各等分　丁香減半

右㕮咀每服四錢水一椀薑十片紫蘇十葉棗三枚煎至半椀乳母食後須先捏去乳汁盡方取服之即仰臥霎時令藥入乳之絡次令兒吮數口不可過飽此良法也如搐定一日後急宜截風服八仙散兩日後宜醒脾散如前件藥俱用不效危困可灸須診太衝脉未絕者當灸百會一穴前後髮際兩耳尖折中乃是穴也方書所載但云頂上旋毛中殊不審有雙頂者又有旋毛不正者用醫之者審循循不悞人多矣灸後仍當控涎用青州白丸子末研煎如稀糊入煉蜜調奪命散良久涎下細研靈砂米飲調旋抹口中漸看退證如風搐服八仙散昏困服醒脾散常令減乳乳母服釀乳藥如此調理無不愈者間有稟受不堅五行數短者雖神聖工巧不能奪其造化矣　若涎已離胸但在喉中如鋸藥不能入又不可控當用別法撩之兼搐鼻噴嚏得出次服奪命散庶免再作

撩痰方

川烏尖　白附尖各柒箇去皮生用

蝎梢柒枚　石綠少許

右為末一處和勻用軟雞翎蘸藥入喉中遂漸抽出頻用帕子拭之

右湯氏治慢驚法先用奪命散白丸子控涎候涎下一回用八仙醒脾各一回令乳母用釀乳法如危極者却灸百會及撩痰法但奪命用礞石氣虛者難用必與東垣益黃散相兼服之可也

陳氏法

治慢驚風先服[illegible]蝎散用下法并用川[illegible]痰冷涎自不

痰呆次服油珠膏後服益黄湯溫壯元氣將服前朴
散寛上實下
芎蠍散　治小兒癎癥受風顖顱開解皮肉筋脉急
服腦骨縫百筋起色少血色或腹中氣響時便青
白色沫或嘔吐痰涎欲成慢驚搐足腿冷者
川芎　蓽撥各壹兩　細辛
半夏湯浸七次焙各二錢　蠍梢去毒壹錢
右細末一週兒抄一銅錢用數沸湯調稍熱微服
如痰滿胸喉中眼珠斜視速與服若目上直視不
轉睛者難救或痰氣壅塞不能嚥藥用一指於兒

喉腭中探入就斡去痰涎氣稍得通次用補脾
益黄湯或以油珠膏選用此方累世活人多矣
油珠膏　治氣逆嘔吐風痰作搐
石亮脂飛研如粉　滑石各半兩
黑附子炮去皮臍　半夏湯浸一宿洗七次焙乾
南星臘浸一宿湯洗七次焙乾各二錢
右細末每服一錢用冷清蒸汁半盞滴麻油一點
如錢抄藥在油珠上須臾墜下却去蒸汁與兒服
之更用清蒸汁二三五口嚥下北微服服訖後一時
方與乳食

補脾益黄湯　治胎弱吐乳便清而成陰癎氣逆涎
潮眼珠直視四肢抽掣或因變蒸客忤及受驚誤
服涼藥所作
木香　當歸　人參
黄耆　丁香　訶子
陳皮　厚朴薑製　甘草炙
肉荳蔻麪裹煨　草菓　茯苓
白朮　桂枝　半夏湯泡
附子炮各二兩　全蠍炒每服加壹枚入
右㕮咀每服三錢水一盞半薑一片棗一枚煎六

分稍熱微服服訖令揉心腹以助藥力候一時方
與乳食　渴者加茯苓人參甘草去附子丁香肉
蔻　瀉者加丁香訶子肉　嘔吐加丁香半夏陳
皮　腹痛者加厚朴良薑　咳嗽加前胡五味子
去附子官桂草菓肉蔻　足冷加附子丁香厚朴
惡風自汗加黄耆官桂　痰喘加前胡枳實赤
茯苓去附子丁香肉蔻草菓　氣逆不下加前胡
枳殻檳榔去當歸附子肉蔻　腹脹加厚朴丁香
前胡枳殻
前朴散　治心腹結氣或嘔逆吐瀉腹脹痛驚悸

前胡　白术　人參
陳皮　良薑　藿香
甘草　厚朴各等分
右剉每服三錢水一盞煎七分稍熱空心服
小兒誤服涼藥或用冷藥水漱口因此傷動脾胃或
泄瀉或腹脹或腹中響　小兒面少血色常無喜笑
不看上而覷下　小兒顖顱而急頭縫青筋時便青
糞　小兒肥壯糞如清涕或如凍汁　小兒時時扎
眼糞便青白珠有時乾硬　已上五證忽然嘔吐者
必成陰癇俗謂慢驚是也小兒頭雖熱眼珠青白而

足冷或腹脹而足冷或瀉而足冷或嘔而足冷或瀉
而足冷頭熱目赤鼻塞咽喉皆無根之火逆也　已上五證忽然吐而
作搐者名曰慢脾風速與補脾益真湯一服三錢重
加蠍一枚如因驚而搐者前朴散一服三錢重加附
子前胡各半錢同煎
右陳文忠治慢驚法其治之次第自成一家故另
錄之以備採用其醫案所言蠍散油珠膏累累
服効

曾氏方

中和飲　治感冒風寒或咳嗽發熱肩背拘急惡心嘔
吐腹痛膨脹兼寒濕相搏四肢拘急冷氣侵襲腰
足痛疼
蒼术米泔水浸一宿去麤皮剉片炒微黃色[illegible]　人參去蘆
前胡去蘆　桔梗炒各伍錢　枳殼去瓤麩炒微黃色
麻黃去節　陳皮去白各柒錢　川芎
白芷　半夏湯洗七次薑汁浸曬乾炒　白芍藥
當歸酒洗　薄桂去麤皮　厚朴[illegible]
赤茯苓去皮各壹錢半　乾薑慢火炒乾各貳錢　甘草炙柒錢半
右剉每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分無

時溫服傷冷惡心嘔吐煨薑同煎開胃進食加棗
子煎空心溫投寒疝痛入鹽炒茱萸茴香同煎
七寶散　治時氣傷風傷寒頭昏體熱咳嗽及脾胃
肺臟不和口中腥氣或常或牙縫微有鮮血兼調
理諸病後小溢得中以其品味不僭不燥爲佳
紫蘇去老梗　淨香附[illegible]　甘草
陳皮去白　桔梗[illegible]　川芎
白芷各壹兩
右㕮咀每服二錢水一盞薑一片煎七分無時溫
服痰嗽加製半夏口腥氣入鹽煎調理諸疾加棗

子煎

六柱散　治吐痢泄瀉門虚脾慢手足俱冷六脉沉
微

人參去蘆　白茯苓去皮　熟附子
南木香　肉豆蔻　白术六味各等分

右碎每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分不
拘時溫服

日生湯　治吐瀉痢後將傳慢驚慢脾神昏脉弱飲
食不進睡露揚睛手輕夜重急宜投服

北南星壹兩[illegible]
人參去蘆　冬瓜子仁各伍錢打碎

右件㕮咀每服二錢水一盞半薑三片慢火煎七
分候溫無時少與緩服投之急必吐

固眞湯　主吐瀉痢後胃虚脾慢四肢口鼻氣冷沉
困不省人事

人參去蘆　附子湯泡裂去皮臍　白茯苓去皮
白术各貳錢　山藥去皮[illegible]　黃耆蜜水炙
肉桂去皮伍分　甘草[illegible]各貳錢

右件㕮咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七
分空心溫服或無時

醒脾散　主醒脾養胃止吐痢進飲食及調理病後
神昏目慢合睡多困脉弱微有痰涎並宜投服

人參去蘆　白茯苓去皮　藿香葉
白术　甘草炙各伍錢　丁香不見火肆拾粒
大南星[illegible]　縮砂仁肆拾粒

右碎每服二錢水一大盞薑三片冬瓜子仁伍拾
粒搯碎慢火煎七分空心緩投服之急必吐

沉香飲　治吐痢後神昏倦怠飲食減少脾胃氣虚
水穀不化或噎時嘔丑心煩熱盜汗常出或聞食
心惡

沉香　丁香　南木香
藿香葉各貳錢半　陳皮去白　白术
半夏湯洗七遍[illegible]製　白茯苓去皮　肉豆蔻各伍錢
粉草炙叁錢

右除沉香丁香木香不過火餘七味或曬或焙仍
同三味研爲細末每服半錢至壹錢用紫蘇木瓜
煎湯空心調服棗湯亦好

天麻飲　治諸般風搐不省人事

天麻明亮者　川烏炮製去皮臍各柒錢

右剉每服一錢水二盞薑三片慢火煎若稀糊[illegible]

時勤與溫服

錢氏方

朮附湯　治風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風濕頭目眩重等證

白朮肆兩　甘草貳兩炙　附子炮去皮臍壹兩半

右為末入附子每服三錢薑五片棗一枚水煎服

愚按附子溫中回陽為慢脾之聖藥也如元氣未脫用之無有不應須用每隻重一兩二錢者端正不尖底平週圍如蓮花瓣者佳否則快用川烏也製法切去皮尖以童便浸之秋冬七日春夏五日每日一換浸畢切作四塊以濕草紙包數層微火煨半日取出切開無白星為度如急用炮至裂紋即投童便中良久浸透切片如色白再微炙之氣脫甚者急生用亦効

天乙保生丹　治慢驚尚有陽證者

全蠍去毒炒拾肆箇　白附子生用　真殭蠶

牛膽南星　殭蠶　琥珀

防風　朱砂各壹錢　麝香伍分

右為末米糊丸桐子大金箔為衣每服一二丸薄荷湯化下

聚寶丹　治慢驚

人參　茯苓　琥珀

天麻　真殭蠶　全蠍炙

防風　牛膽南星　白附子生用

烏蛇肉酒浸焙壹錢　朱砂半錢　麝香少許

右為末煉蜜丸桐子大每服一二丸菖蒲湯下

金箔鎮心丸　治風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇焦頰赤夜卧不安譫語狂妄

朱砂壹兩　白茯苓　人參

甘草各半兩　山藥壹兩半　片腦

牙硝各壹錢半　麝香伍分　金箔拾貳貼

草紫河車壹錢半用米泔煮

右為末煉蜜為丸每兩作五十丸以金箔為衣每服一丸薄荷湯化下含化亦得

天南星散　治慢驚驅風豁痰

南星重捌玖錢者壹箇地坑深尺許先用炭伍觔燒通紅以刻木臨一砂鑵坑中即投南星以火炭密蓋又用盆覆時許取出

右為末入琥珀全蠍各壹錢每服二字煎生薑防風湯下

烏沉湯　治慢驚驅風助胃

天麻一分　人參　川烏生用
全蠍去毒　南星炮半兩　木香
沉香各半兩　甘草炙半兩
右爲末每服三五分薑水煎服
沉香散　助胃氣止吐瀉
茯苓貳錢　沉香　丁香
木香　藿香　厚朴製
甘草炙各半錢
右爲末每服一字米飲湯調下
蘇青丸

蘇合香丸壹分　青州白丸子貳分
右和勻每服五分薑湯調下
銀白散　治胃虛吐瀉
糯米炒貳兩　扁豆蒸貳兩　藿香貳錢
白朮炒壹兩　丁香貳錢　甘草炙壹錢
右爲末紫蘇米飲調下直指方加炮白附子全蠍
木香石蓮薑水煎
鈎藤散　治吐利脾胃氣虛生風
鈎藤鈎貳錢　蟬殼　天麻
防風　蝎尾去毒　人參各半兩

麻黃　殭蠶炒　甘草炙
川芎各貳錢　麝香壹分
右爲末水煎服虛實加附子一錢
黑附子湯　治慢脾風四肢厥冷
附子參錢炮去皮　木香　人參各壹錢半
白附子壹錢　甘草炙半錢
右爲散每服三錢薑五片水煎若手足既溫即止
後服
生附四君子湯　治吐瀉不思乳食凡虛冷病先與
數服以正胃氣

人參　白朮　附子
木香　茯苓　橘紅
甘草各等分
右爲末每服五七分薑棗水煎服
辰砂膏　治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐者
黑附子一枚重壹兩以上者去皮臍頂上挖一竅入辰砂末壹錢仍用附子塞之炭火
燒存性　牛膽南星半兩　白附子炮
五靈脂　蝎梢各貳錢半
右爲末煉蜜丸桐子大每服一二三錢生薑汁泡湯
下

七寶辰砂丹　治風痰奇効慢驚慢脾以辰砂為主木香佐之用開元錢一箇背後上下有兩月片者放鐵匙上炭火內燒少頃成珠子取入盞中作一服用木香煎湯送下人參湯亦可

觀音全蝎散　治小兒外感風寒內傷脾胃致吐瀉不止遂成慢驚或慢脾

全蝎貳拾壹箇　天麻炮　防風去蘆
羌活貳錢半　川芎　甘草炙
藊豆薑製　黃耆蜜炙各叁錢　砂仁
赤茯苓各伍錢

右同為末每服壹錢用冬瓜仁煎湯不拘時調服

吉州醒脾散　治小兒慢驚神昏目慢多困有痰

人參　白朮　木香
白茯苓　白附子　天麻
全蝎炒　殭蠶去絲嘴炒各等分

右剉碎每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至五分不拘時服

雜方

(世)治慢驚神効用[illegible]粒丁香[illegible]箇蝎[illegible]辰砂壹點血已上俱為末男用男左手中指血女用女右手中指血調末擦[illegible]愈

(本)醒脾丸　治小兒慢脾風因吐利後虛困昏睡欲生風癇

厚朴　白朮　硫黃入豆腐中煮三五沸
天麻　全蝎　防風
官桂　人參各[illegible]

右為細末酒浸蒸餅和丸如雞頭大每一丸搥碎溫米飲下

蝎梢丸　治小兒胎虛氣弱吐利生風昏困嗜臥或潮搐

全蝎微炒　白附子煨裂各半兩　硫黃
半夏薑汁製焙乾各壹兩

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十丸荊芥湯下量兒大小加減服之

(世)治小兒慢驚風身冷瘛瘲方

天麻　防風　川烏
全蝎去翅足薄荷葉包炒　南星

右㕮咀等分水煎服

湯氏治慢驚方

真川烏[illegible]全蝎等分

右二件㕮咀分二服水二盞生薑十片煎半盞旋旋
滴入口中

【無】陰癇即慢驚風

黑附子(去皮臍生用)　南星(生)　半夏(各貳錢)

白附子(生壹錢)

右研細井水浸七日每日換水浸訖控乾入硃砂
貳錢麝香壹錢研勻每服壹字薄荷湯調下量兒
加減一方用黑附子生去皮臍爲末每服貳錢以
水壹盞半生薑貳片煎至半盞分二服量兒加減
吐者入丁香伍箇同煎空心服或水浸炊餅爲丸

如粟米每服貳拾丸生薑湯下亦可

【錢】回生散　治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風成
慢驚大南星重捌玖錢已上者用地坑子壹箇深
叁寸許用炭火五斤燒紅入好酒半盞在內然後
入南星却用炭火叁兩條蓋在地坑上候南星微
裂取出剉碎再炒勻熟不可稍生放冷爲末每服
半錢濃煎生薑防風湯調下

又方梓朴散

厚朴　半夏(湯洗七次薑汁浸半日曬乾壹錢)

右米泔三升同浸一百刻水盡爲度如百刻水未
盡少加火熬乾去厚朴只將半夏爲末每服五分
或一字薄荷湯調下無時

【直】黃芪散　治小兒慢驚多因藥性太溫及熱藥治之
有驚未退而別生熱證者有因病愈而致熱證者
有反爲急驚者甚多當問病幾日因何得之曾以
何藥療之可用解毒藥無不效宜此方

大黃　黃芪(炙)　甘草(炙各等分)　貫仲

板藍根

右爲末每服半錢水煎服甚者三錢藥水內入油
數點煎又治吐蟲服不拘時

右諸家雜治慢驚其首一方用人血蘸藥末擦唇
者甚効後一方解藥太過之毒尤見錢氏憂人之
切也

黃芪益黃散　治胃中風熱

黃芪(貳錢)　人參　甘草(半生半炙)

陳皮(不去白各壹錢)　白芍藥(柒分)　黃連(少許)

白茯苓(肆分)

右爲麤末每服水一盞煎五沸去柤溫服

【丹】治驚而有熱者

人參　茯苓　白芍藥(酒炒)

白朮

右入生薑煎服暑月加黃連生甘草竹葉煎服

陳明遠治小兒驚悶脾虛肝乘之手足搐動四肢惡寒而食少方

白朮 二錢　茯苓 一錢

右煎湯入竹瀝熱下龍脊九二十九保和九二十九

生氣散

丁香 叁字　白朮　青皮 各貳錢

甘草 炙　木香　人參 各壹錢

右為末每服半錢沸湯點服或用和劑方調氣散亦可

參苓白朮散 見不能食　理中湯 見吐瀉

王氏惺惺散　治小兒吐瀉脾弱內虛生驚

人參　茯苓　木香

天麻　扁豆　全蠍 全炙

陳米 炒各等分

右剉散每服二錢薑棗煎服

醒脾散　治吐瀉脾困不食痰作驚風

人參　白茯苓　白附子 炮

天麻 炮　甘草 [illegible]　石菖蒲 一寸九節者

木香　石蓮肉　白朮 各壹錢

全蠍 [illegible]半

右為末每三字薑棗煎服有熱去木香或加南星半夏陳皮陳米

大醒脾散　治吐瀉脾困不能食痰作驚風

南星　白茯苓　淨陳皮

全蠍 焙　甘草 炙　白附子 炮 各壹

蓮肉　人參　木香 各半

陳倉米 貳百粒

右為末每服二字薑棗煎點服醒脾二方通用亦可醒乳小兒胃虛不消乳食尤須節約

演山觀音全蠍散　因吐後傳慢驚候清神固氣補虛益脉開胃止吐

黃耆　人參 各壹分　木香

炙甘草　蓮肉 炒　扁豆 炒

白茯苓　白芷　全蠍

防風　羌活 各壹錢　天麻 貳錢

為末每一錢棗半箇煎無時服慢脾尤宜服

湯氏醒脾散　吐瀉不止痰作驚風脾困不食

白朮　人參　甘草炙

淨陳皮　白茯苓　全蝎各半

半夏麯　木香各一錢　白附子炮

南星炮一錢　陳倉米一百粒

演山加天麻殭蠶無陳皮半夏陳米

右爲末每服一錢水半盞薑二片棗半箇煎時時服頻則吐

直指星香全蝎散　治慢驚風已傳昏迷痰搐

南星濕紙煨二錢　木香　人參

淨陳皮各一錢　全蝎炙二枚　甘草炙半錢

剉細每服一錢入紫蘇薑棗濃煎旋以匙送下有熱加防風

烏蝎四君子湯

四君湯加生川烏焙過全蝎爲末各少許每服半錢薑棗煎服如再服即去川烏

調氣散　治小兒慢驚之後以此調之

木香　香附子　人參

陳皮　藿香　甘草各等分

右剉散每服二錢薑三片棗一枚水一盞溫服

定志丸見前急驚

右方皆以參苓[illegible]乃治慢驚之正[illegible]也

黑附湯[illegible]人參[illegible]

金液丹

舶上硫黃[illegible]

右以柳木槌乳鉢研極細每服二錢生薑湯下

生附四君子湯

右以四君子湯加生附子四分之一厥逆者對加

每服一錢薑二片煎匙送下

異功散

人參　茯苓　白朮

甘草　橘紅　木香各等分

右剉散每服三字薑棗煎一方無木香

天麻飲　六柱散見前二方並

大醒脾散　治慢脾風內虛昏悶不省

人參　茯苓　木香煨

全蝎焙　南星炮　白朮

陳皮　石蓮肉　甘草炙

丁香　砂仁　白附子炮各等分

陳米（炒）

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片棗一枚煎至五分不拘時服量兒大小加減與服

實脾散　治脾胃虛[illegible]不止乳食不進慢脾等證

人參　白茯苓　白朮
砂仁　麥芽　神麯
陳皮　石蓮肉　乾山藥
良薑　青皮　冬瓜仁
丁香　木香　薏苡仁（炒）各等分

扁豆（薑炒）　香附子（炒）　甘草（炙）
陳米（各貳錢）　肉豆蔻（煨，貳枚）

右為細末每服半錢或一錢用米湯不拘時調服

固真湯（方見前）

右皆慢脾風之主藥也

通治急慢驚　急驚合涼瀉慢驚合溫補此定法也其間有急驚涼瀉而不愈變為慢驚有慢驚溫補而不愈變為急驚者宜用通治急慢驚藥

湯奪命散　大能控風涎不問急慢驚風痰潮壅盛塞於咽喉其響如潮名曰潮涎百藥不能過咽命在須臾但先用此藥入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也

青礞石（壹兩入甘鍋子內[illegible]火煅通紅取出[illegible]）

右為細末急驚風痰壅上身熱如火用生薄荷自然汁入蜜調微溫服之良久其藥自裹痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服退熱祛風截驚等藥慢驚風亦以此潮上塞住咽喉藥食俱不能入醫者技窮勢迫以待其盡但用此藥以青州白丸再研為末煎如稀糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服花蛇川烏全蝎蜈蚣等藥

大黑龍丸　治小兒急慢驚風神效（方見急驚條）

鎮驚丸

琥珀　辰砂　真珠母
青皮　甘草（各貳錢半）　青黛
蘆薈　柴胡　青礞石（硝煅，各半兩）
天竺黃　膽星（各貳兩）　天麻
乳香（各壹兩）　雄黃（半兩）　壹錢

右為末甘草膏丸如雞頭大慢驚參朮湯下急驚薄荷蜜湯下

曾氏鎮驚丸（方見急驚）

小兒急慢驚風

全蝎 貳拾個炒黃　辰砂 半兩研極細和勻

右取蚯蚓拾條洗淨入小瓶內以溫火煅蚯蚓化為水和丸如胡椒大每服三丸用順流水化下

小兒急慢驚風

殭蠶 叁條　辰砂 壹豆大　全蝎 壹個

真珠末 壹錢

右末取蓬蒿中小蟲兒每壹箇研作壹丸如麻子大每一粒用乳汁下

保命丹 治小兒急慢驚風四肢逆冷眼直口禁涎

不止

虎睛 壹對安瓦上以瓦蓋之慢火焙乾　硃砂 半兩

全蝎　麝香 各半錢　天麻 壹分

蜈蚣 貳條去頭尾赤脚者

右為細末煉蜜丸如大豆大瓷罐貯之又入腦麝窨定急驚薄荷蜜湯化下慢驚薄荷湯化下各三丸

溫驚丸 一名粉紅丸

南星 為末入臘月牛膽中陰乾百日為末肆兩　硃砂 壹錢半

天竺黃 壹兩　坯子臙脂 半錢　龍腦 伍分另研

右用牛膽汁和丸如雞頭大每服一丸小者半丸沙糖水下

抱龍丸 治傷風瘟疫身熱昏睡氣麤風熱痰實壅嗽驚風潮搐及蠱毒中暑沐浴後並可服壯實小兒宜時與服之 丹溪云抱龍丸心肺肝藥也

南星 如無牛膽者只將生者剉炒熟用肆兩　天竺黃 壹兩

雄黃 水飛　辰砂 半兩各另研　麝香 壹錢另研

右為細末煮甘草膏和丸皂莢子大溫水化下百日小兒每丸分作三四服五歲兒一二丸大人三五丸亦治室女白帶伏暑用鹽少許嚼一二丸新

汲水送下臘月雪水煮甘草和藥尤佳一法用藥水或新水浸南星三日候透煮軟三五沸取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取末捌兩以甘草貳兩半拍破用水二碗浸一宿慢火煮至半碗去查漸漸傾入南星末內慢研令甘草水盡方入餘藥

琥珀抱龍丸 劉氏

抱龍之義抱者保也龍者肝也肝應東方青龍木木生火所謂生我者父母也肝為母心為子母安則子安心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生故曰

抱龍丸理小兒諸驚四時感冒風寒溫疫邪熱致
煩躁不寧痰嗽氣急及瘡疹欲出發搐並宜可投
其藥性溫平不寒不燥常服祛風化痰鎮心解熱
和脾胃益精神

真琥珀 天竺黃 檀香 細剉
人參 去蘆 白茯苓 去皮 粉草 去節[illegible]兩
枳殼 [illegible]
硃砂 伍兩[illegible]
[illegible]
[illegible]
南星 壹兩[illegible]
山藥 壹斤去黑皮[illegible]
金箔 百片[illegible]

右前拾貳味除硃砂金箔不入碾內餘拾味檀香
不過火外玖味或曬或焙同研為末和勻硃砂金
箔每壹兩重取新汲井水壹兩在入乳鉢內略杵
勻隨手丸如雞頭子大陰乾晴霽略曬日色燥甚
則拆裂宜頻放當風處取其自乾治法並用葱湯
無時化服或薄荷湯痰壅嗽甚淡薑湯下瘡疹見
形有驚溫淨湯下心悸不安燈草湯下若大悶迷
麥門冬熟水下百日內嬰兒每丸作三次投二歲
已上者止宜[illegible]修合之時但缺一

味不依製度必無効矣常用丸泥入麝香同收毋
使散泄氣外入珍珠末[illegible]兩合和名合珠散蓋珍
珠能鎮心寧神除痰[illegible]治法湯使同前

又琥珀抱龍丸 專治小兒急慢驚風發熱咳嗽作
搐痰喘驚悸生[illegible]湯下 [illegible]有瘡疹發熱嘔
吐驚跳白湯下 驚風發熱[illegible]寒[illegible]哭葱湯
下 因著驚發熱睡臥不寧燈心湯下 夏月發
熱嘔吐麥門冬湯下 因母發熱過乳溫熱不寧
甘草湯下 脾胃不和頭熱黃瘦懶食砂仁湯下
週歲小兒服一丸未及者半丸連進一二丸無
不効驗忌食魚腥生冷食乳者乳母同忌

琥珀 貳錢半包在[illegible]
牛膽南星 [illegible]壹兩[illegible]
僵蠶 貳錢 炒
雄黃 辰砂 人參
白茯苓 各叁錢 天竺黃 伍錢 釣藤 全用鉤子 壹兩伍錢
真正牛黃 伍分 真麝香 [illegible]
右各味不可短少分稱[illegible]為極細末用粉甘草八
兩剉碎以水四大碗熬膏一盞入藥末為丸每一
丸五分重金箔為衣外用黃蠟包之一料 二百
丸

又號琥珀抱龍丸 治諸風驚[illegible]

琥珀[illegible]研 天竺黃[illegible] 人參

檀香[illegible] 茯苓[illegible] 硃砂研

珍珠各五錢研細 枳殼[illegible] 枳實[illegible]

牛膽南星 人參 黃芩[illegible] 山藥[illegible]

甘草[illegible] 金箔[illegible]片 蟬蛻[illegible]

黃蠟[illegible]

此藥[illegible]丸[illegible]小兒諸

驚[illegible]痰[illegible]邪熱煩躁不寧痰嗽氣急[illegible]

欲用金箔[illegible]治之其藥性溫平不寒不燥驅風

化痰鎮心解熱安魂定驚和脾健胃添益精神[illegible]

白煎湯或薄荷湯下 痰壅咳嗽生薑湯下 痘

瘡見形有驚白湯下 心悸不安燈心湯下並不

拘時服初生數月者每丸作四次服或三分之一

或半丸數歲者每服一丸更量兒大小加減酌用

可也

世奇命散 治急慢驚風諸藥無效此藥隨手奏功

白附子[illegible]錢 黑附子炮去皮臍半兩

南星[illegible]壹兩 天麻[illegible] 辰砂另研[illegible]

防風 半夏[illegible] 全蠍去毒[illegible]

右為末三歲兒半錢薄荷生薑自然汁加好酒沸

湯各少許調服急驚加輕粉腦子各少許

蜈蚣[illegible] 麝香半錢 僵蠶炒

太乙保生丹 治慢驚

湯治慢驚甚驗

赤脚蜈蚣壹條酒炙 白僵蠶[illegible] 辰砂另研壹字

全蠍[illegible] 青州白丸子[illegible]丸

右為末入麝香少許慢驚人參麥門冬湯調下急

驚加腦子牛黃各少許金銀薄荷湯調下

雄天麻散 治小兒急慢驚風及大人中風涎盛半

身不遂言語艱澀不省人事

半夏[illegible]錢 天麻貳錢半 甘草炙

茯苓 白朮各[illegible]錢

右用水一盞入磁罐內煮藥令水乾將老薑三錢

同煮候乾為細末每服一錢瓜分薑棗湯調下

雄黃散 主暴中急慢驚風驚癇涎滿口及兩便

閉汗不通或涼或熱坐臥不[illegible]

雄黃貳錢半 白薑[illegible] 川烏頭炮裂去皮臍

草烏頭[illegible] 天麻[illegible] 川芎[illegible]

右除雄黃外五味剉焙同雄黃為末驚風痰湧舞

服半錢或一錢用薄荷茶清調下發汗薑葱薄荷
水煎併投三服取効
【經】治驚風墜涎天南星一個重一兩者換酒浸七伏
時取出新瓦上炭火炙乾令裂置地上去火毒擣末入
朱砂貳錢半研爲細末每服半錢五分荊芥湯空心及
午時各調下一服
【田】天麻防風丸　治小兒驚風身熱喘粗多睡驚悸
搐掣神昏痰涎不利等證
天麻　防風　人參各壹兩
蠍尾去毒半兩　甘草　硃砂

雄黃　牛黃　麝香各壹錢
僵蠶炒半兩
右爲末煉蜜丸如櫻桃大硃砂爲衣每服薄荷湯
下一二丸
【[illegible]】七味羌活膏治急慢驚風壯熱
羌活　獨活　天麻
全蝎去毒　人參　殭蠶炒各半兩
烏蛇肉酒浸去皮骨焙乾壹兩
右爲末煉蜜和丸如皂子大每兩作五十丸每服
一丸荊芥湯下

【經】治小兒驚風全蝎一錢不去頭尾用薄荷葉裹炙
乾同研爲末作四服白湯下
【衍】治小兒驚風殭蠶蝎梢等分天雄尖附子尖共一
錢炮過爲末每調一字薑湯調下
【羅】小兒驚風褁乳以乳汁用甘草頭一箇丁香同熬至熟
乳母空心服之
【丹】孫女因胎中受濕熱日午發搐唇黑面青每日作
一次未半週難與藥且釀乳飲之
白朮　陳皮　半夏
芍藥　青皮各伍分　人參

川芎　木通各叁錢　黃連貳錢
甘草炙壹錢
右分八服薑五片與乳母煎服
小兒急慢驚風發熱口瘡手足伏熱痰熱痰喘痰嗽
並用涌法重劑以瓜蒂散輕劑用苦參赤小豆末酒
酸虀汁調服之後用通神散蠲丸服之間以桑牛
陰乾研末調服以平其氣
【本】稱銀丸　治小兒急慢驚風積痢
貴然炙錢　水銀一錢
寒食麵　黃明膠各　輕粉

雄黄　粉霜　硃砂各二兩

巴豆十粒去油　蠍梢少許

右研細滴水為丸如麻子大捏扁曬乾甕盒盛之

壹歲壹丸隨意加減荊芥湯送下不得化破

【附】治急慢驚風乳香甘遂各半兩同研細每服半錢

用乳香湯調下或用童便調下尤妙

劫風膏　治急慢驚搐搦風撮口牙關緊閉痰涎壅

盛咽喉腫痛

威靈仙去蘆壹兩半剉細為末

右用皂莢叄兩去皮弦捶碎挪溫水壹盞絹濾過

慢火熬若稀糊入醇醋半兩再熬三五沸去火候

令用前藥末壹分乳鉢內杵勻丸芡實大先用鹽

揩肉擦牙根次以此膏壹丸或貳丸溫白湯灌調

抹入左右牙關內即開續進別藥熬時得瓦器為

上銀器尤佳及解風痰痰盛滾薑湯調化無時少

與含嚥咽喉腫痛溫茶清調下或薄荷湯

以上諸方通治急慢驚風蓋以虛實兩見急慢互

出故有通治之法合而言之急慢雖異皆本之於

痰故礞石星半之屬通能治之者也分而言之礞

石之屬瀉痰青礞之屬瀉木硃砂之屬瀉火皆治

氣實之劑參芪之屬補土天麻全蝎之屬補木烏

附之屬補火又皆治氣虛之劑故補瀉兼施虛實

通治之法也

霹靂散　解急慢驚風不省人事

豬牙皂角叁錢　細辛　川芎

白芷各貳錢　躑躅花壹錢半

右剉曬為末每以少許用大燈心叁寸長蘸點鼻

內得噴嚏為驗前藥不可輕療則不應

目睛瞤動　論目者肝之竅也肝膽屬風木二經兼為

相火肝藏血血不足則風火內生故目睛為之瞤動

經曰曲直動搖風之象也宜用四物益其血柴胡山

梔清其肝陰血內榮則虛風自息矣若因肝經血燥

而目病者用六味丸以滋其源因肺金剋肝木者用

瀉白散以平金邪若眼睛瞤動者肝木乘脾土也用

抱龍丸若愈後驚悸不寐或寐中發搐咬牙目睛瞤

動者血虛不能榮筋脈也用補中益氣湯或歸脾湯

加茯苓五味益有餘者邪氣實也不足者真氣虛也

凡病氣有餘當認為不足此證無論肝脾多為慢驚

之漸

唇口蠕動　論脣為脾之華口乃脾之竅又陽明之脈

環唇口而交人中陽明胃也是以脾胃虛者多有此證不獨病後而已夫脾主涎脾虛則不能收攝多兼流涎或誤認爲痰而用祛逐之藥則津液益枯不能滋養筋脉遂致四肢抽搐病勢愈甚原其治法與慢脾風相同當用大補脾胃之藥加升麻柴胡切勿用青皮龍膽草之類兼察其色黃者脾弱也青者肝勝也青黃不澤木來尅土也青赤相兼木火風熱也黑爲寒水反來侮土白爲氣虛亡陽凡此宜用六君子湯加小柴胡湯若四肢微搐或潮熱往來或泄瀉嘔吐面色痿黃皆脾胃有傷也宜用白术黃芪川芎當

歸人參陳皮肉豆蔻神麯乾葛白芍藥黃連炙甘草白茯苓以補胃氣若脾胃虛弱者用五味異功散虛寒者加炮薑若脾氣下陷者用補中益氣湯以升其陽作渴者用七味白术散以生津液若肝木侮脾者用補中益氣湯加茯苓半夏芍藥以制肝補脾

目直視 辨小兒忽然驚搐目直者皆肝之風熱也若肝虛生風則目連劄而不搐及多欠咬牙若肝經風實則目直大叫呵欠項急煩悶若肝經有熱則目直視不搐得心熱則搐氣熱則外生氣溫則內生其證手尋衣領及亂捻物宜用瀉青丸壯熱飲水喘悶宜用瀉白散凡病之新久皆能引肝風風內動則上入於目故目爲之連劄若熱入於目牽其筋脉兩眥俱緊不能轉視故目直也亦有飲食停滯中焦致清陽不升濁陰不降肝木生發之氣不得升致生虛風者須詳審之若胸滿腹痛嘔吐惡食輕則消導化痰重則探吐滯積更須審其所傷寒物熱物亦有因感冒吐瀉致使土敗木侮而生虛風者不可遽服驚藥宜用六君子加芍藥木香柴胡制肝補脾若因脾土虛而自病者用五味異功散凡飲食停滯痰涎壅滿而見驚證者實因脾土虛弱不能生金金虛不能平木

故木邪妄動也宜健脾消食其證自愈若輒用驚風之藥反成其風而益其病也況臟腑脆嫩不可投以峻厲之劑治者慎之

睡中驚動 辨小兒睡中驚動由心腎不足所致盖心主血與神肝藏血與魂肺主氣與魄腎主精與恐小兒臟腑脆弱易爲驚恐恐則氣下驚則心無所依神無所歸且夫人之神氣寤則行於目寐則棲於腎今心腎既虛則不能寧攝精神故睡中驚動也治宜清心安神用茯苓補心湯加酸棗仁茯神五味子亦有驚搐而作者因擊動其肝故魂不安也治宜鎮驚定

魂用安神鎮驚丸若飲食間因驚而停滯者用六君子加神麯厚朴食既消而驚未定用茯苓補心湯若木火太過而心神不寧者用導赤散風熱相搏者用柴胡梔子散食鬱生痰驚動不安者用四君以健脾神麯半夏以化痰山梔芎藥以清熱

驚動咬牙 薛曰小兒驚後目微動咬牙者皆病後亡津液不能榮其筋脈也亦有肝經虛熱而生風者當審其氣血有餘不足而治之其日中發熱飲冷而動者血氣有餘也用瀉青丸夜間盜汗及睡不寧而動者血不足也用地黃丸或因肝經風邪傳於脾腎者亦令咬牙先用柴胡清肝散次用五味異功散六味地黃丸若因脾胃虛熱用補中益氣湯加芍藥山梔實熱用瀉黃散蓋牙床屬手足陽明故也若肝腎熱用六味地黃丸

泄瀉 薛曰小兒驚瀉者肝主驚肝木也盛則必傳剋於脾脾土既衰則乳食不化水道不調故泄瀉色青或兼發搐者蓋青乃肝之色搐乃肝之證也亦有因乳母脾虛受驚及怒動肝火而致者經曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄法當平肝補脾慎勿用峻攻之藥脾氣益虛肝邪彌甚甚至抽搐反張者亦肝火熾盛中州虧損之變證也凡見驚證即宜用四君六君異功散等方加白附子定風柴胡平肝引經以杜漸則必不至瀉搐而自安矣今已見瀉而驚搐尚不知補脾平肝以保命抱龍鎮驚等藥治之其亦去生遠矣

腹痛 蟬蛻鉤藤飲 治肚疼驚啼

鉤藤鉤　天麻　茯苓

川芎　白芍藥各叁錢　甘草

蟬蛻各壹兩

右入燈心水煎服

煩渴 閻氏云驚風或泄瀉等證煩渴者皆津液內耗也不問陰陽宜煎錢氏白术散使滿意取足飲之彌多彌好

清心丸 治驚熱煩躁

人參　茯神　防風

朱砂　柴胡各叁錢　金箔叁拾片

右為末煉蜜丸如桐子大每服一二丸竹瀝調下

神芎丸 治風熱壅滯頭目昏眩口舌生瘡牙齒疳蝕或遍身瘡疥咬牙驚惕怔忡煩躁作渴或大便澀滯或積熱腹滿驚風潮搐等證

大黃生　黃芩炒各貳兩　生牽牛末肆兩

滑石肆兩　黄連　薄荷葉

川芎各半兩

右為末水糊丸桐子大每服三四丸温熟水下

潮熱似癎　兒又有急驚天釣之後變作潮熱手足逆冷有似癎疾蓋因病瘉之時不善將護外感風邪乘虚而入於經絡再未解散以致如此經曰重陽必陰亢則害承乃制此其義也宜服柴胡加桂湯及當歸散氣實者則以烏犀丸水晶丹略與通利勻氣散此補後以參苓白朮散調理自然平瘉此證所用藥品間使苦寒之味務在消陽盛之火肺金得勝肝

木自平而風邪亦散斯為良法

柴胡加桂湯見傷寒　當歸散見痢

烏犀丸　水晶丹並見癖積

勻氣散見腹痛　參苓白朮散見泄瀉

雜證類驚　海藏云治諸驚安神丸子加辰砂半分棗湯調下　又有一證狀類驚於先身熱驚跳或發搐此非驚風當用發散藥　有暑風一證因夏月感冒風熱太甚致面垢唇紅脉沉細數忽發驚搐不省人事治用消暑清心飲辰砂五苓散及琥珀抱龍丸自安切勿以温劑調補

消暑清心飲　治伏熱中暑煩躁作渴神氣不清及有驚搐名暑風發搐之可劾

香薷去老梗　澤瀉去毛各壹兩　扁豆炒熟去殼研

淨黄連　羌活　豬苓去皮

厚朴去粗皮薑汁浸透炒　白朮　乾葛

赤茯苓去皮　升麻　川芎各半兩

甘草叁錢

右剉每服二錢水一盞煎七分無時帶涼服治暑風證先投此劑得效次服却暑丹其搐不發矣

薛氏於急慢驚癎之外又出驚風一證其候虚惕怔

忡氣怯神散痰涎來去泄瀉色青蓋驚之輕而虛者也若驚入心則面赤夜啼用梔子清肝散加黄連入肝則面青眼竄用柴胡清肝散入脾則面黄嘔吐虛汗嗜臥用六君加柴胡山梔入肺則面白喘急用異功散加柴胡桔梗入腎則面黑齘咬牙用六味地黄丸若因乳母恚怒肝火或膏粱積熱遺兒為患或兒吐瀉傷脾清氣不升風木陷入太陰傳變等因皆能致此當隨主治否則必成慢脾也須預慎防為善

針灸　小兒急驚灸前頂二穴三壯取法在百會前一寸若不愈灸兩眉心及鼻下人中一穴炷如小麥大

小兒慢驚灸尺澤穴各三壯在肘中横紋約上動
脉中炷如小麥大 若睡中驚掣灸足大指次指之
端去爪甲如韭葉各一壯 若角弓反張身強灸
鼻上入髮際三分三壯灸大椎下節間三壯 若
睡中驚不合眼目灸[illegible]中三分各一壯
【證】[illegible]咬牙甚者發驚 目直面青身反折者生驚
呵欠面青者驚風 呵欠面黃者脾虛驚 目赤兼
[illegible]
[illegible]發搐目左視無聲右視有聲女發搐目
右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證（錢乙云男）
尊 幼科二 九十三
（木旺故左視木位無聲右視金位相擊則有聲女金旺故右視金位無聲左視木位亦相擊有聲）
寺丞子三歲發搐自卯至巳目右視大叫哭錢見
曰此逆也男為陽本發左視無聲則順右視有聲則
逆所以然者左肝木也右肺金也逆則二臟相戰金
木相擊而有聲也治宜瀉強補弱假令女發搐目左
視是肺來乘肝肝不能任故叫哭也當瀉其肺後治
其心續治其肝若病在秋（日西時同）肺旺位當大瀉其
肺若病在春（早晨時同）此肝旺之時尚不能勝肺是肺強
而肝火弱也當補其肝腎大瀉其肺若男發搐目右
視是肝來勝肺而叫哭當瀉其肝心若病在春夏（早晨
（日中時同）肝心旺時當大瀉其肝若病在秋冬（日晡時同）此肺
旺之時尚不能勝肺是肝強而肺極虛也當補其肺
大瀉其肝所以言目反視者乃肝主目也凡搐則是
風熱相搏於內風屬肝故外見於目也今此病男反
女證故稍易治於女也先瀉其肺以瀉肺湯上之二
日不悶亂知病退也後用地黃丸補腎二服後用瀉
青丸各二服以瀉心肝五日而愈 又肺虛不瀉者
何也曰假令男目右視木克金肝旺勝肺而但瀉肝
若更病在春夏金氣極虛故當補其肺慎勿瀉也
湯 凡搐男左女右為順易治男右女左為逆難治
錢 幼科二 九十三
脉訣啓蒙曰小兒脉促急為虛驚 直指云浮數洪
緊為急驚 沉遲散緩為慢驚 虎口脉紋青紫為
驚風 紅者風熱輕 赤者風熱盛 紫者驚熱
青者驚積 青紫相半驚積風熱俱有主急驚風
青而淡紫伸縮來去主慢驚風 紫絲青絲或黑絲
隱隱相雜似出而不出主慢脾風 形勢彎入裏者
順 出外者逆
【不治證】搐而不休休而再搐 驚叫發搐 汗出足
冷 痰滿胸喉 口開目直
急驚眼睛翻轉口中出血兩足擺跳肚腹搐動或神

緩而摸體尋衣或撮空而神昏氣促噴藥不下通關不嚏心中熱痛忽大叫者不治　慢驚四肢厥冷吐瀉咳嗽面黯神慘鴉聲胃痛兩脇動氣口生白瘡髮直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎頭軟大小二便不禁手足一邊牽引者皆爲不治　慢脾身冷粘汗直臥如尸喘嗽頭軟背直口噤搖頭痰如牽鋸之聲面無潤澤之色縮唇氣粗者不治

【醫論】治小兒急驚方搐不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危病也急驚方搐時但扶持之不可擒捉蓋風氣方盛恐流入筋脈或至手足成拘攣也

驚悸

【論】人身有九臟心藏神肝藏魂二經皆主於血血虧則神魂失寧而生驚悸也經曰東方青色入通於肝其病發驚駭又曰二陽一陰發病主驚駭驚者心卒動而恐怖也悸者心跳動而怔忡也二者因心虛血少故健忘之證隨之用四物安神之類丹溪謂亦有屬痰者宜用溫膽湯加辰砂遠志之類若思慮便動虛也用養心湯時作時止痰也用茯苓丸觸事易驚心膽虛怯也用溫膽湯卧驚多魘血不歸源也用眞

珠母丸夢寐不寧肝魂失守也用定志丸恐畏不能獨處膽氣虛冷也用茯神湯睡卧煩躁膽氣實熱也用酸棗仁丸眩運驚悸風痰內作也用本事辰砂遠志丸思慮鬱結脾虛氣滯用歸脾湯前證雖曰屬心與肝而血之所統實主於脾脾之志曰思思慮多則血耗損而不能滋養於肝心者脾使之也思慮內動未嘗有不役其心者夫心爲君火之藏十二官之主也夫君之德不怒而威無爲而治故宜鎮之以靜謐戒之以妄動動則相火翕合熾爍陰精精血既虧則火空獨發是以驚悸怔忡之所由生及忘之火心所

不能制者矣故治脾者不可不知養心養心者不可
不知鎮靜而寡慾然人孰無思也思之正則無妄動
之慾矣朱子曰必使道心常爲一身之主而人心每
聽命焉此善養於心者也

溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致
心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣
悸乏或復自汗膽虛不能制脾則脾之水飲作矣

半夏湯洗 竹茹 枳實麩炒
橘皮去白各貳兩 甘草炙壹兩 白茯苓壹兩半

右每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分食
前服

寧志丸 治心虛多驚若有痰宜吐之

人參 白茯苓 茯神
栢子仁 琥珀 當歸
酸棗仁溫酒浸半日去殼 遠志炒各半兩
乳香 朱砂 石菖蒲各參錢

右爲末蜜丸桐子大每服三十丸食後棗湯下

茯神散 治五藏氣血虛弱驚悸怔忡宜用此安神
定志

茯神去木 人參 龍齒另研

遠志去心 桂心 防風
獨活 酸棗仁 細辛
白朮炒各參錢 乾薑炮

右爲末每服四五錢水煎服蜜丸亦可

治要茯苓補心湯 治心氣不足善悲愁怒衄血面
黃五心煩熱或咽喉閒痛舌本作強

茯苓肆錢 桂心 甘草炙各分
紫石英煅 人參 麥門冬去心各壹錢
大棗貳枚

右水煎服

茯神湯 治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨
處胸中煩悶

茯神去木 酸棗仁炒 黃耆炒
梔子仁炒 白芍藥炒 五味子搥炒
桂心 熟地黃自製 人參各壹兩
甘草炒伍錢

右每服五錢薑水煎

酸棗仁丸 治膽氣實熱不得睡臥神志不安驚悸
怔忡

茯神去木 酸棗仁炒 遠志去心

柏子仁(炒)　防風　枳殼(麩炒)
生地黃　青竹茹
右爲末蜜丸梧子大每服七八十丸滾湯下
定志丸　治心神虛怯所患同前或語言鬼怪喜笑
驚悸
人參　茯苓　菖蒲
遠志(去心)
右爲末蜜丸如梧子大每服七八十丸滾湯下
治要茯苓散　治心經實熱口乾煩渴眠卧不得心
神恍惚

茯神　麥門冬(各壹兩半)　通草
升麻(各壹兩貳錢半)　紫苑　桂心(各柒錢)
知母(壹兩)　大棗(拾枚)　淡竹茹(伍錢)
赤石脂(壹兩柒錢伍分)
右每服壹錢水煎
朱雀丸　治心病怔忡不止
白茯苓(貳兩)　沉香(伍錢)
右爲末蜜丸小豆大每服三十丸人參煎湯下
世傳密陀僧散　治驚氣入心絡不能語者昔有人
爲狼及犬蛇所驚皆以此而安

密陀僧
右茶清調一錢匕
丹溪朱砂丸　治勞役心跳
朱砂　當歸身　白芍藥
側柏葉　川芎　陳皮
甘草　黃連
右用猪心血爲丸粟米大每服百丸龍眼湯下
本事辰砂遠志丸　消風化痰鎮心安神
人參　石菖蒲　遠志(去心)
茯神　川芎　山藥

白附子　麥門冬　細辛
鐵粉　辰砂(各伍錢)
右爲末用生薑汁入水糊丸菉豆大以朱砂爲衣
每服一二十丸臨睡生薑湯下
加味歸脾湯去丹皮山梔即歸脾湯　治脾虛弱損
健忘驚悸等證
人參　黃耆　茯神(去木各壹錢)
甘草(伍分)　白朮　木香(伍分)
遠志(去心)　酸棗仁(炒)　龍眼肉
當歸　牡丹皮　山梔(炒各壹錢)

右水煎服
愚按前方若乳母憂思傷脾血虚發熱食少體倦或脾虚不能統攝以致陰血妄行或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或婦人經候不準晡熱內熱或瘰癧流注等證致兒爲患者令子母俱服之

辰砂膽星膏　治小兒痰熱氣熱氣喘嗽驚悸不安

辰砂壹錢　牛膽南星壹兩　琥珀
青礞石末各五錢　天竺黄貳錢　甘草
麝香少許

右爲細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時生薑湯化下

大通散　治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚熱

羌活　山梔子各貳錢　大黄煨
木通　赤茯苓　甘草各壹錢

右剉每服二錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分不拘時服

癎

夫驚癎即急慢之證但驚癎發時仆地作聲醒時吐沫急慢驚則不作聲不吐沫也　仁齋曰癎小兒之惡候也蓋小兒血脉不斂氣骨不聚爲風邪所觸爲乳哺失節停結癖積而得之其候神氣怫鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚膨脹手足搐掣似死似生或聲或啞或項背反張或腰脊強直但四體柔弱發而時醒者爲癎若一身強硬終日不醒則爲痓證矣

陰陽二癎　陽癎初作時病先身熱瘈瘲驚啼叫喚而後發脉浮者爲陽癎乃急驚也內在六腑外在皮膚爲易治　若病先身冷不驚掣不啼呼而作脉沉者爲陰癎乃慢驚也此病內在五臟外在骨髓劇者難治　**驚**陽癎者因感驚風三次發搐不與去風下痰則再發然三次者非一日三次也或一月或一季一發驚搐必經三度故曰三次所謂驚風三發便爲癎即此義也其病主身熱自汗兩目上視嚼沫齩牙手足掣搦而色紅紫六脉浮數以百解散加五和湯水煎疎解次下痰用水晶丹或半夏丸　陰癎者因慢

驚後去痰不盡痰入心包而得四肢逆冷吐舌搖頭口嚼白沫牙關緊閉但不甚驚搐作啼面色或白或青脉息沉微故嬰孩寶書云惟中吐舌更搖頭正此之謂治以固真湯加白生湯同煎調寛氣飲和解

風驚食三癎 千金云小兒之癎有三風癎驚癎食癎也風癎緣衣煖汗出風因入也初時先屈指如數物乃作驚癎起於驚怖大啼乃作食癎其先不哺乳吐而變熱後發然風癎驚癎時時有之十兒之中未有一二凡是先寒後發熱者皆食癎也驚癎皆按圖灸之風癎當以豬心湯食癎當下乃愈紫霜丸佳 一按

此論三癎蓋有三因之分風癎屬外因驚癎屬內因食癎屬不內外因也又按全嬰方云風癎因將養失度血氣不和或厚衣汗出腠理開舒風邪而入之其病在肝肝主風驗其證目青面紅發搐宜驅風膏大青膏琥珀散鎮驚藥有熱四順飲退後與利驚丸下其痰涎驚癎因血氣盛實臟腑生熱或驚怖大啼精神傷動外邪所入爲之其病在心心主驚驗其證忽然叫聲發搐宜琥珀散紅龍散鎮心丸有熱四順飲利驚丸下之不生別病也食癎其病在脾脾納食驗其證噯吐醙氣即發搐此病或大便酸臭紫丸子下之巳上三證大同小異並屬陽也各目睛斜手足潮搐或作豬聲發過即甦皆十生一死也

五藏癎 三因云古方有五癎五臟癎六畜癎等名證不同難於備載別錄有五癎之治一曰馬癎作馬嘶鳴以馬屬在午手少陰君火主之故其病應於心二曰羊癎作羊叫聲以羊屬未足太陰濕土主之應乎脾三曰雞癎作雞叫聲以雞屬酉足陽明燥金主之應乎胃四曰豬癎作豬叫聲以豬屬亥手厥陰心包主之應乎右腎五曰牛癎作牛吼聲以牛屬丑手太陰濕土主之應乎肺此五癎應乎五畜應乎五藏者

也發則旋暈顛倒口眼相引目睛上搖手足搐搦背脊強直食頃乃甦各隨所感施以治法 **醫** 凡治五癎皆隨臟治之每臟各一獸犬癎反折上竄犬叫肝也羊癎目瞪吐舌羊叫心也牛癎目直視腹滿牛叫脾也雞癎驚跳反折手縱雞叫肺也豬癎如尸吐沫豬叫腎也五癎重者死病後甚者亦死輕者五色丸主之 **辞** 面赤目瞪吐舌齧舌心煩氣短其聲如羊者曰心癎 面青唇青兩眼上竄手足攣掣反折其聲如犬者曰肝癎 面黑目振吐涎沫形體如尸其聲如豬者曰腎癎 面如枯骨目白反視驚跳反折

搖頭吐沫其聲如雞者曰肺癇　面色痿黃目直腹滿自利四肢不收其聲如牛者曰脾癇　五癇通用五色丸為主仍參以各經之藥　心癇屬血虛者用養心湯發熱飲冷為實熱用虎睛丸發熱飲湯為虛熱用妙香散　肝癇者虛證用地黃丸抽搐有力為實邪用柴胡清肝散大便不通用瀉青丸　腎癇者用地黃丸紫河車丸之類腎無瀉法故徑從虛治之　肺癇者屬氣虛用補肺散面色痿黃者土不能生也用五味異功散面色赤者陰火上衝於肺也用地黃丸　脾癇者用五味異功散若面青瀉利飲食少

思用六君子加木香柴胡　按千金叙六畜癇無五臟之分屬錢氏始分之而無馬癇一證曾氏謂初發作羊犬聲者咽喉為風痰所梗聲自如此其理甚明言六畜者特強名耳故丹溪謂於經既無所據而治法亦未見有五者之分所以不必分五也

治法 仁齋曰大槩血滯心竅邪氣在心積驚成癇通行心經調平血脈順氣豁痰乃其要也假令小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癇之漸即以紫霜丸導之(方見變蒸熱)時間量與紫霜丸減其盛氣則無驚風癇釣之患癇證方載耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之則為爪破須令出血啼叫尤得氣通諸癇發不能言者蓋咽喉為氣之道路風傷其氣以掩聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳南星炮為末雄豬膽汁調和少許啖之輒效若夫錢氏五癇丸(并前菖散)以菖蒲煎湯調下甘遂豬心湯和蘇合香丸一丸皆治癇之要藥也　劉小兒神尚弱驚則神不守舍舍空則痰涎歸之或飲食失節脾胃有傷積為痰飲以致痰迷心竅而作者治法當尋火尋痰而前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清痰若有頑痰膠固者此藥未易舉逐在

上者必用吐吐後方宜服此藥有痰實在裏者亦須下之隨病輕重而用之也　**潮熱** 如有客痰發熱而有聲煎大黃荊芥湯下五色丸　潮熱有時積熱也桃枝丸主之(方見積熱)壯熱不退當用地骨皮散(方見驚熱)下五色丸　風熱當用防風黃芩湯下大青膏　身溫不熱當用白虎湯加蒼朮下五色丸　闢此皆元氣不足之證須以紫河車(方見驚熱)丸為主而以補藥佐之設若泛行尅伐復傷元氣則必不時舉發久而變危多至不救　一老人生子方週歲秋初暴冷忽發搐似驚癇過則氣息奄奄此元氣虛弱所致與補中益

氣湯而愈　一小兒十歲一小兒七歲各有癇證歲
發二次後因出痘及飲食停滯舉發頻數用六君子
補中益氣二湯而愈　一小兒患前證每發吐痰困
倦半晌而甦諸藥不應年至十三而頻發用紫河車
生研爛入人參當歸末丸桐子大每服三五十丸日
進三五服乳化下一月漸愈又佐以八珍湯全愈
一小兒七歲發驚癇每作先君令其恣飲人乳後發
漸疎而輕至十四歲復發仍用人乳不應余令用肥
厚紫河車研爛人乳調如泥口服二三次至數具而
愈後常用加減八味丸而安至二十三歲發而手足

厥冷仍用前法佐以八味丸十全大補湯而痊
錢氏五色丸
硃砂研半兩　水銀壹分　雄黃熬壹兩
鉛叁兩同水銀熬　真珠末研壹兩
右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下
三因六珍丹
雄黃　雌黃　未鑽珍珠各壹兩
鉛貳兩熬成砂　水銀壹兩半
右研令極勻蜜丸桐子大每服三丸至五丸薑棗
湯下須搗二三萬杵乃可丸

風癇口議云先用化痰利胸膈開通關竅安鎮心
神然後與治風癇藥服之又云先用化風丹去其風
熱次服奪兒散定癇
散風丹　治小兒風癇先
牛膽南星貳錢　羌活　獨活
防風　天麻　人參
川芎　荆芥穗　細辛各壹錢
右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二丸用薄荷
紫蘇湯不拘時送下
保安丸　治小兒諸風癇久後亦驗

五靈脂半兩　川烏生用去皮尖貳錢半
右為末豬心血為丸如梧桐子大每服一丸用生
薑湯化下不拘時服
獨活湯　治小兒風癇解表通裏
獨活　麻黃去節　川芎各壹錢
大黃　甘草炒各半錢
右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分
不拘時溫服
細辛大黃湯　治小兒風癇內熱
天麻　防風各半兩　細辛

大黃 煨　川芎 各貳錢半　甘草 炙壹錢半
右剉碎每服二錢入犀角少許用水一鍾煎至四
分不拘時服
牛黃丸　治小兒風癇迷悶抽掣涎潮
牛膽南星　全蝎　蟬蛻 各貳錢半
防風　牛黃　白附子 生
直殭蠶 炒去絲嘴　天麻 各壹錢　麝香 半錢
右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢研極細
次入藥末和丸如菉豆大每服三五丸用荊芥生
薑煎湯送下不拘時服

化風丹　涼風化痰退熱定搐
牛膽南星 貳錢　羌活　獨活
天麻　防風　甘草
荊芥穗　人參　川芎 各壹錢
右件為末煉蜜為丸如皂子大每服一丸薄荷湯
化開服 一方有全蝎二枚 一方有硃砂無甘草
驚癇口議先涼三焦利驚去熱安神定志平調藏府
溫化痰涎然後與治驚癇藥服之
比金丹
人參　白茯苓　遠志 去心
山藥　辰砂　天麻
石菖蒲　川芎　甘草 炙各壹分
天南星 炮 貳錢　麝香 壹字
右為細末煉蜜為丸皂子大每服一粒煎金銀薄
荷湯化下 一方有琥珀無山藥
錢氏蛇黃丸　治驚癇因震駭恐怖叫號恍惚是也
蛇黃 火煅醋淬　鬱金　麝香
右為末飯丸桐子大每服一二丸煎金銀磨刀水
化下

鎮驚丸　治小兒一切驚癇
茯神 去木　鐵粉　遠志 去心薑製焙
紫石英 煅醋研　人參 去蘆　琥珀
滑石　蛇黃 煅醋　南星
龍齒　熊膽 各半分　輕粉 叁分
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服
三五丸煎金銀湯磨化不拘時服
虎睛丸　治小兒驚癇邪氣入心
虎睛 細研　遠志 去心薑製焙　犀角 鎊
大黃 濕紙裹煨　石菖蒲　麥門冬 去心各
蜣螂 去足翅炒

右爲細末粥米粉打糊爲丸如梧桐子大每服五七丸竹葉煎湯磨化或金銀煎湯亦可不拘時服

七寶鎮心丸　治小兒驚癇心熱

遠志去心薑製焙　雄黃　鐵粉

琥珀各貳錢　硃砂　金銀箔伍片

麝香少許

右爲細末煮棗取肉爲丸如梧桐子大每服三五丸煎去心麥門冬湯化下不拘時服

清神散　治小兒驚癇

犀角　白鮮皮　石菖蒲

遠志去心薑製焙　半夏湯泡各貳錢半　茯神半兩

大黃焙　人參　甘草炙各壹錢半

右爲末每服半錢煎去心麥門冬湯調不拘時服

[illegible]妙聖丹　治小兒食癇通利

雄黃　蝎梢　硃砂

代赭石煅醋淬　輕粉　麝香各貳錢半

巴豆去皮出油叁箇　杏仁去皮尖炒貳錢

右爲末蒸棗肉爲丸如梧桐子大每服三五丸木香煎湯磨化不拘時服

天麻丸　治小兒食癇有痰

南星炮　白附子　大黃

牙硝　川練脂　全蝎焙各壹錢

輕粉半錢　巴豆霜[illegible]

右爲末稀麪糊爲丸如麻子大每服十丸用薄荷煎湯或薑湯送下亦可不拘時服

[illegible]蛇黃散　治小兒諸癇

蛇黃火煅醋淬七次研細　青礞石　鬱金

雄黃各貳錢　硃砂各壹錢

鐵粉研細[illegible]分

右爲末搗粳米飯爲丸如梧桐子大每服三五丸

人參煎湯磨化不拘時服

地龍散　治小兒諸癇發歇無時

乾地龍焙半兩　虎睛炙壹對　人參貳錢半

金銀箔各拾片　天竺黃　硃砂

代赭石煅醋淬　鐵粉各貳錢半　雄黃壹錢半

輕粉半錢

右爲末每服半錢紫蘇湯調不拘時服

龍腦安神丸

茯苓叁兩　人參　地骨皮

甘草　麥門冬　桑白皮各貳兩

馬牙硝貳錢　龍腦　麝香各錢

牛黃半兩　硃砂貳錢　烏犀壹兩

金箔叁拾伍片

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大金箔爲衣如風癇冬月溫水化下夏月涼水化下不以時二三歲者日進二服小兒一丸分二服虛勞發熱咳嗽新汲水下

奪魂散　定癇

白殭蠶去絲炒令黃色半兩　蛇含石燒紅用米醋淬七八次

白附子炮各貳分　生銀

生金

白花蛇頭末斷寸許酒浸炙　牛黃如無以膽製倍加用之　白茯苓

天麻各貳錢　天南星末壹分生薑汁浸一宿焙　赤脚蜈蚣壹條酒浸炙

半夏末貳錢薑汁浸一宿焙

炙　犀角鎊貳錢　腦子少許

麝香少許

右件爲末蒸棗肉爲丸如麻子大每服十丸至十五丸二十丸煎金銀薄荷湯下硃砂爲衣

本草古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡疾煮水汁和諸藥煮服之彌古者尤佳

雄黃丸　治小兒癲癇欲發眼暗瘈瘲聲惡嚼舌

雄黃　黃丹研各壹　麝香研壹錢

右爲末拌令極勻用牛乳汁半升熬成膏入前藥末杵三五百下丸如菉豆大每服三丸溫熟水下一日三服此方得自名醫之家極有神効

拔萃妙香丸　安神通關辟惡氣

辰砂研細玖　龍腦　膩粉

麝香研各壹錢半　牛黃半兩　金箔玖拾片研

右合研勻煉蜜去蠟淨入沙蜜白者半錢同煉勻爲丸每兩作三十丸米飲化下

鎮心丸

硃砂　龍齒　牛黃各壹錢

鐵粉　琥珀　人參

茯神　防風　全蝎米炒各

右爲末燈心湯調下三歲一字

密陀僧散治心癇不語及諸驚失音用密陀僧爲末每服一匙米醋湯調下大人服一錢熱酒下

代赭石散　治陰陽癇

代赭石煅醋淬研爲末水飛過曬乾

右為末每服半錢以金銀薄荷湯和金箔銀箔調勻進二服脚脛上有赤斑乃邪氣發出可治無赤斑則難治

神應丹

辰砂 不以多少研

右以豬心血和之得所以蒸餅裹劑蒸熟取出就丸如桐子大每服一丸後食臨卧煎人參湯下

〔附〕牛黃清心丸　治小兒躁悶項背強直腰背反張時發時醒

牛黃 壹兩貳錢研　麝香 研　龍腦 另研

羚羊角 末壹兩　當歸 去蘆　防風 去蘆

黃芩　麥門冬 去心　白芍藥

白朮 各壹兩半　柴胡 去苗　杏仁 去皮尖雙仁麩炒黃另研

桔梗　白茯苓 去皮

芎藭 各壹兩貳錢半　阿膠 剉碎蛤粉炒　肉桂 去麤皮

大豆卷 炒各壹兩柒錢半　蒲黃 炒

人參 去蘆　神麴 炒各貳兩半　甘草 炒伍兩

雄黃 研飛捌錢另研　白歛　乾薑 各柒錢半

金箔 壹千貳百片內四百片為衣餘入藥內另研　犀角 貳兩

乾山藥 柒兩　大棗 [illegible]

右除棗杏仁及牛黃麝香雄黃龍腦四味另為細末入前藥和勻煉蜜與棗膏為丸每兩作十丸用金箔為衣每服一丸溫白湯化下食後服小兒驚癎即酌度多少以竹葉煎湯溫溫化服

比金丸

虎睛丸 [illegible]

清神湯　治驚癎

犀角 鎊　遠志 [illegible]　白鮮皮

石菖蒲　人參　甘草 炒各壹錢半

右為末每服五七分麥門冬煎湯調下

酸棗仁丸 見驚悸

〔附〕定志丸 見驚悸

寧心湯　治心血虛怯驚癎或驚悸怔忡盜汗無寐發熱煩躁

黃耆　白茯苓　茯神

半夏麴　當歸　川芎

辣桂　柏子仁　酸棗仁

五味子　人參 各叁錢　甘草 炒肆錢

右每服一二錢薑棗水煎

妙香散　治心氣不足驚癎或精神恍惚虛煩少寐盜汗等證

辰砂（一錢）　麝香（三錢）　木香（各半分）
茯苓　山藥　茯神
遠志　黃耆（各三錢）　桔梗
甘草　人參（各五錢）
右各另爲末每服一錢溫酒或白湯調服
治痰　半夏丸（方見驚搐）
星蘇散　治諸風口噤不語
天南星（一錢略炮）
右每服五七分薑四片紫蘇五葉水煎入雄豬膽
少許溫服

治癇方　治太陽陽明二經爲病
荆芥穗（肆兩）　白礬（半生半熟一兩爲細末）
右棗肉爲丸如桐子大每服二十丸荆芥湯下次
三十丸四十丸又次五十丸俱食前
礬丹
虢丹　白礬（各壹兩）
右丹磚鑿一窠可容二兩許先安丹在下次安礬
在上以炭五斤煅令炭盡取出細研以不經水豬
心血爲丸如菉豆大每服十丸至二十丸橘皮湯
下

元戎二白丸
白礬（壹塊約一兩）
右用生蒸餅剝裹蒸熟去皮可丸入輕粉壹字或
半錢量虛實加減丸桐子大每服一二三十丸生薑
湯下小兒丸小
硃砂滾涎散　治小兒五癇
硃砂　白礬（半生）　赤石脂
硝石（各等分）
右爲細末研蒜膏爲丸如菉豆大每服三十丸食
後荆芥湯下

琥珀壽星丸
天南星（壹觔掘坑用火煅坑紅出炭淨入好酒壹升在火穴中放入南星蓋穴勿令通氣過一宿取出焙末）　琥珀（肆兩）　硃砂（貳兩半爲衣）
右以豬心血打乾糊丸如桐子大每服五十丸煎
人參湯送下
南星五生丸
南星　半夏　川烏
白附子　大豆（去皮各一兩）
右爲細末滴水爲丸每服一丸至五丸不過七丸
薑湯下

斷癇丸　治小兒諸癇發作

皂角（貳尺各去皮捶碎以水壹升浸汁濾過砂器內熬成膏）

白礬（壹兩枯研細）　蝎梢（炒）　山蜘蛛（炒）

雄黃（另研）　硃砂（另研）　白附子（各半兩）

麝香（壹錢另研）　烏蛇（酒浸去皮骨取肉焙）

南星（薑汁製壹兩）　赤蜈蚣（炙去頭足）

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏搗為丸如梧

桐子大每服三五丸用生薑湯磨化不拘時服

定癇丸　治小兒五癇

赤脚蜈蚣（壹條酒浸炙去頭足）　蝎梢（炙去毒）

烏蛇肉（酒炙）　白附子（生）　大南星（末）

圓白半夏（末用薑汁和一宿）　熊膽

白礬（枯各貳錢半）

右為末稀麪糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服

二三丸用薄荷煎湯磨化不拘時服

治小兒驚癇

膽星（貳兩）　全蝎（去毒炒半兩）　白附子

殭蠶（炒）　川芎（各壹兩）　薄荷（半兩）

右為末粥丸青黛為衣每服一二丸

吐痰　碧雲丹

石綠（研細水飛）　附子尖　烏頭尖

蝎梢（各拾伍箇）

右為末入石綠令勻麪糊丸如雞頭每服用薄荷

汁半盞化下一丸良久以酒半合溫服之須臾吐出

痰涎然後隨證治之

下痰　控涎丸

川烏（生）　半夏（各半兩）　殭蠶（半兩生薑汁浸）

全蝎（去尖柒箇）　鐵粉（叁錢）　甘遂（生貳錢半）

右為末生薑自然汁或薄糊丸如菉豆大朱砂為

衣每服十五丸薑湯下忌甘草

治小兒癇用甘遂末壹錢豬心壹箇取三管頭血叄

條和甘遂末將豬心批作兩片入藥在內以線縛

定外濕紙包裹入文武火煨熟不可過度取藥細

研入辰砂末壹錢和勻分作四丸每服一丸豬心

湯化下再服另服豬心煎湯此方神效

下癇　水晶丹（方見驚癇）　四順飲

五和湯（方見驚癇）　利驚丸（方見驚癇）

紫霜丸（方見發熱）

當歸大黃湯　治小兒諸癇作熱利下心中惡血

大黃（濕紙裹煨）　甘草（炙）　當歸

赤芍藥[illegible]　半夏[illegible]　川芎[illegible]

右爲末每服一錢或二錢水八分鍾煎四分無時服

[illegible]百解散　大青膏[illegible]

驅風膏[illegible]

[illegible]劑[illegible]　四順湯

日生湯[illegible]　茯神湯[illegible]

元戎小靈寶丹

附子[illegible]　天麻　全蝎

白殭蠶[illegible]　藿香葉　南星[illegible]

白附子[illegible]

右爲末酒糊丸桐子大溫酒下一十五丸

類案[illegible]而治魏敬甫之子四歲從長老摩頂授記衆僧[illegible]而大恐遂發驚搐痰涎壅塞目多白睛項背強急喉中有聲一時許方醒後每見皂衣人輒發多服朱砂龍腦鎮墜之藥四十餘日前證猶在又添行步動作神思如癡予診其脈沉弦而急黃帝鍼經云心脈滿大癇瘛筋攣又云肝脈小急癇瘛筋攣蓋小兒血氣未定神氣尚弱因而驚恐神無所依又動於肝肝主筋故癇瘛筋攣病久氣弱小兒易爲虛實多服鎮墜寒涼之劑復損其氣故添動作如癡內經云

[illegible]癇眩足不任身取天柱穴是也天柱穴乃足太陽之脈所發陽蹻附而行也又云[illegible]癇瘛瘲不知所苦兩蹻主之男陽女陰潔古云晝發治陽蹻申脈夜發治陰蹻照海先各灸兩蹻各二七壯次處沉香天麻湯

沉香　益智　川烏[illegible]

天麻　防風　半夏[illegible]

附子[illegible]　羌活[illegible]　甘草[illegible]

當歸　薑屑[illegible]　獨活[illegible]

右㕮咀每服五錢生薑三片水煎溫服舉痛論云恐則氣下精怯而上焦閉又云從下上者引而去之以羌活獨活苦溫味之薄者陰中之陽引氣上行太陽之經爲引用故以爲君天麻防風辛溫以散之當歸甘草辛甘溫以補氣血之不足又養胃氣故以爲臣黑附子川烏頭益智仁大辛溫行陽退陰又治寒客傷胃腎主五液入脾爲涎以生薑半夏燥濕化痰十劑云重可去怯沉香辛溫體重氣清去怯安神故以爲使氣味相合升陽補胃恐怯之氣自利不矣

牛黃丸　治因驚中風五癇天釣客忤潮涎灌壅

白花蛇（酒浸去皮骨） 白附子 全蠍
真川烏（童便浸炮去皮） 天麻 薄荷葉（各半兩）
雄黄（各□錢） 辰砂（水飛□錢）
腦子（半錢） 牛黄（二錢） 麝香（壹錢）
右爲一處和勻麻黄去根以兩酒□升煎麻黄至一盞去麻黄用酒熬藥得所勿令焦赤衆手疾丸如芡實大瓷器盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯磨化大能發散驚邪

治五癇得效方

露蜂房（□） 石綠（各壹兩） 桂心

遠志（去心） 人參（各半兩） 硃砂（壹錢）
右爲末粥丸如桐子大每服二三十丸白湯下

斷癇丹 治癇瘥後復作連綿不除服之有驗

黄耆（蜜炙） 鈎藤鈎 細辛
甘草（炙各半兩） 蛇蛻皮（三寸酒炙） 蟬蛻（去土四箇）
牛黄（壹錢另研）
右爲末煮棗肉丸麻子大煎人參湯下每服數丸量兒加減

紫河車丸

紫河車即小兒胞衣肥厚者□□洗淨重湯蒸爛研化入人參當歸末和勻爲丸如芡實大每服五六丸乳汁化下

八味地黄丸（即六味丸加肉桂附子各一兩）治稟賦命門火衰不能生土以致脾土虚寒或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺經云益火之源以消陰翳蓋謂此也或乳母命門火衰兒飲其乳致前證者子母並宜服之

加減八味丸治稟賦腎陰不足或吐瀉久病津液虧損口乾作渴或口舌生瘡兩足發熱或痰氣上湧或手足厥冷等證（即地黄丸加肉桂壹兩五味子肆兩）

地黄丸治小兒肝經虚熱血燥或風客淫氣而患瘰癧結核或四肢發搐眼目抽動痰涎上湧又治腎疳腦熱肢體消瘦手足如冰寒熱往來滑泄肚脹口臭乾渴齒齦潰爛不□□□遍身或兩耳生瘡或耳內出水或發熱自汗盜汗便血諸血失音等證其功不能盡述（方見六味丸即六味地黄丸）

八珍湯治氣血俱虚陰火內熱或因尅伐之劑脾胃虧損肌肉消瘦等證（即四君子湯四物湯二方見虚勞）

十全大補湯治氣血虚弱或稟賦不足寒熱自汗食減體瘦發熱作渴頭痛眩暈最宜用之（方見虚勞）

灸法小兒癲癎驚風目眩灸神庭一穴七壯在鼻柱直上入髮際五分　小兒猪癎如尸厥吐清沫灸巨闕穴三壯在鳩尾下一寸陷中是穴　小兒雞癎善驚及掣目搖頭灸少陰二壯取法在足跟後兵腕半寸陷中是穴　小兒驚癎者先驚叫乃發也灸頂上旋毛中三壯及耳後青絡脈如小麥大　小兒驚癎灸鬼祿一穴三壯取法在上唇內中央弦上是穴　小兒食癎者先寒熱洒淅乃發也灸鳩尾穴上五分三壯　小兒牛癎目直視腹脹乃發也灸鳩尾一穴三壯取法胸蔽骨下五分陷中是穴　小兒馬癎張口

搖頭身折反馬鳴也灸僕參穴各三壯取法在足跟白肉際陷中拱取之是穴　小兒羊癎目瞪吐舌羊叫也灸第九椎下節間三五壯　按靈樞經云暴攣足不任身取天柱天柱穴足太陽也又云癲癎瘈瘲不知所苦兩蹻之下男陽女陰潔古云晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻各二壯陽蹻起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉照海穴也

不治證錢氏五癎重者死病後甚者亦死　小兒癎病目直無聲目視不轉眼生白障眼慢唇黑瞳人瞬動目閉青黑面青指黑口出涎沫如白膿口禁肚脹不乳喉如牽鋸之聲多睡不乳身熱下血不乳身體痿軟不醒腹內虛鳴唇逆而痛吐利不止汗出壯熱不止卧久不寤身體反張大人脊下容一手小兒脊下容一指並不治

中風

張渙等方有中風方論今見小兒絕無患者而用藥多犯香燥恐血熱生風類中風證誤用之則為害不淺故一切削而不載薛氏云中風之證西北方有之東南氣濕腠理疎泄人患之者皆類中風也況小兒元氣未充皮毛不固易虛易實外邪乘之則壯熱抽掣氣麤涎涌甚至昏憒口噤卽似中風悞以續命等湯投之多至不救大人且無眞中況小兒乎凡有前證當辨其因若陽明經氣虛風邪所乘筋脈拘急者

為外因足厥陰肝火熾盛筋脈偏急者為內因脾肺虛弱腠理不密外邪乘入或驚風過服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亡津液不能養肝致口眼喎斜者皆肝血不足肝火生風之類中風之類證也

角弓反張

【醫】肝有風甚則身反張強直不搐心不受熱當補腎治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸　【丹溪】云痓比癇為虛宜帶補多是氣虛有火兼痰用人參竹瀝治之不用兼風藥此論實發前人所未發湯氏雖云痓候十無一生蓋未嘗有此法施於人也　【薛】錢仲陽曰角弓反張者由風邪客於太陽經也經曰風從上受足太陽主周身之氣其脈起於目內眥而行於背肝屬木主風所以風邪易侵也夫小兒肌膚未密外邪易

傷肝為相火其怒易發若身反張強直發熱不搐者風傷太陽也宜用人參羌活散小續命湯若因暴怒而擊動其肝火者宜用瀉青丸若飲前劑其證益甚者此邪氣已去而脾氣虧也宜用異功散加芎歸補之若因肝經虛熱或因尅伐眞氣虛熱生風者宜用異功散地黃丸補之若因下而脾氣困憊腹肚膨脹者此中氣損也宜用白朮散補之若氣血素弱或服攻伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠者肝經虛甚也急用地黃丸以補之仍與肝臟參覽　一小兒忽腰背反張目上視面青赤曰青屬肝主風赤屬心主火此

風火相搏用柴胡梔子散倍加鈎藤鈎頓安而痰如舊又用抱龍丸而愈　一小兒忽腰背反張服治驚之藥後不時舉發面色黃白肢體甚倦余用五味異功散十餘劑而愈後因驚兼飲食不節不時舉發隨用前藥即愈遂日以參朮末每服五七分炮薑大棗煎湯調下服至二兩而不發巳上二證元氣虛而病氣實也若用攻邪之藥皆誤矣　一小兒素患前證痰盛面色素白而兼青余謂肺氣不能平肝肝氣乘脾脾氣虛而生痰耳先用抱龍丸二服以平肝隨用六君子湯以補脾肺月餘而痊半載之後復發謂非

逐痰不能全愈遂用下劑痰涎甚多而咽喉如鋸聲余曰乃脾不能攝涎也咽間鳴乃肺氣虛甚也遂用人參伍錢炮薑叁分水煎服而醒至第四劑後加棗貳枚人參服數兩而愈後每發非獨參湯不應若執常方鮮有不誤者

人參羌活散 方見驚搐　小續命湯 方見雜病中風
瀉青丸 方見肝臟　異功散 方見吐瀉
柴胡梔子散 方見積熱　抱龍丸 方見驚搐
六君子湯 方見吐瀉

【灸】角弓反張穿上入髮際二分灸三壯　大椎下節間灸三壯

【診】湯氏曰身軟時醒者為癇身強直反張如弓不時醒者為痙痓候十無一生

搖頭

【湯】肝風搖頭諸方不載鄭都丞子患七年搖頭三年下血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥無効予既觀其病又知其詳亦不明其標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木盛而脾土爲木所尅脾與肺是子母俱爲肝所勝而血遂漬於大便故便血不止遂處一方但損肝袪風而益脾初亦一時之見只數服而愈十餘日後血止而下白膿遂得以安

清肝益胃丸

犀角屑　甘草各壹分　瓜蔞根

黄耆蜜炙　羌活　白芍藥各半兩

蛇退皮炙赤　釣藤鈎　麻黄去節各壹錢

防風伍兩

右爲末蒸肉丸食後薄荷湯下只二服作效頭搖即止便血隨愈次間服胃風湯數日頓除沈舍人子服之亦驗

【薛】經曰諸風掉眩皆屬肝木木得風則搖動乃肝經火盛而生虛風也便血者風木搖動則土受凌虐而不能統血也或食酸味過多以益其脾致令陰結經曰結陰者便血一升再結二升三結三升又邪在五藏則陰脉不和陰脉不和則血留之結陰之病陰氣內結不得外行滲入腸間故使便血亦有乳母恚怒風熱熾盛或肝木傷脾使清氣不升或風邪侵入大腸者治法若因風熱用柴胡清肝散若因怒火用加味小柴胡湯若清氣不升脾氣下陷者用補中益氣湯若風邪侵於大腸者用清肝益胃丸肝經血熱妄行者用六味地黄丸脾土不能培肝木者用六君柴胡鈎藤鈎肝木勝脾土者用四君芍藥鈎藤鈎結陰者用平胃地榆湯

一小兒傷風咳嗽痰涌余謂脾虛肺弱腠理不密風邪外來用六君子湯加桔梗桑皮杏仁而愈後飲食停滯作瀉腹脹仍用六君子加山查厚朴而安又停食作瀉服消導之藥更加咳嗽余謂當調補脾土不信自用發表尅滯前證益甚更加搖頭余以天麻散倍加釣藤鈎及異功散而愈

一小兒項間結核面色痿黄肌體消瘦咬牙抽搐頭搖目劄此肝木尅脾土也用六君子湯及九味蘆薈丸頓愈

一小兒病後遇驚即痰甚咬牙抽搐搖頭作瀉各服鎮驚化痰等藥以致慢驚而卒

海食療云蚯蚓皮主大風邪明目治小兒一百二十
種驚癇寒熱痔𧏾毒安胎熱用　治癇弄舌搖頭者
宜用全蛻
余猶憶少時聞友人孫彭山云昔見姻家一小兒患
驚搐延專科治之諸證悉退而搖頭不止後一老醫
至於常服藥中加入紫河車即時愈按紫河車草名
神農本經名蚤休唐本名金線重樓錢氏方名白甘
遂芒治驚癇搖頭弄舌乃本經正文古人謂為白字
療病多効不虛也

偏風口噤

按小兒偏風者屬少陽厥陰肝膽二經證也噤者筋
急由風木太甚而乘於脾以勝水濕則筋太燥然燥
金主於收斂勁切故也又曰風之為病善行而數變
或左或右其因一也治須審而藥之若足陽明胃經
氣虛風邪所乘其筋脉偏急者屬外因若足厥陰肝
經風熱乘脾筋脉拘急者屬內因若脾肺虛弱腠理
不密外邪所乘或服金石之劑耗損肝血或吐瀉後
內亡津液不能養肝致口眼歪斜或半身不遂諸證

皆屬肝血不足肝火生風宜滋腎水養肝血壯脾土
治法脾胃虛而動風者異功散加柴胡鉤藤鉤脾肺
虛而外邪所乘者用鉤藤飲肝火血燥者用六味地
黃丸津液不足者用白术散老兼目緊上視寒熱往
來小便淋瀝面色青潔兩脇脹痛之類皆肝經之本
病也或唇口歪斜腹痛少食目胞浮腫面色青黃肢
體倦怠之類皆肝木乘脾之證也當審五藏相勝而
主之設執其見證槩投風藥反成壞證者有矣　一
小兒口眼喎斜面色或青或赤此肝心風火乘脾也
朝用柴胡清肝散夕用異功散加鉤藤鉤而愈其時

有患前證服祛風導痰之藥者皆不能起　一小兒
痢後患前證發搐面色痿黄肢體倦怠此元氣虛尅
伐多矣余用補中益氣湯加釣藤鈎子服而漸愈後
因乳母七情飲食失宜或兒乳食過多前證仍作服
補中益氣湯五味異功散而愈

全蝎散　治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正
手足偏廢不舉

全蝎去毒炒　殭蠶去絲嘴炒各　川芎
黄芩去心　甘草　桂枝
赤芍藥　麻黄去節各壹兩　天麻蒸熟

大南星湯泡去皮臍切焙乾伍錢

右爲麄末每服三錢水一鍾生薑七片煎七分温
服無時量大小與之一日三四服忌羊肉

胃風湯　治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注
下及腸胃濕毒下如豆汁或瘀血日夜無度

人參　白茯苓　芎藭
肉桂　當歸　白芍藥
白术各等分

右爲散每服二錢入粟米數粒同煎食前服

口噤失音 論見前中風條

硃砂丸　治小兒口眼喎斜筋脉牽引

硃砂研壹錢　全蝎炒　天麻
白附子炮　殭蠶炒去絲嘴　乾薑炮
牛黄各半錢　麝香壹分

右爲末粳米糊丸如黍米大每服一十丸用薄荷
湯不拘時化服

全蝎散　治小兒口眼喎斜語言不清

全蝎炒　川芎　黄芩

殭蠶炒去絲嘴　赤芍藥　甘草
硃砂　南星湯泡去臍焙　天麻各叁錢

右爲細末每服一錢用生薑湯不拘時調服

寬氣飲　治小兒風痰壅滿風傷於氣不能言語

枳殼去瓤麩炒壹兩　人參去蘆伍錢　天麻
殭蠶炒去嘴　羌活　甘草炙各叁錢

右剉碎每服二錢用水一盞生薑三片煎五分不
拘時服

木通湯　治小兒血滯於心心竅不通語言不出

木通　石菖蒲各等分　防風

枳殼　全蝎　殭蠶（炒）
甘草　木香　南星（炮各等分）
右剉碎每服二錢用水一盞豬心三片生薑一片
紫蘇五葉煎至五分不拘時服

天釣 內釣附

天釣亦驚風之證但天釣發時頭目仰視驚風則無也

湯氏　小兒痰癎不定翻眼搐搦狀若神祟頭目仰視名為天釣凡有此疾宜服蘇合香丸灸兩手大拇指兩甲肉相半男先灸左女先灸右及兩足大拇指中間各三五壯又灸前後手心各五壯此皆得効之法

九龍控涎散　治天釣
赤脚蜈蚣（酒塗炙壹條）　滴乳
天竺黃（二味另研各壹錢）　臘茶
雄黃（另研）　甘草（炙各貳錢）　荊芥穗（炒）
白礬（枯各壹錢）　菉豆（壹百粒半生半炒）
右為末每服半錢人參薄荷湯調下

釣藤飲　治天釣潮熱
釣藤　人參　犀角屑（各半兩）
全蝎　天麻（各貳錢）　甘草（半分）
右為末每服一錢水煎服

湯氏　張渙　小兒心膈壅滯邪熱痰涎蘊積不得宣通或乳母飲酒食肉煩毒之氣流入乳中令兒宿滯不消邪熱

毒氣乘於心神致使驚悸眼目翻騰壯熱不休四肢瘈瘲其病名曰天釣甚者爪甲皆青狀如神祟今集經効名方治之於後

一字散 醒風爽精神

天南星(半兩炮) 蟬殼(去足) 乾蝎

白殭蠶(各壹分)

右件擣羅爲細末次入蕎麥麪半分用醋石榴殼壹枚將諸藥入在石榴殼內以鹽泥封裹於爐下慢火上燒之泥乾燥爲度取出再研勻每服壹字溫酒調下

雙金散 治天釣驚風目久不下

蜈蚣(壹條去頭足尾用真酥塗慢火炙黃置砧子上面南立用竹刀子當脊中停劈作兩半箇左邊者入一帖子內寫左字右邊者亦入一帖子內寫右字不得交錯大慎矣)

麝香(壹錢細研先將左邊者研於乳鉢內研細末却入在左字帖內收起別用乳鉢將右邊字者入麝香同研細却入右字帖內收不得相犯每有病者眼睛約止見白睛兼角弓反張更不能出聲者)

右用細葦筒子取左字貼內藥少許吹在左邊鼻裏右亦如之用藥不可多若眼未全下更添些小以意量度其眼隨手便下即止

牛黃散 清心截風

牛黃(壹分研) 硃砂(半兩研) 麝香

天竺黃(研) 蝎梢 釣藤(各壹分爲末)

右件一處研勻每服半字新汲水調下

白銀丹 治驚風涎潮

天南星 全蝎 麝香 水銀

右都和勻入石臼內擣一二百下如黍米大每服五粒至七粒薄荷湯下

抵聖丹 治驚風胸膈不利乳食不下

錫恡脂(壹兩細研水飛去黑水令盡) 牛黃(研)

鉛霜(細研) 熊膽(各壹分研) 麝香(半分研)

蟾酥(研壹錢)

右件通研勻粳米飯和如黍米大每服五粒至七粒新汲水下

薛氏法

薛天釣者發時頭目仰視驚悸壯熱兩目反張淚出不流手足搐掣不時悲笑如鬼祟所附甚者爪甲皆青蓋因乳母厚味積毒在胃致兒心肺生熱痰鬱滯或外挾風邪爲患法當解利其邪用釣藤飲止氣喘

驚若用烏蝎四君子湯内鈎若腹痛多喘唇黑囊腫偃僂反張眼尾赤此胎中受風及外驚所致若内藏抽掣作痛狂叫或泄瀉縮脚内證一作外證亦然極難調理内證服聚寶丹外證服鈎藤飲進乳食者可治若腹痛唇黑囊腫之類用聚寶丹若外證内藏抽搐之類用鈎藤飲若因乳母膏粱積毒在胃用加味清胃散若因乳母鬱怒積熱在肝用加味逍遥散加味歸脾湯俱加漏蘆子母俱服凡母食膏粱厚味飼兒之時先擠去宿乳然後吮之　一小兒因乳母受驚發搐時目赤壯熱腹痛哭而曲腰用四物加

柴胡防風又用加味逍遥散加熟地黄以清肝熱生肝血再用地黄丸滋腎水以生肝木母子俱安　一小兒曲腰而啼面青唇黑此寒氣所乘内鈎腹痛也用五味異功散加木香乾薑一劑與母服之頓愈後因母感寒腹痛而啼用人參理中湯一劑與母服其子亦安　一小兒曲腰乾啼手足並冷用六君加乾薑木香服之未應又加肉桂母子俱服而愈　一小兒忽乾啼作瀉睡中搐手足冷此脾土虚寒肝木侮之而作發搐乃内鈎也用益黄散一劑而安用四君加柴胡升麻乳食漸進而安　一小兒乾啼面青或赤手足並熱或用清熱之劑久不愈診其乳母有肝火氣滯用加味逍遥散及越鞠丸以治其母時灌子數滴不旬日子母並愈　一小兒患前證服藿香散而愈後復作服祛風鎮驚之藥上氣喘粗此元氣虚寒也余先用烏蝎四君子湯稍愈但倦怠殊甚用補中益氣湯及五味異功散而痊　一小兒因母感寒腹痛飲燒酒發熱痰盛面赤手足並熱屬胃經實熱之天鈎也用清胃散子母服之並愈後因傷乳吐瀉面色或青或白手足並冷屬脾氣虚寒用六君木香乾薑而愈三歲後傷食腹痛唇黑作瀉數去後而

無糞或糞少而青此氣虚寒下陷用補中益氣湯漸愈　一小兒啼哭陰囊腫大眼目上翻赤脉流淚此肝熱内鈎用柴胡清肝散加鈎藤鈎治之諸證漸愈又用鈎藤飲而痊後復發或用祛病根之藥致乳食日少肚中脹痛手足浮腫余先用六君升麻柴胡數劑諸證稍愈又傷乳食吐瀉用平胃散一服即愈　一小兒因乳母懷抱鬱結腹痛發搐久而不愈用加味歸脾湯加漏蘆母子並服漸愈又母大怒發厥而涎兒遂食乳腹痛作瀉面青作嘔先用小柴胡湯二劑母子並服少愈其母又煎炒腹脹用越鞠丸加味

歸肝湯佐以加味逍遙散而疥

鈎藤膏　魏香散二方並見腹痛

鈎藤飲　治小兒臟寒夜啼陰極發躁此方主之

鈎藤　茯神　茯苓

川芎　當歸　木香

甘草　芍藥炒各

右為末每服一錢薑棗水煎若心經熱臉紅舌白小便赤澀用鈎藤飲去木香加硃砂末壹錢木通湯下

鈎藤飲　治天鈎風搐

鈎藤　犀角　天麻各半分

全蝎五箇　木香　甘草各五分

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

鈎藤飲子　治驚風天鈎卒然驚悸眼目翻騰

鈎藤炒分　麻黃去節　甘草炙各參分

天麻　川芎　防風

人參各半分　全蝎炒去毒　殭蠶炒各半分

右作一服水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

乳香丸　治驚風內釣腹痛驚啼

乳香半錢　沒藥　沉香各壹錢

蝎梢炒壹錢　雞心檳榔半壹錢

右為末蜜丸桐子大每服二三錢菖蒲鈎藤鈎煎湯下

木香丸　治同前

木香　全蝎各五分　沒藥

藿香　鈎藤鈎各壹錢

右各別為末以大蒜研爛和丸桐子大曬乾每服二丸鈎藤煎湯下

牛黃丸　治小兒一切驚風五癇天鈎客忤痰涎四肢抽掣

白花蛇酒浸取肉　白附子　全蝎

川烏生用壹隻重半兩去皮臍　天麻

薄荷葉各半兩已上為細末入　雄黃另研

辰砂參錢　牛黃壹錢　麝香

片腦另研各半錢

右件為細末一處和勻麻黃去節貳兩酒一升煎麻黃至一盞去麻黃用酒入蜜少許熬成膏和前藥末為丸如芡實大用金箔為衣每服一丸用薄荷湯化下大能發散風邪

天[illegible]膏　治天鈎風搐急

烏頭去皮　芸薹子各錢
右為末每用壹錢新汲水調敷兒頂上
天漿子散　治小兒天釣驚風
天漿子炙　蝎梢　犀角屑
丹砂另研　雄黃另研　附子炮去皮
南星炮去皮　白附子　半夏
水銀另研　乳香另研　白殭蠶
膩粉另研　牛黃各壹錢另研　麝香壹字另研
銀箔伍片另研
右為細末和勻每服壹字用薄荷湯調下量兒大
小加減服

青黛丸　治小兒天釣客忤五疳八痢十二種驚癇
青黛　天竺黃　乾蝦蟆壹箇黃泥包裹燒
蜓赤去泥　乾蝸牛殼　黃連
人參　地龍去土　鈎藤炒
龍腦各貳錢半　蘆薈　熊膽各半兩
牛黃　麝香　雄黃
丹砂各壹錢　夜明沙淨去土　胡黃連各參錢
右為細末蒸餅糊為丸如麻子大一歲三丸空心
米飲湯送下

再生散　治小兒天釣驚風潮搐項筋緊強手足厥
冷
烏蛇酒浸取肉　天麻　南星炮去皮
全蝎微炒去毒各貳錢半　麝香　膩粉各伍分
丹砂另研　牛黃另研　白附子炮各壹錢
右為細末和勻每服半錢煎金銀薄荷湯調下量
兒大小加減服
三白散　治小兒盤腸氣釣先服此藥後服鈎藤膏
白牽牛炒壹兩　白朮　桑白皮
陳皮　木通各參錢
右為細末每服半錢用小蔥湯調不拘時服
廣利方治搐迷悶不仰視牛黃大豆許和蜜水調

拘攣

續命湯　治小兒手足拘攣不能屈伸

麻黃　人參　黃芩

川芎　芍藥　甘草炙

防風　杏仁去皮尖麩炒　官桂去皮

防己　附子炮去皮臍各等分

右剉碎每服二錢水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

退風散　治小兒感冒發熱手足拘攣

人參　茯苓　防風

川芎　柴胡　羗活

枳殼　桔梗　甘草各等分

右剉碎每服二錢水一鍾生薑三片煎至五分不拘時服

手拳不展

張渙云小兒所受肝氣怯弱致筋脉攣縮兩手伸展無力薏苡仁丹主之

薏苡丹　治手拳不展

薏苡仁湯浸去皮　當歸洗焙　秦艽去苗

防風　酸棗仁炒　羗活各等分

右為細末煉蜜和如芡實大每服壹粒至貳粒麝香荊芥湯化下不拘時候

聖惠方兒在胞母藏府虛為風冷所乘兒生肝氣不足致筋脉攣縮不得伸展故手拳不展薏苡仁散方前就此加減以其平和故刪於當

薏苡仁各三分　秦艽　防風

酸棗仁微炒　甘草炙微赤各半兩　當歸焙

桂心各貳錢半

為散每壹錢水壹小盞煎五分不計時候量兒加減

羚羊角散　治兒手不展是風邪滯氣所客令榮衛不通

羚羊角　羗活　五加皮

白蘚皮　桂心各貳錢半　麻黃去根節半兩

甘草炙微赤壹錢貳分半

為散每服壹錢水壹小鍾煎伍分量兒加減不計時溫服

脚拳不展

張渙云緑禀受腎氣不足者氣血未榮脚指拳縮無

力不能伸展海桐皮散主之

海桐皮散　治脚拳不展

海桐皮　當歸洗焙　牡丹皮

熟地黃　牛膝酒浸焙各壹兩　山茱萸

補骨脂各半兩

右為細末每服壹錢水捌分入葱白貳寸煎至伍分去滓溫服食前

聖惠兒在胞母藏府有積冷為風邪所乘生後腎氣不足氣血未榮故脚指拳縮不展宜當歸散

當歸焙　麻黃去根節各半兩　羌活

酸棗仁微炒　人參　杜仲微炙

桂心各貳錢半

右為細末每服壹錢水壹小盞薑少許煎伍分量兒大小乳前分減服

乾地黃丸

生地黃　郁李仁湯浸去皮尖微炒各半兩

牛膝　防風　桂心

海桐皮　羌活　白茯苓

薏苡仁各貳錢半

右為末蜜丸如菉豆乳前溫酒下七丸量兒加減

汗亦不可針灸鍼灸湯藥宜損用

驚癱鶴膝

曾氏曰肝者東方青龍木也其動則應於風病則主驚駭諸熱引肝風有風則生痰有痰亦作搐小兒驚風之際手足動掣當聽其自定然後療之免生異證或父母見其病勢可畏從而按伏之豈知筋者肝之合也臨病發時若按束其手足則筋不舒伸遂至經絡為風所閉終為廢人內經曰頭弱名緩風疼重名濕痺又有四肢痿痺不仁致手足稍脹痛不堪忍者此風毒之氣使然故傳曰風淫末疾是也凡小兒心悸不常及遍身腫痛或手足不隨此為驚癱候也若治之稍遲至臂腕膝脛骨節之間流結頑核或膝大而腫肉消骨露如鶴膝之狀或為攣為痿此名鶴膝候也已上形證并宜發汗為先使腠理開通則風熱可除有濕亦去用百解散和㕮咀五苓散倍加麻黃水薑葱煎服微得汗為度或以麻黃湯發散尤佳次防己湯袪風散及獨活湯加桑寄生投服并防風湯或黑虎丹作小丸子間服使風不生而痰不作則其疾易愈若為癱為瘓疼重者用黑牽牛半生半炒略研碎煎無灰酒調下五苓散以除流注之寒濕則腫毒可

消如大腑閉而不通此是風熱内熾其右腮紅紫及右手三部脉浮而實滑宜五和湯或當歸散枳殼丸治之其加減之法尤在臨機審處若泥一方非良醫也前證更宜間服排風湯

鶴膝風者其腿漸細其膝愈粗狀如鶴膝是以名之此因稟腎經不足外邪所乘而患之初則膝内作痛外色不變伸屈艱難若一二月間焮腫色赤而作膿者可治腫硬色白而不作膿者難治初起者用大防風湯為主佐以益氣養榮湯膿成者用補中益氣湯為主佐以大防風湯切勿用十宣流氣等藥若不潰不斂或發熱等證者須調補脾胃為善否則必變敗證矣

大防風湯　治鶴膝風腫痛不消或潰而不斂

附子炮　牛膝酒炒各壹錢　白术

羌活　人參　防風各貳錢

杜仲去皮薑製　川芎　肉桂去皮

黄耆炒　熟地黄自製　芍藥炒各壹錢伍分

甘草壹錢

右每服三五錢水煎仍量兒大小用之

獨活寄生湯

獨活　桑寄生　杜仲炒

細辛　牛膝酒炒　秦艽

茯苓　白芍藥炒　桂心

川芎　防風　甘草

人參　熟地黄　當歸各等分

右每服二三錢水煎空心乳母同服

益氣養榮湯方見[illegible]　百解散方見[illegible]

五苓散方見[illegible]　麻黄湯傷寒

防巳湯　治感冒風濕之氣失於解表流注兩足疼痛至兩膝浮腫不能屈伸傳成癱瘓

防巳去黑皮　麻黄去節存根功全表裏沸湯泡去沫焙乾用

薄桂去麤皮各半兩　赤芍藥　赤茯苓去皮

蒼术米泔水浸一宿去麤皮剉片火炒至微黄各壹兩　甘草炙錢半

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分空心熱服或入薤白同煎

祛風散　治卒暴中風不能言全口眼㖞斜驚癱搐掣痰實煩躁神昏有熱睡卧不穩

防風去蘆　南星生用　甘草生用

半夏製　黄芩酒炒各壹錢

右碎每服二錢水一盞薑三片煎八分七分不

拘時溫服

獨活湯　治驚癱鶴膝及中風濕日久致腰背手足疼痛晝輕夜重及四肢痿痹不仁

川獨活（黃色如鬼眼者佳半兩）　當歸（酒洗）

白朮　黃耆（蜜水炙）　薄桂（去皮）

川牛膝（酒洗各貳錢半）　甘草（炙叁錢）

右件㕮咀每服二錢水一盞薑二片葱白一根煎七分空心熱服或無時

防風湯（見驚）

黑虎丹　治諸般風證

草烏（去黑皮壹兩生用）　川烏（去黑皮生用）　甘草（各半兩）

麻黃（不去根節）　甘松　熟乾地黃（焙）

藿香葉　白芷　油煙墨（燒存性）

豬牙皂莢　川芎　當歸

何首烏　南星（生用）　殭蠶（去絲）

赤小豆　羌活　白膠香

木鱉子（去殼各半兩）

右件剉碎或焙或曬研為細末糯米粉煮糊丸麻仁大每服三十丸至五十丸或七十丸稍空心用淡薑湯下兒小者丸作粟穀大治法如前

五和湯（方見）　當歸散

枳殼丸（見大便）

排風湯　治中風狂言失音不語精神昏困驚癱鶴膝等證及癱瘓幾愈後偶然外風滿面遍體虛浮並宜可服

白鮮皮　白朮　白芍藥

薄桂（去皮）　防風（去蘆）　川芎

當歸　杏仁　甘草

川獨活　麻黃（去根）　白茯苓（各）

右每服二錢水一盞薑二片煎七分無時溫服

眼目

【薛】經曰目者五藏六府之精榮衛魂魄之所常營也神氣之所常生也又曰諸脉者皆屬於目目得血而能視五藏六府精氣皆上注於目而為之精故白睛屬肺黑睛屬肝瞳人屬腎上下胞屬脾兩眥屬心而內眥又屬膀胱五藏五色各有所司心主赤赤甚心實熱也用導赤散赤微者心虛熱也用生犀散肝主青青甚者肝熱也用瀉青丸淡青者肝虛也用地黃丸脾主黃黃甚者脾熱也用瀉黃散淡黃者脾虛也

用異功散目無睛光及白睛多黑睛少者肝腎俱不足也用地黃丸加鹿茸晝視通明夜視罔見者因稟賦氣衰弱遇夜陰盛則陽愈衰故不能視也用冲和養胃湯凡赤脉翳物從上而下者屬足太陽經用東垣選奇湯從下而上者屬足陽明經用局方流氣飲蓋翳膜者風熱內蘊也邪氣未定謂之熱翳而浮於外邪氣已定謂之冰翳而沉於內邪氣既深謂之陷翳宜升發之退翳之藥佐之若上眼皮下出黑白翳者屬太陽寒水從外至內者屬少陽風熱從下至上綠色者屬足陽明及肺腎合病也肝眼者因肝火濕熱上衝脾氣不能上升清氣故生白翳睫閉不開眵淚如糊久而脹流遂至損目用益氣聰明湯茯苓瀉濕湯及四味肥兒丸目閉不開者因乳食失節或過服寒涼之藥使陽氣下陷不能升舉故目不開用柴胡復生湯若陽氣虧損眼睫無力而不能開者用補中益氣湯若赤腫痛者肝火熾盛也用龍膽瀉肝湯多淚羞明者肝心積熱也用生犀散亦有肝腎虛熱者用地黃丸風沿爛眼者脾有積熱也用清胃散若時作痒者濕熱生蟲也用點礬紫蘇膏眼睫連劄者肝經風熱也用柴胡清肝散若生下目黃壯熱

大小便秘結乳食不思面赤眼閉者皆由在胎時感母熱毒所致兒服瀉黃散母服地黃丸若乳母膏粱積熱致兒目黃者令母服清胃散若肢體面目爪甲皆黃小便如屋塵色者難治又有痘疹後餘毒未盡上侵於目者屬腎肝虛也用滋陰腎氣丸前證多宜審治其母兼調其兒

初生眼不開

胎赤 見初生門

目赤腫痛 曾熱極挾風則目赤腫痛晝夜不開驚啼不已先用九仙散木賊煎湯服大 解散擂米泔水

調下及點以黃連膏　若大天行時浮紫赤腫痛貫
夜苦甚久則昏曚治法先以九仙散解表次以小柴
胡湯去半夏加大黃薄荷竹葉生地黃木通服併投
草龍膽散及點以黃連膏貼以清涼膏　有孩兒胃
氣素虛脾氣實盛眼胞赤腫羞澁不開遂投苦寒之
劑以退赤腫反傷脾胃不可則瀉或四肢微冷後以
温藥調治則目疾轉加宜先用吹明丸合散木賊燈
心煎服次投瀉黃散自愈　有心脾蘊熱經久及肝
受邪熱致兩目羞明眼胞浮腫微有紫色大腑閉或
流利小便澁或通順先以百解散發表次投明目飲

自然平復仍忌酒葷三五日　有小兒薄劣多致塵
埃塵入目搭摩成腫發熱作痛啼哭不已宜用辟塵
膏治之立效

瀉導赤散　治心熱小便赤眼目赤腫

赤芍藥　羌活　防風各半兩
大黃　甘草各二錢

右爲末燈心黑豆同煎食後服
余平生無赤眼之患用之如神大人小兒可通用凡
眼赤澁之初只用自己小便承出用一指接抹
眼中便閉目少頃即淚化以洗風道去邪熱也

膏治小兒赤熱腫眼

大黃　白礬各等分

右爲末同冷水調作膏子貼眼立効

小防風湯　治小兒熱毒眼患

大黃蒸　山梔子　甘草炙
赤芍藥　川當歸　防風
羌活各等分

右判碎每服五錢水一盞煎至五分食後服

小流氣飲　治小兒風毒眼患

蟬蛻去足　甘草　羌活

天麻　川當歸　防風
大黃　薄荷　赤芍藥
杏仁各等分

右判碎每服五錢水一盞煎至五分食後服

小菊花膏　治小兒積毒眼患

黃連　黃芩　大黃
菊花　羌活　蒼术米泔浸
荊芥穗　防風

右各等分爲末煉蜜和膏如小指頂大每服一餅
細嚼白湯嚥下不拘時服

通頂散 治眼疾赤熱翳膜作楚
瓜蒂 藜蘆各半錢 皂角肉半錢
麝香少許
右為細末研勻每少許吹入鼻中
九仙散 解諸目疾不拘歲月並宜先服
柴胡去蘆 蒼朮米泔浸一宿
赤芍藥 荊芥 甘草各半兩
麻黃去節 川芎 薄荷各半兩
旋復花去老梗
右㕮咀每服二錢水一盞薑二片葱一根煎七分不

拘時溫服
三解散一名寧公湯 主上焦蘊熱傷風面紅目赤狂躁
氣急渴水驚啼煩悶丹毒口瘡痰嗽搐掣
人參去蘆 防風去蘆 天麻
茯神去皮木 鬱金 白附子
大黃半生各貳錢 赤芍藥 黃芩
僵蠶各伍錢 全蠍 枳殼各伍錢
粉草叁錢
右焙為末每服半錢至一錢用溫荷湯無時調下
或燈心湯

草龍膽散 治暴赤火眼晝夜澀痛作腫淚多
草龍膽 木賊去節 荊芥
菊花 防風去蘆 草決明半生半炒
甘草
右剉每服二錢水一盞煎七分無時溫服痛甚加
羌活乳香同煎
明目飲 治心脾蘊熱肝受風邪致兩目羞明經久
不瘉
山梔仁 淨香附 夏枯草去梗各半兩
右剉每服二錢水一盞蜜一匙煎七分無時溫服

金波散 治時行赤眼腫痛成翳有熱多淚
淨黃連壹兩 硼砂 寒水石
大黃各貳錢 海螵蛸 銅青各壹錢
玄明粉半兩 全蠍 麝香壹字
右除玄明粉麝香餘七味剉曬為末仍入玄明粉
麝香乳鉢內同前藥末杵勻每用一字至半錢溫
淨湯或涼水調化澄清去滓無時頻洗有風夾蟲
作痒入輕粉取効仍忌酒煮三五日
黃連膏 治時行火眼腫澀痛晝夜煩啼

右件細剉雞子一枚敲破札開一頭大處取清入
瓷盛入黃連和勻攤一時見黃色以絹濾過成膏
患者仰面卧外令人挑一字許點目內覺口中
有苦味滿舌上藥之驗也之療餘毒攻眼眵多有
熱用之驗

清凉膏　治暴赤火眼腫痛及血瘀作疼發熱・

大黃　淨黃連　黃蘗
赤葛　細辛去葉　薄荷葉
風化朴硝去淡豆豉

右前六味或晒或焙爲末臨入朴硝乳鉢内同杵

勻每用一錢至二錢冷水加薑汁調塗太陽或新汲井水調妙熱瓣以凉米湯水調搽患處

辟塵膏　治小兒塵埃入目揩成肺熱作痛啼哭不已　治以油烟細墨新汲井水濃磨入玄明粉半錢和勻爲膏用筆多點目內三五次即効仍忌飲酒一晝宵

速効飲　治長成小兒因他物或跌着觸損兩目血脹腫痛

荊芥穗　薄荷葉炒　草決明微炒各

甘草各等分

右爲麁末和半生半炒芝麻等分抄二錢掌中盛乾嚼之味盡吐去如此法投二五次即効

[illegible]一小兒目赤作痛咬牙寒熱余以爲肝經風熱用柴胡飲子一劑而赤痛　又用四物加白朮柴胡而寒熱退又用補中益氣湯而愈後加　一小兒眼素白或青患眼赤作痛服降火之劑眼如血貫脈洪大或浮按之皆微細用十全大補湯加柴胡山梔數劑赤瞇漸退而脈漸斂又數劑而愈　一小兒患眼赤痛服大黃之藥更加寒熱如瘧余謂脾胃復傷用

四君升麻柴胡炮薑鈎藤鉤而寒熱愈又用補中益氣湯間服而目疾痊　一小兒目痛恪服瀉火治肝之藥反加羞明隱澀睡中驚悸悲啼此肝經血虛火動傷肺也用五味異功散加山梔補脾肺清肺金用地黃丸滋腎水生肝血而安仍兼服四味肥兒丸而痊

龍膽瀉肝湯方見脚　小柴胡飲方見心

生熟地黃散　治眼初患之時因撲築刺或肝受驚風後目腫赤痛痒

生地黃　熟地黃各[illegible]　麥門冬去心

當歸　枳殼(麩炒)　甘草(炙)

防風　杏仁(湯泡去皮尖炒)　赤芍藥(各貳錢半)

右每服一錢煎以七分水煎服

犀角飲　治脾火眼疼

犀角(壹兩錢)　射干　草龍膽(炒)

黃芩(炒各伍錢)　人參(貳兩)　茯苓(貳錢伍分)

鈎藤鈎(柒錢)　甘草(伍錢炙)　右每服一錢水煎

東垣廣大重明湯　治兩瞼或兩眥赤爛熱腫疼痛及眼胞痒極抓之至破爛赤腫眼楞生瘡痂目多眵淚隱澀難開

草龍膽　防風　生甘草根

細辛苗葉(各壹錢)

右用水一椀半煎龍膽至七分入餘藥再煎至半碗熱洗日五七次洗畢合眼須臾瘥

東垣助陽和血補氣湯　治發後熱壅白睛紅多眵淚隱澀此過服涼藥而眞氣不能通九竅也

防風(柒分)　黃芪(壹錢)　蔓荊子

白芷(各貳分)　升麻(柒分)　炙甘草

柴胡　當歸身(酒洗各伍分)

水壹鍾煎至半鍾[illegible]服

潔古方　治眼赤暴發腫

防風　羌活　黃芩(炒)

黃連(炒各等分)

右剉每服一錢水煎如大便秘加大黃([illegible])痛甚加川當歸地黃(各分)煩躁不得眠加梔子仁(叁分)

保命點眼藥　除昏退翳截赤定痛

當歸　黃連(各貳錢)　防風(貳錢伍分)

細辛(伍分)　甘草(壹錢)

右水一大碗文武火熬滴水中不散爲度入熟蜜少許點用

[illegible]劑復生湯　治紅赤羞明淚多眵少腦頂沉重睛珠痛應太陽眼睫無力常欲垂閉久視則酸疼翳陷者

藁本　蔓荊子　川芎

羌活　獨活　白芷(各貳分半)

白芍藥(炒)　炙甘草　薄荷

桔梗(各肆分)　蒼朮　茯苓

黃芩(炒各伍分)　柴胡(陸分)　五味子(拾貳粒杵)

右每服二錢水煎食後服

[illegible]連羊肝丸　治目中[illegible]

黃連隨多少　白羊肝一具
先以竹刀將羊肝刮下如糊除去筋膜再擂細入
黃連末丸桐子大每服五十丸茶湯送下
【外障】小兒病目生翳不可輕用點藥只以服藥內消
爲主看赤脉上下內外分經處治已見雜病第七卷
及前薛氏總論茲不復錄　【薛】一女子年十四因恚
怒先月經不行寒熱脇痛後兩目生翳青綠色從外
至內余謂寒熱脇痛足厥陰之症也翳從外眥起足
少陽之症也左關脉弦數按之而濇肝經風熱兼血
滯也遂以加味逍遙散加防風龍膽草四服而寒熱

脇痛頓減用六味丸月餘而翳消　一小兒十五歲
兩目白翳腹膨遍身似疥非疥晡熱口乾形體骨立
此肝疳之症也用六味肥兒丸而痊後陰莖作痒小
便澄白瘡疥益甚狀如大風用大蘆薈四味肥兒丸
諸症漸愈又用大蕪荑湯而痊　一小兒九歲素有
肝火兩目生翳服蘆薈肥兒等丸隨愈至十四歲後
遇用心過度飲食不節即夜視不明用補中益氣湯
人參補胃湯四味肥兒丸而愈　一小兒眼每生翳
皆因乳母恚怒而作用九味蘆薈丸柴胡梔子散母
子並服而愈　一小兒乳哺失節服藥過劑腹脹少

食大便不調兩眼生花服治眼之藥漸生浮翳余用
異功散加當歸柴胡飲食漸進便利漸調少佐以九
味蘆薈丸其眼漸明乃用人參補胃湯肥兒丸而痊
一小兒十二歲傷寒咳嗽發熱服發散之藥目漸
不明服降火等藥飲食日少眼中生翳余謂中氣虛
用人參補胃湯飲食[illegible]又用千金補肝丸及熏眼
之法而痊　一女子十二歲目生白翳面黃浮腫口
乾便泄用四味肥兒丸而痊

本事方　治太陽寒水陷翳膜遮睛

防風　白蒺藜(各壹兩)　羌活(壹兩半)

甘菊花(叁兩)

右爲末每服二錢入鹽少許百沸湯點服

保命羚羊角散　治冰翳久不去

羚羊角(鎊)　升麻　細辛(各等分)

甘草(減半)

右爲末一半煉蜜丸桐子大每服五七十丸一半
泔水煎吞送丸子嫩發陷翳亦依羊角散之類用
之在人消息若陰虛有熱者兼服神仙退雲丸

東垣補陽湯　治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅
不通今青白翳見於大眥乃足太陽少陰經中鬱

遏厥陰肝經之陽氣不得上通於目故青翳內障
也當於太陽少陰經中足九泉之下以益肝中陽
氣衝天上行此乃先補其陽後於足太陰標中瀉
足厥陰之火下伏於陽中內經曰陰盛陽虛則當
先補其陽後瀉其陰每日空心服升陽湯臨臥服
瀉陰丸須預期調養體氣和平天氣晴明服之補
其陽使上升通於肝經之末利空竅於目矣
羌活　獨活　當歸身酒洗焙乾各一
甘草梢　熟地黃　人參
黃芪　白朮各壹兩　澤瀉

橘紅各半兩　生地黃炒　白茯苓
知母炒黃色各叁錢　柴胡貳兩　防風
白芍藥各伍錢　肉桂去皮[illegible]錢
右每服五錢水煎空心服候藥力行盡方可飲食
東垣羌活退翳湯
柴胡　甘草　黃芪各叁錢
羌活　黃連　五味子
升麻　當歸身各貳錢　防風伍分
黃芩　黃蘗酒浸各一[illegible]　芍藥
草龍膽酒洗各[illegible]貳錢

右分二服水煎入酒少許臨臥熱服忌言語
叢甫五秀重明丸　治眼翳膜遮睛隱澀昏花常服
清利頭目
甘菊花伍佰朵　荊芥伍佰穗　木賊去節伍百根
楮實伍百枚
右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸白湯送下
鎮肝散　去痰熱退翳
胡黃連　梔子仁各壹兩　甘草微炙
馬牙硝　青葙子各半兩　以上[illegible]
真珠末研　牛黃研各壹分[illegible]
右件都拌勻細研每服壹錢水八分入荊芥[illegible]
各少許煎四分去滓溫服食後
泉石散　治眼疳邪熱攻於眼目漸生障翳致損
睛瞳
井泉石壹兩　石決明　甘菊花
夜明沙微炒　黃連去鬚　晚蠶沙微炒各半兩
右件搗羅為細末每服壹錢用米泔壹盞入生豬
肝少許煎五分肝爛為度放溫時時服乳食後
羅氏煮肝散　治小兒疳眼翳膜羞明不見服十日
必退如大人[illegible]一服效

夜明沙　青蛤粉　穀精草各壹兩

右件為細末每服壹錢五七歲已上貳錢豬肝一大片批開摻藥在內攤匀麻線纏定以米泔半碗煮肝熟取出肝湯傾碗內熏眼分肝作三服嚼訖卻用肝湯下一日三服不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如患多時日二服

龍膽飲子　治疳眼流膿生疳翳濕熱為病神効不治寒濕為病者

青蛤粉　蛇蛻皮　穀精草各半兩

羌活　草龍膽各叁錢　麻黃貳錢半

黃芩炒　升麻各貳錢　鬱金

甘草炙各半錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

灸雀目疳眼法　小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際各一壯炷如小麥大

小兒疳眼灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間陷中

內障　東垣人參補胃湯　治勞役飲食不節內障眼痛神効

黃芪　人參各壹兩　炙甘草捌錢

蔓荊子　白芍藥　黃蘗酒炒各叁錢

右每服二三錢水煎稍熱服臨卧三五服

沖和養胃湯　治內障初起視覺微昏空中有黑花神水變淡綠色次則視岐覩一成二神水變淡白色久則不覩神水變純白色

柴胡柒錢　人參　當歸

炙甘草　乾生薑　升麻

葛根　白朮　羌活各壹兩

防風伍錢　黃芪壹兩伍錢　白茯苓叁錢

白芍藥陸錢　五味子貳錢

右每服二錢水煎服

滋陰腎氣丸　治神水寬大漸散昏如霧露中行漸覩空中有黑花視物二體久則光不收及內障神水淡白色者

熟地黃叁兩　當歸尾　牡丹皮

五味子　乾山藥　柴胡各伍錢

茯苓　澤瀉各貳錢半　生地黃酒炒肆兩

右為末煉蜜丸如桐子大辰砂為衣每服十丸空心滾湯化下

為熱黃連湯　治內障有翳發花除

黃芩　黃連　大黃（各…）
柴胡（各壹兩）　升麻（伍錢）　龍膽草（叁錢）
右每服一錢水煎食前服
千金補肝散　治目失明
青羊肝（壹具去膜薄切以新瓦上炙乾）　決明子（壹錢半）
蓼香（壹合熬令香）
右為末每服方寸匕日二服久而有驗
局方菊睛丸　治肝腎不足眼花昏暗
枸杞子　肉蓯蓉（酒浸）　巴戟（去心各壹兩）
甘菊花（肆兩）

右為末煉蜜丸梧子大每服十丸空心白湯送下
眞珠膏　專治眼病久不差眩暗不見物
眞珠末（細研）　甘菊花（為末）　香豉（炒黃為末）
井泉石（細研各貳錢半）
右件勻用白蜜壹合鯉魚膽壹枚同藥慢火熬成
膏入好龍腦壹錢同拌勻每用少許時時點眼中
熟地黃散（見前）
雀盲　千金治雀盲方
地膚子（伍兩）　決明子（壹升）
右為末煮米飲和丸每服二三十丸

世傳方　治雀盲
蒼朮（米泔浸去皮切片焙乾）
右為末豬肝貳兩批開摻藥在內用麻絲紮定以
粟米壹合水壹碗砂鍋內煮熟熏眼候溫臨卧每
服叁錢大効
聖惠方　治雀盲不計時月用蒼朮壹兩為末每服
壹錢
復明散　治小兒每至日暮即不見物乃雀目也
蒼朮（米泔浸剉去皮切片焙乾貳兩）　穀精草（壹兩）
地膚子　決明子　黃芩（各半兩）

右件搗羅為細末每服壹錢水捌分入荊芥少許
煎五分去滓溫服食後
眼白多　初虞世曰眼白多多屬虛山茱萸丸主之
山茱萸（貳兩）　熟地黃　牡丹皮
牛膝　茯苓　澤瀉（各壹兩）
鹿茸（半兩）
右為末煉蜜丸如梧子大食後鹽湯下一二十丸
解顱　一小兒白睛多吐痰發搐先用抑青丸四服而痰
搐止後用地黃丸年許而黑睛多　一小兒白睛多
三歲不能行語聲不暢兩足非扶執則令大便不實調

用補中益氣湯加五味子乾山藥以補脾肺夕用地
黃丸加五味子牛膝鹿茸補肝腎不三月而瘥 一
小兒眼白睛軟附足熱面似愁容服地黃丸兩月餘
漸從服年餘白睛漸黑出嬰童百問

通睛 湯氏牛黃丸 治小兒通睛皆因失墜築打觸
着頭面額角兼倒撲令兒肝受驚風遂使兩目閗
睛名曰通睛宜服此

牛黃　白附子炮　肉桂
全蝎　芎藭　石膏各壹錢
白芷　朱砂研各貳錢　藿香半兩

麝香壹分

右爲末煉蜜丸如芡實大三歲巳下每服壹丸薄
荷湯下乳食後忌油麵豬肉

眼劄 一小兒雀盲眼劄服蘆肝丸而目明服四味
肥兒丸而目不劄 一小兒發搐目劄屬肝膽經風
熱先用柴胡清肝散治其肝後用地黃丸補其腎而
愈 一小兒因驚眼劄或搐先用加味小柴胡湯加
蕪荑黃連以清肝熱又用六味地黃丸以滋腎生肝
而痊 一小兒兩目連劄或色赤或時拭眉此肝經
風熱欲作肝疳也用四味肥兒丸加龍膽草而瘥

[illegible]

目直

目動 見兒驚搐門

胎黃 見初生門

小便不通

【曾】嬰兒小便不通者有陰陽二證陰閉者爲冷濕乘虛入裏因而不通名曰陰閉以白芍藥湯加南木香及用炒鹽以絹帕兜令帶熱熨臍四圍併投五苓散入靈砂末鹽湯空心調服其効尤速陽閉者因暴熱所逼澁而不通名曰陽閉又有癃則與淋不同內經宣明五氣篇曰膀胱不利爲癃 註 癃者乃內臓氣虛受熱壅滯宣化不行非澁非痛但閉不通腹脹緊滿但以㕮咀五苓散加車前子燈心之類及投木通散玉露飲益元散皆可用之或貼蠃豉餅於臍上取効

又痾陰陽二證悉能療之併與爲安飲尤妙【薛】東垣云小便不利有在氣在血之異夫小便者足太陽膀胱之所主長生於申申者金也金能生水肺中伏熱水不能生是絕小便之源也治法用清燥金之正化氣薄之藥茯苓豬苓澤瀉琥珀燈心通草車前瞿麥萹蓄之類皆爲淡滲能泄肺中之熱而滋水之化源也若不渴熱在下焦是熱澁其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之二者之病一居上焦在氣分而必渴一居下焦在血分而不渴血中有濕故不渴也二者之殊至易分別耳竊謂前論若汗流偏滲於腸胃大便瀉利而小便澁少者宜分利若熱蘊於下焦津液燥而小便不行者宜滲泄若脾胃氣澁不能通調水道者宜順氣若乳母肝心二經有熱者用梔子清肝散肝經怒火者用柴胡梔子散若因父母曾服燥劑而致者用四物麥門甘草數劑血虛者用四物加山茱萸黃蘗知母五味麥門肺虛而短少者用補中益氣加山茱麥門陰挺痿弱而頻數者用地黃丸熱結膀胱而不利者用五淋散脾肺燥不能化生者用黃芩清肺飲膀胱陰虛陽無以生而淋瀝

者用滋腎丸若膀胱陽虛陰無以化而淋瀝者用六味丸若因乳母厚味酒麵積熱者用清胃散五淋散仍參諸淋覽之　一小兒十四歲股體倦怠發熱晡熱口乾作渴吐痰如湧小便淋瀝或面目赤色躁不欲衣此稟賦腎虛陰躁也用補中益氣湯加減八味丸而愈　一兒五歲小便不利用五苓散分利滲泄之藥益加不通小便陰囊漸腫先兄用前藥復損眞陰也用六味丸料加牛膝肉桂車前子佐以補中益氣湯而痊　一兒八歲先小便澁滯服五苓散益甚加木通車前之類腹脹吐痰加滑石海金砂而胸滿

陰臟衛身發汗余用六味丸間送滋腎丸而痊此證
稟受氣所致其作濕熱痰氣治之而歿者多矣。一
兒八歲先因小便黄赤服五苓導赤等散後患便血
余以為稟賦虚熱也用六味丸及補中益氣湯而痊

錢捻頭散　治小便不通
玄胡索　川苦楝各等分
右同為細末每服半錢或一錢捻頭湯調下量大
小多少與之食前服

木通散　治心經熱小便不通喘叫
木通壹兩　牽牛子炒半兩　滑石壹兩
右為末燈心葱白水煎服

冬葵子散　治小兒腹急悶
冬葵子壹兩　木通半兩
右為末每服壹錢水煎

張葵石散　治小便不通悶亂者
葵根壹握　滑石　木通各壹兩
牽牛子半兩炒
右件搗為麤末每服壹錢以水壹大盞入燈心葱
白各少許煎陸分去滓放溫服乳食前

車前散　治熱盛積於小腸此則尿血

牡蠣半兩　車前子　甘草炙各壹分
川朴硝各壹兩
右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小盞煎至五
分去滓溫服不拘時量兒大小加減

芎黄散　治臟腑有熱小便赤大便不通
芎藭壹兩　川大黄炒　郁李仁湯浸去皮炒
右件搗羅為散每服壹錢以溫水調下量兒大小
加減

朱砂丹　治證仝前
朱砂細研水飛　續隨子各半兩　膩粉壹錢
右件藥都研令勻煉蜜和如黍米大每服七粒以
溫水下量兒大小加減乳食後

朱砂散　治心神煩躁小便赤澁不通
朱砂壹兩研細另　滑石　犀角屑各半兩
黄芩　甘草炙微赤　車前子各半錢
右件藥搗羅為散入朱砂同研勻每服半錢煎竹
葉湯調下食前

錢白芍藥散見前　五苓散見驚
玉露飲　益元散

清肺散　治渴而小便閉或黃或澁

五苓散加琥珀半錢　燈心

一　通草　車前子各貳錢　瞿麥半錢

木通　萹蓄各壹兩

右爲麤末每服參錢水煎食前服

八正散　治蘊熱咽乾口燥大渴引飲心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼或咽舌生瘡小便赤閉或熱淋血淋

車前子　瞿麥　大黃麪裹煨

山梔　滑石　萹蓄

木通　甘草炙各壹兩

右爲末每服貳參錢入燈心水煎食前服

梔子仁散　治小便不通臍腹脹悶心神煩熱

梔子仁伍枚　茅根　冬葵子各半兩

甘草炙貳錢

右爲末每服壹錢水煎空心服

滋腎丸　梔子清肝散

柴胡梔子散即柴胡清肝散　三方並見發熱

淋

曾巢氏病源曰諸淋皆腎虛所致腎與膀胱爲表裏至水下入小腸通於胞行於陰而爲溲腎氣通於陰下流之道也淋有五名曰冷曰熱曰血曰石各具于後　膏淋見小便有肥脂似膏而浮於小便之上此腎虛不能制其肥液而下行也　冷淋先戰慄而後小便此亦腎虛而下焦受冷冷氣入胞與正氣交爭故小便澁而戰慄　熱淋下焦有熱熱氣傳於腎流入於胞其溺黃多而澁間有鮮血而同來者

血淋熱之極也心者血之主外行經絡內行臟腑熱盛則失其常道心與小腸爲表裏故下流而入於胞則爲血淋　石淋腎主水水結則化爲石腎爲熱所乘遇小便則莖中痛不得流利痛引小腹則沙石從小便出甚至寒痛令人昏悶遍身有汗而後醒此痛之使然蓋五淋者雖曰腎虛所致然小腸爲受盛之府氣通於膀胱膀胱爲津液之府氣通於腎餘化下流而不通皆曰腎氣不足熱入膀胱水道澁而不利出入起數臍腹急痛蘊作有時或如豆汁膏血並以局方五淋散下龍腦雞蘇丸自然平愈及香薷丸補

腎地黄丸與之〔[illegible]〕蓋夫小兒諸淋
腎與膀胱熱也二經相爲表裏俱主水道水入小腸
下行於胞則爲溺若膀胱熱則津液内涸水道不通
腎氣熱則小便淋瀝或少腹引臍而痛夫淋有五石
淋者腎熱化石内塞水道痛引膀胱氣淋者肺氣壅
熱小腹脹滿小便澀滞熱淋者三焦有熱傳入腎膀
胱流入于胞小便赤澁血淋者心熱血散失其常經
溢滲入胞寒淋者膀胱氣冷與正氣交爭寒戰氣解
是也亦有因妊母肝熱及乳母恚怒者當分五臟蓄
熱治之若心藏有熱者導赤散加黄連肝藏有熱者

柴胡梔子散大便不通瀉青丸脾藏有熱者瀉黄散
脾氣不足者異功散脾氣下陷補中益氣湯肺藏有
者瀉白散肺氣虚熱異功散加炒黒山梔腎藏有熱
者地黄丸或因乳母肝經熱者用梔子清肝散恚怒
者用柴胡清肝散乳母厚味者用加味清胃散心小
腸熱者用清心蓮子飲或兒早近色慾小便澁滞或
作痛及更衣後大小便牽痛者皆屬肝腎不足也用
六味地黄丸補中益氣湯加牛膝車前肉桂木應當
參五臟所勝不可輕用滲泄寒凉之藥大損胃氣仍
參前小便不通證覽之　一小兒小便不通服五苓

之類不應須用[illegible]肝腎虚熱也用四物
山梔及地黄丸而愈後[illegible]誤汗小便仍不利余
用補中益氣湯加麥門五味而安　一小兒小便不
利莖中澁痛時或尿血此禀父腎熱爲患也先用五
淋散以疎導又用滋腎丸地黄丸補肝腎漸愈後出
痘色紫小便短赤細間有血或赤或白用補中益氣
湯六味地黄丸煎服並愈　一男鄭應使之子年十六
初生七箇月患淋病五七日必一發其發則大痛水
道狀如黍如粟者約[illegible]許然後定診其脉輕則濇
重則弦視其形瘦而長其色青而蒼意其父必因多

服下部藥遺毒在胎留於子之命門而然遂以紫雪
和黄蘗末丸桐子大曬極乾煎湯下百丸以食物壓
之又半日痛大作腰連腹水道乃行下如黍如粟者
一大碗許其病減十分之八後又以陳皮壹兩桔梗
木通各半兩作一服與之又下如黍粟者一合許而
安父得燥熱且能病子況母得之者乎予書此以證
東垣紅瘤之事此亦熱在血分也

五淋散

赤茯苓去皮　赤芍藥炒　山梔子去殼
甘草生　當歸去蘆　黄芩炒

車前子（炒） 淡竹葉 燈心
木通去皮節 滑石水飛 葵子
葶藶炒
右㕮咀用葱白[illegible]莖水煎入車前草杵擣取汁用
五苓散調化食前服或硝石末調化服 白淋白
茅根燈心煎湯服 有氣淋小腹脹滿尿後有餘
瀝木通煎湯服 熱淋小便赤而淋澀臍下痛新
水煎服或黃芩煎湯服 石淋莖內痛尿澀有砂
石令人悶絕滑石膩紙包焦爲細末葵子煎湯服
局方五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不出或

尿如豆汁或成砂石或如膏或熱怫便血
赤茯苓陸錢 當歸 甘草各伍錢
赤芍藥 山梔子各貳錢
右㕮咀每服叄錢水壹小盞入燈心煎服
導赤散 治小兒血淋
生地黃 木通各貳錢 黃芩
甘草生用各壹錢
右爲末每服壹錢井水入燈心煎服仍以米飲調
油髮灰空心灌下
葵子散 治小兒諸淋

葵子 車前子 木通
桑白皮炒 瞿麥 赤茯苓
山梔子 炙甘草各等分 右水壹盞煎服
香芎丸 治諸淋澀若患風則尤効
淨香附炒去毛 川芎 赤茯苓去皮 各半兩
海金沙 滑石 枳殼
澤瀉 石葦 檳榔 各
右剉曬爲末糯米粉煮爲糊糊丸麻仁大每服三
十三丸至五十五丸或七十七丸並川麥門冬熟
水空心送下若小便澁痛滴三五點者取流水用

火微溫入鹽少許調勻空心嚥下
木通散見驚
清心蓮子飲 治小兒上盛下虛心火炎上口苦咽
乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋並宜服之
黃芩 車前子 甘草炙
麥門冬去心 地骨皮各半兩 黃芪蜜炙
白茯苓 石蓮肉去心 人參各柒錢半
右剉碎每服伍錢水壹盞煎至六分去滓食前服
如發熱加柴胡薄荷
金沙散 治小便淋瀝不通

鬱金　海金砂　滑石
甘草各等分
右為末每服壹錢煎地膚子湯調下燈心木通亦
可
又方　冬瓜最治宿熱小便不通內熱口渴
立効散　治小兒諸淋不通莖中作痛
木通　甘草　王不留行
胡荽　滑石　海金砂
山梔子　檳榔各等分
右每服壹錢水煎

治血淋神効方
紫草　連翹　車前子各等分
水煎服
又方
海螵蛸　生地黃　白茯苓
右等分為末柏葉車前草煎湯調下
治氣淋
赤芍藥壹兩　檳榔壹箇麪裹煨
右為末燈心同棗子煎湯調下
滑石散　治小便淋澁痛悶

石燕燒醋淬細研　瞿麥　滑石各壹兩
木通　海蛤
右件搗羅為細末煉蜜和如黍米大每服拾粒以
葱白湯下食前量兒大小加減
石韋散　治諸淋澁水道中痛臍下妨悶
石韋去毛壹兩　冬葵子　木通剉
赤茯苓各半兩　車前子　瞿麥
榆白皮　滑石　甘草各貳錢半
右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小盞入葱白
五寸煎至五分去滓溫服如人行十里再服量兒

大小加減
葵子散　治腎熱水結化為石淋甚者水道中澁痛
不可忍
冬葵子壹兩　石楠　榆白皮剉
石韋去毛　木通剉各半兩
右件藥搗羅為散每服半錢以葱白湯調下日二
服量兒大小加減
滑石散
滑石　栝蔞根　石韋去毛各半分
右件藥搗羅為散每服半錢煎大麥飲清調下日三

二服量兒大小加減

蒲黃散　治膀胱熱甚血淋水道澁痛

蒲黃　冬葵子　生地黃各半兩

右件藥搗羅為細末每服壹錢以水壹大盞煎至陸分去滓溫服量兒大小加減

遺尿

原病式云遺尿不禁者冬冷内經云不約為遺溺仁齋曰小便者津液之餘也腎主水膀胱為津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿睡裏自出者謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也以雞腸散主之亦有熱客於腎部干於足厥陰之經挺孔鬱結極甚而氣血不能宣通則痿痺而神無所用故液滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁也　薛氏用六味地黃丸脾肺氣虛者

用補中益氣湯加補骨脂山茱萸　曾氏謂乃心腎傳送失度小腸膀胱關鍵不能約束有睡夢而遺者皆是下元虛冷所致亦因禀受陽氣不足用三因方家韭子丸治之及參苓白朮散補腎地黃丸然又當實土以存水乃免滲泄之患所謂補腎不如補脾是也平胃散倍加益智仁剉碎薑棗燒鹽煎空心溫服

雞腸散

雞腸一具男用雄雞女用雌雞炙　牡蠣

茯苓去皮　桑螵蛸炒各伍錢　桂去粗皮

龍骨各貳錢半

右為極細末仍以雞肶胵壹具雞腸壹具燒存性
研極細末每用前藥末壹錢用温酒調化食前服

張雞腸散　治因膀胱有熱服冷藥過多小便不能
禁止或遺尿病
雞腸草　　龍骨　　麥門冬去心
白茯苓　　桑螵蛸　　牡蠣粉各半錢
右件㕮咀每服壹錢水壹小盞入生薑少
許棗壹枚煎至陸分去滓温服量兒大小加減
按此與前方名一方而傳寫之訛竊詳用鷄腸較
是而張氏婁氏薛氏皆主用草今兩存之

遺尿

益智丸　治脾腎虛熱心氣不足遺尿白濁
益智仁　　茯苓　　茯神各等分
右為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心白滾
湯下

破故紙散　治膀胱虛冷夜間遺尿或小便不禁
用破故紙為末每服壹錢熱湯調下
又方　破故紙炒為末黃蘗湯調下
外臺療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄雞肝等分搗
丸如小豆大温水下日三服
初虞世治小兒遺尿以益智仁壹合去心不去殼試石

入鹽一小撮同炒黃色用水二鍾煎至半鍾空心
服之累效
三因家韭子丸方見諸病便不禁

尿白便濁

仁齋曰小兒尿白如米泔狀由乳哺失節有傷於脾致令清濁不分而色白也久則成疳此亦心膈伏熱兼而有之令嬰兒亦小便初出微赤良久白濁者乃熱疳之邪也初出黃白久白濁者乃冷疳之候也冷者益黃散主之熱者牛黃丸主之冷熱者蘆薈丸主之純下白濁者厚朴丸主之諸失津液欲成疳而小便白者茯苓散主之　薛氏曰小便如泔或良久變白亦有脾虛食積濕熱下注者先用茯苓散五七服

次用四味肥兒丸若乳食少思或肚腹脹大小便頻數此脾虛元氣下陷也朝用五味異功散夕用四味肥兒丸若肥體色黃小便不調髮黃脫落鼻下瘡痍嗜土少食大便青褐者用梔子茯苓湯仍審其乳母飲食七情治之　一小兒發熱懶食小便良久變白余用四味肥兒丸即愈或誤以為積熱用清涼祛逐之劑形體瘦弱虛證悉至小便如疳用補中益氣湯及四味肥兒丸而愈　一小兒面色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食少思小便澄白大便不實此脾疳之證也用四君子加山梔蕪荑兼用四味肥兒丸而愈

一小兒白濁兩耳內耳外生瘡膿水淋漓用大蘆薈丸而愈後遍身如疥肌體消瘦發熱作渴大便酸臭小便白濁用九味蘆薈丸五味異功散而愈　一小兒白濁發熱口乾體瘦骨立余謂腎經虛羸朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸而愈後兩目或生白翳面黃浮腫小便仍白此變肝脾疳證用四味肥兒丸月餘漸瘥

益黃散 方見吐瀉　　牛黃丸 方見疳積

蘆薈丸 方見諸疳

厚朴丸　治小兒小便白濁久則黃瘦不長肌肉

史君子 煨去殼　厚朴 製　黃連 各壹兩

木香 叁錢

右為末蒸餅糊丸桐子大每服壹貳拾丸米湯下

茯苓散　治乳食傷脾或心經伏熱小便白濁

三稜 煨　蓬莪茂 煨　砂仁

赤茯苓 各半兩　青皮　陳皮

滑石　甘草 各壹錢半

右為末每服壹錢燈心湯調下

三稜散　治小兒尿白久則成疳宜補脾消食化積

三稜 炒　蓬莪茂 炒各　益智仁

甘草　神麴炒　麥芽

橘皮各半兩

右爲末每服一錢白湯調下

清心蓮子飲見前

又方　用大甘草頭煎湯服

梔子茯苓湯即大蕪荑湯方見前

香砂丸　治嬰孩小便白濁

香附子炒去毛　縮砂去殼各錢三　三稜煨

蓬莪茂煨　陳皮　麥糵炒

蘆薈各錢半

右爲極細末煮麪糊丸如黍米大用米飲鹽湯食

前服

疝

曾按內經大奇論曰腎脉大急沉肝脉大急沉皆爲疝證心脉搏滑急爲心疝肺脉沉搏爲肺疝蓋疝者寒氣結聚之所爲故令臍腹絞痛者是也又巢元方曰諸疝者陰氣積于內復爲寒氣所傷榮衛不調二氣虛弱風冷入腹而成故脉經云急者緊也緊則爲寒爲實爲痛血爲寒泣積則爲瘕氣爲寒聚則爲疝皆因本臟氣虛外感於寒濕內傷於生冷遂使營瘕絞刺激搏而痛無有定處倉卒之際不堪忍者謂之疝也並宜先用五苓散沸湯調服和解輕則但以白芍藥湯烏梅散鉤藤膏爲治重者金茱丸散氣丸未有不愈也　仁齋　癩疝者陰核氣結腫大而釣痛也多因小兒啼怒不止動陰氣故陰氣下擊結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣閉亦變此證惟是陰氣不得流行加以風冷入焉白朮聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其狀有如李者亦有稀軟者亦有升腎腫大者亦有大硬者臍下痛楚皆不能忍用藥行心氣逐腎邪利其大小二便則無補法　閻　小兒陰疝癩疝氣者多爲肝腎氣虛及坐

卧寒濕之地或風邪所傷血氣相搏或啼叫氣逆水
道不行或禀父肝經虚熱或姙娠肝氣鬱結或乳母
怒動肝火而致者若兒肝經熱用梔子清肝散兒啼
躁怒用匀氣散乳母恚怒用柴胡清肝散肝火氣逆
用加味逍遥散小腹作痛小便澁滯用龍膽瀉肝湯
久坐冷地小便不利用四苓散加柴胡山梔車前子
不時寒熱者加味小柴胡湯經云肝氣熱則莖痿宗
筋弛縱腎莖腫脹或出白液痒痛或裏急筋縮挺縱
不收或精隨便下者此名筋疝俱屬肝火不係於腎
宜詳治之

茱萸内消丸　治小兒陰㿗偏大上攻臍腹疞痛膚
囊腫脹或生瘡瘍時出黄水

川楝子 炒壹兩半　大腹皮　五味子
海藻 洗　玄胡索 [illegible]　桔梗
青皮　山茱萸 [illegible]　木香 [illegible]錢半
蘹香 炒　桂心　川烏頭 炮去皮臍
吳茱萸　桃仁 另研炒　食茱萸 各伍錢

右為細末酒糊為丸如麻子大每服叁拾丸空心
温酒送下

當歸散　治小兒㿗疝

牽牛 [illegible]　辣桂 [illegible]半兩　當歸
大黄 [illegible]　全蝎 [illegible]錢半　桃仁 [illegible]

右剉碎每服三錢水一鍾入蜜半匙煎至五分食
前服以利為度

川楝丸　治小兒㿗疝小腹痛引腰脊攣曲身不能
直

木香　檳榔　三稜
蓬莪茂 [illegible]　陳皮 去白
川楝肉 [illegible]　辣桂
牽牛 [illegible]錢　巴豆 [illegible]

右為細末飛麵糊為丸如麻子大每服叁丸空心
用生薑湯送下

五苓散 方見驚搐

當歸芍藥湯　治冷疝腹痛及誤汗誤下即壞證傷
寒是也並宜先服次投剉散之劑

白芍藥 壹兩半　澤瀉 去粗皮 壹錢半　甘草 炙 貳錢
薄桂 去粗皮 壹錢半

右件㕮咀每服貳錢水壹盞煎柒分空心温服誤
汗誤下加人參南木香各貳錢臍下痛入生薑葱
鹽同煎或加鈎藤亦好

烏梅散 治腹疼及初生嬰孩臍下冷痛疝氣等疾

烏梅 去核 玄胡索 粉草 半生半炙 各伍錢

乳香 沒藥 鈎藤 各貳錢半

右件㕮咀每服貳錢水壹盞半煎柒分空心溫服

金鈴散 治疝氣腹痛投諸藥後痛而復作宜服

金鈴子肉 壹錢 三稜 煨剉 莪蒁 煨剉

青皮 去白 陳皮 去白 各[illegible] 赤茯苓 去皮

蘹香 各半兩 南木香 貳錢 甘草 炙 半錢

檳榔 [illegible] 枳殼 麩炒 [illegible] 鈎藤 [illegible] 錢

右除檳榔木香不過火餘剉焙仍同檳榔木香為

末每服半錢至壹錢仍用炒蘹香煎無灰酒空心

調服不飲酒者煎炒蘹香湯調下

鈎藤膏 方見夜啼

金茱丸 治冷疝氣痛及膚囊浮腫

金鈴子肉 伍兩 家園茱萸 半兩

右研末酒煮麵糊丸麻仁大每服三十丸至五十

丸空心溫鹽湯下溫酒亦可兒小者丸粟粒大丸

數下法同前

散氣丸 理諸疝氣小便利或不通臍下作痛不可

忍者

海藻 [illegible] 澤瀉 [illegible] 蘹香 炒

車前子 焙 葫蘆子 [illegible] 川楝肉 [illegible]

[illegible] 大腹皮 [illegible]

右剉焙為末酒煮麵糊丸粟米大每服叁拾丸至

五拾丸南木香煎酒空心下或防風牡川皮煎酒

下不能飲者於木香湯防風川皮湯中各少入酒

並空心投亦可再用鹽炒蘹香煎湯尤妙

[illegible]湯 治小腸疝氣家傳妙方

芫花 [illegible] 木香 檳榔

三稜 各半兩 茯苓 青皮

全蝎 桂枝 附子

硇砂 各貳錢半

右為末將硇砂浸澄去土頓在湯瓶上候成膏子

和糖醋打麵糊為丸如豆大每服叁拾丸空心溫

酒下未效再服

勻氣散 主調補通利後及冷疝腹痛氣滯不和

桔梗 貳兩 [illegible] 陳皮 [illegible] 縮砂仁

蘹香 各半兩 白豆蔻 [illegible] 錢 粉草 [illegible]

右剉焙為末每服半錢或壹錢空心沸湯調服冷

疝腹痛燒鹽湯調下

木香飲　治小兒小腸氣痛

川楝肉（拾箇巴豆拾五粒去殼同炒令黃去巴豆）　玄胡索（半兩醋）　南木香（二錢）　史君子（去殼）

右為極細末用少許食前調服

梔子清肝散　柴胡清肝散（二方並見發熱）

龍膽瀉肝湯　治肝經濕熱不利下部生瘡兩拗腫痛或腹中作痛小便澁滯等證

龍膽草（酒拌炒黃）　澤瀉　車前子（炒）

木通　生地黃（酒拌）　當歸（酒拌）

山梔　黃芩（炒）　甘草（各等分）

右水煎食前服

四苓散即五苓去桂

小柴胡湯（方見發熱）

陰腫

全嬰方云小兒陰腫核腫者由兒啼怒氣逆不順乘虛而行陰核偏大又因甘肥不節生冷過度致生疳氣氣結不行流入陰中或傷著毒或觸風邪使血氣與邪氣相搏停結不散則成陰腫也　仁齋云若腎經氣虛或坐石不起冷氣凝之或近地經久風邪濕氣傷之不為陰腫幾希矣間有啼叫怒氣閉繫於下結聚不散加以水竇不行亦能發為此疾治用桃仁丸主之丹溪謂脫囊腫大墜下不收用紫蘇莖葉為末水調荷葉包之一人傳此方用野白紫蘇為末濕則摻之乾則香油調傅雖皮潰子墜皆有神効此用紫蘇蓋亦同功也　曾氏元方論曰諸筋會于陰器邪客於厥陰少陰之經與冷氣相搏則陰囊腫痛而引縮經中雖分四證曰腸𤸷氣𤸷水𤸷卵𤸷然小兒患此若治之不早則成痼疾如腰曲腹痛冷汗自出而陰囊二子吊縮入腹痛止方出名為內吊用川烏梅散匀氣散金茱丸金鈴散為治　有陰莖全縮不見有陰囊光腫不痛此因肝腎氣虛宜以橘子仁煎湯調下金鈴散匀氣散皆可投之內經曰𤸷疝瘕脹

者陰亦盛而脉脹不通故曰㿉疝由是觀之乃陰氣盛而致有此弔縮者筋急也筋遇寒則引縮遇熱則弛張故三因所用方法以寬小腸氣疎風為治然小兒此證多因坐陰濕之地感風濕而得用當歸散加檳榔蒼朮木香煎服并青木香湯鈎藤膏外以立消散傅之　有外腎無故而腎囊腫大不燥不痛光亮如吹此名氣虛所致以匀氣散調治三因方家韭子丸主之　一證外腎腎囊赤腫通明及女兒陰戶腫脹乃心熱之所傳皆以木通散導赤散為治或用薏苡仁煎湯調五苓散及以外消散傅之併投天花散用無灰酒煎下不能飲者水煎少入酒同服亦好

張渙曰小兒足少陰之經虛而受風邪者衝於下經則成陰腫病桃仁丹主之

桃仁丹

桃仁 壹錢半湯浸去皮尖雙仁者麩炒微黃　牡丹皮

白蒺藜 微炒去刺　桂心 各半兩　郁李仁 貳錢半湯浸去皮微炒

右件藥擣羅為細末煉蜜和黍米大每服拾粒以溫酒下乳食前量兒大小加減　亦可水煎服

胡連散　治陰腫生瘡

胡黃連 去鬚　胡粉 研　白礬 煆錢半

右擣羅為細末每用少許以生油調塗患處

湯小兒陰腫由啼叫怒氣閉縱於下成此疾宜

海蛤散

海蛤 叁錢　茴香 炒半兩　薏苡仁

白朮　檳榔 各一

右為末食錢溫酒調下大小加減

桃仁丸

桃仁 去皮尖炒叁錢　桂枝 去皮　牽牛 炒取頭末

蒺藜　牡丹皮 各貳錢

右為細末煉蜜丸如黍米大用青皮木香葱白入鹽少許同煎湯食前服

三白散　治小兒解初中腫疾四肢痾囊浮脹大小便不利皆因膀胱蘊熱風濕相乘

桑根白皮 炒　白朮　木通 去皮節

陳皮 去白　白牽牛 半生半炒　甘草 炙各伍錢

右㕮咀用水煎食前服

丹 腹囊即外腎腫大

木通　甘草　當歸

黃連　黃芩　右水煎服

蚯蚓散 治腎囊腫硬或痛用乾蚯蚓為末唾調
傳常避風冷濕地（先用葱椒湯洗後用此藥避風處）
又治小兒囊腫如升用甘草煎汁調地龍末塗之立
退累効
傳藥方
牡蠣粉（二分） 乾地龍（末一分）
右用津唾調敷外腎熱者雞子清調敷
牡蠣散 治小兒外腎腫大莖物通明
用牡蠣粉研十分細先以唾津塗腫處次以牡蠣
粉摻
又方 治小兒卵腫研桃仁唾調敷

烏梅散 匀氣散
金朱丸 金鈴散（方並見疝）
當歸散（見痲）
牡蠣大黃湯 治三五歲小兒感受溫濕之氣侵襲
膀胱致陰莖腫囊浮腫作痛
牡蠣（用熟黃泥包裹火煅透出地上候冷用）
大黃（紙裹水浸透煨過候各二兩）
右剉研為末每服壹錢無灰溫酒空心調服不能
飲者溫湯調少入酒同服

青木香湯 治小兒陰莖無故而腫或痛縮因陽明
經有風熱濕氣相搏故當宜此 經行愈蓋陽明
受病不能養其宗筋故也咳嗽痰喘亦宜服之
青木香（去蘆） 枳殼（去瓤麩炒） 甘草（炙各錢半）
右每服貳錢水壹盞煎七分不拘時溫服
立消散 治膀胱久受熱毒致陰囊腫裹亦腫脹痛
赤小豆 赤芍藥 生枳殼
商陸 風化朴硝（各等分） 入
右件不過火剉曬為末稻枝煎湯候冷調貳錢或
參錢塗腫處仍服㕮咀五苓散加車前子薏苡仁

水煎
木通散（見疝）
天花散 治外腎腫囊腫痛
天花粉（去皮） 甘草（炙錢半）
右剉每服貳錢無灰酒壹盞煎七分空心溫服不
能飲用水煎少入酒同服

偏墜

治小兒狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛拾肆枚
熬焦桂枝半兩二物爲散每服八分日再酒調下蜜
丸亦通

黑散

黃連　黃芩　大黃
黃檗各貳錢

右同燒存性爲極細末雄豬膽汁蜜同調傅

偏墜亦宜防葵丸令兒坐於土中午時灸印下偏墜
之處七壯防葵丸未詳

小兒偏墜若非胎中所有在後生者於莖下腎囊前
中間弦子上灸七壯立愈

小兒胎產癩卵偏墜　囊縫後十字紋上灸三壯春灸夏差
又灸
灸差

陰瘡

臘茶散　治小兒陰囊生瘡汁水出久不瘥

臘茶　五倍子各等分　膩粉少許

右爲末先用甘草湯洗後用香油調敷

一方　治陰囊生瘡疼痛

右先用川椒荊芥槐枝柳枝蛇床子煎湯洗後用
朴硝爲末雞子清調敷

一方　治陰生瘡濕不乾

右用烏鰂魚骨爲細末乾摻患處

一方　用紫蘇葉煎湯淋洗及作細末摻之妙

一方　治小兒陰生瘡不乾

右用輕粉密陀僧爲末摻之如痒加山梔子訶子
燒存性研同前藥爲末先將米泔水洗淨然後敷
占七灸

不寐

內經曰陽明胃脉也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也又曰胃不和則臥不安夫人身之衛氣晝則行於陽夜則行於陰陽主動陰主靜寤則魂魄志意散於腑臟發於耳目動於肢體而為人身指使之用寐則神氣各歸五宮而為默運之妙矣若脾胃氣盛則腑臟調和水穀之精各各融化以為平和之氣若胃氣一逆則氣血不得其宜腑臟不得其所不寐之證由此生焉當用四君遠志酸棗仁肝腎虛熱者六味丸心血不足者真珠母丸思慮過度者歸脾湯精神短乏者人參養榮湯病後餘熱者酸棗仁湯膽虛不得眠者人參竹葉湯肝火不寧者加味小柴胡湯驚悸不得眠者四君生薑酸棗仁夜啼驚哭不寐各詳別證當參求之

仲景酸棗湯 治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁 炒壹錢 甘草 知母 炒
茯苓 芎藭 生薑 各伍分

右水煎服

本事鼈甲丸 治膽虛不得眠四肢無力

鼈甲 酸棗仁 羌活
黃芪 牛膝 人參 各壹兩
五味子 五錢

右為末煉蜜丸梧子大每服三四十丸溫酒下

聖惠治骨蒸勞煩心不得眠用酸棗仁弍錢水煎熟下地黃汁一蛤蜊殼服之

本事真珠母丸 治肝膽二經因虛內受風邪臥則魂散而不守狀若驚悸

真珠 [illegible] 當歸 熟地黃 各壹兩半
人參 酸棗仁 炒 柏子仁 各壹兩

犀角屑 茯神 沉香
龍齒 各半兩

右為末煉蜜丸小豆大辰砂為衣每服二十丸白湯下日午夜臥各一服

人參竹葉湯 治虛煩不得眠

人參 竹葉 甘草 各弍錢
半夏 小麥 麥門冬 各壹錢

右每服弍錢薑弍片粳米一撮水煎服

人參養榮湯 見虛汗　歸脾湯 見驚悸

咽喉

心鑑咽喉爲一身之總要與胃氣相接呼吸之所從出若胸膈之間蘊積熱毒致生風痰壅滯不散發而爲咽喉之病喉内生瘡或狀如肉腐爲腫爲痛窒塞不通吐嚥不下甚則生出重舌治之尤宜先去風痰以通咽膈然後解其熱毒遲則有不救之患又有熱毒衝于上腭而生瘡謂之懸癰及腑寒亦能令人咽閉吞吐不利臨病詳審治之　咽喉之疾本傷熱毒上攻也四時受熱藏心腑之間一旦所觸上攻咽喉

所謂腎傷寒也然其證有单肉蛾雙肉蛾有重舌木舌痄腮有懸癰腫脹有裏外皆腫甚者上攻頭面皆腫大法先洗去口中舌上白胎其次掃去風涎如是单雙肉蛾可針則針有不可針者則用熏摻藥退後方依次用服藥如是木舌服藥之外仍用摻藥痄腮則用塗藥輕者但服藥而自退不須用針及藥點其瘡而自消也　醫小兒喉痺因膏粱積熱或稟賦有熱或乳母七情之火飲食之毒當分其邪蓄表裏與證之輕重經之所主而治之　若左腮色青赤者肝膽經風熱也用柴胡梔子散右腮色赤者肺經有熱也用瀉白散額間色赤者心與小腸經熱也用導赤散若兼青色風熱相搏也用加味逍遥散鼻間色黄脾胃經有熱也用瀉黄散若兼青色木乘土位也用加味逍遥散兼赤色心傳土位也用柴胡梔子散頦間色赤腎經有熱也用地黄丸凡此積熱内藴二便不通者當踈利之風邪外客而發寒熱者當發散之外感風邪大便閉結煩渴痰盛者當内踈外解若因乳母膏粱積熱者母服東垣清胃散若因乳母恚怒肝火者母服加味逍遥散稟賦陰虚者兒服地黄丸大槩當用輕和之劑以治其本切不可用峻利之藥以

傷真氣也　一小兒喉間腫痛驚悸飲水服驚風降火之藥益甚仍欲攻風痰余曰驚悸飲水心經虚證蓋胃爲五臟之本先用五味異功散以補胃加桔梗甘草以消毒諸證頓退後用牛蒡子湯加柴胡而愈

一小兒發熱引冷大便黄色手足並熱不能吮乳視口内無患捫其喉間則哭此喉内作痛乃脾胃實熱也用瀉黄清胃二散各一劑母子並服而愈後因乳母飲酒兒躁不安口内流涎仍用前二散而愈

一小兒喉間腫痛發熱咳嗽大便秘結此肝與大腸有熱也先用牛蒡子湯加硝黄一服大便隨通乃去

消黃再劑頓愈審其母有肝火發熱用柴胡清肝散
母子並服而痊
甘桔湯　治嬰孩感冒風熱火氣熏逼瘡瘩蘊毒上
攻咽喉腫痛痰氣不順咳嗽失音
人參去蘆半兩　桔梗蜜浸炒壹兩　甘草半生半炙叁錢
右剉散用水煎不拘時候服
立効散　治嬰孩小兒咽喉痺痛不能吞嚥
鵬砂　龍腦　雄黃
朴硝各半錢
右為極細末乾摻

吹喉散　治嬰孩咽喉腫痛氣塞不通
甘草生貳錢半　朴硝壹兩
右為極細末乾摻喉中如腫甚者用小竹管吹入
喉內
牛蒡湯　主傷風發熱煩躁鼻塞氣喘痰嗽驚啼及
諸瘡赤紫丹毒咽喉腫痛
牛蒡子叁兩略炒細研　大黃壹兩半　防風去蘆
薄荷去老梗各壹兩　荊芥去根梗肆兩　甘草壹兩壹錢半
右㕮咀每服貳錢水壹盞煎七分無時溫服
化毒湯　解風熱上攻咽喉腫痛飲食不便

桔梗剉炒半兩　薄荷葉　荊芥穗
甘草各貳錢半　山豆根取皮壹錢半以上五味俱為末
牙硝　鵬砂　朴硝
雄黃　硃砂各貳錢以上二味另研為末以上五
右五味焙為末五味研為末同一處再研勻每用
一字至半錢乾點舌上化下或以溫湯濃調少與
含嚥亦可
備急散　治小兒諸般骨哽咽喉腫痛
五倍子壹兩研　先春茶末半兩
右二味和勻抄壹錢溫湯半盞調化無時少與嚥

下依法服餌不過三五次即効如骨出或剌破處
血來多者鵬砂末陸錢水煎消毒散飲調服血止
痛住腫消食進
牛蒡子湯
牛蒡子炒杵　玄參　升麻
桔梗炒　犀角鎊　黃芩
木通　甘草各等分
右每服壹貳錢水煎
拔萃桔梗湯　治熱厥喉痺
桔梗炒　甘草炒　連翹

梔子炒　薄荷　黄芩各等分

右爲末每服壹貳錢水煎服

消毒飲　解急驚風毒赤紫丹瘤壯熱狂躁睡卧不安胸膈滿悶咽喉腫痛九道有血妄行及遍身瘡疥

牛蒡子除去　荊芥穗貳兩　甘草壹兩

右㕮咀每服貳錢水壹盞煎七分無時溫服

柴胡飲見瘡疹　東垣人參安胃散見吐利

三因玉鑰匙　九味蘆薈丸見疳

濟生犀角地黃湯見吐血　五味異功散見吐利

柴胡清肝散見發熱